

9 QL
457,4
H55X
v. 3
Ent.

MAGYARORSZÁG PÓK-FAUNÁJA.

A KIRÁLYI MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT MEGBIZÁSÁBÓL

IRTA

HERMAN OTTÓ

A MAGY. NEMZ. MUZEUM S. ÖRE, A K. MAGY. TERM. TUD. TÁRSULAT,
A BÉCSI CS. K. ÁLLAT- ES NÖVENYTANI TÁRSULAT RENDES, A DANZIGI TERMÉSZETVIZSGÁLÓK TÁRSASÁGÁNAK KÜLTAGJA stb.

III. KÖTET.

LEÍRÓ RÉSZ.

NÉGY KÖNYOMATU TÁBLÁVAL ÉS KÉT FÜGGELÉKKEL.

UNGARNS SPINNEN-FAUNA.

IM AUFTRAGE DER KÖN. UNGAR. NATURWISSENSCHAFTLICHEN GESELLSCHAFT

VERFASST VON

OTTO HERMAN

CUSTOS-ADJUNCT AM UNGAR. NATIONAL-MUSEUM,
MITGLIED DER KÖN. UNGAR. NATURWISSENSCHAFTLICHEN GESELLSCHAFT, DER K. K. ZOOLOGISCH-BOTANISCHEN GESELLSCHAFT IN WIEN,
AUSSWÄRTIGEM MITGLIEDE DER GESELLSCHAFT DER NATURFORSCHER IN DANZIG &c.

III. BAND.

BESCHREIBENDER THEIL.

MIT VIER LITHOGRAPHIRTEN TAFELN UND EINEM DEUTSCHEN ANHANGE.

BUDAPEST.

KIADJA A KIRÁLYI MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT.

VERLAG DER K. U. NATURWISSENSCHAFTLICHEN GESELLSCHAFT.

(1879.)

TARTALOM.

	Lap
Előszó	V
Általános tartalomjegyzék	VIII
I. A gyakorlatról	XIII
1. A gyűjtésről és fenntartásról	XIII
2. A vizsgálásról	XVI
II. A leírásokhoz	XVIII
LEIRÓ RÉSZ	1
I. Függelék : Kaszáspókok	325
II. Függelék : Német kivonat	333
Index	388
Magyar index	392

ELŐSZÓ.

A harmadik kötettel művem be van fejezve, a mi azonban távolról sem azt akarja jelenteni, hogy immár Magyarország pókfaunája is teljesen tisztába van hozva, hogy ahhoz többé sem szó, sem kérdés nem fér.

Az első kötet előszavában világosan kimondottam, hogy «e mű oly alapúl akar szolgálni, a melyből a részletes kutatás indulhat; és ha ilyen alapnak beválik, ezélját érte.»

Vajjon beválik-e ily alapnak? ennek megítélése másokra tartozik. Lesz-e kiindulópontja a részletes kutatásnak? nem tudom; de hogy ez ohajtásom, azt mondhatom.

Hogy a mű nem kifogástalan, azt nagyon is érzem; hogy még így is, a mint terveztettem, csonka, azt is tudom. Főbaja első sorban és minden bizonyynyal egy Iconographia hiánya, olyané, mely legalább az alrendek, családok és alcsaládok legjellemzőbb alakjainak képét a részletekkel együtt lehetőleg természetihíven visszaadná. Azt is érzem, hogy a mű nyelvezete nem kifogástalan; de már az úgy van, hogy az úttörés botlásokkal jár, kiváltképen pedig a szakirodalom terén van ez így. Az elemire nézve éppen úgy, mint a magaslaton is teljes tökéletesen más nemzetek szellemi termékeire rászorúlva, a szemlélődés körébe vont tárgyak hatásának kitéve, cserbe hagyatva a szavak forrása által, több teremtő erő kell ezeknek legyőzésére, mint a mennyi bennem van, ha ugyan van.

Megnyugvásom az, hogy egy megtisztelő megbízatásnak eleget tettem, tettem pedig úgy, a mint az tölem kitelt.

Most még némely más dolgokról is kell megemlékeznem.

Az első kötet bevezetésében kifejtettem a mű egész tervét. Ott két függelégről volt szó, melyek közül az egyik azoknak a fajoknak a bírálatát volt magába foglalandó, a melyekről, mint magyarországiakról, az irodalom megemlékezett. Én, művem tervéhez híven, ezt a munkát el is végeztem. Akadtak azonban oly körülmények, a melyek arra bírtak, hogy e függelékot ki ne adjam. Sikerült ugyanis időközben oly állatok birtokába jutnom, a melyekre irodalmi publicatiók alapíttattak; a felülvizsgálat azonban kimutatta, hogy azok az állatok semmi viszonyban sincsenek azokkal a nevekkal, a melyek alatt az irodalomban szerepelnek. A fajneveket lehet ugyan a synonymika segítségével szabatosítani; de nincs köszönet benne, mert a név alapján ráfogott névvé válik, mihelyt nem tartozik az adott állatra. Kitünt, hogy némely szerzők kizárólagosan csak a Hahn- és Koch-féle nagy műbe foglalt képekkel, még pedig egészen felületesen hasonlították össze állatjaikat s elnevezték, mi bizony ritka esetben elég-

séges. Úgy gondoltam tehát, hogy ezt a dolgot későbbre halasztom s abban a mértékben hajtom végre, a melyben a típusokhoz hozzáférhetek.

E helyett a függelék helyett, külföldi barátaim és szaktársaim kívánságának eleget téve, a harmadik kötetnek német nyelven írott kivonatát adom, mely az alrendek biológiai jellemzésén kívül, az alakok elterjedését, az új fajokat s némely érdekesebbeknek tüzetesebb méltatását foglalja magában.

Azonkívül még elszántam magamat arra is, hogy e kötetet egy, a gyakorlatra vonatkozó bevezető részszel lássam el, mely mindazoknak, a kik a tárgyat netalán megkedvelik, avval tüzetesebben foglalkozni ohajtanak, utasítást adjon mindazokra a fogásokra nézve, a melyek törekvésüket elősegíthetik.

Némely igazítások, pótlások úgy a jelentékenyebb sajtóhibák is, e kötet legutolsó lapján olvashatók.

Mindezek után még van valami mondani valóm, a mi nem a könyvre, hanem a szívre tartozik, a mit magamba fojtani nem bírok.

A művelődés története, és még inkább sok porlepte, elsárgult, hallgatag kézirat-halom bús történeteket mond azokról a boldogtalanokról, a kik egész valójukat — testi erejüket és szellemük legjavát — egy cél elérésére áldozták; kik megküzdöttek a nyomorral, a gúnnyal, a lenézéssel s eltűrték mindent, mert erős hitök volt, az: hogy jó a szándék s ha majd célt érnek, akkor, majd akkor megszűnik a nyomor, elnémúl a gúny, a lenézést pedig a tisztelet váltja föl. Sokan ezek közül nem a személyes dicsőségért, hanem a művelődés előmozdításáért, egy nemzet vagy éppen az emberiség előmeneteleért hevültek, és — elbuktak. Igen, mert összeütköztek az anyagi kérdés rideg valójával, kérlelhetetlenségével és legyőzettek. Irataikat, a melyekbe egész valójuknak legjavát tették le, belepte a por, megszállotta a moly; évek jöttek, évek teltek s átgázolt az idő embereken és eszméken, mert az emberek eszméikkel együtt elavultak, noha akkor, annak idejében, azok az emberek s azok az eszmék időszerűek voltak. Ez valóságos tragikum; annyival inkább az, mert ez a sors nem mindig a szegény nemzetek szegény fiait, hanem a gazdag nemzetek szegényeit is érte.

A midőn azon vagyok, hogy e művön az utolsó tollvonást megtegyem, ez a tragikum szemem előtt áll s megtanít arra, hogy mennyi hálával tartozom azoknak, a kik nem engedték meg, hogy az én sorsom is ilyen legyen. Nem tehetek másképen, mint hogy e helyen újból is köszönetet mondok a királyi magyar Természettudományi Társulatnak, úgy válaszmányának és állattani bizottságának is, az irántam tanúsított bizodalomért s jóindulatú türelemért. Legvégre pedig még köszönetet mondok a társulat másodtitkárának, Paszlavszky József tr. úrnak, úgy dr. Károli János barátomnak is a szöveg olvasására fordított fáradságért.

Kelt Budapesten, december 24-én, 1878.

HERMAN OTTÓ.

VORWORT.

Mit diesem Bande ist die Spinnenfauna Ungarns, richtiger ausgedrückt: ist dieses Werk abgeschlossen. Getreu der Erklärung, welche ich im Vorworte zum zweiten Bande abgegeben habe, finden meine verehrten auswärtigen Collegen u. z. im II. Anhange, pag. 333 eine Uebersicht der Spinnen Ungarns. Die einleitenden Worte dieses Anhanges bieten über meine Absichten wohl genügende Orientirung. Ich war bestrebt vor Allem ein Bild der bis jetzt bekannten localen Verbreitung der Spinnen, dann die neuen Arten, endlich einige eingehendere Bestimmungen und Notizen, welche sich besonders auf die Biologie beziehen, zu vermitteln.

Budapest, 24. December 1878.

OTTO HERMAN.

ÁLTALÁNOS TARTALOMJEGYZÉK.

I. KÖTET.

ÁLTALÁNOS RÉSZ.

	Lap
Előszó	IX—XX
Bevezetés	1— 7
Általános rész	9
I. Az irodalom	11— 36
1. Általános tekintetben	11— 14
2. Az ó- és középkor mutatóvanyai	14— 17
3. Az újkor irodalma	17— 21
4. Az irodalom jegyzéke	21— 36
II. Az alak és külső szervezete (Orismologia)	37— 52
1. Testrészek és szervek	37— 44
2. A test színének borítékai	44— 46
3. A fonó és szövőszervek külső alkata	46— 51
A fonó szervek	47— 48
A szövő szervek	48— 51
4. A külső alaknak ivarszerint való eltérései	51— 52
III. Az életmód jelenségei	53— 98
1. A kifejlődés	53— 55
2. A vedlések	55— 57
3. Csonkítások helyreépítése	57— 59
4. Tartózkodás	59— 60
5. Az alak és színezet	60— 63
6. Szövés-fonás (Műosztón)	63— 70
7. Lakások és építmények	71— 76
8. Táplálkozás	76— 80
9. Szaporítás. Nemzedékek sora	80— 85
10. Vándorlás. (Öszifonal)	85— 90
11. A pók a természet háztartásában	91— 98
12. Földrajzi elterjedés	98—119
Nevezetesebb lelhelyek	107—119

II. KÖTET.

A RENDSZER.

Előszó	V—VI
Általános bevezetés	3— 25
Speciális bevezetés	25— 42
Clerck rendszere	28

THORELL rendszere	35
SIMON rendszere	39
A rendszer	43— 73
A magyar póknemek sorozata	45— 47
Alrendek, családok és alcsaládok	48— 53
Kerekhálósok (Orbitelariae)	54— 56
Hurokkötők (Retitelariae)	56— 60
Csöszvők (Tubitelariae)	60— 64
Földbeszövők (Territelariae)	64
Keszegjárók (Laterigradae)	64— 66
Futók (Citigradae)	66— 68
Ugrók (Saltigradae)	68— 72
A pókműködés rendszere	74— 89
Hálózók	74— 84
Üldözők	84— 89
A biológiai rendszer összegezése	90—100

III. KÖTET.

LEÍRÓ RÉSZ.

Előszó	V
I. A gyakorlatról	XIII
1. A gyűjtésről és fenntartásról	XIII
2. A vizsgálásról	XVI
II. A leírásokhoz	XVIII
Pókok. (Rend.)	3
Hálózók (Theratriae)	4—214
Kerek hálósok (Orbitelariae)	4— 50
Hurokkötők (Retitelariae)	50—105
Csöszvők (Tubitelariae)	105—209
Földbeszövők (Territelariae)	209—214
Üldözők (Diotricae)	215—324
Keszegjárók (Laterigradae)	215—247
Futók (Citigradae)	247—290
Ugrók (Saltigradae)	291—324
I. Függelék: Kaszázpókok	325—331
II. Függelék: Uebersicht der Spinnen Ungarns	333—387
Index	388—391
Magyar index	392—394
Jegyzetek	395

MAGYARORSZÁG PÓK-FAUNÁJA.

III. KÖTET.

UNGARNS SPINNEN-FAUNA.

III. BAND.

I. A GYAKORLATRÓL

A ki a természetrajznak bármely ágát sikerrel akarja művelni, az lepton-nyomon rászorúl bizonyos gyakorlati fogásokra, a melyek a tapasztalás eredményei s így az útmutatás és sok tekintetben a begyakorlás tárgyai is.

Ezek a gyakorlati fogások a tárgyak gyűjtésére, fentartására és vizsgálására tartoznak. Könyvem e részének tehát az a feladata, hogy az ezekre vonatkozó útmutatással szolgáljon mindazoknak, a kik a pókok gyűjtésével, gyűjteményben való fentartásával és vizsgálásával foglalkozni akarnak.

A mint ez a mondottakból önkényt következik, a gyakorlatról szóló rész két szakaszra oszlik, u. m. a gyűjtés és fentartás, vegre a vizsgálás szakaszára.

1. A gyűjtésről és fentartásról.

A regibb Araneologusok, a tökéletes átalakulással bíró rovarok legtöbbje által szolgáltatott jelenséget, hogy t. i. ilyen rovarok a telet vagy pete vagy valamely kifejlődési fok alakjában, tehát nem teljesen kifejlődve töltik, analógiának vették a pókok részere is, s ezért a pókokat csak a tavasz, a nyár és az őszi szakában gyűjtötték. A nemzedékek egymásutánja körül tett behatóbb tanulmányozás azonban másra tanít minket, arra t. i., hogy az alrendek legkülönbözőbb alaksorai áttelelnek s a tavasz ébredésével folytatják életpályájukat ott, a hol azt a tel dermesztő behatása ideig-óráig megakasztotta. Erre nevezve felvilágosításokat szolgáltat az első kötet 9-ik szakasza, mely a szaporodásról s a nemzedékek soráról emlékezik meg; meg inkább pedig szolgáltatja azokat a leíró rész biológiai jegyzetsora, mely nemely fajoknál a teli állapotról is megemlékezik.¹

Ezekből az következik, hogy pókokat minden évszakban gyűjthetünk, és hogy a teli gyűjtésre bizonyos súly tartozik azért, mert érdekessége mellett minden bizonynnyal meg az életmódról létező ismeretek bővítését is eredményezi.

A czelszerű gyűjtésnek lenyeges feltetele a gyűjtő eszköze s annak használata.

A szerint, a mint borszeszben vagy szárított állapotban akarjuk a gyűjteményt berendezni, más eszközök kell.

A borszeszben való fentartás számára a pókokat legott borszeszbe gyűjtjük. E vegre két oblos szájú, mintegy decziliternyi tartalmú üveget egy badogosnál közös tokba foglaltatunk, úgy, hogy az üvegek nem éppen könnyen húzhatók ki; az üvegek jó parafa-dugókkal szereltetnek föl, a dugókra pedig egy karika jön, a melylyel zsinór által a tokhoz kötjük azokat. A bádogtokot azután jó bőrrel vonatjuk be s szíjjal szereltetjük fel, hogy az egész készüléket, úgy, mint egy színházi látócsövet viselhessük. Legjobb, ha a szíj csak

¹ Lásd pld. Palygnathia Clerckii Sund. p. 52; Trochosa infernalis Mots. p. 277 stb.

oly hosszú, hogy a tok fenekével a kötést érje, nehogy lehajlás alkalmával a földet érve, az egész fölborúljon. A két üveget kétharmad részig megtöltjük erős, legalább 38°-nyi borszeszszel, beléhelyezünk néhány ágacs-kát ■ a nagyobb pókokat gyűjtéskor felváltva majd az egyik, majd a másik üvegbe rakjuk. E felváltva való elhelyezés azért szükséges, mert ha két eleven pók egyidőben kerül egyazon üvegbe, a haláltusa közben összemarakodnak annyira, hogy rendszeren a végtest tönkre megyen. A halottakat a még élő pók nem bántja; menekülési ösztöne inkább arra készíti, hogy a fácskákon föl s alá járjon.

Ezenkívül szükséges még két kis, hengerded üveg jó dugóval és erős borszeszszel. Ezeket a zsebben hordhatjuk s beléjük rakjuk az apróságokat, szintén föl váltva, hol az egyikbe, hol a másikba.

Egy erős csipesz, melynek fogófelei simák, továbbá egy kapabalta, t. i. oly eszköz, melynek egyik fele balta, a fokrésze pedig kapa, nélkülözhetetlenek, mert sokszor résekbe kell nyúlnunk, sokszor kerget kell lefejtenuünk, sokszor ásáshoz kell folyamodnunk.

A kapabalta szintén szíjra jár, úgy mint ezt a tűzoltóknál láthatjuk.

Szükséges egy erős bot, a melyre egy, erős vaskeretre reávarrt vászonháló alkalmazható, a mely-lyel azután a füveken s bokrokon végig «kaszálhatunk».

Szükséges végre egy közönséges, fehér férfinapernyő, a melynek rendeltetése az, hogy homorú oldalával a lombos galyak alá tartjuk, e galyakat a bottal hirtelenül s erősen megkopogtatjuk, mire az ernyőbe sok rovar mellett pókok is hullanak.

Általános szabály az, hogy a pókot nem szabad a lábaknál fogva megragadnunk, mert ezek szerfelett könnyen leszakadnak; továbbá szabály az, hogy a nagyokat mindig a hátfelől a fej mellél fogva ragadjuk meg, nehogy — kivált ha a kéz bőre finom — a csipés bajában részesüljünk.

Némely Kerekhálósok leejtik magokat s a szálón függve maradnak; ilyenkor kiveszszük a nagyobb üveget, alája tarljuk s belémerítjük.

Szóval, a mennyire csak lehet, kerülni kell a megragadást, nehogy a sokszor igen könnyen leváló szőrözet s evvel legtöbbször a színezet és rajz is kárba menjen.

Az igen apró, pl. Erigonefajokat legkönnyebben úgy keríthetjük hatalmunkba, hogy egy ágacs-kára föl mászatjuk, s midőn arról egy szálón lebocsátkoznának, az üveget alájuk tartjuk.

Jól fölkészülve tehát bejárjuk a bokrokat, a sövényeket, a rétet, az erdőt, a görgetegeket, a nádasokat, a kerteket, pinczék, barlangokat, szóval: igyekezzünk minden helyiség pókalakjait föl kutatni, előbb a körülményeket megtanulmányozni, a melyek között az egyes alakok élnek s csak azután a zsákmányoláshoz fogni.

Némely hálósok napszakában nem járnak ki a hálóra s mindenképpen azon vannak, hogy tartózkodási helyöket föl ismerhetetlenné tegyék; ez annál is inkább sikerül nekik, mert igen gyakran színmikrik is. Itt a háló vezérfonalára kell ügyelnünk, arra t. i. a mely vagy egy részében igen erőssé teszi a hálókeretet, vagy éppen a háló síkjából félrevezet; e fonal mindig elkalauzol a pók bűvőhelyéhez.

Igy fürkészünk, hálózunk, kopogtatunk es ásunk nappal. De ez még nem elég, mert az éj esőndjében mas jelensegek is kínálkoznak.

Az éjjel való gyűjtésre egy gyűjtőüveg elegendes; evvel es egy úgynevezett tolvajlámpással felszerelve bejárjuk a bokrokat, még pedig leginkább a levelekre ügyelve; majd a retre vagy a görgetegekre terünk. A földolog az, hogy a világosság hirtelenül essek a tárgyakra, mert az éjjel járó pók, ha tartós a világítás, meglapul, nem mozog s így könnyen kikerüli szemünk figyelmét.

Minden a gyakorlástól függ; a kéz, a szem biztossága egyiránt; és rövid idő múlva szemünk a legkisebb mozgást is észreveszi, kezünk, az állatok mozgásához alkalmazkodva, biztosan észel ér.

A prédával hazatérve, első gondunk az legyen, hogy a borszeszt megújítsuk, mert az, a melyben a pókok meghaltak — kivált ha nagy a zsákmány — megtámadja a has bőrét, ez meglágyul, azaz: rothadásba megyen át s az állat használhatatlanná válik. Azután különítsük el az egyes fajokat, mindegyiket más-más üvegbe, az üveget számozzuk meg, az illető szám alatt pedig írjuk naplónkba mindazt, a mit megfigyeltünk.

Rakásra gyűjteni nem jó dolog, mert az emlékező tehetség is botlik, a botlás pedig ilyenekben csak valamivel kisebb hiba a ferdtésnél, kivált ha tehetünk róla.

Egy igen lenyeges elv az, hogy egy és ugyanazt a helyiséget az érnék és napnak lehetőleg minden szakában látogassuk meg, hogy annak életéről minél teljesebb fogalmat szerezhessünk magunknak. Ez és az a bizonyos merseklet, melyet akkor tanúsítunk, a mikor az állatot megpillantva, nem nyúlunk rögtön utána, hanem igyekezünk a viszonyokat, a melyek között épen van, vagy valamely eseményt ellesni: ez kölcsönzi a kutatásnak a mélységet, úgy, a mint biztosítja a kutatónak a magasabb élvezetet is. Mert az életmozzanatok kitudása kapcsolatokhoz vezet: a holt alakokkal bibelődő szobatudóssággal szemközt épen ezek kepezik az élő tudományt, a melyben mindenképen van köszönet, mert ez jutalmazza a fáradozást azáltal, hogy a legtöbb esetben valóban gyarapítja tudásunk tőkéjét.

A mi mármost a gyűjtemény berendezését illeti, ez a következőkhöz van kötve.

Szerezzünk néhány száz tiszta, öblös száju, jól becsiszolt dugóval felszerelt üveget, melynek magassága — a dugó fogantyúját beleértve — $8\frac{1}{2}$ cm, átmérője $2\frac{1}{2}$ cm. Hogy a dugók jól zárjanak s tehát a borszesz elpárolgását minél jobban megakadályozzuk, bekenjük azokat igen vékonyan a gyógyszerházakban kapható «sperma ceti»-vel s arra ügyelünk, hogy az üveg szája a dugaszolás alkalmával egészen száraz legyen; a dugót jó erősen becsavarjuk. Ezekbe az üvegekbe rakjuk a fajokat külön-külön; minden üveget megszámozva, azonkívül a kellő felirattal látjuk el. A feliratos lapocskánál födolog, hogy minél vékonyabb papírból készüljenek s az egyik oldalon levélbélyeg módjára ragasztékosak legyenek; a ragaszték lehet vizahólyagoldat vagy arab gummi, mely utóbbiba azonban kevés czukrot kell tennünk, mert különben megszáradaskor lepatlan az üvegről. A felirat szövegezése a következő:

I. sz.

ARGIOPE LOBATA (PALL.)

♂. ♀ Budapest, Junius 1878.

A naplóban tehát az első szám alatt bejegyezzük mindazokat a speciális tapasztalásokat, a melyeket e fajra nézve szereztünk.

A fenntartás maga igen egyszerű dolog. Szabály az, hogy a míg az állatokra töltött borszesz sárgúl, addig azt frissel kell fölváltani, mert a pókok lágy végtesténél a legfőbb föladat az, hogy a vizet kivonjuk belőle, minek következtében megkeményedik s ekkor már bátrabban bánhatunk el az állatokkal. Mihelyt a borszesz sárgulása megszűnt, gyengébb, $26-28^{\circ}$ -nyi borszeszt töltünk az állatokra, jól elzárjuk az üvegeket; ennyi az egész.

Így kezelve, igen sokáig maradnak meg a pókok s voltak kezeim közt már olyanok is, a melyek 60 év óta borszeszben tartva, még mindig a vizsgálatra alkalmasak maradtak. Az igen erős borszeszszel való kezelést tulhajtannunk nem szabad, mert különben a pók keménynyé és törekenynyé válik.

A száraz állapotban való fenntartás sok ügyességet, még több gondosságot és türelmet követel; teljes sikerrel csak a nagyobb alakoknál alkalmazható. Az eljárást a következőkben adom:

A pókokat nem borszeszbe gyűjtjük, hanem vagy elevenen hozzuk haza, vagy egy eszepp cyanalki-oldattal megöljük. Otthon azután levágjuk egy finom kessel a végtestet, azaz ketté vágjuk a nyelecsket, mely a törzs két főrészt összeköti. Ekkor a végtestet egy papírdarabra teszszük és ovatos, lassu nyomással kiszorítjuk annak belső részeit, melyek a nyelecsken tolulnak kifelé: a kitolulást egy finom csipeszszel mozditjuk elő s gondosan ügyelünk, hogy a szőrzetet ne érhesse a kiömlő folyadék. Mire a végtest ki van ürítve, a nyelecsket reá húzzuk egy finom, csöves végbe kihuzott, $15-16\frac{1}{2}$ cm hosszú, $5-6\frac{1}{2}$ mm vastag üvegcsőre úgy, a mint ezt hólyagok felfúvásánál teszszük, mire a szárító készülék alatt meggyújtjuk a borszesz-lángot.

A szárító készülék mindössze egy $8\frac{1}{2}$ cm széles, $12\frac{1}{2}$ cm hosszú, egyenes plehtábla, mely negy labon allva megengedi, hogy a borszeszlámpát alája helyezhessük. E plehtáblára reaborul egy másik pleh, melynek alakja szakasztott olyan, mint a parasztszekér abroncos fedele, mely tehát felkerek és hatul el van zárva. A borszesz lángja hamar megmelegíti e kis sütőben a levegőt s ide tartjuk a csőre húzott végtestet. Par másodperc mulva a nyelecske már reaszarad a csővecskere s ekkor ovatosan felfújjuk a végtestet s igyekezünk, hogy a levegőnyomás folytonos legyen; e közben folytonosan forgatjuk a praeparatumot. Egy-

két perc alatt tökéletesen kiszárad a végtest, mely most üres és nem esik többé össze. Az előtesttel való összeillesztés úgy történik, hogy egy vékonyka fácskát faragunk, azt az egyik végével beszurjuk az előtestbe, ott, ahol a nyelecske darabkája követeli; a kiálló véget ragasztékkal kenjük be s ekkor ovatosan reáhúzzuk a kiszáritott végtestnek az üvegesőről nyitva lekerült nyelecskéjét. Az előtest chitines voltánál fogva nem szorúl külön eljárásra.

Az így kikészített állatot azután finom rovartüre tűzzük, úgy, hogy a tű nem a mellrész közepébe, hol a meghatározásra nézve sokszor igen fontos hátgödör vagy res látható, hanem ettől kissé jobbra áthatoljon. Az állatokat azután éppen úgy tartjuk, mint más rovarfeleket, t. i. jól záró, parafával kirakott, sima papírral kiragasztott, üveges ládákban. Minden faj elé vagy mögé odatűzzük a hozzá tartozó feliratot.

Tagadhatatlan, hogy a száraz gyűjteménynek vannak bizonyos előnyei; de vannak bajai is. A színek és rajzok megmaradnak s egy szépen szárított Epeira, Marpessa, vagy Eresus sor valóban a színektől s a fénytől csak úgy ragyog; de a tárgyak szerfelett törékenyek s a meghatározásokra nézve oly igen fontos zár vizsgálata sokszor majdnem lehetetlen, mert az igen rövid gyűjtő távolságú nagyítóval, a melyre reászorúlunk, a tű miatt nem ferhetünk hozzá. A mellett a színre nézve különösen a pókoknál áll az öreg LINNÉ mondása, hogy t. i. abba túlságosan bízni nem szabad.

A borszeszes gyűjteménynél a színek sokat vesztenek ugyan, de a nyereség az, hogy az állatok minden részét mindenkor minden oldalról bátran és biztosan megvizsgálhatjuk.

Még a borszeszes gyűjtemény felállításáról is méltó néhány szóval megemlekezni. Tartozik hozzá egy jól záró üveges szekrény, melybe kellő mennyiségű, erejű és szélességű polczok alkalmaztatnak; ez a szoba árnyékosabb helyén állíttatik fel. Hogy a tért kimérljük, az üvegeknél arra kell ügyelnünk, hogy szájuk hajtókája ne legyen nagyobb átmérőjű, mint az üveg teste maga; így azután szorosan, közök nélkül sorakoztatjuk az egészet. Az alrendek, családok stb. úgy jeleztetnek, hogy közbe helyezünk szépen gyalult, üvegmagasságú és vastagságú fákat, a melyekre az illető feliratokat reáragasztjuk. Kiválóan díszes, nagy példányok úgy is alkalmazhatók valamivel tágasabb üvegekbe, hogy oly üveglemezeket vágatunk, a melyek befernek. Ezekre ragasztjuk a pókot természetes állásában, úgy, hogy az állatot kiveszszük a borszeszből, itatópapíron külsejét jól megszikkasztjuk; ekkor az üveglemeszre egy gombostűfejnyi, forró és igen sűrűre olvasztott arab gummit cseppentünk, az állatot hasával e cseppre nyomjuk s leszorítjuk addig, amíg a gummi megszárad; közben a csipeszszel megigazgatjuk a lábakat. Mindezek után betesszük az egészet az üvegbe s ovatosan feltöltjük borszeszszel. Az ilyen példányok nagyban emelik a gyűjtemény külsejét, kivált ha a szekrény belső fala fehér, az egyes üvegeket pedig fekete lemezekkel választjuk el egymástól. A polarizáció itt a világosságot az állatra gyűjti s ez igen jó benyomást tesz.

Mielőtt, hogy a vizsgálásra tartozó fejtegetésbe bocsátkozzunk, meg arról akarok megemlekezni, hogy a gyűjtemények csinosága, tisztasága mellett ne feledkezzünk meg a humanitásról sem: ezeltalanul, halomra öldödni oly állatokat, a melyek a végen is egy fontos munkakört töltenek be a természet háztartásában, nem dicső dolog. Pontos meghatározásra csak a teljesen ivarérett példányok alkalmasok, ezért csak ezeket kell gyűjteni; egy pillantás a nőstények zárjára, a hímek tapogatóira elégséges utbaigazító.

2. A vizsgálásról.

Igazságszeretet, szigorú tárgyiasság, a minden tudás anyja: a tapasztalás által nevelt és megélesztett ítélőtehetség, a szem alkalmazkodási képességének gyakorlás által való fokozása, nyugodt kez, erős akarattal párosult szívós türelem, eles, tisztán mutató nagyítóüveg, egy szerényebb mikroskóp s még egy pár egyszerű eszköz — mindezekhez pedig egy jól megvalogatott könyvtár, a melyre nézve az első kötet irodalmi s a második kötet bíráló része fölvilágosít: ezek képezik a vizsgálás alapföltételeit és főszükségeit.

Ezekkel felszerelve, bepillantunk a szervezetek csodás kis mindensegére, s minden pillantás az elvezet mellett tanúságot fog nyújtani.

Első sorban meg fogjuk látni egyazon szervezeti alaptervnek a viszonyokhoz és illetőleg a feladat-

hoz való illeszkedését, elváltozását: másfelől megtanuljuk azt, hogy a közönséges életben oly csekélybevett «apró» szervezetek, működésök folytonosságánál fogva mily lézagot töltenek be, mennyire folynak be a jelenségek ama nagy körfolyamába, melyet egy szóba foglalva: *természetnek* nevezünk.

Fogalmunk az életről tisztulni fog, mihelyt az életet nem csak közönséges emberi, hogy úgy mondjam önző szempontból tekintjük, hanem megismerkedünk fokozataival is, úgy, a mint azok a magasabb és alsóbbrendű, de a maguk helyen teljesen egy jogu, egy értékű szervezetekben ki vannak fejezve.

E jelenségek bármely sorával foglalkozzunk is, idővel reájövünk, hogy itt fakad az értelem, a kedély, az önismeret legtisztább forrása, a melyből az elfogulatlan szemlélődés mindenkor és biztosan tisztávalót, megdönthetetlen igazságokat merít. Ezek azután megérdemlik az utánjárást, a fáradozást mindeneken.

Nem szenvedélyről, nem időtöltésről, játékról van itt szó, hanem egy nagy feladat megoldásáról, a mely megoldáshoz minden nemzedéknek szent kötelessége hozzájárulni annak legjavával, a mire egyáltalában képes. Mert a természet jelenségeinek korei, sorozatai nagyok, felismerésük roppant feladat, ezt pedig csak a munka folytonossága győzheti le — majdan. Az pedig kétségen kívül való dolog, hogy az ember maga csak akkor fogja igazán és méltóképen berendezhetni saját életét a jelenségek közepette, ha azokat lényök szerint felismeri, velök biztos alapon számol.

Mínthogy tehát e munka nemzedékek sorára oszlik fel, lenyeg szerint mindig haladásról, továbbfejlesztésről van szó, minek legfontosabb feltetele az, hogy barátkozzunk meg a tárgyakon kívül mindazon ismeretekkel is, a melyek rolok a tudomány evkonyveibe be vannak jegyezve. A regiek megtörik az utat, az utódok előbb egyengessék a nyers törest, azután torjenek tovább, hogy utódaik átvehessék az egyengetes es továbbra való törés munkáját. Én részemről ezeket tartom szemem előtt, tekintsem a dolgot akár a tudomány egyetem, akár a nemzeti művelődés szempontjából. Eddig még nem csatlakoztam s ezért ajánlom másoknak is.

De lássuk immár a tiszta gyakorlatot is; annyival is inkább, mert hiszen ennek fejtegetésére vállalkoztam. Arról van tehát szó, hogy borszeszben fenntartott állatokat vizsgáljunk.

Közönséges, öt-hatszor nagyító, ugynevezett füvesz-nagyítóval nem érünk czelt, mert a szemek relativ távolságainak megiteleséhez, a fegyverzet szambavételéhez igen eles képre van szükségünk. Kell tehát mindenek előtt egy minel kisebb átmerőjű es oly domborúságú lencse, melynek gyújtó távolsága (focusa) legfeljebb $4-5 \frac{mm}{m}$ -nyi legyen.

Ezeket a nagyítókat külön kell megrendelni; használhatjuk azonban jobb mikroszkopok u. n. objektívjeit is nagyító gyanánt, melyek már azért is igen czélszerűek, mert a végső lencse csekély átmerőjű, tehát jól hozzáfér a tárgyhöz.

Lecsukjuk tehát balkezünkön a kis-, a gyűrűs es a középső ujjat, a mutatóujjat ellenben kinyújtjuk s a hüvelykujj segítségével ennek leghegyén tartjuk a megvizsgálandó pókot. Ekkor a louppet jobb (vagy bal) szemünkhez viszzük, úgy, hogy azt e kéz hüvelyk-, mutató- es középső ujjal tartja, míg a gyűrűs- es kisujj ki van nyújtva s a pókot tartó balkez hüvelykujjára van támasztva a végét, hogy egyfelől a rezgést kikerülhessük, másfelől a tárgyat a focusban tarthassuk, forgathassuk.

A pók a balkez mutatóujján fejjével a köröm fele álljon; a hüvelykujj a hátulsó lábpárt szorítja le. Ebben az állásban megvizsgálhatjuk a szemeket, a ragókat, a fejnellet, a végtest felületét, úgy a lábakét is. Ezután megfordítjuk az állatot, hogy megvizsgálhassuk az állkapcsokat az alajkkal együtt, a mellvértet, a has lapját, nőstényeknél a zárt; továbbá a fonószerveket. A him tapogatóját minden oldalról szemlelve fogjuk s ügyelünk a szerzők utasításaira, a melyek e szerv leírásánál legtöbbször megmondják, hogy erről vagy amarról az oldalról tekintve, ezt vagy azt láthatjuk rajta. Az így szerzett tapasztalásokat gondosan szembesítjük a szerzők állításaival s az egybevetésre alapítjuk végső ítéletünket.

Igen piczi alakoknál, például az *Erigone*-nembe tartozóknál, sokszor a legjobb nagyító is cserben hagy; itt azután a mikroskophoz folyamodunk. Ez ne legyen tulságosan nagyító, mert a külső vizsgálatra már a 20-szori nagyítás elegendes. A tulságosan erős mikroszkop már csak a rétegről-retegre való vizsgálatot engedi meg, tehát nem alkalmas arra, hogy az egészében sokszor nagyon is domboru szemesoportot egy-

szerre láthassuk, a szemek egymás közötti viszonyát megítélhessük. A szemny eltávolítását finom esettel, a tagok egyengetését finom, nyeles tűvel végezzük.

Ott, a hol a szövőkörmök, a pikkelyzet, szőrözet minéműsége a kérdés, ott már mikroszkopius eljárásra, kikészítésre szorulunk. Ha épen csak ad hoc keressük a feleletet, akkor elégséges, ha egy megfelelő üvegdarabra törüljük a finom késsel leszedett szőrözetet vagy pikkelyzetet, egy csepp glicerint vagy épen csak borszeszt adunk rá, leborítjuk egy fedőüveggel s így visszük a mikroskop alá; ha azonban tartós praeparatumokról van szó, akkor Canadabalzsamot vagy Damárlakkot használunk, a praeparatumot számmal és kellő, a gyűjteménynyel egyező felirattal látjuk el s bevezetjük a naplóba is.

A szövőkörmök különös gondot követelnek. Az első feladat az, hogy azokat egy jó eset segítségével többször váltott borszeszben megmossuk s csak azután vágjuk le az íz felével együtt. A levágás üveglapon történik, s mihelyt megesett, egy más üveggel lassan-lassan s fokozva erősebben lelapítjuk az ízt; a lenyomó lappal szorítás közben egy csekély oldalmozdulatot teszünk a vegett, hogy a körömpár kinyíljen, ne fedje egymást. Ezután evvel is úgy bántunk el, mint a szőrözettel vagy pikkelyzettel.*

A mérésekre egy finom, pontosan milliméterekre osztott mérték és egy minél kisebb, külön, túfinomságra hegyezettett körző szükséges, melylyel egy félmillimétert még megmérhessünk; az ennél kisebb vagy valami töredékkel nagyobb mértékreszecekkéet egyszerűen becsüljük.

Nem hiszem, hogy valamely lényegesebb dologról megfeledeztem volna s ezért e fejtegetést ezenel be is rekesztem.

II. A LEÍRÁSOKHOZ.

Az e műbe foglalt leírások a szervezet, életmód, színezet és tartózkodás alapján eszközöltettek.

A példányok, a melyekről a leírások vetettek, borszeszben tartattak; a leírás előtt itató-papírra tétetve, a megszikkadás bevéartott. Azoknál az alakoknál, a melyeknél a borszesz jelentékeny színváltozást idézett elő, a természetes szín mellett az elváltozott is jelezve van.

A mérések a méterrendszer szerint történtek, még pedig — a tárgyak kicsinyiségénél fogva — a *miliméter* (m. m.) és ennek tizedrészei használtattak. A mérés egy érzékeny, finomhegyű körzővel történt, úgy, hogy a m. m. öt tizedrésze mérés, az 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 tizedrész ellenben becsülés.

A törzs, annyi mint: *fej*mell és *vég*test együtvéve. Mértéke a fejrész elejétől a végtest végéig, tehát a hossz tengelyben vetetett; a kinyújtott rágók és fonók kibagyattak s ott, a hol mértékeik fontosak, külön megmértettek. A fejmell külön is megmeretett.

A lábak mérésénél a csipők kihagyattak, a mérték tehát a czomb tövétől a szövőkörmök hegyéig vetetett.

A mi a Nomenclaturát illeti, a Dr. THORELL által kritikai szigorral megalapítottat követtem. A Synonymákra nézve legtöbbször csak a legregibb szerzőt idézem, a többiekre nézve Dr. THORELL «Remarks on Synonyms of europ. Spiders» című művet idézem, «Remarks» rövidítéssel. Így a nemeknél is: On europ. Spiders. A többi idézetet oly rövidítéssel adom, mely a mű fölkeresését az általános rész irodalmi lajstromában lehetővé teszi.

A magyar ¹ Nomenclaturánál csak a jelentőséget tartottam szem előtt; igyekeztem, hogy a név az állatnak valamely sajátosságára vonatkozzék. A mythologiai és egyéb személyneveket, mint pld. Singa, Zilla, Meta, Dictyna, Marpessa stb. átvettem.

Az általam alkalmazott magyar neveket nem akarom mértékadoknak feltolni; ² sőt megengedem, hogy némelyik nyelvészeti szempontból kifogás alá is esik; de megnyugszom abban, hogy nem rosszabbak

¹ A németnél is, a mennyiben sajátom.

² A németeket sem.

mint azok, a melyek a culturnepek irodalmában szerepelnek, a melyeknek szintén csupán csak a jelentőség — s az sem mindig — szolgált zsinormertekül.

Úgy vagyok meggyőződve, hogy pld. az *Epeira diademata* (CL.) fajra alkalmazott «koronás keresztspók» elnevezés nem vesz semmit a francia «*Araignée portecroix*» vagy a német «*Stirnbinden Kreutzspinne*» mellett, sőt azt hiszem, hogy a rendszer szempontjából nyer, u. m.:

Orbitelariae	= Radspinnen (MENGE)	= Kerekhálósok.
Epeiroidae	= Kreutzspinnen (MENGE)	= Küllőszövk.
Epeirinae	= — —	= Keresztspókok.
Epeira	= Kreutzspinne	= Keresztspók.
Epeira diademata	= Stirnbinden ¹ . Kreutzspinne	= Koronás Keresztspók.

Az alrendek, családok, alesládok és nemek magyar neveinél alkalmazott nagy betűket, melyek helyesirasi szempontból kifogás alá esnek, megkülönböztető jegyekül és tisztán csak az áttekintés megkönnyítésére alkalmaztam.

JEGYEK ÉS RÖVIDÍTÉSEK.

() = Ha a nem (genus) neve után álló szerző neve parenthesisben áll, akkor ez azt jelenti, hogy az illető szerző, e nevet felállította ugyan, de szűkebb vagy tágabb határok között alkalmazta, mint a minők között én alkalmazom. Ha a szerző neve parenthesis nélkül áll, akkor oly határok között alkalmazom a nem nevét, mint alkalmazta a név szerzője is.

() = Ha a fajnév (species) mögött álló szerző neve parenthesisbe van téve, akkor az illető szerző az illető fajt más nemben tárgyalta, pld. *Epeira quadrata* (CLERCK) az jelenti, hogy CLERCK az általa felállított *quadrata* fajt nem az *Epeira* nemben tárgyalta, ellenben *Epeira acalypha* WALCKENAER azt mondja, hogy WALCKENAER a mondott fajt a mondott genusban tárgyalta.²

I
II
III
IV

a lábmerésnél = első, második, harmadik, negyedik lábpárt jelent.

1

2

3

4

a lábak leírásánál azoknak egymasközzötti hosszarányát mutatja pld. 1, 1, 2, 3 = az első a leghosszabbik, utána követi a negyedik, ezután a második, végre a harmadik lábpár.

$\frac{m}{mm}$ = millimeter.

n. sp. = nova species = új faj

Syn. = Synonym.

♂ = him.

♀ = nőstény

A SZERZŐK NEVEI.

AES. = AUSSERER.	FABR. = FABRICIUS.	PANZ. = PANZER.
BLACKW. = BLACKWALL.	FUES. = FUESLIN.	POD. = PODA. ³
BRUL. = BRULLÉ.	KEYS. = KEYSERLING.	SAV. ET AUD. = SAVIGNY ET AUDUIN.
CAMBR. = CAMBRIDGE.	LATR. = LATREILLE.	SCOP. = SCOPOLI. ⁴
CANESTR. = CANESTRINI.	L. = LINNÉ.	SIM. = SIMON.
C. K. = CARL KOCH (SEN.).	L. K. = LUDW. KOCH (JUN.).	STR. = STROEM.
CL. = CLERCK.	LUC. = LUCAS.	SUND. = SUNDEWALL.
DOBL. = DOBLIKA.	MOTSCH. = MOTSCHOUISKY.	THOR. = THORELL.
DOL. = DOLESCHALL.	O. H. = HERMAN.	WALCK. = WALCKENAER.
DORTH. = DORTHÉS.	OLIV. = OLIVIER.	WESTR. = WESTRING.
DUF. = DUFOUR.	PALL. = PALLAS.	WID. = WIDER.

¹ «Stirnbinden» homloksáv vagy esik hibás mert CLERCK-nél „*Stirnband*“ = corona s ezzel bizonyosan a koronaszertűen kiálló szemesoportra célelőzött. MENGE, «Pr. Spinnen» pag. 42 helyesen adja a magyarázatot, de azután «Stirnbinden»-t ír.

² Ez megfelel azon szabálynak, melyet a «British Association for the Advancement of Science» felállított, s melynek üdvös voltát nem lehet eléggé kiemelni. Lásd: Ann. and Magazine of Nat. History Ser. I. Vol. XI. p. 239. Series of Propositions for rendering the Nomenclature of Zoology uniform and permanent, being the Report of a Comité for the consideration of the subject appointed by the Brit. Assoc. for the Advanc. of Science. Továbbá: THORELL «On europ. Spiders» p. 3 etc.

³ 1765-ben a selmeczi bányászati Akadémiánál a memijésgtánt tanította; azelőtt Graczbán tartózkodott, hol 1761-ben «*Insecta musci Graecensis*» című művét kiadta. A selmeczi bányász és erdész akadémia évszázados emlékkönyvében (1871) pag. 7 és 23, a név hibásan «Boda» iratott.

⁴ 1769-től 1779-ig szintén tanára volt a selmeczi akadémiának, a vegy- és ásványtant tanította.

LEÍRÓ RÉSZ.

ORDO-REND:

A R A N E A E. P Ó K O K.

Orismológiai meghatározás.

Szarnyatlan állatok.

A test törzsöke csak két részből, u. m. a fejfel egybeforrott mellből, tehát szilárd chitinkergű fejmellből, és a gyűrűzetlen vegtestből áll, melyeket egy vékony nyelecske köt össze.

A mellreszen negy pár, het izű — terdizzel ellátott láb.

Valamennyi láb vegen bordázott karmokból álló szövő szerv.

A vegtest végén szemölcszerű, izelt, páros számú, csevekkal felszerelt fonószerv.

A rágó csipőkarma becsapható, hosszabban átfűrott.

Egyszerű szemek, symmetrikus csoportosításban.

Semmi csapó.

Az allkapoes lábszerű tapogatókkal, ivar szerint más-más szerkezettel és rendeltetéssel.

Biológiai meghatározás.

Semmi atalakulás. A kifejlődés vedlések által történik, melyek a petéből kibuvó eredeti alakon nem változtatnak.

A kifejlődés utolsó mozzanata az ivarszervek teljes kifejlődése.

A fonó és szövőszerv jelen van, működése a petéből való kibuvástól fogva folytonos. E két szerv működéséhez alkalmazkodik az életmód úgy a szervezet minden sajátsága is.



SECTIO I. OSZTÁLY.

THERATRICAE. HÁLÓZOK.

(θιζαρρον = vadászhaló.)

SUBORDO I. ALREND.

O R B I T E L A R I A E

(Orbis = kerek; tela = szövet; a háló alakjáról.)

KEREKHÁLÓSOK.

A fejmell fejerese lelapuló; a homlok szele és az alsó szemsor középszemei között elterülő ter keskenyebb vagy legalább nem szelesebb annál, mely az alsó es hátsó szemsor középsői között elterül.

A lábvegek hármás karomrendszerrel; a bordáskarmok erős kampoval es sűrűn álló bordákkal; a sánja-karom hosszú-kampós es a tövén tompafogacsos.

Az első lábpar hosszabb a tobbinel (Cercidia kivetelevel).

A fonók rövidek; a felső es alsó par egyenlő hosszúságú.

A háló, sokszögű keretben a központból induló küllöket es küllőről küllőre esigavonalban vezetett, ruganyos összekötő fonalakat mutat.

A kerekhalósok szervezet es életmód szerint okvetetlenul a rend tipikus kepet szolgáltatják. A mód, a mely szerint a természet tünetkörebe befolyiak, a voltakepeni «pókmód» következöleg jellemezhető: az üres hézagokon uralkodnak, ott foglalnak állandó működési tert, a hol a repülő allat is open csak átröpülhet, de meg nem állhat. A biológiai túlsuly a háló jelenletében fekszik.

E tulajdonságnak főeszköze a geometricus alakzatokat kepező, egy síkban kifeszített kerekhaló, melynek alkalmazása mindig a körölmenyek szerint történik; felállításának vegleteit kepezi a függöleges es a vízszintes állás s ezek köze esnek a dült állások veghetetlen sorai.

A hálókötő kepesseg nem egyforma, s az alrend második alesaládjában — a Torkosoknal — láthatólag csökken.

A függöleges es dült hálón mindig fejfel lefele állanak; a függölegesen mindig a vedettebb oldalon, a dült es vízszintesen mindig az alsó oldalon tartózkodnak, illetöleg rejtekökből oda közlekednek.

Lábaik szövésre es a fonalakon való kapaszkodásra alkotottak, mi különösen a végiz bizonyos merevségéből kitünik, mely a lábvegnek behajlását engedi, a kihajlast — helyesebben áthajlast — kevesbbe engedi s oka annak, hogy a foldre érve, e pókok úgyszólván lábujhegyen járnak, síma síkokon megfogodzni tehát haladni majdnem képtelenek.

Alaknagyságra nevezve fokozatosságot mutatnak, minthogy ez a mogyorónagyságtól a kenderszem nagysáig megfigyelhető. E szerint alakulnak a halók is, jelesen a fonalzat erejere nevezve.

Tevékenységek főszaka a szürkületre, főleg az estelire esik: de ott, a hol a preda sűrűn jár, nappal is működésben vannak, nevezetesen árnyas helyeken melyeket előszeretettel keresnek fel.

Mindnyájoknál közös tulajdonság az, hogy megerintve, leejtik magokat s a testhez vont lábakkal egy darab ideig mozdulatlanul fekvé maradnak; a háborgatás megszűntével azon a fonalon ternek vissza a hálóra, a melyet a leejtés alkalmával kifejtettek. A hálónak azon megrezzentetését, melyet az elő preda okoz, attól, a melyet egy odasodort idegen test okoz, legtöbbször megkülönböztetik; ha kétségeik vannak, a térsere sietnek, megkapaszkodnak s a testnek gyors fel-le mozgásával sebes rezzenésbe hozzák az egész hálót; evvel az idegen test lerázását, esetleg pedig a preda vergődését nyerik meg.

Az erős predát roppant gyorsasággal befonják, láthatólag azért, hogy a háló fonalatában s így erzekenysegeiben kárt ne tegyen; e vegre a vegtest vegevel fordulnak a predának, ranyomják fonóikat, s ezeket egy sorba állítva, széles fonalszalagot fejtenek, mialatt a predát a negyedik lábpárral gyorsan forgatják, tehát begöngyölik.

Ha a preda arra alkalmas, lefejtik s szabadon a térsere czipelik; ha nehéz, akkor fonal segítségével, lassanként vagy a térsere, vagy — főleg nappal — a rejtekhelyre vonszolják, olyformán, hogy a szállító irányban a fonalat megfeszítik, az ellenkező irányban pedig folyton lazítják vagy épen elmetszik. A vonszolást a negyedik lábpár végzi.

Az igen nehéz predát ott költik el, a hol megfogódzott; ha nem rongálta össze egészen a hálót, akkor kiszívás után kifejtik s lelökik; a hálót igen ügyesen kitatarozzák. A kisebb predának maradványait az előtest hirtelen mozdulatával szintén ellokik (esupán csak a Küllöpök, *Cyrtophora*, látszik kivetelt képezni: lásd a nem leírásában).

Tartózkodásra nézve főleg az aljakban, a közephegysegekben s a havasok tövében uralkodnak, a fák tenyeszővenek legfelső szeleig folyton csökkenve elterjedve, ezen túl ritkák lesznek, míg vegre is mintegy 2000 meter magasságban a tenger színe felett, csak egy, ott állandó alak képviseli a rendet. A barlangok szájában, a meddig felhomály uralkodik, szintén előfordulnak.

A működésben főleg a tapintás finomsága s kevesbe a szem vezérli; a hallás erzekének semmi nyoma sem tapasztalható¹

Tevékenységek kifejtésében alig ismernek korlátokat, minthogy a fonalröpítés segítségével mindenüvé hozzáférhetnek, a hol befolyásuk helyén van.

Azon rendszerben, a melyet a pókrend tevékenysége megalkot, osztályrészek a rovaroknak *átröpülés* közben való korlátozása s eszközlik ezt az alak, ebből kifolyólag a háló erejéhez kepest.

A nemzedékek sorára nézve, a teli evszakon át az alrend rendszerint csak a peték által van biztosítva: fedett, különösen emberlakta helyiségek védelme alatt azonban nemely fajok fejlett vagy felig fejlett állapotban át is telelnek s ilyenkor 6—10^o R. hideget kár nélkül elviselnek; a teli evszakot mozdulatlanul, mintegy megdermedve elik át.²

Peteiket különös gonddal helyezik el; meleg szövetbe borítva, rendesen meg egy pergamenszerű, sűrű szovettel is biztosítják.

¹ Ezen érzékre nézve direct vizsgálatokat tettem. Lakásom folyosójára, mely a légáramlattól teljesen védve van, nádlépőket telepítettem, melyek a jól bepépezett ablaktáblák felibe csakhamar hálót feszítettek s a keretek zugaiba rejtekhelyeket szőttek. Alkonyatkor, a mikor az állatok a térsére kijöttek, tehát legéberebbek voltak, egy igen élesen szóló, b' hangolású és rúgón járó, ütővel ellátott csengővel megközelítettem az állatot s hirtelenül megszólaltattam a csengőt, a nélkül, hogy az állatot valami mozdulatra bírhattam volna. Da mintegy 2 centiméter távolságra közeledve, a csengés az állatot megzavarta, láthatólag azért, hogy a lecsapó üttő levegőt, ez a hálót megrezzenté; sőt egészen friss feszítésű, tehát igen érzékeny hálónál magok a hanghullámok is láthatólag megrezzenték a hálót s így zavarták a pókot. Minthogy azonban kétségtelen, hogy némely állatok bizonyos hangokra jobban figyelnek, hallási érzékek bizonyos hangokra jobban reagál, a rovarokról vett analógia a szerzegetetés alkalmazására is reávit, melyet egy finom vaslemez és reszelő segítségével majd erősebben, majd gyengébben alkalmaztam, anélkül, hogy az állatok megzavartak volna. Mindezeknél fogva én mindazon jelenségeket, melyek az irodalomban szerepelnek, s többek között a pókok zeneszeretetről szólnak, a *tapintható* rezgésre viszem vissza; ide tartozik Grétry pókja, mely a praelodiumokat «esodálta»; Péliссон pókja a Bastilleben, mely a hegedűszóra elősietett; és Walckenaer bűvárpókjai, melyek a víz felszínére jöttek. Zongorákon nem ritkán láthatni pókokat, a melyek óvatosan tapogatva, a játszás közben támadó rezgés után: indulnak, jelesen akkor, a mikor hálójuk a hangszerrel érintkeznek. A vizsgálat ezen eredménye egybevág arval, miszerint a boncztan sem bírt kimutatni oly valamit, a mit a hallás szervére magyarázhatott volna.

² Ez különösen az Eresz-Keresztespókról áll, mely helyen közön valódi házi állattá lett s folyosók mennyezetén áttelelve, tavasszal folytatja fejlődését, egyáltalában életét. Ezen újabb észleletet vedd össze «Általános rész» 48. l.

FAMIL. I. CSALÁD. EPEIROIDAE. KÜLLÖSZÖVÖK. SPEICHENWEBER.

(ἐπιστρώω = feszíteni; a küllőfonalak feszítéséről.)

SUBFAM. I. ALCSALÁD. EPEIRINAE. KERESZTESPÓKOK. KREUZSPINNEN.

GEN. I. NEM. ARGIOPE. DUF.

(Ἀργιόπη = mythologiai név.)

Syn. 1825. SAV. et AUD. «Description de l'Égypte» II ed. XXII.

Vide: THORELL «On Europ. Spid.» p. 49 et 51.

Diszes külsejű, nagy pókok. Az előtest mellresze kikerekítve-lelapított: a fejresz kicsiny. A végtest tarajos vagy hengerded-d-hossztojasdad. A fonók a hasfele toltak, úgy, hogy a végtest vege felettök tetemesen kiáll. Az alsó szemsor a homlok élen ugyszinten a hátsó oldalszem is: a hátsó sornak két középső szeme a fej búbján kisse hátratulva, minek folytán a hátsó szemsor erősen behajló. Az alsó sor szemei egymásközött egyforma távolságra állanak, a hátsó sor közép szemei az oldalszemektől kétszer akkora távolságra esnek mint a mekkora a távolság a két középső szem között.

A hímek a nőstényekhez képest igen kicsinyek es karesük, kevesbbe diszesek, hasreszok sohasem tarajos.

E szép pókok buja növényzetű, árnyekos, kisse nyirkos helyeken szövik nagy terjedelmű, függőleges kerek hálókát. E hálók rendesen a tércsetől kifutó s a szelekig nyúló, kigyózó szalagot viselnek, mely rendesen lefele hatol. Áttelelő peteiket igen mesterseges, csuporalaku burokba szöve, a növények törzsén, közel a földhöz erősítik meg. Júliusban ivarérettek, peteiket szeptember vege felé rakjak le, mire elpusztúlnak. Hazánkban két faj el.

SPEC. I. FAJ. ARGIOPE LOBATA. (PALL.) TARAJOS ARGIOPEPÓK. GELAPPE ARGIOPE.

(IX. tábla 192 ♀, 193 ♂, term. nagys.)

(lobus = karaj, taraj, taréj, pld. a kakasé; a ♀ végtestén lévő csücskökre vonatkozik)

Syn. 1772. *Arauca lobata* PALLAS. «Spic. zool.» I, fasc. 9.

Vide: THORELL «Remarks» p. 520.

♀ Törzsének felülete feherlő- atlaszfenyű, majdnem ezüstös: a végtest oldalai negy-negy csücsökkel.

A végtest szélessegeénel kevesse hosszabb, lelapított: mindket oldalán vízszintesen fekvő negy csücsökkel, melyek közül az első a legkisebb, a két közbelső a legnagyobb, valamennyi husos; együttesen a kakastarejra emlekeztetnek. A testtörzs felületet finom, ezüstszimű, fenyő szőrőzet borítja. A lábak világos foldön söteten es sűrűn gyűrűzöttek.

A lábak aránya 1, 4, 2, 3.

Világos színezet. A fejmellen a fej beigtatásától kezdődve két oldalt egy-egy barnás sáv, mely a nyeleeske táján egy harántos öv által egyesül. A végtest csücskei közül a második, harmadik és negyedik az előszélen fekete. A mellvért közepe világos: szélei széles, barnás, néha szakadozott szegélylyel. A has sötétbarna, mind a két oldalán két vagy három világosabb folttal: közbül — a fonók előtt — egy ilyenmü pettyel. A szájreszek es vegtagok sárgások, az utóbbiak sötétbarnan karikázottak. A tapogatók sárgások, egyszínűek.

Az oldalszem-párok csücskösen kiemelkedő közös domborodáson állanak. Az alsó sor középszemei kisse kiemelkedők, a hátulso serei megfekvők.

A zár széles, erősen kiemelkedő keretet alkotva, széles, felálló, kurtakampos nyujtványnyal vedett.

Mertekek: ♀ Törzs 17 m_m

I Labpar 31 »

♀ Végteste hengerded, kisse lelapított; lábai egyszínűen barnás sárgások; a fejmell ugyanilyen színű. Hasa szennyesbarna, kétoldalt egy-egy keskeny, sárgás sávval díszítve. A mellvert közepe élénk-sárga. A tapogató nyele sárga; nemzőszerve kis pikkely alatt egy csavart, bütökös gyűjtőt mutat, melyből az illető oldal fele fogószerűen két köröm áll ki; az előrefele álló köröm (embolus) csavarodó és hosszabb.

Mertekek: ♂ Törzs 7 $\frac{m}{m}$

I lábpár 19.5 »

E szep pok lelhelyei: Buda környeke (Zugliget); a pesti oldalon ritkább; a Rakos bujább növényzetű helyein találtam magam. Pável es Anker; Nógrádmegye (ismeretlen pont). Nagy, szep hálóját bokros helyek árnyékos szélein s a magas fűben szövi. Junius végén ivarérett; szeptemberben lerakja peteit, mire elpusztul.

SPEC. 2 FAJ. ARGIOPE BRÜNNICHII. (SCOP.) BRÜNNICH ARGIOPE-PÓKJA. BRUNNICHES A.

(Brünnich, mult századbeli természetbarát tiszteletére így nevezve.)

Syn. 1772. *Aranea Brunnichii* SCOPOLI «Observ. Zool.» in Annal. V. Hist. Nat. p. 125.

Vide: THORELL «Remarks» p. 518.

♀ Fejmelle fehér, selyemfényű; végteste sárga, fehér és fekete, sűrűn álló harántcsíkokkal.

Végteste szélességénél hosszabb, hossztojásdad, kevéssé hengeres, simaszelű. Fejmelle selymesen fénylő fehér, tömött szőrézettel borított. Az első lábpár czombja majdnem végig egyszínűen barna, a többi iz világos földön sötéten gyűrűzött. A labak aránya 1, 2, 4, 3.

A fejmell rendesen egyszínű, ritkán oldalsávok nemi nyomaival. A végtest felül fehér, sárga es fekete harántcsíkokkal tarkált, előszelén kisse szögletes s e szögletektől oldalt, egy finom fekete vonással, mely a has fele elmosódik. Az első harántcsík fehér, széles, a következő fekete es nem éri az oldalakat, az erre következő harmadik fehér, a negyedik fekete es a has sötét színebe átnyúló, az ötödik sárgás, nehá élénk sárga a hatodik fekete es a hát közepén kétszer kigyózó; a fehér es fekete csík így váltakozva húszig is terjed; a kigyózó csíkon alóli fekete csíkok nehá párosan összefolynak s csak oldalt válnak el, hol azután a közök rendesen élénk sárgák (var. *transalpina* C. Koch). A mellvert közepe ekalakra világos fehér, szélei sötétek. A has sötétbarna, kétfelől széles, sárga oldalszalaggal díszített, a szalagok a felső fonószemölcs pár magasságát elérik s a fonószemölcsök táján kisse egyenetlenek. A két sáv között nehá négy pár finom sárga pontocská. A szájrészek egyszínűek, sárgásbarnások, vagy barnások. A tapogatók egyszínűek, sárgásbarnások; a lábak sárgás földön sötét, sűrű karikázattal, az első lábpár czombja sötét csak közel a vege felé egy világos karikával ékesített.

Az oldalszem párok csücskösen, erősen kiemelkedő közös domborodáson allanak; az alsó sor közep-szelei közös dudorodáson erősen kiállók úgy hogy köztök es az oldalszemek között mely nyereg támad, a hátsó középszempár megfekvő.

A zár egy széles, szélességénél hosszabb, lefekvő, vege elmetszett, felgyűrt szelű, belül csatornas lemezzel védve.

Mertekek: ♀ Törzs 20 $\frac{m}{m}$

I lábpár 29.2 »

Termékenyítés előtt a nőstények sokkal kisebbek, a végtest színezete csak kezdetleges, úgy a labake is. A ivarérettseg első idejében a ♀ hossza csak 11—12 $\frac{m}{m}$

♂ Aránylag igen kicsiny. Végteste hosszshengerded, felül márványozott, alul a nőstényéhez hasonló színezetű. Előteste es lábai egyszínűen barnássárgák, az előbbi selymesfényű fehér szőrézettel borított. A tapogatók sárgás nyellel; a nemzőrés: kis pikkely alól kidagadó tojásdad, sima gyűjtővel, melyből az illető oldal fele fogószerűen egymásfele álló körömpár kinyulik, az előrefele álló köröm (embolus) csatornas, kisse csavart, egyszerű es hosszabb a hátsónál.

Mertekek: ♂ Törzs 5 $\frac{m}{m}$

I láb 12 »

Juliusban ivarérett, szeptember végén és október elején bekövetkezik a peték lerakása, a mikor is a ♀ pók teljes nagyságát és színezetét megnyerte. A magas, terebélyes növények alján az állat kikeresi a helyet, hol néhány kereszteződő fonalat húz, erre szövi a tojó-leplet, a melyre a petéket (6—800) letolja, beszövi, felül és alul sűrű gyapottal betakarja s az egészre egy rendes csuporalakú, fedett burkot sző, mely pergamentszerű és sárgás, néhány barnás hosszszikkal ékesített. Hálója nagy, rendes kerekháló, a térsétől lefele két küllőfonal között kigyózó szalaggal, melynek kigyózása a küllők elágazásához képest, kifelé nagyobbodik. A hálók rendszeren buja növényzetű nedves árkok szélein es kissé dülten állanak: az állat többnyire a térsén tartózkodik s külön rejteket nem sző, hanem a háló alatt valamely növény száron foglal állást, itt védelmet keres úgy a veszedelemben mint a nap leve ellen is. Leginkább estvefele működnek. Az ifju nemzedék áprilisban kél ki.

Ismerem: Kolozsvárról, lóversenyter; Szamosfalváról, sóstó környéke, Nagy-Szebenből (Sill V.) Nagy-Várad (Muz. gy. Mocsáry), Pest (katonai temető Muz. Gy. Pável); Doroszlóról és Budáról (B. M. Ankertől); fajrokonával az Arg. lobatával együtt a délkeleti részeket jellemző alakok közé számíttatik.

GEN. 2. NEM. EPEIRA. (WALCKENAER.)

($\varepsilon\pi\epsilon\iota\rho\acute{\omega}$ = vide: Epeiroidae.)

1805. WALCKENAER «Tabl. d'Ar.», p. 53.

Vide: THORELL «On Europ. Spid.» p. 49. 53.

Zömök testalkat. A fej mell meglehetősen domború, fejerésze aránylagos, néha meglehetősen nagy; mellrésze kiszélesedő-kerekded, a nyelecske felett szívyszerűen bemélyedő. A végtest nagy, alakra nézve változó, majd szívalakú-vállas, majd közel háromszegletes, majd vállcsücskös*, majd kerek és lelapuló vagy hossztojásdad. Kisebb nagyobb mértékben a fej mell hátsó részét is fedi.

A szem három csoportba osztva; a közepes csoport, négy szeme trapezbe vagy négyszögbe állítva, az oldalszemek párosan s távolabb a középszemcsoporttól, mint ennek szemei egymástól. A csoportok külön külön párnaszerű dudorodásokon elhelyezve.

A lábak aránya 1, 2, 4, 3 vagy 1, 4, 2, 3; a lábak aránylag vaskosak, járásra kevesebbe, szövéssre ellenben kitünően alkalmasak. A bordáskörmök fogai 9—11, az első fog erős, kampós, a többiek fölé messze kinyúló; a sánjaköröm 2—3 tompa fogacscsul; a fogas serték mindég jelen vannak.

Faunánk legnagyobb alakjai e nembe tartoznak (♀); a hímek rendszerint kicsinyek, sok fajnál a második lábpár szárának kivastagodása által tűnnek ki; fej mellrészek igen fejlett.

A fonók a végtest végén és kissé lefele irányzottan állanak, végökön csévések. Az egész test egyszerű, ritkás szőrözettel borított, ritkán tömötten, megfekvően szőrös. A lábak fedezete szőrökből, sertékből és tompa tüskékből áll s a szövőkörmök táján a legtömöttebb.

Kerekháló szövő: tavaszi-nyári és őszi alakok; petéiket sűrű szövetbe burkolva attelelik. Prédájukat vagy a háló középtérséjén vagy egy közeli rejtekhelyen, melyhez a hálónak egy vezérfonala vezet, lesik; mindég fejjel lefele csüngenek s lábaikat a testhez illesztik. Veszedelem perczeiben a hálóról levetik magokat, s egy szálon függve maradnak, melyen a veszedelem multával ismét a hálóra kapaszkodnak; megérintésre is a földre vetik magokat, s egy darab ideig testhez vont lábakkal akár mint halva, mozdulatlanul maradnak addig, míg a veszedelem elvonul. A legtöbb alak alkonyatkor van teljes működésben.

Az e nemhez tartozó alakok tudományos és népies értelemben egyaránt tipikusok. Szervezetileg, biológiailag s a műöszön tekintetében leginkább megalkotják a pók fogalmát. A vizet s a földalatti, teljesen sötét üregeket kivéve mindenütt — helyen közön a viszonyokhoz képest oly tömegesen elnek, hogy okvetlenül föl kell tűnniök. A víz színe föle hajló növényzeten open úgy föltaláljuk hálóikat, mint a havasokon, ott, a hol a törpefenyő öve rég megszűnt s az állat hálójával a sziklara van utasítva.

* E vállcsücskők nagyon hasonlítanak a párnák csücskeihez.

SPEC. I. F. A. J. EPEIRA GROSSA. C. K. ŐRIÁS KERESZTESPÓK. RIESEN KREUTZSPINNE.

(grosse = durva, vaskos, az alak nagyságára, főleg a ♀-nél vonatkozik.)

Syn. 1845. E. grossa C. Koch «Die Arachniden» XI. p. 84.

Vide: THORELL «Remarks» p. 5. 6.

♀ Cserbarna, sárgabarnán lángolt és rajzolt; a magyar Fauna legnagyobb pókja. Fejmelle szélesen szívalakú fejrésze elől észrevehetőleg szűkülő; a végtest elején két csecsszerűen ki- és felálló kúp; hasfelen semmi rajz.

A fejmell barnászörös, a mellresz szélei szélesen besötétítve; a mellvért közepe elmosódva világosabb. A végtest elején, közepén egy ♂ alakú világos rajz, melynek szárai a vállkúpok alá kanyarodnak; a végtest czimere sötétbarna és enyésző, mintegy lágoló, — keskeny, világosabb harántvonásokkal átszelt, — szélei csipkések (ezikezak), elesen ki és beszögellők. A has sötétbarna, enyésző harántsavokkal díszítve, melyek rezsutosan az oldalak felé tartanak.

Lábai világos barnászörösek, sötét barnavörös gyűrűzettel; a czombok különösen feltűnők: tövükkel keskeny, végükön igen széles karikával ekesítettek s e karikák sötét színezete mintegy elmettszve válik el a czombközép világos színezetétől. A szemállást IV. t. 69. a mutatja.

A zár aránylag kevesse kiemelkedő; kétoldalt felgömböszzerű és fenyés dudorokat mutat, melyek köze a hosszú, igen durván haránt-rovátkolt fedőlemez korsófülként ∞ megfekszik, a lemez vege elkerekített, kanalasán kivájt.

Mertekek: ♀ Törzs	18-22 $\frac{ml}{m}$ ebből
fejmell	10—11 »
A végtest szélessége terhes állapotban	17 »
magassága	16—17 » es ebben
az állapotban a csücsök kevesebbe kiállók.	
I lábpár	26 »

♂ A nősténynél kisebb, rajzra nézve vele egészen azonos; hátsücskei hegyesen kiállók. A második lábpár szára kevesse kivastagodott, végén, a belső szelen, egy erős és több gyengébb túske; ugyan e lábpár csipője töven egy erős, egyenesen álló, alul vastag túske; az első lábpár czombja végén egy kurta, tompa, kissé kampósan görbült dudorodás. A szemcsoportok magas dudorodásokon állnak. A tapogató kurta, terden két felálló, aránylag kurta serte; oldalt és befelé fordított pikkelye keskeny, alóla a nemzőresz diószerűen és roppant vastagságra kidagad; az embolus végkörme igen hosszú, hegyes s hajlásával a gyűjtőre lelapul. Csak egy himet ismerek, tudtom szerint a jelen leírás az első.

Mertekek: ♂ Törzs	12 $\frac{ml}{m}$ ebből
Fejmell	6-5 »
I lábpár	24 »

A nőstény színezete változik. Az alapszín néha feketebarna, a rajzok szürkek s a ♂ alakú jegy enyésző vagy egészen hiányzik; a végtest hátezmerének csipkes szegélyzete azonban mindegy megmarad.

E nagy pók leginkább az erdőt és a cserjéseket, ritkábban a díszkertek bokrait lakja, hol erős nagy hálóját a nyílásokra alkalmazza. Párzását nem ismerem; ivarerett állapotát a nyár derekán éri el.

Ismerem az erdélyi részekből: Kolozsvárról (Bükk), Bonczhida (Bánffy-park), Szász-Vesszős (gróf Degenfeld erdeje); magyar részekből: S.-A. Ujhelyről (Kopasz töve), Pecsvidéke (Muz. gy. Frivaldszky), Buda (B. M. Ankertől kitűnő szépségű tipikus példányok).

SPEC. 2. FAJ. EPEIRA CIRCE. SAV. ET AUD. BÜVÖS K. ZAUBER-KREUZSPINNE.

(Circe = myth. alak, Hélios leánya, veszélyes bűvölő; a haló veszélyére ezélez.)

Syn 1825. (?) *Epeira Circe*. SAVIGNY ET AUDUIN «Descr. de l'Égypte.»

♀ Deres kinezésű, sűrű, megfekvő szőrözettel borítva, mely alól a rajzok, kisebb nagyobb mertekben elmosódva, tűnnek elő. A második lábpár csipője láthatólag fejlettebb a többinél. A végtest eleje módosan esücskös-vállas. Úgy alakra mint színezetre nevezve az *Epeira angulata* és *grossa* köze esik.

Sárgásbarna deresfehér vagy sárgás szőrrel borított. Fejmelle igen fejlett, szeles; a fejresz élesen elválasztott és határozottan kiemelkedő előre kissé szűkülő, és úgy mint a mellresz megfekvő szőrözettel borítva. A hátgödör, mely, harántul benyomott, a közte és a nyelecske közötti ter szőrtelen sima, barnás-sárga. A mellvert közből világos, szélein szélesen barnasárga, szőrös.

A rágók tövüknél világosak, szőrösek, lefelé mindinkább barnulók, végükön sötét piros-barnák és szőrtelenek. A csipőkarmok sötetek. Az állkapcsok és az alajk szeleiken világosak, tövükön barnák. A három első lábpár czombja, tövén, alig észrevehető barna, szakadozott karikával, végén ellenben szeles a czomb $\frac{1}{3}$ részét borító vörösbarna karikával diszitve; a negyedik lábpár a közepén is egy nagyobb, a czombot majdnem körül fogó barna folttal. A végtest ezimere a határozottabb rajzuaknál csipkeze határolt, sárgás-barna; oldalszegélye világosabb s a sötétebb szőrrel elegyes barna oldalak fele szinten csipkesen határolt. A has vörösbarna, a fonók és a zár között egy világos, határozott, nagy folt párral. A tapogatók vég ize felső felen vörösbarna, a többi iz ily színű keskeny karikák által elválasztva. A szem megfelel az *Ep. grossa*-nak; a közepesoport *lankásan* dagadó párnán és ketszernel is távolabbra áll az oldalszemekből mint a mekkora a távolság az alsó sor középszemei között.

A zár kissé esőszertűen emelkedik; fedő lemeze durván-haránttránczolt, hosszú ($2-3 \frac{m}{m}$) gyenge és ∞ formára hajlott, a végén kanálszerűen kivájt.

Mertek: ♀ Törzs $20.2 \frac{m}{m}$ ebbőlfejmell 9.2 »I lábpár 34 »

♂ Meglehetősen zömök természetű, nem aránytalanul hosszú lábú. Fejmelle fejlett, a fejresz keskeny és határozatlanul elválasztott; a szemesoportok magas dudorokon. A szőrözet kevesse tömött, neha épen ritkás és felálló, deres. A végtest igen módosan esücskös-vállas, szemyes fahéjszmű, egészen elmosódott, határozatlan rajzmaradványokkal. A lábak színezete a nőstényéhez hasonló, kevesebbe határozott; az első és második lábpár czombján, alul, két sorban felig barna, felig sárga sertetüskék állanak. A második lábpár szára igen kivastagodott, a kivastagodáson legalább három sor tüskevel; a kivastagodás testfelőli elen álló tüskesor külső végén egy kirívóan nagyobb tüske. A kurta tüskék barnák, erősek, a hosszabb tüskék karesuk, tövükön barnák, hegyükön sárgás fehérek. Ugyan e lábpár csipője tövén egy igen erős, kupalakuan, egyenesen felálló tövis; az első lábpár csipője végén egy kis se kamposan hajló, tompa fog. A tapogató kurta nyelvű, terdzéken két felálló serte, pikkelye aránylag keskeny, befele oldalt fordított, belőle a szerfelett nagy, diószertű nemzőszerv dagadozik, melynek gyűjtője világos gyantásárga, csavaros; embolusa megfekvő, egy csonka rákollóhoz hasonló és egy hosszú, éles, kis se hajlott tövissel fegyverzett.

Mertek: ♂ Törzs $14 \frac{m}{m}$ ebbőlfejmell 7 »I lábpár 24 »

Életmódját bővebben nem ismerem. Előfordult eddig az Alduna vidékén, hol Ogradena és a Veterani-barlang között meredező sziklákon szövé nagy hálóját; Mehádiáról (Muz. gy. Frivaldszky), «Bánát» megyelőléssel a becsi es. muzeumban, végre Kolozsvárt az erdélyi muzeum gyűjteményében.

SPEC. 3. FAJ. EPEIRA ANGULATA. (CL.) VÁLLAS K. SCHULTER K.

(angulatus = szögletes, vonatkozással a végtest csücskeire.)

Syn. 1757. *Araneus angulatus* CLERCK «Aran. Suec.» p. 22.

Vide: THORELL «Remarks» p. 3.

♀ Nagy alak, kétsücskös végtest; feketebarna vagy szürkés fekete; a végtest elején egy fehér középrajz. Lábai sárgásbarnak sötétbarnán karikázottak. Fejmelle laposan domboru, a fejrész oldalai egyen-közűek (paralleli); a végtest elején kétoldalt egy-egy csecsforma csücsök (mely vállas kinézést ad az alaknak; innen a magyar elnevezés). A színezet változékony:

Typus: A végtest elején es közepén egy széles, hátrafelé két ágra oszló, kurt, fehér vagy sárgás-fehér folt, mindjárt alatta egy hasonló színű, X alakú jegy; fekete barna vagy barnasárga alapszínezet mellett a lábak enyésző sötét gyűrűzettel bírnak.

1. változat: Szürkés alapszínezet; a végtesten csak a felső, kétágú folt van meg.

2. változat: Feketés; a felső folt hiányzik, az X forma alsó helyett egy közel háromszögletes kis fehér foltoeska (Ep. pineterum C. Koch «Die Arachniden» fig. 894. et 895).

3. változat: Barnásfekete a felső és az X forma folt enyészők, alig kivehetők.

A fejmell rendszeren vörösbarna, a mellrész oldalai szegélyszerűen besötétítve; a mellvért oldalain sötét barna-fekete, közepén világos barnássárga; a has sötét barna-fekete, az Epeiridáknál gyakori () forma világos rajz helyett 2 néha 4, sőt ritkán 6 feheres vagy sárgás páros-folt; ha kettőnél több van: akkor az alsó pár a szemölcsök mellett kétoldalt foglal helyet.

A végtest hátczimere legtöbbször kivehető és szélesen ékalakú, hegyével a fonókig lenyomul, oldalai kigyózza elhatároltak. Az alapszínezet rendszeren kásásan vagy porosán világosabb színnel elegyített.

Az alsó szemsor középszemei a homlok alsó szélétől nem állanak távolabbra mint a hátsó sor középszemeitől, az utóbbiak valamivel kisebbek és közelebb állanak egymáshoz mint az előbbieket. Az oldal-szempárok igen közel állanak egymáshoz, de nem érintkeznek; az alsó sor oldalszeme a közepes csoport alsó szemeitől kétszer-nél is nagyobb távolságra áll mint a mekkora a távolság a közepes csoport alsó szemei között; az alsó szemsor egyenes. A rágók sötét vörösbarnák, rövidek, hengerdedek, a csipőkarom hasonló színű, erős; a becsapó rés szélén több fog között egy kirívóan erős tűnik ki. Az állkapcsok kerekdedek, alapjuknál sötétbarnák, elők felé világosak.

A zár kétoldalt egy-egy hosszúkú dudorodást mutat: e dudorodások között a vaskos, hosszú fedő-lemez vastag, kétfelé fényesen dudorodó alaplóból ~ formára hajlik; vége felé kissé csatornás.

Mertekek: ♀ (ivarérett) Törzs 16 $\frac{m}{m}$ ebből

fejmell 6.7 »

♀ (terhes) Törzs 18 » ebből

fejmell 7 »

I lábpár 23 »

♂ Színezetre nézve többnyire a 3-ik változatnak megfelelő; fejmelle rendkívül fejlett, a végtestnél rendszeren nagyobb; a második lábpár szára kivastagodott, belső elén egy sor előre álló hosszú, erős tüske, e sor felett két sor apróbb tüske, ugyan e lábpáron a csipő tövén egy rövid, erős tövis. Az oldalszemek csecsformán kiálló emelkedésre helyezve. A tapogató kurt, térdizéken két hosszú sertével; a nemzőrész bunkószerűen és roppantúl kivastagodó; a befele oldalt fordított keskeny pikkelyből egy kettős csavarodású tányeralaku gyűjtő dagad ki, melyre a karforma embolus megfekszik, az embolus vége, egy rák csonka olló-jához hasonló, a nagy körme hajlott és éles-hegyes.

Mertekek: ♂ Törzs 11 $\frac{m}{m}$ ebből

fejmell 6.5 »

I lábpár 21 »

A vállas Keresztes legnagyobb pókalakjaink közé tartozik, erdőkben és díszkertekben gyakori; roppant merészen alkalmazott, erős és terjedelmes hálót sző; fonalzata oly erős, hogy a könnyebb szerű kalapot lesepri az ember fejéről; rejtet nem sző, hanem az ágak könyökeiben vagy a palánkok esües fedele alatt foglal helyet, hová hálójának erős vezérfonala is vezet. Ifju nemzedéke április vége felé jelenik meg; júliusban ivarérett; úgy látszik azonban, hogy evenként csak egy nemzedéke van. A párzást nem ismerem.

Találtam az erdélyi részekben: Kolozsvárt (Museum-kert), Balábányán (Csíkszék), Hosszuteiken, Nagy-Szebenben (Bergleiter gyűjtemény); magyar részekben: Diós-Győrött (fürdő), Alsó-Hánor (vasgyár, Lustavölgy, Köhát, Hosszaberez), S.-A.-Ujhely (Kopasz töve), Buda videke (Muz. gy. Pável), Ungvar (Muz. gy. Vidra Ferd).

SPEC. 4. FAJ. *EPEIRA DROMADARIA* WALCK. TEVE K. DROMEDAR K.

(dromas-camelus = kettős-püpos teve; a végtest kettős püjjára vonatkozik).

Syn. 1802. *E. Dromedaria* WALCKENAER «Fam.: Paris» 11. p. 191.

Vide: THORELL «Remarks» p. 21

♀ Kisebb alak, háromszögletesnek látszó végtesttel, melynek vállalai eles szögletűek, de csak kevésbé esüeskösen s inkább oldalt kiállók.

A fejmell meglehetősen domboru, a mellrész kevésbé kiszélesedő, mindkettő vöröses barna, a fejresz valamivel világosabb; a mellyert egyszínű sötétbarna. A lábak vékonyak elmosódó sötétebb gyűrűzettel. A végtest sarkai megfekvők, majdnem háromelűek, elesszögűek; elük meg feltünőbbé tetetik egy világos harántvonal által, mely esüesökről esüesökre futva a végtest elejét mintegy metszi s a közepen könnyeden behajlik. A végtest alapszíne fahéj-, vagy sárgásfehér színű, a czímeren végig finom metszésű harántsávokkal díszített. A czímer legtöbbszörre határozatlan, elmosódó, nem ritkán azonban sötétbarna, ékalakú, hegyével közel a fonókig lehatoló, alapján egy benyomuló, széles de gyorsan enyésző sáv által kettéosztva, és az oldalak felé szabálytalanul meghatározva. A végtest eleje (a esüesök előtti rész) íves, közepén gyakran egy lefele 2-3 ágra oszló világos, vesszőszerű rajzoeskával díszített. A lábak gyengék, sárgavöröses földön homályosan inkább pettyezetve mint gyűrűzve. A has közepén sötétesbarna az oldalak felé világosodó; a () forma világos rajznak ritkán és csak nyomai láthatók.

A középszemecsoport jól kiemelkedő, széles alaphól induló párnaszerű dudorodáson áll, az oldalszemek közös dudora csak kevésbé kiemelkedő.

A zár hornyolt szelű, meglehetősen kiemelkedő keretet mutat, melyre a kurta, széles, szelein felgyűrt és a végén szabatosan elkerekített fedőlemez szorosan megfekszik.

Mértekek: ♀ Törzs $8\frac{m}{m}$ ebből

Fejmell 3 »

♂ Igen kiesiny, karesű, hosszú lábu, de alakra nézve a nősténynek megfelelő; mindig sötétebb színű; végtestén leginkább a esüesökről esüesökre futó világos harántvonal s a vesszőszerű közép rajz látszik; a czímer és harántsávjai neha határozatlanok, sokszor bársonyfekete czikkelyek által elválasztva, elesek. A has sötétbarna. Az első lábpár csipője elején egy erős, kurta tüske; a negyedik pár czombjára törén egy kurta, erős tüske. A tapogató rövid, terdizeken két felálló sertével, pikkelye, befelé és oldalt fordítva, keskeny, alóla a nemzőrész erősen kidagad; a gyűjtőből egy sötétbarna, lapiczka, széles lemez áll ki, mely elmetsett végén kétszer kivágott úgy, hogy felülről tekintve 3 tompa fogat mutat. A második lábpár szára kevésbé kivastagodott, belső oldalán két sor tüskével fegyverzett.

Mértekek: ♂ Törzs $5\frac{5}{m}$ ebből

Fejmell $2\frac{5}{m}$ »

* Rendesen «dromedaria» íratott, helyesen javított! Fickert «Verz. des europ. Arten der Arach.» Genus Epeira; in Abh. der Naturf. Ges. in Götting XV. 1874. Lásd Thorell «Verz. Süd russ. Spinnern», S. Petersburg 1875 p. 15, sub. 1).

E csinos kis állat, mely június elején, néha már május végén is ivarérett, a buja füvet, réteken álló egyes bokrokat s az erdők szeleit kedveli; halóját mindegy közel a földhöz feszíti fel: rendszeren csak növény-szárazokon foglal állást, néha néhány fűszalat is összehúz és selejtesen összeszövi, hogy az így előteremtett ernyő alatt megvonulhasson. Párzását nem láttam. Gyakori.

Ismerem az erdélyi részekből: Kolozsvárról (Szénafüvek), Mező-Záhról, (Bottavölgy), Szász Vesszős-ről; magyar részekből: Apatinból (Galagonyás), Palánkáról (Gája Mandra), Illok környekeről, Panesovárról (wojloviczi erdő), Orsova (Allion hegy töve), Mragonya völgy (Ogradena és a Veterani barlang között a Dunaszorosba nyílik), Báziásról, Rakamazról, Tokajról (Kopasz tető), Nagy-Várad (Muz. gy. Mocsáry), Pecs vidékeről (Muz. gy. Frivaldszky), Buda vidéke (Muz. gy. Pável), Pest körül (Muz. gy. Frivaldszky), Mehadia (Muz. gy. Frivaldszky), Dabas (Muz. gy. Metelka Ferencz), Buda (Csillagvölgy Pável).

SPEC. 5. FAJ. EPEIRA ARBUSTORUM. C. K. CSERJE K. STRAUCH-K.

(aribustum-cserje, fáültetvény; a tartózkodásról).

Syn. 1837. *Epeira arbutorum* C. Koch «Uibers. d. Ar. Syst.» I. p. 3.

Vide: THORELL «Remarks» p. 19—21 et 458.

♀ Kisebb alak, végteste előreszőn kiálló vállcsücskök. Fejmelle barna; végteste poros-barna, benne a címér sötétebb néhány zöldessárga haránt-ívnyallal, elöl egy ilyszinű közepfolttal; labai sárgásfeherék fekete gyűrűzettel.

A zár egy kurta, kisselesedett, oldalain sötétszinű kiemelkedest kepez, mely felett egy finom, tompahegyű, hátra felé hajló fedőlemez áll.

Mertek: törzs $6\frac{1}{2}$ — $7\frac{m}{m}$

♂ Végteste kicsiny, majdnem ekalaku, vállcsücskei aprók, már inkább csak szögletek; a színezet és rajz a ♀ hez hasonló, de sötétebb és finomabb; a második lábpár czombja végén vastagodott, tuskos.

A tapogatón a nemző-resz kidagad; a gyűjtőből semmi lemez sem áll ki.

Mertek: törzs $4\frac{5}{m}$

Szeben környekeről elősorolja SILL Victor *Epeira bicornis* Walck. elnevezése alatt; a példányokat azonban nem láttam.

SPEC. 6. FAJ. EPEIRA DIADEMATA. (CL.) KORONÁS K. GEKRÖNTE K.

(*diadema* = korona, vonatkozik a koronaszerűen kiálló szemcsoporthal.)

Syn. 1757. *Araneus diadematus* CLERCK «Ar. Suec.» p. 26.

Vide: THORELL «Remarks» p. 8.

♀ A végtest felületén cseppalakú fehér foltokból alakított kereszt.

A fejmell hosszúkás-szívalakú, laposan domborodó; fejerésze határozottan elválasztott, kissé kiemelkedő; a hátgödör megvan s haránt, hosszúkásan bemélyedő, a lábpárok felé barázdásan kisugárzó. Végteste hossztojasdad, végén kisse csücsosodó, elöl enyészve csücsos, mintegy vállas. Labai világos földön sötétén gyűrűzöttek.

Sárgásbarna; néha rozsdásbarna, néha fekete-barnásba átmenő alapszínezettel. A fejmellen egy sötét középsáv, mely a hátgödörből indulva villásan oszlik és ágait a közép és oldal szemcsoporthok felé bocsátja. Az oldalszemektől egy széles, sötét sáv indul, mely a fejmell oldalait szegélyezve, a nyeleeske felett nem egyesül. A végtest, felül, háromszögletes czimert visel, mely csücsával a fonóig nyomul, kétoldalt egy többszőrösen kigyózó vonal által szegélyeztetik; a címér közepében, a test hossztenegelyének megfelelő, egy sor részint hosszúkás, részint cseppalakú, jól sorakozott, sárgás vagy fehér folt és petty, melyhez a végtest

elején két nagyobb oldalfolt csatlakozik s megalkotja az e fajt különösen jellemző keresztet; oldalai barnások bordaszerűen resimtosan előre és a czimer szegélyefelé törekvő sötétebb vonalakkal. A has közepén rendesen egy sötét térese, melyet két [] alakú élénk sűrűs vonal szegélyez. A mellvert egyszerűen sötétbarnás.

A test ritkán álló, egyszerű szőrözettel fedett, rajzai, jelesen a végtest keresztje, a felbőrök alatt elterülő ikrás zsírétegtől erednek.

A szemesoportok párnaszerű dudorodásokon elhelyezve; a közep csoport felső párja közelebb áll egymáshoz, mint az alsó szempár hozzá és egymás között. Az alsó oldalszemek észrevehetőleg nagyobbak a hátsóknál. A rágók a test alapszínének megfelelő színezetűek, a csipőköröm táján sötétedők (infuscatae), a csipőköröm vörösbarna, kissé áttetsző. Az állkapcsok tövükön sötétebbek, szeleiken világosodók.

Terhes állapotban a végtest nagyon felpuffad, mogyoróalakat ölt. A zár kiemelkedő szélű, láthatólag két felkörü felből áll, e két fel felett egy fel és lehajtható, keskeny, a zár szélén túl és a fonókéfé messze kinyúló, harántránczolt, végén kissé felhajló fedőlemez, melynek hossza meghaladja az 1 $\frac{m}{m}$ metert.

Mértékek: ♀ Törzs 15—18 $\frac{m}{m}$ ebből

fej mell 6—7 „

♂ A hím színezete a nőstényének megfelelő, alakja kisebb, karesű; fej melle oly széles vagy valamivel szélesebb mint a végtest; a hosszú lábak közül a második lábpár szárának felső vége láthatólag kivastagodott; e kivastagodás testfelőli élén egy sor erős tüskevel fegyverzett. A tapogató nyele rövid; térdizéken felfele ágaskodó két hosszú, erős serte áll; nemzőszerve befelé és oldalt fordított kis pikkely alatt nagy, karforma embolusa kurta, szuronyyszerűen hajlott erős körömbé végződő, a gyűjtő laposan domborn alóla, és oldalt kifele egy fehéres, lapiczkás, széles lemez kinyulik, mely végén feketesen szegélyezett.

Mértékek: Törzs 8—9 $\frac{m}{m}$ ebből

Fejmell 4—5.5 „

E leírás a faj tipikus alakjait illeti. Színre nevezve a változatosság szerfelett nagy. Néha az egész állat szőke s a kereszt is e színbe enyésző, ugyancsak a lábak gyűrűzete és a fej mell sávjai is elmosódnak (varietas E. peleg Черек); máskor szürkésen fekete alapszínezetű, máskor ismét feketebarna igen kirívó és megszaportított fehér pettyekkel (E. stellata C. Koch) s e változatok felismerése mindig az ivarszerv azonosságán fordul meg.

A Koronás Keresztspók mindenütt elterjedett faj, mely a havasok fenyő, söt törpefenyő öve felett is open úgy mint háztájakon, kerítéseken bokros helyeken, erdőben stb. lelhető, sokszor nappal, a verőfényen is lesben áll nagy kerekhálója téresején; rendszerint azonban kedvelője az árnyéknak. A házak táján szereti a fák kamrákat, az ólak mögötti közekeket, mindennemű nyitott ablakokat hálóiival bevonni; a kertek sövényein bokrain mindenütt ott van; nevezetesen őszkor feltűnő, a midőn a terhesség folytán nagyra nőtt végteste feltűnővé teszi. Bokrok között lakásul néha harangmódra szövö össze a leveleket, legtöbbször azonban beéri valami alkalmas zuggal is, sokszor éppen csak a növény szárán foglal helyet s tartja a vezérfonalat, melyet a hálótól vont, hogy a megrezzenésekről tudomást szerezhesen.

Július vége fele már akadnak ivarérett példányok s megkezdődik a párzás, mely lényegében megfelel az életmódról szóló szakaszban leírtakhoz, csak az állás más, a mennyiben az ivarok hasfelőkkel egymásfelé fordulnak a hím azonban alantabban áll, úgy hogy feje a nőstény zárjának magasságát éri. A nőstény októberben rakja le petéit, melyeket ereszek alá, a fák hónaljában felgömbölköztető sűrű szövetbe burkol, a melyben áttelelnek. A peték száma 1000—1600. Az ifjú nemzedék csak nyár kezdetén lesz észrevehetővé.

Elterjedésének részletezését mellőzve csak a nevezetesebb körülményekkel járó helyiségeket kívánom megemlíteni. Észleltem Kőszeg városában egy kiszáradt kutban mintegy 3 ohyi mélységben; a Krivanon (Kárpát) meg mintegy 6000 láb magasságban is jelenkezett, hol is az óriási görgetegek szikla tömbjei között szőtte hálóját; Erdélyben a Nagy Hagymáson (esíki havasok) mintegy 5000 láb magasságig és a Csófronka kő (ugyanott) magános szirtesücsa alatt is, mely 4000 lábna magasabbra hág, találtatott; egy szép róka-vörös színváltozat igen gyakori a Kárpát tövén (Csorba mellett) elvonuló ingovány-övön (Prónyiszka), mely a magyar Arancák, jelesen Epeiridáknak előttem ismert leggazdagabb lelhelye.

A keresztespók az az alak, a mely a legtöbb vizsgálat tárgyaul szolgált, boncztanilag legtöbbször tárgyalatott. Aristoteles vizsgálatának e faj szolgált alapul; az okor symbolicájában nagy szerepet játszott, mely szerep maradványa a mai ugynevezett «szerencsepók» is; a középkor babonás hiteben gyakran találkozhatsz a szerencsepókkal; ama beteges állapot is, mely nemely egyeneknél jelentkezve, az étvágyat rendkívüli dolgokra ingerli, leginkább a keresztespókot választja; így Lalanderól és Schoppenhauer Johannáról legalább följegyeztetett, hogy a «kövér» keresztespókot esemegeik közé számíták stb.

SPEC. S. FAJ. EPEIRA MARMOREA. (CL.) MÁRVÁNYOZOTT K. MARMORIRTE K.

(marmorea = márványtarka; a végtest színvegyületéről.)

Syn. 1757. *Araneus marmoreus + pyramidatus* CLERCK. «*Ar. Succ.*» p. 29, 34.

Vide: THORELL «*Remarks*» p. 9, 10.

♀ Színezetre és alakra nézve közel áll az Epeira diadematahoz; az előbbire nézve egyike a legváltozobbb fajoknak.

A lábak világos sárgásfeherék, a czomb vége és a terd elenken vörösesek; a többi gyűrűzete a lábaknak barna. Ez legállhatatosb ismertető jele.

A fej mell módosan fejlett, módosan domboru, a fejresz láthatólag elválasztott, de nem kiemelkedő; az egész barnássárga; a középszemesoporttól a hátgödörig egy finom, enyesző, barna vonal fut; a szőrzet gyenge és gyér; a hátgödör harántfekvő mintegy erőszakosan benyomva, törött.

A mellvert tiszta fekete, kisse fénylő, gyeren szőrös.

A has tiszta fekete, [] formán sárgás-feheren befoglalva.

Az állkapcsok világos barnássárgások, végükön bebarmitottak.

Ezek valamennyi válfajjal közös jellegekként állanak.

Válfaj: α = marmoreus CLERCK (Ar. succ. pl. 1. tab. 2.) Végteste barnás alapszínű, neha sárgás lehelettel, elejen egy széles, rövid hosszfolt fehér, tőle két oldalt szabálytalan felholdszerű, hasonló színű foltok, ezek alatt kezdődik a hasonló színű, szalagszerű, többször kigyózó szegelye a czimernek, melyben a koronás keresztes keresztjehez hasonló foltocskák foglalnak helyet. E fehérfoltos változat alapszíne átmegyzen a sárgásba vegre a zöldesbe és elenk világos zöldbe elmosódó foltokkal.

Válfaj β = babel CLERCK (Ar. Succ. pl. 1. t. 6) barnás alapszínezettel, valamennyi folt vöröses sárga.

Válfaj γ , barna alapszínezettel, valamennyi folt gyönyörű sötét karminszínű.

Válfaj ε = pyramidatus CLERCK (Ar. Succ. pl. 1. t. 8) az egész végtest felülete sárgás fehér vagy elenk világossárga, vagy zöldes lehelletű; a szemölcsök felett kezdődve egy ek. vagy nyelvalaku sötétbarna czimer nyomul felfele a hátsó ingödör-parig. (Epeira scalaris, Epeira pyramidata Auctorum.)

E fő válfajok között számtalan és oly átmenet letezik, mely lehetségessé teszi egy olyszerű sornak az összeállítását, hogy a karminpuntu válfajtól az ε jegyűig, még pedig valamennyi itt elősoroltakon át a lassankenti átmenet kimutatható. Minél világosabb a válfaj, annál élenkebb a lábak gyűrűzete: a czomb majdnem alabastromfehér, vagy vajsárgás, felső gyűrűje ugy a terd is elenk sárga-vörös, a többi gyűrű sötétbarna.

Az oldalszemek a középsőkből kétszer akkora távolságra, a mekkora az alsó sor középszemeinek a távolsága egymás között.

A zár kiemelkedve, kétoldalt fenyes bütyköt alkot, a fedőlemez áttetsző barnasárga, harántrovátkolt \sim hajlásu, kivájas nélküli, hosszának közepe táján láthatólag kivastagodott.

Mertekek: ♀ Torzs 14 m_m ebből
 fej mell 6 »
 I lábpar 20 »

♂ Jelesen két színváltozatot mutat, melynek elseje elmosódva mutatja az α válfajét, a másik teljesen megfelel az ε válfajának.

A fej mell igen fejlett, jelesen mellresze kiszélesedő, az egész sárgabarna. A végtest kicsiny. A lábak elmosódva gyűrűzöttek, a czomb vége és a térd jellemző gyűrűzete hiányzik. A második pár lábszára kivastagodott, belső oldalán három sor tüskével, melyek közül a felső a leggyengébb és sárgavörös, a más kettő erős, fekete tüskéből áll; minden czomb alsó oldalán 3—5 gyenge, vörösbarna sertetüske.

A szemek magas párnákon elhelyezettek.

A tapogató rövid nyelű, terdizéken két hosszú serte, pikkelye oldalt befelé fordított, keskeny, kicsiny, nemző szerve kidagadó, előlről tekintve egy hosszú, erős tövű, sarlószerűen hajlott eles-hegyes karom vehető észre.

Mértékek: ♂ Törzs 6.5 $\frac{mm}{m}$ ebből
 fej mell 3.5 »
 I lábpár 14.5 »

Ez epen oly szép mint színváltozatai által érdekes pókfaj eredetileg is két, sőt három fajnak tekintetett, miglen THORELL igen beható vizsgálatai (Remarks on Synonyms of eur. Spiders pag. 9—13) ki nem mutatták, hogy e változatok ketsegtelenül egy fajhoz tartoznak.

A faj a dús növényzetű nedves helyeket, nevezetesen az ingoványokat kedveli, hol nagy, függőlegesen álló kerekhálóját leginkább bokrokra alkalmazza, közeleiben egy lefele nező, jól kárpitozott cseszeszerű ernyővé szövi össze a leveleket vagy füveket.

A párzás lefolyását nem ismerem.

Legnevezetesebb lelhelye a Kárpát töven, közel Csorba faluhoz a Prvnyiszka ingoványokon van, hol a sötét karmin diszszel ékeskedő példányokon kezdve, átmenetileg az ε válfajig minden szín képviselve van. Itt találtam azt is, hogy ez az α változatnak megfelelő him egy ε változatu nősténynel tartózkodott s így a változatok iránt letezett nemi ketsegeket is végképen eloszlatta.

A faj ivarerettségé julius végére esik.

Ismerem meg az erdélyi részekből az α válfajt: Kolozsvárról (setater Schusztér ur gyűjteménye), ε válfaját ugyanonnan (Muzeumkert); Mező-Záhról; Bekas szoros (Entreke, Gyilkostó); Szászvesszősről, Bonyháról, Nagy-Szebenből (Bergleiter gyűjteménye); magyar részekből a Prvnyiszkon kívül: Orsováról (Allion töve), Alsó-Hámor (Borsodban, Kovácskö alja, Lustavölgy eleje), Lykauka (Liptó, a vár alatt), Ruttká (Trencsén), Lucsivnárol (Szepes) és Csepel szigeteről. A pesti nemz. muzeumban csak egy példány, Bees környekeről, gyűjtte DR. KOVÁCS GYULA.

SPEC. 9. FAJ. EPEIRA QUADRATA. (CL.) NÉGYES K. QUADRAT K.

(quadrata = négyszögletes, de itt csak a végtest négy fehér foltjára vonatkozik.)

Syn. 1757 *Araneus quadratus* CLERCK «*Ar. Suec.*» p. 27

Vide: THORELL «Remarks» p. 13, 490.

♀ Nagy alak; kerek, kisse lelapított végtesttel; felül négyszögbe álló négy fehér folttal, mely szorosan a nagy ingódrók állásához alkalmazkodik. Terhes állapotban a végtest előre puffadozó úgy, hogy a fej mellnek közel $\frac{2}{3}$ reszet fedi.

A fej mell barnássárga, szeles, laposan domboru, szivalaku; a fej, elől alig keskenyedő; a közep-szemcsoporttól a hátgödörig egy sötétbarnavörös, szeles sáv vonul, ketoldalt tőle — úgy azonban, hogy a szeleket nem éri — két hasonló színű sáv szegélyezi nevezetesen a mellrészt s az oldalszemekig hatolva mindinkább keskenyedek; a mellvert sötét vörösbarna, közepen neha egy kis, hosszúkás világos foltocska. A lábak vörössárga földön barnan gyűrűzöttek.

A végtest színe szerfelett változó s az almazöld színen kezdve az elenksárgáig, ettől pedig a megszínvöröség minden képzelhető változat megvan.

A sötétebb sárgaszínűeknél, néha a zöldeknel is, a fehér foltok néha karminpirosan, finoman szegélyezettek.

A foltok közül csak az ingödörkhöz alkalmazkodó négy folt állandó, néha azonban, nevezetesen a halavanyzöld példányoknál, ez is alig vehető észre. E négy folton kívül sokszor számos folt csillagszerűen tarkítja az állatot: a hol e foltok symmetriát mutatnak, ott ingödörösek lehetnek, néha azonban a symmetria is csak megközelítő.

Néha a hosztengelybe eső apró foltokból álló sor is előfordul, mely a felső nagy foltpárral a koronás Keresztes keresztjéhez hasonló idomot képez. A has nélkülözi a rajzot. A többire nézve az orismologiai rész, mely leginkább e fajra alapítottatott, bő felyvilágosítást nyújt.

Mertekek: ♀ Torzs (ivarerett) 14.5 $\frac{m}{m}$
 » (terhes) 19 » ezekből
 fej mell 7—7.5 »

♂ Aránylag igen kicsiny, karsu, vörössesárga, egyszínű fejmellet, rendszeren halaványsárga végtesttel, rajta enyesző négy folttal, melyből az ingödörök kirimnak. A második lábpár szára kivastagodott, belső elen két sor tüskevel; az első lábpár szárai alul szinten két sor feltűnő hosszúságú tüskevel fegyverezettek.

Mertekek: ♂ Törzs 9 $\frac{m}{m}$ ebből
 fej mell 4.3 »

A nőstény, terhes állapotban, legnagyobb pókjaink közé tartozik. A faj az aljakat keresi, különösen kedveli a sásos árkokat, buja növényzetű szakadásokat, ezeken kívül a bogáncsos helyeket. Hálója aránylag kis terjedelmű, de annál erősebb s nem tartozik a ritkaságok közé, hogy erős sáskák (*Stetheophyma*) vesztőket lelnek benne. A pók, bogáncsfejek alatt, vagy összehúzott sáslevelek csücsében, vagy egy-egy kiálló ágon — lefele néző, csészeszerű, jól kárpitozott ernyőt készít, melyben, háttal a földfele függve, megvonul. A lakas rendszeren igen közel áll a háléhoz. Juniában már feltűnik, júliusban vagy augusztusban ivarerett és szeptemberben néha októberben is a növények közé és közel a földhöz alkalmazza peteburkát, mely áttelel s 1000—1200 petét tartalmaz.

Ismerem az erdélyi részekből: Kolozsvárról (lóversenyter gazdag színváltozatban), Mező Záhrol, Parajdrol, Tölgyesről, N.-Szebenből, Szász Vesszősről, a Gyilkos tó környekeről (Csikszek), Nagy-Szebenből (Sill gyűjtemény); magyar részekből: Alsó Hamor (Vadkert), Lucsivna (Dezsőkut), Veszprém környekeről; Rakos Palotáról (Muz. gy. Pável.)

SPEC. 10. FAJ, EPEIRA CORNUTA. (CL.) NÁDI K. ROHR K.

(cornu = szarv, némileg találma a végtest rajzára; a nádi a tartózkodásról van véve.)

Syn 1757. *Araneus cornutus* CLERCK «*Ar. Suec.*» p. 39.

Vide: THORELL «*Remarks*» p. 15.

♀ A fej mell röviden szívalakú, a fej jól kiálló, a mellreszből jól kiemelkedő. A végtest tojásdad, nem vallas. A lábak csak az ízeket végen behomályosítva (határozatlan gyűrűzés).

Az előtest sárgásbarna, egyszínű; a mellvert sötét feketebarna. A végtest felülete sárgásfehér, ritkán rózsaszín lehelettel, legtöbbszörre elesrajzu czímerrel diszítve. A czímer fekete, finoman, feheren pontozott, széles-ekalakú, hegyével a fonókig, talpával, az az folfele, a második ingödörpárig ér s itt kétfele elesen, majdnem szarvszerűen kicsücsösödő; oldalt 4—5-ször kigyózva határolt; az ingödörök felől a közepébe egy feheres-sárgás, vékony ek nyomul bele s a fonok fele tart, anélkül hogy ezeket elérne; ez eken keresztül 3—4 finom feher keresztvonalas több mezőre osztja az egész czimert.

A czimer felett, a végtest elején, egy finoman pontozott, fekete, háromszögletes folt, két hajlott oldalfolt által mintegy () be foglalva. A has sötétbarna, a fonók és a zár között elenksárga () alakú rajz.

A vegtagok czombjui tövüktől közel hegyökig sárgásanfehérek, hegyükön barnásan homályosok, mely homályosodás felső elükön néha ékszerűen lenyomul.

Szemállás mint az E. diadematánál.

A zár kiemelkedő, duzzadozó, mintegy felgyűrt szélű; fedő lemeze nem éri a zárkeret szélet, igen vékony, harantránczolt, egyenes; ketoldalt tőle két kurta, széles-karajos lemez áll.

Méretek: Törzs 11—12 $\frac{m}{m}$ ebből
fej mell 4 „

♂ Színezete megfelel a nősténynek, avval a különbséggel, hogy a végtesten a sárgásfehér szín kevesebbé uralkodik és inkább csak szegélyezi és osztja a leírt rajzokat. A második lábpár szára nincsen kidagadva. A tapogató nyele kurta; a bunkósan kivastagodott térdizéken, felülről két hosszú s az ivarszervre hajló serte áll; ivarszervresze az oldalt és befelé álló keskeny pikkelyből diószzerűen kidagad s dióhoz hasonló hornyolt gyűjtőt alkot; alulról egy sarlóalakú széles embolus meredez, melytől hüvelykujjformán egy rövidebb mellekköröm elválk.

A nádi keresztcs a buja növényzetű helyeket, leginkább azonban a nádasokat és környékeket lakja, hol rendszeren kora tavasztól késő őszig több nemzedékben fordul elő (lásd az «Életmód» szakaszában és III. t. 67 id. a b); terjedelmes kerékhalója melle mindig lakást is készít s e lakások változatossága roppantnak mondható. Majd sűrű nemezből álló gyűszűformára, majd ügyesen megtörött gyekeny vagy sás szál töresi könyökebe doboz formára alakítja, majd a nádbojtokat szövű össze zacskóformára, majd a vízapadás folytán a nádon fennakadt és kiszáradt vizilencséből szabadon függő harangot alkot; leginkább alkonyatkor működik, hálóját 20, 25 perc alatt készíti el. Áprilisban és június végén vagy július elején parzik s ilyenkor a pár a nőstény lakásában együtt tartózkodik.

Elterjedése nagy, de csak az alantas helyeket kedveli; berezre nem hág, csak ott, a hol mocsáros helyek hegyek közé felnyomulnak, de itt rendszerint nem megyen a lomberdő öven túlra; e szabály alól csak egy kivetelt ismerek: a Gyilkostó nádját (Csik-Gyergyó), melyet fenyessek környeznek.

Találtatott eddig általam Erdélyben: Kolozsvárt, Szamosfalván, Mező-Zahon, Gyekenben, D. Szt.-Mártonban; Sill szerint Nagy-Szebenben; Magyarország területén általam: Doroszlón (Bács megye), Zomborban, Rácz-Militicsen, Bogojeván, Apatinban (a Dunaligetekben), Ujvideken (setah.), Zimonyban, Pancsova körül, Bekes-Csabán, Szajol táján, Rakamaz mellett, Tokaj (a nagy csucs tetején is), S.-A.-Ujhely (a «Kopaszon» is), Veszprem körül, B.-Füreden (a Balaton nádja), Sz.-Fehervár (sóstó); N.-Várad (Muz. gy. Moc ár). Pécs vidéke (Muz. gy. Pável), Pest vidéke (Muz. gy. Pável), Buda vidéke (Muz. gy. Pável). Legnevezetesebb lellye tagadhatatlanul a «Gyilkostó» vagy «Verestó» környeke Erdélyben, mely egy hegyomlás következtében — e század harmadik tizedében — keletkezve, ma már náddal is kerített, a nádi pokot is új keletű faunájához számítja.

SPEC. 11. FAJ. EPEIRA PATAGIATA (CL.) ÖVES K. GERANDETE K.

(παταγέζιον = széles biborszegély a görög ruházaton; némileg a végtest rajzára talál.)

Syn. 1757. *Araneus patagiatus* CLERCK «Aran. Suec.» p. 38.

Vide: THORELL «Remarks» p. 16.

♀ Alakra egyezik, rajzban is hasonlít az Ep. cornutához, egészben azonban sötétebb színezetű; nemzőrészei másképpen alkotvák; a végtest kerékdébb és kissé lapított.

A fej mell sötét vörösbarna s ilyen a mellvert is; a végtesten a sötét vörösbarna szín az uralkodó; czimere az Ep. cornutiának megf lelő, térese beosztása azonban legfeljebb két keresztvonal által eszközöl-

tetik; kigyózó szegélyvonalai szalagszerűek, világosak. A czimer felett sötétbarna földön és egymás felett haránt fekvő két világos sárgabarnás — — alakú, széles arabeszkyszerű ágrajz. A végtest oldalai sárgabarnások, a has felől bordamódra benyuló széles, sötét czikkelyek által csipkésen szakadozottak; a has sötétbarna, a zár és fonók között () alakú világossárga vonással.

A lábak barnászörösek; a czombok végökön rendszerint sötét barnavörös gyűrűvel, néha ilyszínű. lefele elmosódó besötétítéssel.

A szemek közepesoportja gyantásárga, átlátszó.

A zár kerete kidagadó, fedőlemeze *vaskos, rövid, hirtelen felhajló*, a végén elmetezett.

Mertekek: ♀ Törzs	8—9 $\frac{m}{m}$, ebből
fej mell	4 »

♂ Alapszínezete vörösbarna, a nőstényének megfelelő; végtestén csak az oldalszegély és elején rendszeren a közepén egy határozatlan \wedge alakú világos rajz. A tapogató nyele világos vöröses sárga; duzzadt terden két felálló, gyenge sertével; nemzőrésze oldalt és lefele fordított kis pikkely alól vesealakra kidagadó, hornyolt gyűjtőt alkot, mely alól a két sötétfekete színű, *keréssé hajlott, erős, egyforma karomból álló embolus áll ki*.

Mertekek: ♂ Törzs	5·5—6 $\frac{m}{m}$, ebből
fej mell	3 »

Szép, egészben véve világos eserszínű (a cserzésre használt kéreg színe), elmosódó rajzú válfaját a Bogojeva (Bácsmegye) melletti nagy tölgyesekből ismerem.

E faj, mely az Ep. cornutával gyakran összetévesztetett, a bokros helyeket kedveli, ritkábban a fűbe is leszáll; hálójá kisebbszerű, lakásul beéri egy-egy összegyöngyölt levéllel, néha több levelet is összesző és zacskószerű sejté alakítja.

Úgy látszik, hogy tavaszi és nyári nemzedéke van.

Párzását nem ismerem.

Találtam Erdélyben: Kolozsvárt (Museumkert), Szász-Vesszősön: Nagy-Szebenben a Sill és Berg-leiter-fele gyűjteményekben; Magyarföldön: Bogojeván, Doroszlón (kertekben), Palánkán (Gája Mandra erdőréssz), Pancsován (Wojloviczi erdő), Tokaj mellett (tölgyeken), Tokaj hegy («Kopasz» eserjése), Rakamaz (kincstári fiatal erdők), S.-A.-Újhely (fürdő sétahely), Lucsiván (Szakmáry Donát parkja), Csorba mellett (Prvnyiszka), Liptó Sz.-Miklóson (Demanova völgy), Kőrmöczbányán (kertekben), Veszprém mellett; Nagy-Váradon (Muz. gy. Moesáry), Pest vidéke (Muz. gy. Pável), Ugyanott (Muz. gy. Frivaldszky), Ungvár (Muz. gy. Vidra Ferdinánd), Balánbányán (Csikszek).

SPEC. 12. FAJ. EPEIRA ALSINE. (WALCK.) HŰSÖLŐ KERESZTESPÓK. SCHATTEN K.

(alsus = frissítő, hűsítő; alkalmasint a tartózkodásra vonatkozik.)

Syn. 1802. *Aranea alsine* WALCKENAEK. «Faune Par.» II. p. 193.

Vide: THORELL «Remarks» p. 17.

♀ Közepes alak; az általános színezet elenken barnás sárga, néha vöröses lehelettel. Fejmelle világos barnás sárga rozsdavörös szegélyvel és középvonallal; végteste olykor barnássárga, vagy halavány narancsszínű, hátfelén szerteágazó, finom, sötétebb erezettel befutva; néha elmosódó világos pettyekkel, a melyek minden példánynál máskepen csoportosulnak, állhatatlanok. A lábizületek csak végeiken, halaványan gyűrűsök.

A zár egy haránt kiszélesedő szaruncmü, sötét keret; a fedőlemez a kereten túl kiálló, durván rovátkos.

Mértékek: Törzs 9 $\frac{m}{m}$
I lábpár 10 „

♂ Kiválóan élénk sárga sok vörössel; elesebben kifejezett világos pettyekkel; az első két lábpár szára és lábvége barna. A tapogató harmadik ízületén két hosszú, fölfele álló serte; a gyűjtőn egy erős, hegyes, horogszerű embolus.

Mértékek: Törzs 4 $\frac{m}{m}$
I lábpár 11 „

Nagy-Szeben környékéről elősorolja SILL VICTOR, Epeira lutea C. Koch név alatt. Egy ♀ a kolozsvári muzeum kertből az ottani muzeumi gyűjteményében. A ♂ előttem ismeretlen; leírta MENGE l. c. p. 61, 62, 63.

SPEC. 13. FAJ. EPEIRA UMBRATICA. (CL.) RÉŠ K. SPALTEN K.

(umbra = árnyék; umbratius átvitt értelemben: visszavonult életű is; talán a komor színezetre s a tartózkodásra is.

Syn. 1757. *Araneus umbraticus* CLERCK «Aran. Suec.» p. 31.

Vide: THORELL «Remarks» p. 14.

♀ Igen laposra nyomott alak; a hát ingödrei mély benyomásúak, feltűnők; az egész állat homályosbarna alapszínezetű; a végtest címere világosabb, néha épen világos, mindig kigyózó szegelylyel díszítve. A fej mell lapos-szeles, fejerésze jól elválasztott, kisse kiemelkedő, széles, majdnem parallel oldalú; a hátgödör haránt benyomású, meglehetősen hirtelenül és jól bemélyedő. Az egész testresz sötét vörösbarna, fehéres, gyéren álló szőrözettel borítva.

A mellvért egyszínű, feketebarna. A rágók rövidek, láthatólag térszerűen az állkapcsokra hajlók, sötét vörösbarna színűek. Az állkapcsok és az alajk alapja sötét fekete barnák, szeleik kissé világosodók.

A lábak barnák, elmosódó sötét gyűrűzettel. A czombok tövükön csak a negyedik párnál kisse világosodók, egyébként barnák; ugyane lábpárnál a gyűrűzet aránylag a leglátározottabb.

A végtest tompatojásdad, igen lapos (7 $\frac{m}{m}$ szélesség mellett pl.: csak 3 $\frac{m}{m}$ vastag); a sötét címer már elején kezdődve, végig nyomul; oldalt sárgásbarna, néha enyésző, ritkábban fehér, kigyózó, széles szegelylyel ékítve. A címerben hat ingödörpár tűnik fel mélysége és sötétsége által (innen: sexpunctata Linne). A has feketebarna egy világos, sárgásfehér foltpárral.

A fonók bevonva, úgy, hogy a végtest vége felettök kiáll.

A szemesoportok jól kiálló dudorokra elhelyezettek.

A zár lelapított, fedőlemeze kurta, a zár keretét alig meghaladva, tompa; a vége kivájt.

Mértékek: ♀ Törzs 12 $\frac{m}{m}$
fej mell 5.5 „
I lábpár 16 „

♂ A hím karesu, lapos; fej melle igen fejlett, valamivel élénkebb rajzú, lábai határozottan gyűrűzöttek, jelesen a III. és IV. lábpár czombjai töven sárgásfehér, végén szélesen barna. A többiekre nézve a nősténynyel egyező. A második lábpár szára nem dagadt.

A tapogató kurta nyelvű, terdizeke két felálló sertével; pikkelye befele, oldalt fordítva keskeny; nemzőszerve diószerűen kidagadó; alulról tekintve éleshegyű, szétágazó V forma villa látható.

Mértékek: ♂ Törzs 8—8.5 $\frac{m}{m}$ ebből
fej mell 4.3 „
I lábpár 25 „

Válffajai léteznek: α minden jellemző jegy mellett dobányszínűek; β közel feketek, egészen enyésző rajzzal és ivarérett korban (σ) alig $8 \frac{m}{m}$ nagyságúak.

E faj a lakott helyek táját kedvelve néha meglehetősen magasságban is kapható. Tartózkodik főleg a kerítések szőlőpeinek repedéseiben, a zsindelek alatt, falresekben, rosszul illesztett kereszttek könyveiben stb., egyáltalában oly helyiségekben, a melyek alig későfoknyi nyílásúak; a szabadban leginkább sziklarepedésekben és kergek alatt. Nagy terjedelmű kerekhálójának vezérfonala a résbe vezet. Az állatok csak késő alkonyatkor jönnek ki a háló teresejére, nappal soha sem láthatók. A párzást nem ismerem. Úgy látszik, hogy e fajnak tavaszi és őszi nemzedéke van.

Ismerem: erdélyi részekből: Kolozsvárról, Mező-Záhról, Gyekéből, Parajdról, Gyergyó Szt.-Miklósról, Borszeokról, Ilváról, Hosszútelkeről, Tordáról; kis fekete válfaját Szász-Vesszősről, hol a gf Degenfeld-fele szőlők karóinak szűk repedéseiben tanyázott; magyar részekből: Doroszlóról, Illokról, Pancsováról, Orsováról (Allionhegy csücske), Jeselniczáról, Mehádiáról (Stana bogára, a Damoclet alatt, Ogradenáról, Ungvárról, Alsó-Hámorból, Miskolczról, Selmezbányáról, Kőszegről, Pécs vidékeről. (Muz. gy. Frivaldszky.) Ezeken kívül Nagy-Szebenből (Sill gyűjt. «alter Berg» és a Bergleiter-fele gyűjteményből.)

SPEC. 14. FAJ. EPEIRA SCLOPETARIA. (CL.) ERESZ K. TRAUEREN K.

(sclopetum = pisztoly; a him tapogatójának alakjáról van véve. A magyar név a tartózkodásról.)

Syn. 1757 *Araneus sclopetarius* CLERCK «Aran. Succ.» p. 43.

Vide: THORELL «Remarks» p. 15

♀ Kevésbé lelapított, az előbbi fajjal rokon alak élenkebb rajzokkal, kevésbé feltűnő hátgödörrel; nagyobb és nyulánkabb az Ep. umbraticánál. Alapszínezete vörösesbarna vagy szürkés fekete; valamennyi czomb legalább a töven sárgás fehér; a fejmellnek a felfekvő végtest által fedett része világos.

A fejmell fejlett, fejerésze jól elválasztott, kisse domboru, széles, vörösbarna, a hátgödör mögött világos rozsdasárga; a szemek közepesoportjától a hátgödör felé gyakran egy sötét vonás fut; a mellresz szakadozva, egyenetlenül, sötétén szegélyezett; a többi rész egy rozsdasárga, csillagszerű, világos rajzot alkot, mely jelesen a borszeszben lesz jól láthatóvá. A mellvert egyszínűen barna.

A rágók erősek, kisse terdszerűen és befele hajlottak, sötétszínűek, az állkapesok és az alajk rozsdabarnák, világos szegélyzettel. A lábczombok tövükkel sárgásfehérek vagy rozsdasárgák, végökön beburnítottak. A III. és IV. lábpár gyűrűzete határozott, a többie elmosódó.

A végtest szélestojságad, majdnem korded (ellipticus), lenyomva domboru ($10 \frac{m}{m}$ szélességénél $6.5 \frac{m}{m}$ vastag, elején egy \uparrow alakú barna rajz, mely sárgás-fehéren szegélyeztetik, s nyelével a czímerbe lenyomul; a nyel 2—3 világos keresztvonallal metszve.

A czímer ékalakú, hegyével a fonóig lenyomulva talpával az első ingödörpárig hatol, hol kétfelé, majdnem szarvszerűen kikanyarodik, oldalról kigyózva szegélyezett; a szegély széles, szürkés fehér vagy sárgás.

A has sötétbarna, enyésző határozatlan [: sárgás szegélylyel határolva. A fonók két oldalán négy elmosódó, sárgás foltoeska mutatkozik.

A szemek közepesoportja jól kiemelkedő.

A zár alacsony, széles keretet alkotva, elől két sötét, hátul egy világosabb fénylő dudorodást mutat. A fedőlemez a két sötét dudor között indulva gyenge, egyenes, a hátsó dudornak csak kezdetét éri, tehát nem haladja meg a keret szélét.

Mertekek: ♀ Törzs 17—18 $\frac{m}{m}$ ebből

fejmell 8 »

I lábpár 25.5 »

♂ Karsú, hosszalábu; élesebb rajzu, melyben különösen a világos színek határozottak. A fejresz választéka fekete szegélylyel, a mellresz oldalai hasonlóképpen, úgy, hogy a sötét szegély és a szélek között

világos szegély támad. Valamennyi czomb alabástromszerűen áttetsző fehér, vége barna; a két hátulsó lábpáron e barna gyűrűzet igen keskeny. A tapogató kurta nyelvű, terdizéken két felálló sertével; pikkelye oldalt befelé fordított, keskeny; nemzőszerve diószerűen módosan kidagadó, alulról tekintve egy pisztoly-ravaszhoz hasonló és így kiálló lemezzel, mely a végén egy elkerekített lapos és egy hegyes kis fogba oszlik.

Méretek: ♂ Törzs	10—11 $\frac{m}{\mu}$ -ból
fejmell	6 „
I lábpár	28-29 „

Vallaja: ♀ Sötét barnafekete, a végtest valamennyi rajza finom, fehér, éles szegélyzettel; a has fekete, határozott () forma világos szegélylyel. A lábak gyűrűzete igen sötét és igen határozott beosztású, (*Araneus sericatus* CLERCK «Ar. Suec.» pl 2. tab 1.)

E pók jelesen a lakott helyek környékét szereti, gyakori ereszek alatt (innen magyar neve), a hidak karfáin, a padlások nyílásaiban, palánkokon stb. Nappal elrejtőzik s csak alkonyatkor keresi fel nagy hálóját, melytől egy vezérfonal jár a rejthez; ez utóbbi sarkokban van inkább mint tágas réseken; rendszeren pamutszerűen kárpitozott. Peteit ereszek alá egy csomóba rakja le, a petecsomóra fecskefészekszerűen alkalmazott, rendkívül erős burkot sző. Kora tavasztól késő őszig mindig akadnak ivarérett példányai s áttelelő nemzedéke is van,* mely tavasszal mindjárt szaporitáshoz lát s a melyből nyári nemzedék származván ez ismét szaporít; így a tavaszi nemzedék unokái jutnak áttelelésre, mely leginkább a házak nádfeleiben történik.

Ismerem: magyar részekből: Doroszlóról (Márczius) Apatinból (Május), Zimonyból (kikötőhajó fedélzete), Pancsova (kikötőhajó fedélzete), Orsováról (Junius), Békes-Usabáról (Junius), Tokajból (Junius), Bodrog Keresztúrról, Alsó-Hámor (Julius), B.-Füredről (Szeptember), Kőszegről (Szept.), ismét Doroszlóról (Junius—Julius), Nagy-Váradról (Muz. gy. Mocsáry), Budapest (Muz. gy. Frivaldszky), Ungvár vidéke (Vidra F.), Dabas (Metelka F.), Komjáti; Rózsahegy a Vág hídján kiválóan szép, sötét, finom rajzu változat. Erdélyi részek: Nagy-Szeben, Kolozsár, Mező-Záh, Hosszútelke, Szász-Veszős.

SPEC. 15. FAJ. EPEIRA SOLLERS. WALCK. ÜGYES K. GEWANDTE K.

(solleis = ügyes, ravasz; itt arra az ügyességre látszik vonatkozni, a melylyel lakását készíti. Minieri száraz körökön.)

Syn. 1841. *E. sollers* WALCKENAER. «Hist. Nat. des. Ins. Apt.» 11, p. 197.

Vide: THORELL «Remark» p. 18.

♀ Kis, zömök alak, kerekded végtesttel, vékony lábakkal, igen módosan fejlett fejmellel.

Szürkésbarna. Fejmelle keskeny, egyszínű vörösbarna, fejerésze jól elválasztott, domború kissé bozontosan szőrös; a hátgödör kiesény, sekély. A mellvért barna, közepén néha elmosódva-világosodo. A rágók nyulánk tövűek, a becsapórás erős, egyenetlen fogacsokkal fegyverzett, színezetök vörösbarna; az állkapcsok egyszínűen vörösbarnák.

A czombok vörösbarnák, végök fele elmosódva és alig észrevehetőleg sötétebbek, a többi íz elmosódó vörösbarna gyűrűzettel.

A végtest kerekded, széles, csak a fonók fele kissé csúsesodó; szürkésbarna, a hát közepetáján sötétebb.

A hát közepén egy hasítékszerű fekete hosszolt, két oldalt szürkésfehér, kirívó szegélyzettel, e szegélytől keresztbe egy V ritkán két ágpar válik el s keresztet alkot, melynek nyele azonban nem ér a fonókig, teteje gyakran igen széles A szürkésfehér folthoz enyészik, mely a végtest elején áll; néha csak a fehér szegélyű fekete hasíték van meg; néha csak a felső ágfolt látható. Az oldalak szürkésesek. A has sötétbarna, világos sárgásfehér, néha elmosódó | szegélylyel.

* Doroszlón a kistérségi erdőmesteri lakóház folyosóján mindig áttelel.

A szemek a fej szőrözete által borítottak, az oldalszemek a középsőkből nem egészen kétszer akkora távolságra, a mekkora az alsó szemsor közepi szemek közötti.

A zár módosan kiemelkedő széles, fedője nem lemez, hanem tompa háromszög alakú karaj, elgyűrődő, fenyő szelekkel.

Mertekek: ♀ Törzs	8—9 $\frac{m}{m}$ ebből
fejmell	4 „
I lábpár	11 „

♂ kicsiny, a nőstényéhez hasonló rajzu és színezetű; a két hátsó lábpár czombja töven határozottan világosodó. A fejmell módosan fejlett. A tapogató kurta nyelvű, terdizéken két gyenge sertével; a diószertűen kidagadó nemzőrész alsó feleiből egy vastkos tövű, kurta, hajlott, a hajlásban tompán fogacsolt köröm meredez.

Mertekek: ♂ Törzs	4·6—5 $\frac{m}{m}$
fejmell	2·2 „
I lábpár	13·5 „

Válfa: ♀ a vegtesttől kissé vállas, a vállakon szabálytalan felhoidalaku () egymás felé fordított sötét-fekete barna folt; a második ingödörpártól le a fonókig egy széles, nyelv alakú, sötét-barna fekete czímer, elmosódva fehéren szegelyezve.

Ifjú nemzedek: ♀ sárgászöröses, vagy viasz sárga, a vegtesttől elején Δ alakú fehér folttal vagy X alakú fehér jeggyel. (*Epeira dalmatica* Doleschall.)

E csinos állat tavaszkor és ősszel, nevezetesen száraz körökon tartózkodik, hol az elálló ágak köze szövő hálóját, maga egy kiasszott rügy mellé lapul, melyhez színezetenél és alakjánál fogva igen hasonlít s így nehezen észrevehetővé lesz (azt hiszem erre céloz WALCKENAER adata neve is). Párzását nem ismerem.

Ismerem az erdélyi részekből: Kolozsvárról (Museum kert), Mező-Záhról: magyar részekből: Doroszlóról. Pecs vidéke (Muz. gy. Frivaldszky), Buda vidéke (Muz. gy. Pavel), Pest vidéke (Muz. gy. Pavel), Orsova (Muz. gy. Frivaldszky) Köljáti, (Dr. Horváth Géza). A változatot és ifjú nemzedeket Szász-Vesszőről Erdélyben.

SPEC. 16. FAL. *EPEIRA AGALENA*. (WALCK.) NYUGTALAN K. RUHRIGE K.

(a é: $\gamma\alpha\lambda\gamma\gamma\gamma =$ nyugtalan; a magatartásról.)

Syn. 1802. *Aranca agalena* WALCKENAER «Faun. Paris.» II, p. 197.

Vide: THORELL «Remarks» p. 23, 491.

♀ Kis alak. Fejmelle tojásdad, kissé szivalakú; vegteste tojásdad, szélessegenél alig hosszabb, elől a legszelesebb.

A fejmell és a lábak vörösesbarnák, a fejresz valamivel világosabb. A lábak barna gyűrűzettel. Vegteste a hátfelen sárgásfehér, elől két elkerített háromszögű barna foltcsakkal, közül egy ilyen színű hosszukás folttal; a rajz egyáltalában az *E. patagiata* rajzához hasonlít.

A zár egy szaruszerű kiemelkedés, két oldallemezzel; fedőlemeze kiválóan hosszú és durván keresztbe-rovátkos.

Mertekek: Törzs	4·5 $\frac{m}{m}$
I lábpár	7 „

♂ Színezet szerint hasonlít a nőstényhez, de vegteste inkább csak barna foltokat mint rajzokat mutat. A tapogató harmadik ízületén két hosszú serté; a gyűjtőből egy kétágú, hegyes embolus és egy tompavegű fog áll ki.

Mertekek: Törzs	4 $\frac{m}{m}$
I lábpár	8 „

Nagy-Szeben vidékeről elősorolta Sill Victor *Epeira agalena* C. Koch nev alatt. A példányokat nem láttam.

SPEC. 17. FAL. EPEIRA VICTORIA. (THOR.) VICTORIA K. VICTORIEN K.

(victoria = győzelem, de női név is)

Vide: THORELL «Remarks» p. 24, 25, 551.

♀ A két első lábpár czombja felül bebarmitva, a végtest hátán sárgás fehér, barnán pettyezetett foldon egy tolgylevel alaku világos, viaszszerű rajz. A zár fedőlemeze szélessegenel sokkal hosszabb, durván harántrovátkolt és hosszú, finom hegybe végződő.

A törzs egészen nyulánk; különösen a végtest hossztojtásad, elől hátul majdnem egyforma magassagu, elkerekített vegevel a fonók felett kiálló.

Világos barnássárga alapszínű.

A fej mell szélessegenel sokkal hosszabb, sárgásbarna; a fej jól elválasztva, fehér szőrrel borított, mely szőrőzet a hátgödörnél kezdődik; a mellresz módosan és elkerekítve domboru, a hatgödör mögött szőrtelen, szeleim fehér szőrsávval szegelyezett; a mellvert fekete, fehér szőrőzettel gyeren borítva, minden csipő előtt egy kis fehér üstökkel.

A rágók kissé terdszerűen domborodók, a domborodason, illetőleg tüvükön sárgások, egyebkent sötétbarnak. Az állkapcsok és az alajk egyszínűen barnássárgák.

Az I. és II. lábpár czombjának (femur) felülete bebarmitott, vegen enyeszve-gyűrűzött; a terdiz elől elesen határolt sötét barna gyűrűvel; a szár közepén és vegen hasonlóan, úgy szintén a lábveg második izeke (metatarsus) az utóbbihoz hasonló gyűrűzettel.

A III-dik és IV-dik lábpár czombja egyszínű sárgabarna, vegen határozottabb sötét gyűrűvel, a többi izeke az I. és II. lábpárhoz hasonló.

A végtest szőrös sárga; barna pettyezetett foldon egy tolgylevel alaku, világos sárga, a végtest elején kezdődő, de a fonókat el nem érő czimert visel, melynek közepén és hosszaba rendezve két sor elmosódó, barna, finom petty látható. E czimernek hat oldalkaraja közül az első kettő hátul alig észrevehetőleg barnán szegelyezett, a többi belsejében barna, úgy, hogy a sárga szín a barnát szegelyezi. Oldalt e czimertől minden oldalon két sor szabálytalan alaku sárga folt, melyek közül a czimerhez legközelebb álló a czimer barna karajainak szegélyébe olvad.

A fekete-barna has közepén egy világos, sárgásfehér csík, mely a fonók előtt megszakad, úgy, hogy közvetlenül a szemölcsök előtt egy pettyet alkot; két oldalt e közepesíktól] alaku, gyakran szakadozott, fehérsárga foglalat; az alsó fonópártól oldalt egy-egy nagyobb, a felső pártól oldalt egy-egy kisebb sárgafehér petty.

A középső szemcsoport negy szeme dereknegyszögbe elhelyezve, az oldalszemektől kétszer akkora távolságra a mekkora a középszemek közötti távolság.

A zár gyantaszerűen áttetsző, sárga; fedő lemeze korszóful módra \sim görbült, szélessegenel legalább négyszer hosszabb, harántul és különösen a zárra nező oldalán durván rovátkolt, a vegen gyorsan hegyesedve vékony csucsba végződő; a leghibiztosabb ismertető jegyet kepezi.

Mértékek: ♀ Törzs	13—15 $\frac{m}{m}$ ebből
fej mell	6 „
I lábpár	20 „

♂ Kisebb, karsúbb, színezete a nőstényével azonos; az első és második lábpár felülete kevesebbe barmitott; a második lábpár szára a vege fele vastagodott, e vastagodás belső oldalán több apróbb tüske közül négy nagy tüske kiáll.

A tapogató igen kurta, bunkója igen tetemes; a terdiz felül két szemölcszerű dudorral, vastagságánál nem hosszabb; a szárízék kurtább, kifele és oldalt egy széles, vaskos, felülről tekintve bárszerű, egyenlő szélességű tarajt bocsát; a pikkely keskeny, oldalt és befelé fordított; nemzőszerve a belső oldalról és kissé alulról tekintve, egy, a pikkely csúsa alól le- és kifele kanyargó erős és hegyes, horogszerű nyujtványt mutat, melynek hajlásában meg egy hegyes tövis látható, e nyujtványhoz, kívülről egy ívesen elvágott

szeles és simaszélű lemez csatlakozik, e lemezhez kívülről ismét egy lemezszerű, keskenyebb, elkerekített és kisse fogacsolt lemez alkalmazkodik. A külső oldalról tekintve egy kerek gyűjtő látható és egyszersmind az is, hogy a szelesebb lemez külső sarka eles fogban végződik.

Mertekek: ♂ Törzs	8·2 $\frac{m}{\mu}$ ebből
fej mell	3·5 "
I lábpár	16·4 "
II " 	13 "
III " 	8·7 "
IV " 	12·3 "

Ismerem, erdélyi részekből: Kolozsvárról. Gyékéből (a hímét Schusztér Károly ur fedezte fel Kolozsvár környéken); magyar részekből: Budáról (B. M. Ankertől), ugyaninnen «Sashegy» (Muz. gy. Pável), Rákospalotáról (Pável). Ugy látszik, hogy ez a faj az aljakat, rokona — a következő faj ellenben a hegységet kedveli.

SPEC. 18. FAJ. *EPEIRA CEROPEGIA*. (WALCK.). VIASZOS K. WACHSK.

($\chi\chi\rho\acute{o}\varsigma$ = viasz, $\pi\eta\eta'\acute{o}\varsigma$ = fehér; a végtest tölgylevélszerű rajza színére vonatkozik.)

Syn. 1802. *Aranca ceropogia* WALCKENAER «Faune Paris» II, p. 199.

Vide: THORELL «Remarks» p. 24, 25, 551.

♀ Az I. és II. lábpár czombja alul rövid-csikyszerűen bebarmitva; a végtest hátán, barna földön egy viaszszerű, elejen kétszer \wedge szerűen elágazó sárgásfehér rajz; a zár fedőlemeze szélesen szívalakú, szélességénél alig hosszabb és hirtelenül árszerű csúcsban végződik.

A fej mell vörösbarna szélességénél hosszabb, fejerése jól elvalasztott, fehér szőrrel borított, a szőrzet a hátgödörből indul. A mellresznek a hátgödörön túli tere kopasz; oldalai fehérszőrösök, neha igen finom, fehér szőrszegelybe foglaltak. A mellvert vörösbarna, gyeren álló, hosszú, sötét szőrokkal fedett. A rágók egyenletesen az állkapcsokra hajlók, egészen vörösbarnák.

Az állkapcsok és az alajk egyszínűen vörösbarnák.

Az első és II-dik lábpár czombja különösen alul egy csikyszerű, vörösbarna folttal. A lábak színe és gyűrüzete egyebkent az Ep. Victoriához hasonló.

A végtest meglehetősen szeles-hossztojásdad, hátul alacsonyabb, a fonók felett elkerekített és valamennyire kiálló.

Cizmere élenken sárgásfehér, viasz kinezesű, igen symmetricus és kirívó rajzzal, mely ket egymásfelett álló szeles, \wedge alakú ágparból és ezek alatt s hozzájuk sorakozva három () alakú, a fonókig le nem erő, fokozatosan kisebbedő foltparokból áll. Az ágparok közötti ter sötétbarna földön sárgásfehéren, finoman pettyezett; szegélyzete az egész rajznak sötét feketebarna s e sötét szegély mind kétoldalt egy többször kigyózó sárgásfehér szalaggal szegélyeztetik.

A has fekete; a közepén egy szeles, sárgásfehér hosszcsikkal, kétoldalt egy szakadozott, enyésző, sárgásfehér () be foglalva. Az alsó fonópár mellett egy szabálytalan alakú apró, sárgásfehér foltpar; a felső fonók mellett hasonlólag egy igen apró foltpar, a fonók felett, azokat mintegy körítve, egy finom sárgásfehér íves vonal.

A középső szemecsoport derek négyszögbe elhelyezve, egyebkent az Ep. Victoriához hasonló.

A zár fedőlemeze sötétvörösbarna, szélesen szív vagy inkább hagymaalakú, durván szemeszett és csúcsba végződő, lapos, e faj legjobb ismertető jele.

Mertekek: ♀ Törzs	11 $\frac{m}{\mu}$ ebből
fej mell	3·5 "
I lábpár	14·5 "

♂ Kisebb, karesubb. Az első és második lábpár czombja alul és kisse oldalt-befele beharmitott, a harmadik lábpár czombján egy halavány gyűrűfolt. A végtest igen sötét s a viaszrajz igen elesen kifejezett. A második lábpár szára, a végén erősödött s belső oldalán, több apróbb, tüske között, négy hoszu tuskével fegyverzett.

A tapogató igen rövid, terdize vastagságánál nem hosszabb, felületen két szemölcsessel, melyeken egy-egy hoszu, erős serte ágaskodik; szára igen rövid, külső oldalán egy bárszerű karajt bocsát, mely a végén szelesebb mint a töven; a pikkely keskeny, befele-oldalt fordított; nemzőszerve igen kidagadó; a belső oldalról, s kisse alulról tekintve a pikkely csücske alól le és kisse kifele egy igen könnyeden (*nem horogszerűen*) hajlott, tompán hegyes, egyenlő vastagságú, karesú nyujtvány indul, melyhez kívülről egy igen széles, sima és egyenes szélű lemez csatlakozik, e lemez külső sarka fogszerűen végződik. (A nyujtvány alakja legbiztosabban különbözteti meg e faj himét az *E. Victoria Th.* himtől).

Mértékek: ♂ Törzs	7.8 $\frac{m}{m}$ ebből
fejmell	3.8 »
I lábpár	15.5 »
II »	11.4 »
III »	8.2 »
IV »	11 »

Havasi alak, mely leginkább a fenyőövben fekvő tisztások bujabb növényzettű helyein a fűveken szövi szép kerékhalóját.

Ismerem, erdelyi részekből: a Hargitáról (Mezőhavas 4000 lábíg), Gyergyó-Szent-Miklós környékéről és Balánbányáról (Gyümölcsésés); magyar részekben csupán csak Csorba mellett «Prvnyiszka» ingoványokban találtam.

SPEC. 19. FAJ. *EPEIRA ADIANTA*. (WALCK.). KÖKÉNY K. SLEHDORN K.

(ἀράχνη = meg nem nedvesített, a melyet nedvesség nem érhet; lehet hogy a tartózkodásra vonatkozik).

Syn. 1802. *Aranea adianta* WALCKENAER «Fam. Paris» II, p. 199.

Vide: THORELL «Remarks» p. 23.

? Az *Ep. ceropegiára* emlékeztető végtest-rajzzal, a hason azonban semmi közepesik; a fejmell közepén egy finom sötét hosszvonal, mely a szemeket nem éri el. A zár fedőlemeze felálló, széles, kurtakampós, elöl elkerékített és felgyűrűt finom szélű. A megelőzőknél sokkal kisebb alak.

A fejmell és függelékeinek alapszíne agyagsárga, az egésznek törzse módosan fejlett, szélességenél hosszabb; fejezése szűkülő, határozatlanul elválasztott, módosan domboru, szőrözete fehéres és igen gyér. A középszemcsoport mögött kezdődik egy finom, hasitékhoz hasonló barna vonás, mely a hátgödörön túl menve, nem éri a mellrész végét. A mellvért tiszta fekete, majdnem meztelen.

A rágók egy kevésbé terdszerűen kihajlók, agyagsárgák s csak végükön keskenyen beharmitottak. Az állkapcsok és az alajk sötét agyagszínűek, kevesse világosodó szelékkel. A tapogatók, csipők egészen, a czombok tövéknél agyagsárgák, az utóbbiak az I és II lábpárnál, felül, hosszában és végükön gyűrűszerűen beharmitottak. A terdek és száruk végeiken határozatlan, elmosódó barna gyűrűkkel, ilyen a bordáskörmök táján a láb vége is. A végtest kisse lelápitott, meglehetősen szélesen és kisse csücsösen tojásdad, felül agyagsárga földön bíborbarnásan sűrűn pettyezetett, neha bíborbarna alapszínű, közepén az *Ep. ceropegiáéhoz* hasonló fehér, kétszer \wedge szerűen és háromszor $()$ szerűen összetett rajzzal, mely a fonók fele mindinkább keskenyedek, itt neha lándzsás csücsbe összefoly. A has fekete, igen kialtó sárgásfehér $[]$ szegélylyel, melyben közepesik ninesen. A fonók mellett két oldalt elhelyezve két sárgásfehér folt pár.

A közep szemcsoport negy szeme derek negyszögbe állítva az oldalszemektől nem egészen kétszer annyira, a mekkora a távolság az alsó sor középszemei között.

A zár vörösbarna, elöl elkerekített, széles, kurta és mindjárt tövetől kampósan görbülő lemezzel fedett.

Mértékek: ♀ Törzs	7 $\frac{m}{m}$ ebből
fej mell	2.6 »
I lábpár	11.5 »

♂ Karesu, hosszulábú, színezetben a nősténynek megfelelő; neha azonban az oldalakra is fehér, úgy, hogy a jellemző hátrajz épen csak sötét-biborbarnán szegélyezve van. A lábak egyszínűen agyagsárgák és csak a terd, szár és lábvege izenek legvege keskenyen barnan gyűrűzött.

A tapogató rövid száru; terdizen két felálló, vöröses, hosszú sertével; befele-oldaltfordított pikkelye keskeny, nemzőszerve dió szerűen kidagadó, a külső oldalról tekintve egy kurta, éles, csavart körmöt mutat.

Mértékek: Törzs	5—5.5 $\frac{m}{m}$ ebből
fej mell	3.6 »
I lábpár	13 »

Válfa ♀. A végtest alapszíne feljül sok fehérrel kevert, a hát fehér középrajza elöl keskenyen, hátrafele mind szélesebben biborbarnán szegélyezve.

E pót eddig csak két lehelről ismerem: Kolozsvárról, hol a szopori völgyben előforduló kökénybokrokban találtam. Augusztusban ivarérett. Egy-egy bokron 15—20 is tartózkodik s szép, nem nagy kerek-halókat az ágak között feszítik ki. Lakásukat eszésszerűen összeszőtt levelekből készítik. Nappal is teljes működésben vannak. Második lehelhelye Mező-Zab Erdélyben, hol igen világos, elmosódó hátrajzu példányokban fordul elő.

SPEC. 20. FAJ. EPEIRA CUCURBITINA. (CL.). TÖK K. KÜRBISS K.

(cucurbita = tök; a végtest alakjáról és színezetéről).

Syn. 1757. *Araneus cucurbitinus* CLERCK «Ar. Suec.» p. 44.

Vide: THORELL «Remarks» p. 23.

♀ Tökgönd; sárgásbarna előtesttel; a fonók felett egy rókavörös folt; a végtest hátfelének szélén, az ingödörökon kívül, két oldalt négy-négy fekete pont.

Kis zömök alak kis előtesttel és domború, tojásdad végtesttel.

A fej mell sárgásbarna, egyszínű, módosan fejlett, jól elválasztott fejrészszel, mely a szemek táján kissé lecsapva-elkerekített. A mellvért sárgásbarna; hasonló és egyszínűek a szájszervek és a lábak is.

A végtest felül elénken tökgönd, neha fehéres lehelettel, mi a színt még emeli. A kevésbbé kirívó ingödörökon kívül s tölök kétoldalt sorakozva négy-négy sötét fekete pont, a fonók felett álló pár a legnagyobb és legközelebb áll egymáshoz, a többi pontok között a távolság a végtest eleje felé mindinkább növekedik. A fonók felett a végtest kiálló és ezen a helyen rókavörös.

A has zöld; színe valamivel szennyeseb, neha [] szerű világosabb foglalatra emlékeztető nyomok látszanak. A középszemcsoport hátsó két szeme nagyobb az alsónál és tavolabb áll tőle mint egymástól, az oldalszemektől pedig kétszer annyira mint egymástól.

A zár széles alaphól emelkedik, fedőlemeze gyantaszzerűen áttetsző, a zár keretét alig meghaladó hosszúságú, széles, ∞ formára hirtelen hajlású; vege elkerekített.

Mértékek: ♀ Törzs	6.5 $\frac{m}{m}$ ebből
fej mell	2.4 »
I lábpár	7 »

♂ Sárgászöld; igen fejlett, sötét sárgabarna fejmellet, mely a végtestnél nagyobb; a IV lábpár czombja alul, egyenes sorban álló 5—6 sertetűsével.

A fejmellnek mellrésze igen széles, az egész fejmell hosszával majdnem egyenlő; az egész sötét sárgabarna, a mellrész finom barna szegélylyel. A végtest röviden tojásdad, színezethen halaványabb, egyébként a nőstényének megfelelő.

A lábak, jelesen az I. és II. pár, hosszúság mellett a csomb és szár ízeikben láthatólag kivastagodottak; az ízek végén barnán gyűrűzöttek. A tapogató rövid nyelű; terdizeke két felálló, hosszú, barnavörös sertével; pikkelye oldalt és befelé fordítva, keskeny; nemzőrésze kidagadó, alulról tekintve egy kicsiny, tompa foggal fegyverzett.

Mertekek: ♂ Törzs	4	$\frac{m}{m}$ ebből
Fejmell	2.2	»
I lábpár	6.4	»

E csinos kispók igen gyakori, leginkább tavaszi, magasabb helyeken nyári alak, mely a bokrokat, jelesen a nagy levelűeket kedveli, hol hálóját néha a levelek lapjára, ha az bemélyített, feszíti, a szár mellett pedig egy kis rejtet sző. Kertekben a Syringákat különösen kedveli. Kerékhalója szép, rendes, néha alig $4 \frac{m}{m}$ átmérőjű. Vasúti vonatokon többször észleltem, hol is az ablakok sarkaiba (kívülről) alkalmazta kis hálóját s a vonat robogása közben is fogdosta a hálójába sodort szunyogokat. Az aljaktól kezdve meg 3500—4000 láb magasságban is előfordul. Párzását nem ismerem.

Ismerem erdélyi részekből: Kolozsvárról, Oláhfenésről, Mező-Záh, Hoszsutelke, Gyergyó Sz. Miklósról, a Mezőhavasról (4000 láb), Nagy Szebenből (Sill és Bergleiter gyűjtemény), Báznáról (Ugyanott); magyar részekből: Pancsováról (Kis Szlatina, wojloviczi erdő), Orsováról (Allion töve), Ogradena (Mragonya völgy), Báziasról, Tokajról (Kopasz), S.-A.-Ujhelyről (Magos alja), Bükkhegyseg (Eger felett: Köhat), Csorbáról (Prvnyiszka), Nagy Váradról (Muz. gy. Moesáry), Budavideke (Muz. gy. Páve), Ungvárról (Muz. gy. Vidra Ferd.).

SPEC. 21. FAJ. EPEIRA ALPICA (L. K.) HAVASI K. ALPEN K.

(Alpes = havas; a tartózkodásról.)

Syn. 1869. *E. alpica* L. Koch in «Zool. Mitth.» aus Tyrol XI/III, Vers. der deutsch. Naturforscher, Innsbruck. p. 25

Vide: THORELL «Remarks» p. 547, 549.

♀ Világos tökgözd, barnás oldalakkal, barnás hassal, az utóbbin két pár világos folt; a IV. lábpár terd, szár és két végíze barnán gyűrűzött; a végtest hátán, közel a fonók felett csak 2 pár fekete pont (a negy ingödörön kívül); a fonók feletti rókavörös folt szétfolyó.

A fejmell és valamennyi függeléke agyagsárga; a fejrészt szélesedő, jól elválasztott; az I., II., III. lábpárnál a szár láthatólag barnán gyűrűzött (a IV. lábpár lásd fennebb).

A végtest széles-tojásdad kissé lenyomott, oldalai bebarmitottak, úgy, hogy a hát élénk színe elesen határoltatik. A hát közepe rajzszerűen világosodó s e világosodás a négy ingödör körül és a hossz tengelyben néha feltűnő; a végén egy szélességevel fölfelé néző trapezbe rendezve, negy fekete pontocska áll.

A has feketesbarna; a zár és a fonók között két pár világos sárgászöldfoltal, melyek közül a zár melletti pár néha összefoly.

A középszemesoport két hátsó szeme az alsónál láthatólag nagyobb és közelebb áll egymashoz mint az alsó egymás között.

A zár kevéssé kiemelkedő, fedő lemeze közel -, kissé csúcsosodó, a végén könnyeden elkerekített s alig egy keveset fellajló.

Mertekek: ♀ Törzs	7.8—8	$\frac{m}{m}$ ebből
Fejmell	3	»
I lábpár	9.8	»

E szép fajt eddig csak magyar részekből: Alsó Hamor (Borsod, Hollós fenyeve) ismerem, hol meglehetősen terjedelmű hálóját a fenyvek alatti bokrokon és a fenyvek ágai között szővé. A nemz. muzeumban egy példány Tatra-Füredről, hol Frivaldszky János ur gyűjté. A hím ismeretlen.

SPEC. 22. Faj. *EPEIRA ACALYPHA* (WALCK.). RÉTI K. WIENSEN K.

(ἀζυλῶς ἔς = fedetlen; a tartózkodásról.)

Syn. 1802. *Aranea acalypha* WALCKENAER «Faun. Paris» II, p. 199

Vide: THORELL «Remarks» p. 454.

♀ Sárgás zöld; végteste oldalt bordaszerű fekete csikokkal díszítve; a fonók felől H-szerű, kissé szakadozott fekete csikok nyomulnak a hátra; kis alak, ívesen domború, tojásdad végtesttel.

A fejmell módosan fejlett, fejerésze szűkülő, domború, a mellresz kerek, gödre hosszbenyomású, kissé barna, úgy, hogy a vörössárga előtesten csiknak néz ki; a mell szelei finom, sötét szegélylyel ékesítve, mely az oldalszemek felé nyereszik. A mellvert, alajk és az állkapesok barnafeketék, a rágók vöröses sárgák. A tapogatók és lábak vöröses sárgák, az előbbieket végükön, az utóbbiak a száruk és lábvégizetek csúcán bebarmitottak. A terd és csombízek rozsdássárgák barna szőrözettel és tüskékkel, mely utóbbiak fekete pettyekből indulnak.

A végtest a fonóktól ívesen és magasra emelkedik, az oldalak felől kissé összenyomott. A has felől 3—4 meglehetősen széles, szakadozott, fekete bordaszalag nyomul a hát felé; a fonóktól eleintén összefolyva később villaszerűen elvalva három fekete csik indul, melyek között a középső a leghosszabb, a másik kettő épen a második ingödörpárig nyomul; e csikok pontszerűen a végtest elejeig folytatódnak. A fekete csikok közötti tér mindenütt sárgazölden mintegy márványozott.

A has fekete, kettől egy páros sárgás-fehér folttal, a fonók mellett mindket oldalon két ket sárgás-fehér petytyel díszítve.

A középszemek csoportja közel derék négyszögbe helyezve; a hátsó pár fekete karikába foglalva, látszólag nagyobb; az oldalszemek úgy elhelyezve, hogy a hátsók a hátsó középsőkkel egyenes sorba esnek. Az oldal és középszemek közötti távolság nagyobb a középszemek közöttinél.

A zár hátra felé íves, kevesse felvetett keretet alkot, melyben a rövid, széles, nyelvalaku, elől elkerekített fedő lemez úgy megfekszik, hogy a keret belső széleit éri.

Mertekek: ♀ Törzs 5—5.5 $\frac{m}{m}$ ebből

fejmell 2 "

I lábpár 8.2 "

♂ Igen kicsiny, nyulánk lábu; színezete megfelel a nőstényének.

A tapogató kurta nyelvű, térdizen egy felálló serte; oldalt befelé fordított pikkelye kicsiny, nemzöszerve diószzerűen kidagadó, alulról tekintve a végén egy esavart lemez, e mögött egy kurta, horogforma villásköröm látható.

Mertekek ♂ Törzs 3 $\frac{m}{m}$ ebből

fejmell 1.3 "

I lábpár 4.5 "

Válfa ♀: A végtest elenk sárga, a középső csik teljesen hiányzik, a másik két csik kissé szétágazó, az ingödörökben comma (,) szerűen megszakadott.

A legesinosabb kis keresztések köze tartozik; közönséges, bujább növényzetű helyeken, nevezetesen réteken (innen magyar neve); bokros helyeken is nagy számmal található.

Meglepően nagy kerek hálóját a növények szirmaira alkalmazza, igen ritkán folyamodik rejtszöveshez s legtöbbször beeri egy egy level alsó lapjával. Egész nap mozgásban van s úgy látszik, hogy tavaszi és nyári nemzedéke van. A hímek májusban ivarérettek. Párást nem ismerem.

Találtam eddig erdélyi részekben: Kolozsvár, Szász-Vesszős, Korond, Balánbánya, Tölgyes, Mező-Záh, Gyeke, Szt.-László, Torda stb. retségein, N.-Szeben (Sill); magyar részekben: Új-Palánkán, Pancsován, Orsován, Ogradena (Mragonya völgy), Báziason, Tokajban, Tarezalán, Rakamazon, S. A. Újhelyen, Alsó Hamorban (Borsod), Nagy-Váradon (Muz. gy. Mocsáry), Pecs vidéke (Muz. gy. Pável), Mehadián (Muz. gy. Frivaldszky), Buda (Sashegy, Muz. gy. Pável).

SPEC. 23. FAJ. *EPEIRA DIODIA* (WALCK.). ÁL-K. TRÜGENDE K.

(ὀδοῦσία = átmenés, elsőzés; ὀδῶος = átmenet; a Meta nemhez való rokonságra látszik vonatkozni.)

Syn. 1802. *Aranca diodia* WALCKENAER «Faun. Paris» II. p. 200

Vide: THORELL «Remarks» p. 455.

♀ Kis alak; alakilag az *Epeira diadematára* emlékeztet; az előtest világos rozsdabarna; a végtest feketebarna, hátán elől egy Δ elkerekített sarkú fehér folttal, mely belsejében két — — forma, barna, finom vonalat mutat. Az állkapcsok szélességöknél alig hosszabbak; a szemcsoport közelebb áll a Meta¹ mint az *Epeira* neméhez.

A fej mell kicsiny, fejerésze jól elválasztott, kissé nyújtott és domborodó; a mellrész kikerekítve domboru; a módos hátgödörből a jól látható barázdák csillagszerűen oszolnak a csipők felé; az egész rész rozsdasárga. A mellvert világos rozsdasárga, gyéren álló fekete szőrözettel; a szájrészek hasonló színűek; szeleiken alig észrevehetően bebarnitva.

A tapogatók és a lábezombok töve világos rozsdasárga; a tapogatók végze egészen, a czombok vege határozatlanul, elmosódva bebarnitott.

A végtest elől magas, kissé vállas, a vége felé tojásdadra elkerekített, sötét feketebarna; elején egy Δ fehér folttal, melyben két — — vonás áll, ez alatt oldalról fehéren kigyózva, és igen finoman szegélyezett bársonyfekete czimer, a czimer felett meg egy finom fehér Λ ágrajz.

A has fekete, oldalt () szerűen, sárgásfehéren szegélyezve, e szegély a fonók fele kirívóan világos. Az alsó fonópár mellett rendszeren egy fehér pettyár.

A középszemcsoport derek négyszögbe elhelyezve, az oldalszemek kissé hatralépnek, nem érintkeznek egymással s csak kevéssel távolabb állanak a középszemektől mint ezek egymástól.

A zár nem kiálló, fedő lemeze vézna, sárgás-fehér, meglehetősen hosszú, pálcaforma-egyenes, a végén kissé reszűntösen lekapva és bebarnitva.

Mértékek ♀ Törzs 4 $\frac{m}{m}$ ebből

fej mell 2 »

I. lábpár 9 »

♂ Ismeretlen.

E szép fajt magyar részekben az Ogradena mellett a Dunaszorosba meredező Csukár mare szikla tövében júniusban találtam, hol bokrok árnyékában szövő hálóját. Erdélyből Kolozsvár környékéről meg van a Schusztér Károly gyűjteményében.

GEN. 3. NEM. CYRTOPHORA. (SIM.)

(κυρτός = pupa, Buckel; ἔγω = viselni, tragen. A végtest tevépüpjára vonatkozik.)

Syn. 1864. SIMON «Hist. nat. des Araig.» p. 255, ad partem.

Vide: THORELL «On europ. Spid.» pag. 57.

A végtest egy hátrafelé tolt, tetemes, kúpalaku pupot visel. Az oldalszemek a középsőktől csak valamivel távolabbra esnek, mint az alsó sor középszemei egymástól; a hátsó szemsor határozottan kihajló; az oldalszemek meglehetősen széjjel váltak. A fej mell keskeny, részeiben jól dombortított.

E nemnek nálunk csak egy képviselője van, mely sajátos testalkata mellett, finom hálójának olykor igen merész alkalmazása által tűnik ki. Fajrokonai deli alakok.

¹ Az oldalszemek nem épen érintkezők, a középsőktől csak kevéssel távolabb állva, mint ezek egymástól.

SPEC. I. FAJ. CYRTOPHORA CONICA. (PALL.). KÜPOS KÜLLŐPÓK. KONISCHE SPEICHENSPINNE.

(conus = kúp; a végtest magas púpjára ezélez; a «küllő» a fehér lábezombokia s a hálóra is vonatkozik.)

Syn. 1772. *Aranea conica* PALLAS «Spicil. zool.» I. 9. p. 48.

Vide: THORELL «Remarks» p. 48.

♀ Sötét alapon tarka színű. A hát púpja széles alpból indulva magasra emelkedik es kisse hátrahajló. Valamennyi lámpar ezombja-tőven alabastrum fehér es kisse áttetsző.

Az alak kurta, zömök, aránylag kis fejmmel; a végtest, a kup táján merve, szélessegenél magasabb magasságánál valamivel hosszabb.

A fejmmel igen módos fejlődésű, sötét vörösbarna: fejeresze jól elválasztott es jól kiemelkedő, a kerekded mellrésznél keskenyebb. A mellvert gyeren szőrös, vörösbarna; a rágók tövüktől domborúan, kisse térszerűen kihajlók, vörösbarnák; az állkapesok es az alajk töve vörösbarnák, széleik szélesen rozsdasárgák.

A tapogatók végze fekete s csak töven sárgás, az alapizek áttetszően sárgásfehérek. A ezombok tövüktől egészen közepén felülgalabastrum fehérek, végükön szélesen feketebarnán gyűrűzve; a több iz igen sűrűn feketebarnán gyűrűzött.

A végtest színezete változó; felül többnyire feketebarna, a hát elején oldalt két terjedelmes, sárgás, nagy folt, mely elől összefoly; az összefolyás csucsában (|) szerű világos feheres jegy, melytől azután egy sokfelekepen megszakadozott sárgás folt keresztyszerűen indulva, a pup csuca előtt hegyesen végződik, inkább hátrafelől mint oldalról, de mind a két felől, két-két csipkeszerű foltocska igyekezik a csúcsra, a fonóktól pedig a csúcsig egy sárgásfehér szalag vonul mely egy-két keresztvonás által megszakittatik. Az oldalak alja fahejszín es sárga vegyületű. A has fekete, a fonók előtt egy harántfekvő nagy, sárgásfehér foltpárral.

A szemesoport (lásd II. 4 t. 70 a) mindket sora kihajló, az alsó sor kihajlása tetemes. A közepesoport négy szeme közül az alsó pár távolabb áll egymástól mint a hátsó pár; a két pár közötti távolság ismét nagyobb annál, a mely az alsó pár között létezik. Az oldalszemek egymás között jól elválasztottak s a hátsók annyira esnek a közepesoport hátsóitól, a mekkora távolság az alsó es hátsó középszemek között.

A zár kidagadó, két harántfekvő gombszerű dudorodást mutat, melyek között a világos, gyantaszerű, vezna fedőlemez könnyeden lehajlik anélkül, hogy a gombok határát meghaladná.

Mertekek: ♀ Torzs a fejtől a fonókig 7 $\frac{m}{m}$
 » » » pup csucsáig 9 »
 a fejmmel 2·2 »

Neha egészen fahejszínű; máskor barna oldalak mellett levelalaku feheres rajzot visel a hátán, vagy barna hát mellett oldalaiban világos.

♂ igen karsu termetű; lábai a nőstényéhez hasonló, az előtest élénk vörösbarna, a végtest feheres oldalakkal, felületén barnás; a pup módos es nyergesen válik ki a hátból; a végtest egészen kisebb az előtestnél. A labbak nem feltűnően hosszúk. A tapogató sárga, pikkelye jól bemélyített, kerekded kanál alakú, barna, oldalt befele fordított s belőle dagad a nemzőszerv, mely vastagságánál hosszabb s két barna, chitines, fénylő, hajlott lemez között sárgás hártvát mutat, az egyik lemez kisse kampósan hajolva tompa, a másik erős, kurta körömben végződik.

E szép pók kertekben es az előhegysegek bokros helyein nem ritka s tavaszi es őszi nemzedekkel dicsekedhetik. Hálója a legszebb kerekhálók közé tartozik, a mennyiben küllői es csigafonalai igen sűrűek es szabályosak; a mellett nem ritka, hogy e hálók keretfonalai 5—6 ölnyi távolságra álló fákat kötnék össze. A kertekben, nevezetesen a regibb babkarókat kedveli, hol azután nappal gyakran az elálló kergek alá vonul meg. Hálója után úgy is felismerhető, azáltal, hogy a háló teresejétől lefele egy sorba rakja es göngyöli be prédáját. Párzását nem ismerem.

Találtam eddig erdelyi reszekben: Kolozsvár (Muzeum kert), Szász-Vesszős, Mező-Záh, Balánbánya és a Bekás-szorosban; Nagy-Szeben (Sill gyűjtemény); magyar reszekben: Bogojeva (a pusztai kőrőm), Palánka (Trnovaczi erdő), Orsovan (Allion, Graczkai völgy, Jeselnitzai völgy) Mehadia (fehér kereszt tája), Mehadia-Damoclet (Muesuronyi legelő), Ogradena (Csukár szikla töve), Alsó-Hámor (Hollós fenyves, Coburg forrás, Lustavölgy), Pécs vidéke (Muz. gy. Pável), Buda vidéke (Muz. gy. Pável), Mehadia (Muz. gy. Frivaldszky), Dabas (Muz. gy. Metelka Ferencz).

GEN. 4. NEM. SINGA. (C. K.)

(Σίγγα = földrajzi név.)

Syn. 1836. C. Koch «Die Arachniden» III, p. 42.

Vide: THORELL «On europ. Spid.» p. 58.

Hengerded végtestű, kis alakok (törzs hossza legfeljebb $7.5 \frac{m}{mm}$). A végtest rendesen sötét színű, világos hosszszíkokkal díszített, gyéren szőrös, puha bőrű és zsírfenyű. Az oldalszemek majdnem érintkezők az alsó sor középsőitől alig állanak távolabb mint ezek egymástól. A lábak aránya 1, 2, 4, 3. Buja növényzet, jelesen tőszek és mocsarak lakói, melyek kis kerek hálóikat a gyengébb növények szármái közé szövik s melléjük elmeszen alkalmazott, igen változatos rejteket szőnek.

SPEC. I. FAJ. SINGA HAMATA (CL.) NYILAS SZINGAPOK. PFEIL SINGASPINNE.

(hamus = horog; némileg talán a végtest rajzára, mely keresztberóvott nyelű nyílhoz hasonlít.)

Syn. 1757. *Araneus hamatus* CLERCK «Aran. Suec.» p. 51.

Vide: THORELL «Remarks» p. 28.

♀ Fekete; sárgavöröses finoman barnán gyűrűzött lábakkal, a végtest hátfelén egy ↑ nyíl forma világos sárgásfehér rajz, melynek nyelet több haránt vonás metszi; oldalai sárgás színnel elegyítve sötét barnások.

Kis, hengerded alak, módos fejmellel és lábakkal.

A fejrész jól elválasztva, domború, a mellnél nem feltűnően keskenyebb, feketebarna, zsírfenyű; a mellrészt a fejresznel kevesebbe domború, vörösbarna, a nyelecske fele világos vörösbarnás; a mellvert fekete, gyéren szőrös.

A rágók sötét feketebarnak, tövükön láthatólag kidomborodók; az állkapcsok és az alajk vörösesbarnak, széleiken alig valamivel világosabbak. A tapogatók vöröses sárgák a három végű fekete gyűrűvel.

A lábak vöröses sárgák, a csombok és a többi izék végükön barnas gyűrűvel, mely az első két labpar terdizen igen határozatlan. A csombok alul fegyvertelenek, a többi lábízület alul erős, sötét tüskékkel fegyverzett.

A végtest tompakörded, kisse nyújtott és hengerded, a fonók felett jól kiálló. Alapszíne fekete. A hátfel elejére irányzottan egy ↑ szerű rajz, mely nyelel a fonókig ér s a hátán 3–4 kisse határozatlan harántvonal által metszettek, a melyek a sárgán és barnán egyes oldalakra enyesznek. A has fekete, oldalt két párhuzamos sárgásfehér vonással szegélyezve, mely sem a fonókat sem a rimát nem éri el.

A középszemcsoport hátrafele szűkülő trapezbe elhelyezve; az oldalszemek majdnem érintkezők, távolságuk az alsó középszemektől valamivel nagyobb annál, a mely az alsó sor középszemeit egymás között elválasztja. Elölről nézve az alsó sor kisse kihajló, a hátsó kisse behajló.

A zár vörössárga, egyszerű, kevesse kiemelkedő kerettel; fedő lemeze alapján szeles, vegfele kisse csücsösödő, elkerekített s a zár keretét épen meghaladó hosszúságú, alig észrevehetően \sim formán hajlott.

Mertekek ♀ Törzs 7.5 $\frac{m}{m}$ ebből

fej mell 2.9 „

I lábpár 8.2 „

♂ Kiesiny, karesu; elenken sárgás vörös, egyszínű lábakkal, enyesző nyílrajzzal, melyen a harántvonalak alig kivehetők. A vegtest alapszíne vörösbarna. A szemcsoport, jelesen az alsó középszemek tetemesen kiállók; az oldalszemek felülről tekintve kisse hátralepők. A has fekete; sárgás oldalszegelye inkább foltot mint csíkot kepez. Az I. és II. lábpár aránylag meghosszabbított, valamennyi elenk sárgás-vörös, gyűrűm-élküli. A tapogató rövid, sárgásvörös nyelű; pikkelye nagy, kanál alakú, csak kevesse befele és oldalt fordított; nemzőszerve módosan kidagadó, oldalról tekintve egy árforma embolust ez alatt pedig egy kisse csavárosan vegződő lemezt mutat.

Mertekek: ♂ Törzs 3.6 $\frac{m}{m}$ ebből

fej mell 2 „

I lábpár 6.5 „

Válfaj: α . ♀ A lábak egyszínűen sárgásvörösek; a vegtest oldalainak világos színe hosszávva tömörül, úgy, hogy a nyíl nyelevel parhuzamosan állva, mintegy három csíkossá teszi a fekete vegtestet, egyebkent az előbbinek megfelelő es annyi mint: *Singa nitidula* C. Koch, mely eddig önálló fajként szerepelt s nem egybe a *S. hamata* (Clerck) ifjabb nőstényenél. (Thorell tanár is ezt tartja.)

Válfaj β ♀ a fej mell fejresze feketebarna, a mellresz sárgás vörös, a többiben az α válfajnak megfelelő, annyi mint *S. melanocephala* C. Koch (lásd THORELL «Remarks on Syn: p. 28).

E csinos kis pók, leginkább tavaszi alak, buja füves helyeken, de leginkább a tavak sáros szelein igen gyakori és májusban ivarérett. Kis halóját a füvek, sáslevelek közbe alkalmazza, közel a földhöz és többnyire dultén, neha épen vízszintesen is. A lakás készítésben nagy mester: majd a füvek bojtját szövi össze lefele nyíló zaeszkóvá, majd a sás, a gyekeny levelet huzza össze csatornásan s e csatornára hófehér, tozott leplet sző, mely alatt megvonul s peteit is lerakja.

Úgy látszik, őszi nemzedéke is van: teny az, hogy tavasztól őszig lelhető: de megis tavaszkor a leggyakoribb. Typikus alakját ismerem, magyar részekből: Orsováról (Allion tove), Rakamazról (zsídó temető) Nagy-Váradról (Muz. gy. Mocsáry); α Válfaját erdélyi részekből: Kolozsvárról, Szamosfalváról, Mező Záhrol (mocsáros helyekről), Szeben környeke (Sill, Bergleiter gyűjtemény és Seidlitz jegyzete), Disznódról (Sill gyűjt.); magyar részekből: Doroszló (Mosztongá nádja), Apatinból, Palánkáról, Újvidékről, Pancsováról (Kis-Szlatina mocsár), Orsováról (Füzes a neutralis területen), Ogradena (Mragonya völgy talpa), S.-A.-Új-hely (Furdó melletti nádas), Sz.-Fehervár (Sóstó), Nagy Varad, (Muz. gy. Mocsáry), Pest vidéke (Muz. gy. Frivaldszky) Orsova (Muz. gy. Frivaldszky). Válfaj β magyar részekből: Doroszlóról, Apatinból és Orsováról

SPEC. 2. FAJ. *SINGA LUCINA*. (SAV. ET AUD.). ÉKES S. SCHMUCKE S.

(Lucina = myth. név, a születés istennője.)

1825. (?) *Epeira* (?) *Lucina* SAV. ET AUD. «Descr. de l'Égypte?»

1867. *Singa semiatra* L. KOCH. «Zur Arachn. Fauna Süd Europ.» k. k. zool.-bot. Ges. Wien. pag. 4. (860).

♀ Sötét dohánybarna színű, barnásvörös lábakkal; a vegtest hatfelen három szelesebb, sárgásfener, elesrajzú hosszcsík; az első lábpár ezombján felül a vegen egy ekalaku barna folt.

A *S. hamatánál* valamivel kisebb alak, aránylag hosszabb és erősebb lábakkal a vegtest megfordítva hossztojtásdad (csücsösabb vegevel előre fordítva).

A fejmell módosan fejlett, vörösbarna: fejerésze kissé kiemelkedő, módosan domború. A mellvert egyszínűen barna, zsírfényű.

A rágók tövüknel módosan kidomborodók, végükkel az állkapcsokra hajlók, barna-feketek. Az állkapcsok s az alajk vörösbarnák. A tapogatók agyagsárgák; végizük bebarmitott (nem gyűrűs). A lábak agyagsárgák; az I. pár czombja végén, felül, egy tetemes nagyságú, ekalakú, hegygyel lefelé irányozott, barna folt; a lábvégek kissé bebarmitottak, a III. és IV. lábpáron homályosan gyűrűsek.

A végtest sötét dohánybarna, három sárgás fehér (|) állású csikkal, a közep és oldalesikok között nemi határozatlan -- világos tarkitással. Az oldalak szennyesbarnák. A has barna, kettfelől halvány sárgásfehér, párhuzamos, rövid csikok köze foglalva.

A középszemcsoport hátrafele igen szűk trapezbe elhelyezve; az alsó középszempár közötti távolság majdnem nagyobb annál, a mely a középszemeket az oldalszemektől elválasztja. Az alsó középszempár tetemesen kiálló.

A zár megfegyő, hosszú, haránt-dudorodás, egy elöl elkerekített, nyelvyszerű, rövid fedőlemezzel.

Mertekek: ♀ Törzs	6 $\frac{m}{m}$ ebből
fejmell	3 "
I lábpár	8 "

♂ aránylag nagy; a nősténytől — színezetre — csak annyiban különbözik, hogy az első lábpár czombfoltja elmosódó.

Az I. és második lábpár hosszú. A tapogató rövid nyele agyagsárga, terdizen egy felálló sertével; pikkelye módos, kanálszerű, kevéssé oldalt befele fordított; nemzőszerve módosan kiálló, oldalról tekintve egy, kissé nyitott madáresőrlőhöz hasonló embolus látható, melynek külső fele árforma, alsó fele vaskosabb, fogszerű.

Mertekek: ♂ Törzs	4.6 $\frac{m}{m}$ ebből
fejmell	2.2 "
I lábpár	10 "

E kis pók eredetileg Palaestinából lett ismertetve. A faj egészen biztos. Találtam: Doroszlón a Mosztonga sásában igen kora tavasszal (1873. ápril 4-en) ♂ ivarát ivarérett állapotban; továbbá a Balaton nádjában (szeptemberben fejletlen állapotban). Az ivarérett nőstény csak 1874. évi júliusban került meg Doroszlón. A példányok Thorell tanár által a Palaestinából származó eredeti példánnyal összehasonlítottak. Simon E. csak Algeriából ismeri. (Les Arachnides de France Tom. I. 1874. p. 123). Ausserer Olaszországból közölte.

SPEC. 3. FAJ. SINGA HERII. (HAHN). HER SINGÁJA. HERS S.

(Her, német természetbarát tiszteletére).

Syn. 1831. *Epeira Herii* HAHN «Die Arachniden» I, p. 8.

Vide: THORELL «Remarks» pag. 26, 457, 515.

♀ Fekete: a végtesten három széles (|) állású hosszcsík, melyek közül a középső mintegy hasított, sárgásfehér, belsejében élénk rozsdasárga. A végtest széles-tojásdad (nem hengerded). Zömök, kurta alak, finom, élénk-rozsdasárga lábakkal.

A fejmell módosan fejlett; fejerésze jól elválasztott, módosan domború, sötét vörösbarna, a mellresz élénk rozsdavörös; a mellvert rozsdasárga. A rágók módosan domborúak, rozsdasárgák. Az állkapcsok és az alajk rozsdasárgák, közepén elmosódva bebarmitottak. A tapogatók egyszínűen rozsdasárgák.

A lábak elenken rozsdasárgák, szőrösek, gyeren álló gyenge sertékkal s csak a bordáskarmok táján kissé bebarmitottak.

A végtest szélesen tojásdad, három hosszcsikkal; ezek közül a középső mintegy hasított (ket végén

eles-csucsos, közepe fele mindinkább nyíló), mind a három sárgás fehér, a középső belsejében egy elénk rozsdasárga elmosódó, csikkal diszítve. A has egyszerűen feketebarna.

A középszemcsoport dereknegyszögben áll s a szinte érintkező oldalszemektől akkora távolságra esik, a mekkora a távolság az alsó sor középszemei között.

A zár sárgás, sima keretű; fedőlemeze széles, a zár szélét kissé meghaladó, elől elkerekített, egyszerűen – lehajló és szélein kissé bebarmitott.

E típus megfelel annak, a melyet C. Koch S. nigrifrons nev alatt írt le («Die Arachniden» XI. p. 153).

Mértékek: ♀ Törzs	5 $\frac{m}{m}$ ebből
fejmell	2 „
I lábpár	5.5 „

♂ igen kicsiny, hosszulábú, karcsú; a végtesten csak a díszes középsík látható; színezete egyébként a nőstényével megegyezik. A tapogató kurta nyelű, terdizen egy felálló, kurta serte; pikkelye kanálszerű, rozsdabarna, kissé oldalt es befelé fordított; nemző szerve módosan kidagadó, alulról tekintve egy rugómódra lekanyarodó hosszú, vékony, fekete embolust mutat, melynek töve mellett egy vaskos, tompa-csucsos köröm mutatkozik.

Mértékek: ♂ Törzs	3.5 $\frac{m}{m}$ ebből
fejmell	1.8 „
I lábpár	5 „

Válfa *a*. ♀ Az egész fejmell rozsdasárga, a végtest barnasárga, a díszes középsík határozottan kitűnik és mindkét oldalról némi feketés foltocsákkal szegélyezett.

E kis faj legdíszesebb kerékhálósaink közé tartozik, s eddig Pancsováról a wojloviczi erdőben elterülő «Kis Szlatina» mocsár sásából ismerem, hol kora tavasszal mind a két nemben ivaréretten fordul elő. Az írók által rendszeren a S. pygmaeaval összetevesttetik. Fajunk kétségtelen, Thorell tanár igazolta. Erdélyből, Kolozsvár környékéről meg van a Schusztér Károly-fele gyűjteményben is.

SPEC. 4. FAJ. SINGA PYGMAEA. (SUND.). TÖRPE S. ZWERG S.

(Pygmaei = a régiek mesebeli törpe népei; az alak kicsinységére vonatkozik).

Syn. 1830. *Theridium pygmaeum* SUNDEVALL «Svenska. Spind. Beskr.» p. 121. ad. part.

Vide: THORELL «Remarks» p. 26, 67, 455, 457, 554.

♀ Fényes fekete vagy sötétbarnafekete; a végtest felületén három fehér vagy sárgásfehér, ríktó hosszcsikkal (|). Igen kis alak, kissé hengerded végtesttel, vöröses, arányos lábakkal.

A fejmell kicsiny, barnászörös, neha (a barnásoknál) vöröses barna; fejeresze kiemelkedő; a mellvert feketebarna.

A rágók barnászörösek, kissé duzzadtak és tövüktől terdszerűen kihajlók. Az állkapcsok és az alajk sötét barnászörösek. A lábak rozsdavörösek, szőrösek, fegyvertelenek, a bordás körmök táján kissé bebarmitottak; ilyenek a tapogatók is.

A végtest hosztojásdad, kissé hengerded; felül fekete, vagy sötétbarna fekete, három ríktó fehér csikkal, melyek közül az oldalbeliek neha sárgások, a középsík pedig közepén, de ritkán, hajfinoman hasított. A csikok a hátestnek sem elején sem végén nem érnek össze. Neha az oldalsíkok enyészők. A has fekete, kétoldalt egy-egy párhuzamos fehér vonással diszített.

A középszemcsoport kiemelkedő, dereknegyszögbe helyezett, mely azonban szélességével valamivel magasabb. Az oldalszemek érintkezők, a középszemektől akkora távolságra, a mekkora az alsó sor középszemei közötti. Az alsó sor kihajló, a felső behajló.

A zár egy közös keret, melyben ketoldalt két kerek nyílik van; ezek között kozbül egy sima, fényes, szeles lemez látható.

Mertekek: ♀ Törzs	3·5 $\frac{m}{m}$ ebből
fejmell	1·4 »
I lábpár	3·8 »

♂ előttem ismeretlen.

E kis faj tavaszi és nem épen gyakori; leginkább földhányások gyepes oldalán fordul elő, hol a fűszálakon fel s alá jár. Hálózata ismeretlen, ezért és életmódjáért mint szemállásáért is átmeneti alak gyanánt szerepel.

Legtöbbször e pók mutatott le Singa Heerii gyanánt. (Lásd THORELL »Remarks»-on Syn. &c. p. 26. &c.)

Ismerem erdelyi részekből: Kolozsvárról (Muzeum kert), Mező-Záhról (Bottavölgy), Balánbányáról (Nagy-Hagymás töve); magyar részekből: Doroszlóról (zsidó temető), Apatinból (Galagonyás erdőcske), Palánkáról, Pancsováról (honved löhely), Tokajból (legelő), Nagy-Váradról (Muz. gy. Mocsáry).

SPEC. 5. FAJ. SINGA ALBOVITTATA. (WESTR.). FEHÉRJEGYŰ S. WEISSGEZEICHNETE S.

(alba = fehér, vitta = sáv, csík; a fejmell jegyére vonatkozik).

Syn. 1851. *Epeira albovittata* WESTRING »Förtecken» pag. 36

Vide: THORELL »Remarks» pag. 28.

♀ Sárgásfehér, vagy zöldesfehér; a sötét fejmellen egy kirívó fehér folt.

Zömök kis alak, finom, rövidke lábakkal.

A fejmell, az állkapesok, a rágók és tapogatók sárgásbarnák; a fejresz jól elválasztott, domboru, kisse világosabb, a végén és a mellrésze átmenve egy csontfehér folt. A mellvert fekete. A lábak egyszínűen barnássárgák, szőrösek, fegyvertelenek. A végtest kerekdeden tojásdad, felül csontfehéres vagy zöldes, némi erezzel és közepén egy elmosódó, egészen fehér hosszcsikkal; oldali feketések. A has fekete, kétfelől finom, párhuzamos, fehéres vonallal szegélyezve.

A középszemcsoport deréknégyszögben áll; az oldalszemek egymás között érintkezve a középcsoporttól oly távolságra esnek, mely valamivel nagyobb annál, a mely az alsó sor középszemeit egymástól elválasztja.

Mertekek: ♀ Törzs	4 $\frac{m}{m}$ ebből
fejmell	1·2 »
I lábpár	3·5 »

♂ ismeretlen.

E kis pókot csak egy pontrol ismerem: Kolozsvárról a »Szenafüvek» buja füvéből, hol június havában lettem harmadvedlésű állapotban, melyben színezete teljesen talál Westring leírásával.

SPEC. 6. FAJ. SINGA SANGUINEA. C. K. VÉRÉS S. BLUTROTHE S.

(sanguis = vér; az alapszínre vonatkozik).

Syn. 1845. *Singa sanguinea* C. KOCH »Die Arachniden» XI, p. 155.

Vide: THORELL »Remarks» pag. 456. 457.

♀ Vér- vagy barnavörös; a végtest elején és végén, felül, ket-két fekete, párosan álló folt. Zömök, kis alak, vékony, rövidke lábakkal. A fejmell jól elválasztott, jól kiemelkedő, domborodó; a mellrésze arányos, boltozatos; mindkettő barnászörös. A mellvert fekete. A rágók módosan domborodók, vörösbarnák s

ilyen színűek a tapogatók is. Az állkapesok és az alajk barnások. A lábak vékonyak, rövidkék, rozsdavörösek; az I. és II. lábpár czombja, úgy a IV-dik lábpár két végze is bebarmitottak.

A végtest tojásdad, barnászörös; közbül egy elmosódó, oldalt egy-egy szakadozott világosabb csík maradványaival. A közepesik maradványaihoz a végtest elején és végén egy-egy fekete folt pár alkalmazkodik. A has barnavörös, kitüntetés nélküli. A középszemcsoport dereknegyszöget kepez s fekete, kiemelkedő teresen áll; a szemek közötti távolság megfelel annak, a mely a közep- és oldalszemek között letezik.

A zár aránylag nagyocska, rozsdavörös; három egyenlő, fenyő, elkerekített, kis karajból áll.

Mertekek: ♀	Törzs	3·8 m_m ebből
	fej mell	1·6 »
	1. lábpár	3 »

♂ ismeretlen.

E kis pók, melynek szövetét nem ismerem, rendszeren kövek alatt található, még pedig leginkább nyár derekán. Életmódja, szemállása szerint átmeneti alak a kerékhalósok és hurukkötők között. Nem épen gyakori. Ismerem magyar részekből: Rakamazról (kincstári berkek) és Ó-Huttaról (Borsod, Bükkhegyseg). Nagy-Szebenből Sill közölte.

GEN. 5. NEM. CERCIDIA. THOR.

($\chi\epsilon\rho\zeta\varsigma$ = vetelő, Weberschiffchen. A végtest alakjára vonatkozik).

Syn. 1869. THORELL «On europ. Spid.» p. 58.

A lábak hosszaránya 4, 1, 2, 3; ¹ a test kemény, pontozott bőrrel fedett. A végtest elől csúcsos s e csúcsossággal a mellrész felett kiáll; az alsó fonók előtt egy (nehezen kivehető) harántrés. Egyéb-ként a Singa nemnek megfelelő, nevezetesen a *S. sanguineat* megközelítő alak.

SPEC. I. FAJ. CERCIDIA PROMINENS. (WESTR.). HÁTAS VETÉLŐPÓK. BUCKEL SCHIFFSPINNE.

(promineo = elő-, kiállni; a végtestnek az előtestre való fölfekvésére vonatkozik).

Syn. 1851. *Epeira prominens* WESTRING «Förtecken» p. 35.

Vide: THORELL «Remarks» p. 30, 554.

♀ Élénk fahéjbarna; esikyszerű, szakadozott hátrajzzal; vörössárga sűrűn barnán foltozott és gyűrűzött lábakkal; a fej mell élénk vörösbarna alapon sötétbarna csikos.

Kis alak, hosztójasdad, felül kissé lelapított, elől csúcsos végtesttel, módosan fejlett lábakkal. A végtest kerges tapintású.

A fej mell módosan fejlett, fejerésze jól kiálló, oldalról tekintve kissé íves; a mellrész domborodó, módosan széles; mindkettő elenken világos-vörösbarna. Az oldalszemektől kétfelől és kissé összehajolva két széles sötétbarna sáv fut, mely a hátgödörbe egyesülve enyészik; a mell oldalain hasonlóképen sötét sáv vonul szegélyképen, mely a szemek felé enyészik. A mellvert, alajk és az állkapesok fekete-barnák. A homlok a rágók felett kissé kiáll; a rágók világos sötétbarnák, tövüknel kissé térdszerűen kihajlók. A tapogatók vörössárgák, a negyedik íz vége barnavörös gyűrűvel. A lábak vörössárgák, az első lábpár czombja majdnem tövig vörösbarna, töve körül vörössárga gyűrűvel; a többi czomb inkább foltos mint gyűrűs. A lábak többi íze szépen gyűrűzött s a szár és második lábvégiz a közepén is gyűrűt viselnek.

¹ A negyedik lábpár túlhosszasága 0·5 m_m , melyet többek között MENGE A. «Preussische Spinnen» p. 80. sub «Cerceis» meglevőnek állít, igazában oly subtilis, hogy legpontosabb, ismételt méréseim sem bizonyíthatták be, s inkább kitűnt, hogy az I. és IV. lábpár közli egyenlő hosszúsága s a IV. lábpár hosszúsága alig számbavehetőleg nagyobb; a hímeknél az első lábpár épen határozottan hosszabb a negyediknél.

A végtest hossztojásdad, kissé lelapított, elől csúcsos; felületén, kivált elől, egyenetlesen, durván és mélyen pontozott; kerges keménységű. Alapszíne fahéjbarna, sárgával és sötétbarnával elegyített; a csúcsosodástól közel a végtest közepéig egy egyenetlen szelű, világos vörössárga csík vonul; neha az oldalak is kissé világosodók. A has vörösbarna, oldalt elmosódva sárgásan szegélyezett. A fonók előtt egy kis \subset szerű harántvasíték áll, melynek rendeltetése ismeretlen.

A hátsó középszemek nagyobbak az alsóknál, mind a négy dereknegyszögben áll, a rágók tövetől távolabbra mint egymás között. Az oldalszemek közel érintkezők, a hátsók az alsóknál nagyobbak, távolságuk a középszemektől alig akkorra a mekkora a köz az alsó sor középszemei között.

A zár hátrafelé egy-egy fénylő vörösbarna felkarikát alkot, melybe a széles, sárgás, elől elkerekített, durvás felületű fedőlemez nyelvszerűen befekszik.

Mértékek: ♀ Törzs 5 $\frac{m}{m}$ ebből

fej mell 2 »

I lábpár 4·2 »

♂ A nősténynek egészen megfelelő színezet mellett egészben valamivel sötétebb. Nem igen feltűnően bár, de karsú jól fejlett előtestesttel és fejlett előlábakkal, melyek a IV. láppárnál hosszabbak. A tapogató vöröses-sárgás kurta nyelen, melynek térd- és eltörpült szárízén néhány hosszú serte áll; pikkelye barna, kanálszerű, oldalt és befelé fordított; nemző szerve jól kidomborodó, sötétbarna, feljülről tekintve közel a tövehez és oldalt (kifelé) egy tetemes hosszúságú, karsú, tompavégű embolus sarkantyú módra meredez.

Mértékek: ♂ Törzs 4 $\frac{m}{m}$ ebből

fej mell 2 »

I lábpár 5 »

IV lábpár 4·5 »

Nem épen gyakori, sásban és bokrokban élő igen csinos kis pók, mely tavasszal ivarérett. Halóját nem ismerem. Ismerem az Apatin melletti cserjésekből, Ogradenáról (Fraczila), Tokajból (legelő).

GEN. 6. NEM. ZILLA. (C. K.)

(Zilla = bibliai név, Lamech neje.)

Syn. 1834. C. Koch in Herrich-Schäffers «Deutschl. Ins.» 125, 19 ad partem

Vide: THORELL «On europ. Spid.» p. 59.

A hátsó sor oldalszemei ugyan e sor középsőitől a nőstényeknél nem állanak távolabbra mint a középszemek egymás között — valamivel távolabbra a hímeknél. A hátsó szemsor felülről tekintve majdnem egyenes. A homlok nem áll ki a rágók töve felett. A fej mell aránylag keskeny. A has széleskörded, kissé lelapított. Az előlábak hosszuk s a két láb végig a szárhoz képest kissé hirtelenül vékonyodó. Az egyes fajok rajzban igen hasonlóak s csak a nemzőrészekben feltűnő különbségek alapján biztosan megkülönböztethetők. Kerékhalóik mellé rejtet szőnek; némelyek a havasokon tetemes magasságban is tartózkodnak.

SPEC. 1. FAJ. ZILLA X NOTATA. (CL.) X JEGYŰ ZILLAPÓK. X-ZILLASPINNE.

(x notata = x betűvel jegyzett; a végtest elején álló rajzra céloz).

Syn. 1757. *Araneus littera x notatus* CLERCK «Aran. Suec.» p. 46.

Vide: THORELL «Remarks» p. 31.

♀ Zöldessárga, barnással elegyes; a végtest elején, első pillantásra otromba x-nek tetsző sárgásfehér jegy. Körded, láthatólag lelapított végtest, keskeny rozsdabarna előtest és hasonló színű lábak, bebarmitott izekkel.

A fejmell nyújtott, veznás, domborodó; a fejresz nem emelkedik ki s elől kissé lecsapott, úgy a mellresz hátsó fele is. A hátgödör éles-hosszbenyomású némi csillagszerű barázdákat kisugárzó; a fejresz kavásan elválasztott. Az egész rozsdabarna, a hátgödörből a fejfelé ∇ szerűen bebarmitva. A mellvert közbül ekformán sárgafehér, szélein szélesen barna. A rágók vörösbarnák tövükkel kidomborodók, végük fele vékonyulók és szíjjelállók; csipőkörmük tövén sötét vörösbarna, végén áttetsző, világosabb becsapó rése 5 foggal fegyverezett. Az állkapcsok kissé laposak, sárgásbarnásak. A tapogatók kissé veznák, egyszerűen vörösbarnák. Az első lábpár hosszú; valamennyi vörösbarna, a harmadik és negyedik lábpár czombja közepén egy gyűrűnek tetsző sötét folt; minden czomb közepén (felső lapján) egy barna tövis, az első pár lábvégeinek két ize kissé hirtelenül vékonyodó.

A végtest zöldessárga, közepe czimerszerűen világosodó és hátrafelé némi kigyózó, sötétes szegélylél határolt. A világosodás a végtest elején az otromba x jegyet alkotja meg. A czimer belsejében némi ágas erezet látható; vége fele határozatlan harántvonások is láthatók.

Az oldalak sárgászöldes és fekete színnel elegyesek. A has barnás, oldalról enyesző-fehéresen szegélyezett. A középszemesoport hátrafele alig szűkülő trapezbe elhelyezett, alsó szempárja valamivel nagyobb a hátsónál. Az oldalszemek nem crintkeznek. A hátsó oldalszemek a hátsó középsőktől alig valamivel állanak távolabbra, mint a mekkora a hátsó közep szemek közötti köz.

A zár egy sötét vörösbarna, a has tengelyének haránt álló kiemelkedést kepez, melyen felül egy kis horpadás (\cap) látható.

Mertekek: ♀	Törzs	8 $\frac{m}{m}$ ebből
	fejmell	3.5 "
	I lábpár	12 "

♂ Kisebb, karsú; fejmelle szélessebben fejlettebb; lábai egyszínűen rozsdavörösek; a végtest czimere bebarmitás által határozottabb; előlábai hosszúk. A tapogató meglehetősen hosszú nyelen; terdizen egy felálló sertével; száríze a terdiznél valamivel hosszabb, az egész rozsdássárga; pikkelye aránylag nagy, melyen kanálalakú, kevesse befele oldalt fordított; belső szele körül szőrös; nemzőszerve módosan kidagadó barnavörös, igen tekervényes, oldalról tekintve aláfele meredező két apró fogacskát mutat, melyek közül a nyelfelöli sötét, hosszabb és elesebb, az elől álló apróbb, tompa és rozsdasárga.

Mertekek: ♂	Törzs	4.6 $\frac{m}{m}$ ebből
	fejmell	2.3 "
	I lábpár	11.8 "

Eddig egyedül a Pozsony melletti Dunaligetektől ismerem, hol a nagy fák alatti sarjakban szövő hálóját, holott maga a kergén tartózkodott. A háló központjától rendszeren egy külön fonal vezet a rejthez s egyedül e fonal képezi a kapcsolatot a háló és nyugvó állat között.

SPEC. 2. FAJ. ZILLA MONTANA. C. K. HEGYI Z. BERG Z.

(mons = hegy; a tartózkodásról).

Syn. 1839. *Zilla montana* C. KOCH «Die Arachniden» V. p. 147.

Vide: THORELL «Remarks» pag. 34. 35.

♀ Az előtest és a lábak barnás sárgák; a hátgödörből a fejfelé háromágú sötét csik vonul. A zár feketebarna, előlről tekintve kurtá széles kúpot alkot, hátulról tekintve egy kerekded tércsét mutat, mely alatt, közvetlenül a has felett, két kis nyílás látható. A lábczombok felül és alul fegyvertelenek.

A fejmell a *Zilla* x notataéhoz képest kevesebbe nyújtott, a fej kevesebbe kavásan elválasztott, elől domborúan elkerekített, hátul hasonlóképen; barnássárga. A hátgödörből egy barna rajz indul, mely kiindulása pontján három ágra szakad, mely ágak közül a középső a középszemesoport, a két szélső az oldalszem

csoportok fele vonul: a középső ág rendszerint a legerősebb és leghatározottabb, az oldalágak nehe elmosódók, de mindig kivehetők. A mellresz keskeny sötétbarna szegélylyel. A rágók tövüktől terdszerűen kiállók és domboruak, barnák; a becsapó res táján részüntösen szétállók, végükön vörösbarnák; a csipőköröm vörösbarna, töven sötétebb. A mellvert feketebarna. Az állkapcsok és az alajk tövüknel barnák, széleik határozottan világos barnássárgák. A tapogatók és a lábak világos barnássárgák barna gyűrűkkel és foltokkal tarkázva. A tapogatók alapizei egyszínűen világosbarnássárgák, a térdizen felül egy sötét folt, a száríz széles barna gyűrűvel, a végiz beharmitva foltos, vege sötét. A lábak czombjai három barna gyűrűvel ekesítve; a száraz néhány erős tüskevel fegyverezettek s e tüskék barna foltokból indulnak.

A végtest széles-körded; sötétbarna és szennyessárga vegyületű. Elején kezdődve s közepén tulig terjedve egy láncszerű sárgás, közepén barnán hasított hosszcsík, melynek kezdete némileg emlékeztet a megelőző faj x jegyére. A csik körülötti ter barnán és sárgásan mintegy beporozott és sötetes, az oldalak fele világos szín által fogacsoltan határoltatik s ez által czimert kepez. A has fekete, világos sárgásfehér szegélylyel, mely kifele elmosódó s a fekete fonókat is körülfogja. A szemesoport a Zilla x notataétól nem lenyegesen elterő.

Mertekek: ♀ Törzs	7·2 $\frac{m}{m}$ ebből
fejmell	3·2 »
I lábpár	12·8 »

♂ nagyságra nevezve alig enged valamit a nősténynek, valamivel karesubb, fejmelle fejlettebb, szemezte egyezik a nőstényével s az előttem fekvő példány csak annyiban különbözik, miszerint a fejmellen csak a barna közepesik látható. Tapogatója rövid nyelű, a nyelv szennyessárga, terd- és szárizze több felálló sertevel ellátott; pikkelye tetemes, kanál alakú, kivájt, kisse oldalt és befele álló, leginkább szélein szőrös; nemző szerve jól kidagadó, barna, igen szövevényes; külső oldaláról tekintve elől egy lekanyarodó, horgosan befele hajló lemez-körmet mutat, mely mögött három nagyobb vaskos és egy kis fogacska következik.

Mertekek: ♂ Törzs	7 $\frac{m}{m}$ ebből
fejmell	3·4 »
I lábpár	14 »

E fajt a Tatrából ismerem leginkább, hol a fenyő tenyészőveben ritkább, a törpe fenyő öve felett gyakori. Találtam a Kriván tömbjén a «Handel» és Zoldtó közötti gránit tömbökön, továbbá a Kriván nyugoti oldalán fekvő «Zakameniszko» völgyben. Terjedelmes szep kerekhalóját dult irányban alkalmazza a sziklákhöz, maga pedig a repedésekben tanyázik, hová egy vezérfonal vezet, itt rakja le peteit is, melyeket kalit módra beszöve őriz. Bajosan kivehető, mert lapos testenel fogva szűk repedésekben tanyázik. E faj ugyanaz, a melyet Dr. Koch L. Zilla «alpica» nev alatt, a Tátra gallicziái oldaláról ismertetett (lásd: Beiträge zur Kenntniss der Arachnidenfauna Galliziens. XLI. der Gelehrten Ges. in Krakau). Erdélyből a Csiki havasokról (Nagy Hagymás, Békásszoros) és Görgény Szent Imréről ismerem.

SPEC. 3. FAJ. ZILLA THORELLI. AUSS. THORELLI, Z. THORELLS Z.

(THORELL T. kitünő Araneologus tisztetére így nevezve.)

Syn. 1871. *Zilla Thorelli* AUSSERER «Neue Raupspinnen» in Verh. der k. k. zool.-bot. Ges. in Wien. XXI, p. 830.

♀ Fajrokonai között a legtekintélyesebb alak; fejmelle sárgásbarna, fekete szegélyvonallal, mely a rágók táján elenyészik. A zár egy sárgásbarna, széles, nyelv alakú, csúcsba végződő fedőlemez által egészen elfedve.

Fejmelle rendes alakú; végteste kisse lapított, hátfelen az e nemet jellemző széles folttal, mely azonban a végtest utolsó negyed részében el van metszve, tehát nem terjed a fonókig; csupan egy sötét vonal éri el a fonószervet. A nagy folt fekete, közbul egy füreszfogas középszalag által attorott, a középszalag

szorosan egymashoz fűződő rhombicus részekből való. Az oldalak s a hasfel sárgások, sötét pettyekkel díszítve. A labák hosszaránya 1, 2, 4, 3, a czombok vastagok, felső es alsó végükön es közepen sötét gyűrűkkel, a lábvegek kivételével valamennyi lábíz erős tüskekel fegyverzett.

Mertekek: 4 torzs	8 $\frac{m}{m}$ ebből
fejmell	3·7 »
I lábpár	15 »

♂ Ismeretlen.

E szép fajt Dr. MAYR G. a beesi Praterben fedezte fel s AUSSERER az idezett helyen írta le. Dr. BöCKH György pozsonyi orvos gyűjteményében e faj «Epeira Modrensis n. sp.» nev alatt állott, magyar lel-helye tehát Modor környeke. Ketségtelen, hogy Dr. BöCKH e fajt jóval hamarabb fedezte fel mint Dr. MAYR, azonban leírását nem eszközölte s így az elsőbbségtől is elesett.

SPEC. 4. FAJ. ZILLA STROEMII. TH. STROEM Z. STROEMS Z.

(STROEM, jeles svéd buvár tiszteletére.)

Syn. 1870. *Zilla Stroemii* THORELL «On europ. Spid.» p. 235.

Vide: idem «Remarks» pag. 34 et AUSSERER «Neue Radspinnen» p. 829.

♀ Kicsiny, meglehetősen kiszélesedő vörösessárga fejmellel; a zár igen hosszú, vörösbarna, ivesen hajlott fedőlemezzel (0·6 $\frac{m}{m}$).

A fejmell kissé szélesedő, sárgabarna; fejeresze a hátgödortől kezdve vörösbarnás, mintegy eres; a mellvert szennyes-sárgás, szélein keskenyen elmosódva bebarmitott. A rágók módosan kidomborodók, vörös-s barnások. Az alajk es az állkapcsok sárgásbarnasak. A labák szennyes sárgások, elmosódó barnás foltokkal tarkítottak, mely foltok a czombokon gyűrűzetések. A végtest a megelőző fajéhoz hasonló, avval a különbséggel, hogy a világos, láncszerű középrajz inkább lyukasztott mint hasított. A has feketes, alig kivehető, elmosódó, világosabb szegélyllyel. A középszemek dereknégyszögben állanak, az alsók nagyobbak. E csoport az oldalszemektől open annyira esik, mint a mekkora a távolság a hátsó sor középszemei között.

A zár fedőlemeze aránytalan, hosszú es széles, kissé ivesen hajlott, elől eltompított s hosszában kissé csatornás.

Mertekek: 4 Torzs	4 $\frac{m}{m}$ ebből
fejmell	1·8 »
I lábpár	6·5 »

♂ A nősténynel valamivel kisebb; fejresze oldalt határozottabban bebarmitott, mellresze szélesedő; az egész alak karesubb. Tapogatója rövid, sárgás, terd- es szárízen egy-egy felálló sertével, pikkelye módo-san fejlett, sárgás, szőrös; nemzőszerve módosan kidomborodó, sötét vörösbarna; oldalról tekintve elől egy horgosan le- es bekanyarodó, hátul egy le- es kikanyarodó hosszú, horgonyszerűen viszhorgos körömmel.

Mertekek: 7 Torzs	3·5 $\frac{m}{m}$ ebből
fejmell	2 »
I lábpár	8 »

E kis fajt, ivarerett állapotban Doroszlóról, ifjabb állapotban Pancsovaról ismerem; mind a két helyen nyári alak; kedvencz tartózkodási helyei az olfa rakások, hol a közökben azt a szép hálót készíti, a melyet az I. köt. III. t. 54 alatt lerajzoltam s leírtam. A háló ifjabb példányoknál neha alig 2 $\frac{c}{m}$ átmérőjű, megis teljes szabatosággal készített. Erdélyben Gorgeny Szt. Imren találtam.

GEN. 7. NEM. META. (C. K.)

(*Myzma* - mythol. név.)*Syn.* 1836. C. KOCH in HEIRICH-SCHAFFERS «Deutsche. Ins.» 13 et 135, 14—16

Vide : THORELL «On europ. Spid.» p. 61.

Az állkapesok szélessegöknel más felszer söt ketszer hosszabbak. Az alsó szemsor erősen kihajló; az oldal-szemek majdnem érintkezők, a középsőktől valamivel távolabbra állva mint ezek egymás között. A lábak aránya 1. 2. 4. 3. A rágók meglehetősen hosszúk, együttve közepén keskenyebbek mint tövüknel és végöknel, a csipőköröm hosszú erős, könnyeden hajlott, becsapórese hat igen erős foggal fegyverzett, melyek közül 1 a res végén, 2 a külső szélén, 3 a belső szélén áll. Erős testalkat, hosszú, fegyverzett lábakkal. Az e nembe tartozó fajok arnyekos, söt open homályos helyisegeknek a kedvelői; pinczekben, a barlangok elején, a patakokra hajló sziklák alján, olykor a víznek kiteve, szövik kerekhálóikat, melyek mellett rejtet nem készítenek.

SPEC. 1. FAJ. META MENARDII. (LATR.) MENARD MÉTÁPÓKJA. MENARDS META.

(MENARD, francia természetbarát s e faj felfedezője tiszteletére.)

Syn. 1804. *Aranca Menardii* LATREILLE «Hist. Nat. des Crust. et Ins.» VII. p. 266.

Vide : THORELL «Remarks» p. 38.

♀ Nagy alak; olajbarna sárgával elegyítve. Az állkapesok (kifejtve) szélessegöknel több mint ketszer hosszabbak. A fejmell világos rozsdabarna, jól fejlett és domború; hátgödre mély, szivalakú és sötét-vörös-barna; a fejresz láthatólag elválasztott, oldalról tekintve kissé íves; beigtatásának sarka V szerűen bebarmitott. A rágók erősek, tövüknel kissé domborodók, a csipőköröm táján kiszélesedők. A mellvert vöröses-barna egyszínű, ilyen az alajk és az állkapesok töve is, az utóbbiak vege világosodó. A tapogatók rozsdasárgák, végizük bebarmitott és sok tüskevel fegyverzett. A lábak hosszúk, rozsdasárgák, elenk rozsdabarna, kissé elmosódó és sűrű gyűrűzettel (a szár 3 gyűrűs); a czombok felül és oldalt, néhány, a száraz mindenütt sok sötét tüskevel fegyverzetek; a tüskék elálló. A vegtest olajbarna, elől, a közepén csalakra halványsárga s ettől oldalt két terjedelmes sötét folttal; a halványsárga, neha vörösesen elegyes rajz a fonok fele, de mindinkább enyeszve — alakra ismétlődik; a has határozatlan, világosabb, szemnyes színű, kitüntetes nélküli.

A középszemesoport negyszögbe elhelyezve, mely szélességenel hosszabb; a hátsó szemsor közel egyenes, az alsó erősen kihajló; az oldalszemek a középsőktől valamivel tovább állanak, mint állanak a hátsó sor középszemei egymástól.

A zár egy olajsárgás, boglyaszerű kup, mely előről neze narancscsikkszerű hornyoltságot mutat.

Mértékek : ♀ Törzs 16 $\frac{m}{m}$ ebből

fejmell 6.5 »

I lábpár 23 »

♂ Fejlettebb előtesttel; karesubb és elenkebb színezetű, nevezetesen a vegtest világos rajza sokszor open kénessárga; az oldalfolt sötét-feketebarna. A tapogató nyele és nemzőszerve igen sajátosságos berendezést mutat: czombize hosszú, egyenes, terdize kurta, előre elkerekített s alig vastagodó, a szár ize kurta a terdiznel valamivel vekonyabb; a pikkely csonka, silány függelek, szőrös és kissé kifele-oldalt fordított, mindjárt mellette és meg a szárbá csuklódva egy bardszerű, elől két tompa foggal ellátott széles lemez, mely alatt a pikkelynek mintegy második fele *alulról* illeszkedik a tulajdonkepeni nemzőszervhez. E nemzőszerv töven feheres, csavaros, hártatómlós végén barna szinten csavaros gyűjtőt mutat, melyből a görbén-árforma embolus kiáll. A tapogató izülete és a csonka felső pikkely szemnyessárga.

Mertekek : ♂ Törzs 11 $\frac{m}{m}$ ebből

fejmell 5 »

I lábpár 32 »

Az itt leírt színezet a borszeszben tűnik elő leginkább, elő állapotban az egész állat olajbarna lehelletű s a színek mintegy fátvolozottak, ritkán tisztán kivethetők; sötétebb változatok nem ritkák s jelesen a lábak sokszor vörösbarnák s a végtest sárga rajzai korlátozottabbak.

Barlang és pinczelakó, mely telben is a melegebb barlangokban voltaképen megszakadás nélkül tenyészik és csak ritkán teved a barlangoknak oly melysegebe, a melyből a világosság teljesen ki van zárva. Kedvencz helyei a folytonos felhomályban levő sarkok, sziklaoduk és repedések a barlangok torkolatában és a pincekben is, hol azután terjedelmes, ritkás kerek halót sző, maga pedig a sziklához vagy falhoz lapulva lesi a prédát. Juliusban lerakja peteit, melyek tojássárgák, egy csomóba ragasztottak és valóban művésziileg beszőttek. E szövet szép körte alakú, hófehér s oly finom, hogy a sárga petek megláthatók benne; hegyesebb végével a pincek boltozatára felakasztatik s az anyapók által őriztetik. Hossza e buroknak, 22—28 $\frac{m}{m}$, vastagsága 14—16 $\frac{m}{m}$. A legtöbb ivarerett példányt júliusban kaptam.

Ismerem, erdélyi részekből: Kolozsvárról (pincekből), a Körös-szoros barlangjaiból (Leányvár és Magyarbarlang), Biharhegység (Oncsásza barlang); magyar részekből: az Alsóhámorból (Borsodmegye) a Színva melleki tuffba vajt pincekből, cseppegőkő barlangokból és a hatalmas meszkeplet barlangjaiból (Szeleta), «Nagy Várud» megjegyzéssel (Muz. gy. Mocsáry), La Cruce barlang (Muz. gy. Kovács János), «Buda» megjegyzéssel (Muz. gyűjt. Frivaldszky János), «Biharmegye» megjegyzéssel (Muz. gyűjt. Frivaldszky János).

SPEC. 2. FAJ. META MERIANAE. (Scop.) MERIÁN M. MERIANS M.

(*Merian Maria Sybilla* tiszteletére így nevezve.)¹

Syn. 1763. *Aranca Merianae* Scopoli «Ent. Carniol.» pag. 395.

Vide: THORELL «Remarks» pag. 36.

♀ Az állkapcsok egy felszer hosszabbak mint a milyen szelesek. Szemnyes sárga és barna elegyes színű, általában sötetes; lábai hosszúk, szemnyessárga földön barna, sűrű gyűrűzettel. A zár egy előrefele nyílt, szeles felkeret, mely hossza közepen sárgás, végein barna, hosszrovátkolt s egy egyszerű, vese alakú nyílást körít, melynek alapján a két petevezetek nyílik.

A fej mell módosan fejlett, jól kidomborított, a fejrész domborúan elkerekített, az egész szemnyes sárgás. A fejrész beigtatása sarkában barna s e szín inkább foltosan mint vonás alakjában az oldalszemek fele is vonul; a mellrész barna szegélyű s a szegélytől a hátgödör fele sugaras barnás csikok indulnak, a hátgödört nem érik. A mellvert feketebarna. A ragók tovüktől domborúan kisse terdszerűen kihajlók, rozsdavörösek, a csipőköröm beigtatása s a beesapó res körül bebarmitottak. Az állkapcsok barnás fővel, szeleiken kisse világosodók. A tapogatók két végize alapján barna gyűrűs, a legvégső azonfelül csucsan bebarmitott s mindenütt szőrrel és sertekkel fedett. A két első lábpar hosszú. Valamennyi czomb alul fegyvertelen, felül ellenben úgy mint a szár is gyeren tuskos. A lábak szemnyes sárgák, a czomb és szár három, a többi iz két barna gyűrűvel és mindenütt közbeszórva barna foltokkal.

A végtest szeles tojásdad, végefele egyenletesen csucosodó, elől magas. Alapszíne szemnyes feketebarna sárgával mintegy heporozva; neha világosabb es ekkor nemi határozott rajz mellett czinnert mutat, mely azonban csak a fonók felett néhány homályos sárga barántvonal által inkább jelzett mint elesen kifejezett. Neha a szemnyes sárga szín az uralkodó. A has fekete, két oldalt sárgás vonallal

¹ *Maria Sybilla Merian* «Dissertatio de generatione et metamorphosis insectorum Surinamensium. Hagae, 1736.» Ez czíme annak az értekezésnek, a mely a nőnek nevet, és ime, irodalmi emléket is szerzett. E pók az első kötet jegyzékében pag. 98. «fusca» synonym alatt áll.

kerített s e vonal szakadozottan a fonókat is köríti. A szemcsoportok elhelyezése megfelel a megelőző fajnak s kifejezhető különbségeket nem tüntet fel.

Mertekek: ♀ Törzs	8 $\frac{m}{mm}$ ebből
fejmell	3.5 »
I labpár	18.5 »

♂ karesubh szélesebb mellél, a fejrészen sok a vörösbarna szín, benne egy nagyocska, világos foltpár; a mellrész barna sugarai határozottak. A tapogatón a száríz a térdíznél vastagabb, valamennyi íz szennyes sárga; a pikkelyek viszonya olyan mint a Meta Menardiunál, alapjukon felül, felfele és előre egy sarkóalakra görbített, elöl elmesztett lemez ágaskodik. Árforma embolus nem látható.

Mertekek: ♂ Törzs	7.3 $\frac{m}{mm}$ ebből
fejmell	4 »
I labpár	20 »

E faj a nedvességet különösen kedveli, sokszor a vizzuhatok sziklapárkánai alatt a porló vízeseppek között feszíti fel hálóját, s maga, a párkány sarkába megvonulva, tűri a labái alatt a sziklán lefutó vizet. Közlekedesedést a háló fele mindig egyformán eszközli úgy, hogy a háló központjából es a háló lapból hátrafele húz egy vezér fonálat, mely rejtjehez vezet. A keretfonalak után indulva mint a legtöbb Epeiroidat, e fajt megtalálni nem lehet. Árnyekben, felhomályban, nedves sziklara lapulva bajosan megkülönböztethető. Leomló martok kiálló gyepe alatt szintén gyakori. Hálójá terjedelmes és rendes. Tavasztól őszig a kifejlődés különböző fokaiban mindig előfordul, ivarérettsége azonban leginkább júniusra esik.

Ismerem magyar részekből: Illokról, Mehadiáról (Hercules fürdő melletti rés, a melyen keves gőzők tudnak ki!), Ponyikovári barlang (a Veterani mellett), Mragonya völgy (Ogradena mellett a «Fracžila» patak görgetegei), Baziáról, Tokajból, Tarczáról, Bodrog Keresztúrról, S.-A.-Ujhelyről (Magos alji patak partjai), Alsó-Hámor (Borsod a Szinya medrebe nyíló üregek szája), Szilvásról, (Borsod), Ujhutta (Borsod); Csorbai tó környeke (Kárpát), Körnőczbánya (tárnak szája), Selmeczbánya (Klingertarna szája), Pest vidéke (Muz. gy. Frivaldszky János), Erdélyből ismerem a Körösszorosból, a Nagy-Hagymás aljáról (Csiki havasok), és Kolozsvárról.

SPEC. 3. FAL. META SEGMENTATA. (CLERCK.) GYŰRŰS M. GERINGELTE M.

(segmentum - szakasz, részlet, gyűrű a rovartesten; s a végtest harántos rajzára vonatkozik.)

Syn. 1757. *Araneus segmentatus* CLERCK «Ar. Suec.» pag. 45.

Vide: THORELL «Remarks» pag. 39.

♀ Világos zöldes-sárga, fehérrel; a végtest neha elején, neha végén halavány vörössel, barnással es feketével mintegy márványozott. Zoldesbe húzó sárga, lábak gyenge, halavány, sötetes gyűrűzettel.

Zömök alak észrevehetőleg vállas végtesttel es módosan fejlett előtesttel. A zár egy lelápitott, a has színéből alig kiemelkedő, barnás négyszög-lemez, mely hátrafele néző sarkain fülszerűen benyomott.

A fejmell sárgás, zöldesbe húzó, módosan fejlett; hátgödreből a hátsó középszemek felé egy villás, barnás ikeresik vonul, mely a szemeket nem éri; a fejmell színe neha vöröses sárgába átmenő. A mellvért sötét vörösbarna. A rágók tövüktől térdszerűen domborodók, vörössárgák, világosak, csak a csipőköröm es becsapórés táján keskenyen bebarmitva. Az állkapcsok es az aljuk vörössárgák, kissé homályosak. A tapogatók vékonyak, halvány zöldessárgák, a száríz alapján egy halvány sötétebb gyűrűvel; végök bebarmitott, meglehetősen tömötten szőrös-tüskes. A lábak vékonyak, hosszúk, halvány zöldessárgák, czombjaik neha egyszínűek, neha végükön gyűrűsen foltosak, neha gyer tüskeik kerekded foltokból indulnak; a térd, szár es végizék igen halavány barna gyűrűzettek s az utóbbiak közül a szár egészen és a második végiz töven gyéren álló tüskeikkel fegyverzett.

A végtest eleje tompa tojásdad, kissé vállas, a vége meglehetősen csücsösödő. Eleje magas. Színezete elfolyó és csak a vége fele látszik nemi sötétes ezmer. Elejen kétoldalt rendszeren () alakú széles sárgásfehér foltok foglalnak helyet, melyek lefele messze elnyúlnak, a közbeneső ter barnás, néha vöröses, sötét néha kekesbe játszó márványozásszerűen elegyített színezetet mutat. A foltok kicsücsösödő vége egyszersmind hátrát képezi a rövid, előre fele enyesző hátczímernek, mely világos és sötétes színek finom elegyítéséből áll s öreg példányoknál határozatlan. A has sötétszínű, kétfele párhuzamos fehéres csíkokkal szegelyezett; néha a fonók mellett minden oldalon két-két fehéres pont.

A hátsó szemsor egyenes, mind a négy szeme egyforma távolságra egymástól. A hátsó közep-szemek az alsóknál valamivel nagyobbak és valamennyi szem finom fekete keretbe foglalt.

Mertekek: ♀ Törzs 8 $\frac{m}{m}$ ebből
fejmell 2·8 »
I lábpár 13·5 »

♂ karsú, előlábai hosszuk a czombreszben erősek. A fejmell domború, széles, hátgödre mely, fejresze jól elválasztott; az egész úgy mint a lábak is egyszínűen vörössárga. A lábak valamennyi ize sok erős, hosszú, fekete elálló tüskevel fegyverzett. A végtest vége sokszor sok vöröses színt mutat. A tapogató vékonynyelű, ízei egyszínűen sárgások; a külső mellékpikkely igen kicsiny, mellette egy felfele álló széles alapu, tompa, vöröses sárga, átlátszó fog. A voltaképeni nemzőszerv sárgás, esavaros tömlővel, alapján egy vöröses-barna, széles, egykanyarulatú gyűjtőt mutat. A befelé fordított főpikkely fejlett, kanálalaku, szőrös és néhány sertetövissel ellátott.

Mertekek: ♂ Törzs 6 $\frac{m}{m}$ ebből
fejmell 3 »
I lábpár 18 »

Válfa: ♂ ♀ Kisebb alakok: rikító citromsárga kisse barnával és néha ciznobervörössel kevert végtesttel; a hímek néha alig 5 $\frac{m}{m}$ -nyi törzsszel = Meta Mengei Blackwall (lásd THORELL «Remarks on Syn.» pag. 39, var: β).

E csinos fajnak tavaszi és őszi nemzedéke van és májusban open úgy mint szeptemberben is ivarérett példányok kaphatók; tapasztalásom szerint az őszi példányok a nagyobbak. Szép kerekhalóját rendszeren dülten alkalmazza és leginkább víz közeleiben a buja növényzet szirmaira; legtöbbször nappal is a teresen leselkedik. Rejtet nem készít s veszedelem perczében a növénysszárazakra vagy a levelek allapjára menekül. Ket első lábpárját előre, a ket hátulsót hátrafele, egyenesen és szorosan egymás mellett nyújtja ki. Párzását nem ismerem.

Találtam erdélyi részekben: Kolozsvárt (Muzeumkert tava környeke), Szamos falván (tavak melleke), Szász-Vesszősön, Dicső Szt.-Mártonban (kertekben); magyar részekben: Illokön (várkert), Pancsován (wojlovitzi erdő), Mehadian (Dannoclet alatt «Muesuronye» legelő), Rakamazon (mocsarak melleke), Alsó-Hámor (Borsod, Hollos fenyves szele), Lykauka (Liptó, a várrom alatti patakosa növényzeten var β), Kör-möczbányán (tárnavigek szélein); Veszprem (sziklahasadekok vizereinél); Pest körül (Muz. gy. Pável); vegre Csepel szigeten.

GEN. 8. NEM. TETRAGNATHA. (LATREILLE.)

(τετρα — négy; γνάθος = állkapocs. Vonatkozik a rágók és állkapcsok fejlettségére.)

Syn. 1804. LATREILLE: in «Nouv. Diction. d'Hist. Nat.» XXIV, p. 135.

Vide: THORELL «On europ. Spid.» pag. 62.

Az állkapcsok szélességöknel legalább kétszer hosszabbak; az alsó szemsor majdnem egyenes, az oldalszemek szétválasztottak. Igen nyulánk, hengerded testű alakok hosszú lábakkal. Az állkapcsok és rágók hosszúra fejlettek kissé vízszintesen fekvők és előre irányzottak. Világos sárgászöld vagy fehéres-zöld színezet, néha ezüstösen zománczos is. Nagy, ritkás kerekhalóikat leginkább vizek melleken, a buja növény-

zetben található. A hálók rendszeren kissé dültek. Kitünő sajátága e nemnek az, hogy alakjai úgy a háló teresején, mint megvonuló helyükön is igen nyújtott állást foglalnak, mely vegre a két előlábpart előre, hátsó két part hátrafele nyújtják s ily helyzetben, különösen a növények vékony szárain, valami hosszú rüghöz hasonlítanak. A lábak aránya: 1, 2, 4, 3.

SPEC. 1. FAJ. TETRAGNATHA EXTENSA. (LIN.). NYÚJTÓ ÁLLASPÓK. STRECK-KIEFERSPINNE.

(extensa = terjedelmes; itt a hosszú lábak nyújtására czéloz.)

Syn. 1758. *Aranca extensa* LINNÉ «Syst. Nat. ed. X» p. 621.

Vide: THORELL «Remarks» pag. 40.

♀ Sárgás vagy halaványzöld, fémcsomócsézal; a rágók az előtest szélességénél hosszabbak, mindjárt tövüktől kezdve tátongva szétválók; a csipőkörm becsapórése, a köröm töve körül is, erős fogakkal fegyverzett. Nyulánk, hengeres alak, vékony, igen hosszú lábakkal. A fej mell laposan domború, a fej rész széles, jól elválasztott, az egész vörössárga. A mellvért barnasárga szeleim elmosódva sötétebb. A rágók világos vörössárgák, hosszúk, előre irányzottak; csipőkörmük vörösbarna, a rágók hosszúságának felét érő, tövével könyökszerűen hajlott és kissé csúcsos sarkú. Az állkapcsok keskenyek, nyújtottak, lapiczkások, elől elnestsztettek, vörössárgák; az alajk az állkapcsok egy harmadáig ér, elől elkerekített és világosabb, tövével barnuló. A tapogatók nyulánkok, vékonyak, végükön kissé bebarnítottak. A lábak jelesen az első két pár igen hosszúk, végükön igen vékonyak, vörössárgák és gyéren szőrösök, itt-ott egy sertetüskével fegyverezettek. A végtest hengerded, elől néha igen hátság oldalról is hullámos benyomású; néha egyszínűen halványzöldes, vagy sárgás fémcsomócsézal, néha egy végig nyúló levélalakú bebarnított czimerrel és sötét oldalakkal: rendszerint ágas erezzel. A has sötétes, közepén egy hosszú, csakalaku bebarnítással, mely elmosódva világosabban szegélyezett.

A szemek kicsinyek, fekete keretbe foglaltak; az oldalszemek nem állanak külön emelkedesen; a hátsó sor egyenes, az alsó igen csekély mértékben kihajló; a közepi szemesor előrefele alig észrevehetőleg keskenyedő trapezben áll. A hátsó sor oldalszemei ugyane sor középsőitől valamivel távolabbra esnek, mint e sor középszemek egymás között.

A zár egy sárgavöröses, letapadó, hosszánegyszegletes lemez.

Mértékek: ♀ Törzs rágó nélkül	12	$\frac{m}{m}$ vagy kisebb
fej mell » »	3.2	»
1 lábpár	33	»
rágók (köröm nélkül)	2.6	» ¹

♂ még karsabb, a végtest rendszeren egyszínűen halvány-zöldes vagy sárgás, eres. A rágók rendkívül fejlettek és fegyverezettek. A becsapórése körül sok erős fog, ezek közül a középső hosszabb és erősebb. A csipőkörm a rágók felehosszát meghaladó, vékony, éles és hullámosan (~~~~) görbitett. A tapogatók hosszúk és nyulánkok; a szár kissé kupalakú, nyújtott, felül egy sor hosszabb sertével; a pikkely be és aláfele fordított, csúcsosan kanál alakú, szőrös, nemzőszerve egy almúalakú barnás gyűjtőből és a belőle induló, előre irányzott, csőralakú, kissé csavart embolusból áll, mely utóbbi a pikkely végét nem haladja meg.

Mértékek: ♂ Törzs	10	$\frac{m}{m}$ ebből
fej mell	3.3	»
1 lábpár	36	»
rágók (köröm nélkül)	3.2	»

¹ Néha meglepően kis és mégis ivarérett példányok is előfordulnak.

A vízmellekeken es egyáltalában buja növényzetű helyeken mindenütt elterjedett faj, mely a hegységben a fenyőöv szeleig (legalább nálunk) felnyomul: mindenütt ott van, a hol nyirkos talaj bujább növényzetet fejleszt, leginkább nappal működik, rejtet nem készít, de nyújtózkodásával igen ügyesen rejtőzködik a szirmokon es levelszárakon. Tavaszi és őszi nemzedéke van. Párzását nem ismerem eléggé.

Találtam, erdélyi részekben: Kolozsvárt, Oláhfenesen, Mező-Zahon, Gyergyó-Sz.-Miklóson, Nagy-Szeben környekeről (Sill es Bergleiter gyűjteménye es Seidlitz jegyezeke;) magyar részekben: Doroszlóról, Apatini-Gájából, Apatini Dunaliget, Palánkaról, Illokról, Ujvidekről, Zimonyból, Pancsováról, Orsováról, Mehadiáról, Suppanekről, Ogradenáról, Báziásról, Rakamazról, Tarczáról, S.-A.-Ujhelyről, Alsóhámbórl (Borsod), Diós-Győrből: Karpátalja: Rakiton Wreb, Prvnyiszka, Jama tó: Balaton-Füredről, Székes-Fehervárról, Nagy-Váradról (Muz. gy. Moesáry), Kőszegről: Tatra-Füredről (Muz. gy. Frivaldszky), Pest vidékeről (Muz. gy. Pável), Pest (Muz. kert. Frivaldszky), Ungvárról (Muz. gy. Vidra Ferdinand) került.

SPEC. 2. FAJ. TETRAGNATHA OBTUSA. WESTR. ZÖMÖK Á. GEDRUNGENE K.

(obtusa = eltompított; itt a zömökebb alakra vonatkozik.)

Syn 1861. *Tetragnatha obtusa* WESTRING «Ar. Suec», pag. 86. THORELL in litt.

1874. *Tetragnatha chrysochlora* SIMON «Les Arach. de France» I, p. 161.

♀ Oldalról tekintve végteste tompán \smile púpos, aránylag vaskos; a lábak aránylag rövidebbek. A végtest felületen mindig egy tölgyfalevelhez hasonló, elénk-barna mező, kétoldalt halványzöldes, femes fenyű, barnásan elegyített színezet által határolva. A lábszárak végükön gyűrűsek. A fejmell lelapított a fejresz széles, kissé kiemelkedő, mindkettő vörössárga. A hátgödör mely, kisugárzásai neha részben bebarmitottak. A mellvert közbül rozsdabarna, szeleim bebarmitott. A rágók rozsdasárgák, tövüktől számítva hosszáságuk egy harmadától fogva szétválók, a becsapores szelen sok vörösbarna foggal fegyverezettek, csipőkörmük világos rozsdabarna, a Tetr. extensaéhoz kepest alig nemileg könyökös. Az állkapcsok es az alajk a megelőző fajéhoz hasonló, úgy a tapogató is. A lábak hosszuk, karcsuk, vörössárgák, gyéren szőrösök es kevés sertetűskevel fegyverezettek; a terdiz, a szár vége, úgy mind a két lábveg eleje is gyűrűsen bebarmitott. A végtest púpos, nem hengerded: felületen zöldes es barnás, zománczos, elegyes földön egy elől kezdődő s a fonóknál végződő elénkbarna mező, melynek a hátpup előtt es mögött ket-ket karaja (lobus) van, úgy, hogy nemileg egy tölgyfalevelhez, még jobban pedig ket egymásfelibe állított makkhoz hasonlít. A hason egy széles, barna, ékalaku hosszcsík, kettfelől világosan szegelyezve. Az oldalszemek külön, de a tövön összefolyó fekete emelkedéseken s a középszemektől sokkal távolabbra állva mint a hátsó ket középszem egymás között. A zár egy haránt hasítású koldók, mely felett egy sárgás lemez megfekszik.

Mertekek: ♀	Törzs	8 $\frac{m}{m}$ ebből
	fejmell	3 "
	I. lábpár	19 "
	rágó töve	2 "

♂ Karcsú, hengeres, oldalról tekintve íves végtesttel, melyen a levelalakú rajz neha csak elmosódva látható, neha ennek epen csak nemi szakadozott korvonalai leteznek; a rágó csipőkörme hajlásában kevesse kigyózó. A tapogató nemzőszerve megfelel T. extensaénak, de embolusa nem csőrszerű, hanem nyulánk, vékony es külön, csavaros hegybe kifutó.

Mertekek: ♂	Törzs	6 $\frac{m}{m}$ ebből
	fejmell	2·8 "
	I. lábpár	17·6 "
	rágó töve	2 "

E faj sokaig ketsegebe volt vonva; sőt THORELL tanár is a válfajok közé sorolta (Remarks on Syn. p. 10) míg jelenleg ő is külön fajnak veve be. A vetsege abban volt, hogy több auctor (MENGE, C. KOCH) kisse vaskosabb Tetr. extensákat irtak le obtusa gyanánt. A magyar példányok kitünően tipikusok, nevezetesen azok, a melyek a Bodroghöz legelőim álló tölgyfákon tenyesznek. A faj sajátosságai közé tartozik, hogy nem keresi a vizet s kedveli a tölgyfákat, a kertházak ereszeit, hol aránylag kis, ritka hálóját szövi. Ivarérettsege júniusra esik.

Találtam eddig magyar reszekben: Doroszlón (kertilakok), Apatinban, (ifju nemzedek, május, Liciumon); Tokaj (a Kopasz eszerjesen) és különösen a Rakamaz felőli legelők tölgyein, a Bodroghözben; Nagy-Várad (ifj. ♀ Muz. gy. Moesáry), Ungvár (ifj. péld. Muz. gy. Vidra Ferd.).

SUBFAM. II. ALCSALÁD. ULOBORINAE. TORKOSPÓKOK. FRESSSPINNEN.

(ὄλος = minden, βελόσσω = enni).

GEN. 9. NEM. ULOBORUS. LATR.

(vide: Uloborinae.)

Syn. 1806. LATREILLE «Gen. Crust. et Ins.» p. 109.

Vide: THORELL «On europ. Spid.» p. 64.

A fonalszűrő és a nyüst megvannak. Az alsó szemsor a homlok legszelére tolva, a hátsó erősen kihajló. A vegtest csucos-tojásdad, a fonok a vegen alkalmazottak; a nyüst feketebarna, rendkívül finom és tömött, a fonalszűrő keskeny, hosszú, kisse felholdszerűen hajló, közbül választék nélkül; a vegbelnyílás fedője kupalaku kiálló s a felső fonópár közze illeszkedő. Hálójának, melyet néhányszor kövek között találtam, csak töredekeit ismerem. Hazánkban egy faj, az, a melyre e nem alapítottam.

SPEC. I. FAJ. ULOBORUS WALCKENAERI LATR. WALCKENAER TORKOSPÓKJA. WALCK. FRESSPINNE.

(WALCKENAER, üttető francia Araneologus tiszteletére.)

Syn. 1806. *Uloborus Walckenaerius* LATR. «Gen. Crust. et Ins.» p. 100.

Vide: THORELL «Remarks» pag. 334.

♀ Kretasfehér, feketes lábakkal; a feherseg rendkívüli tömötségű, megfekvő szőrözettől ered. Kisse keskeny alak arányos lábakkal. Az egész fej mell megfekvő, fehér szőrözettel borított, mely meg a szemeket is részben fedi; szívalaku, kisse boltozatos, határozatlanul elválasztott, elől kevesse elkerekített fejjel. Borszeszben a szőrözet alól két barna hosszúsik látható, mely a módos hátgödrot közbefogva, az alsó sor közepszempárjáig terjed. A mellvert barna, megfekvő szőrözettel borított. A rágók rövidke, vaskosak, vörös-barnák fenyesek és kopaszok; az állkapcsok szélesek, összehajlók, szőrösök, széleiken gyerebb szőrözettel, barnák. A tapogatók vöröses sárgák, felül kisse bebarmitottak és fehérszőrösök, végük sok sertetűskevel ellátott, a melyek között a fekete bordáskarmok már loupeval is kivehetők. A lábak vékonyan végződők, végig finom fehér szőrözettel borítottak, mely alól a barnás vörös gyűrűzet kilátszik; fegyvertelenek. A vegtest fehér, csúcsosan hossztojásdad, elején (vastagabb vegen) egy barnás orsóvonallal, mely nem a szőrözet-től ered és csak a borszeszben jut ertyenyre. A has gesztenyebarna, megfekvő sűrű szőrözettel borított, kétoldalt az oldalak fehér szőrözete által elesen határolt. A fonalszűrő, épen úgy mint a fonók, barna.

Az alsó szemsor (és különösen oldalszemek) nagyon közel áll a homlok szélehez, az oldalszemek

igen kicsinyek, a középsőktől távolabbra esnek mint ezek egymástól: a sor könnyeden behajló. A hátsó sor tetemesen kihajló, középszemei nagyoeskák, egymástól távolabbra állanak mint az oldalszemektől.

A zár egy kiemelkedő széles lemezt mutat, mely közepén behasított úgy, hogy a megalkotott felek hátranező ket csecshez hasonlítanak.

Mertekek: törzs	8 $\frac{m}{m}$ ebből
fejmell	2.4 »
1 lábpár	10 »

♂ előttem ismeretlen.

Életmondjáról csak annyi ismeretes, hogy körakásokban feszíti hálóját. Ivarerettsege júniusba esik. Találtatani: Orsova körül (Graczkai völgy); Rákospalotán az erdőben találta Pável J.

GEN. 10. NEM. HYPTIOTES. WALCKENAER.

(ὕπτωσις = hanyag tartás-u, hátra hajlott, ὀπτωσις = Alkamasius a hát púposágáról).

Syn. 1833. WALCKENAER *Uptiotes* «Mémoires sur une nouv. class. d'Arañ.» p. 438.

Vide: THORELL «On Europ. Spid.» p. 67.

A fonalszűrő és a nyüst megvannak. Az alsó szemsor a homlok szeptől hátrahajlott, behajló; a hátsó szemsor hosszúra nyúló, kihajló. Az alak zömök, feltornyosuló vegtesttel, rövid, erős lábakkal. Egy faj mely saját tapasztalásom szerint lomberdőkben fordul elő, a bokrok ágai között szövi csonka, aránylag kis kerék-hálóját.

SPEC. 1. FAJ. HYPTIOTES PARADOXUS. (C. K.). FURCSA ÁRASZPÓK. PARADOXE SPANNERSPINNE.

(paradoxus = rendellenesen, kivívón elütő; úgy látszik a szemesoportra vonatkozik).

Syn. 1834. *Mithras paradoxus* C. KOCH in Herrich-Schäffers «Deutschl. Ins.» 123. 9.

Vide: THORELL «Remarks» p. 43.

♀ Sárgásbarna; vörösbarna előtesttel és ilyen lábakkal is. A fejmell. oldalról tekintve púpos, — felülről tekintve a hátsó sor kiálló oldalszemei folytán szegletes. A homlokresz részintösen lecsapott: az egész szennyesbarna. A mellvert vörösbarna. A rágók. rövidék barnasárgák tövükkel úgy kiállók, hogy a lecsapott homlokkal egy vízbe esnek. Az állkapcsok és az alajk világos barnás-sárgák; ilyenek a tapogatók is. A lábak aránylag rövidék és vaskosak, egyszínűen vörösbarnák, megfekvően szőrósek és fegyvertelenek. A vegtest. oldalról tekintve, a fejmell és fonók felől egyiránt magas puppá tornyosul, magassága meghaladja szélességet és hosszúságánál csak valamivel csekélyebb. Alapszíne barnássárga s a nagyító alatt e színt sejtyszerűen elágazó, barna erezet apró teresekre osztja. A has egyszínűen gesztenyebarna.

A szemesoport a legsajátságosabbak egyike. Az alsó sor szemei igen aprók; a két középső közel áll egymáshoz, a két meg ennél is kisebb oldalszem kétszer akkora távolságra, a mekkora a két középszem közötti; az egész sor könnyeden behajló; a hátsó sor szemei nagyok, hosszú vonalon szetszórva állók, a két középső annyira esik egymástól, a mennyire az alsó sor *oldalszemei* állanak szinten egymástól. A hátsó sor oldalszemei kupos csücsökön állanak s a fejmell keretéből kisse kiállók. A nyüst finom, tömött, a fonalszűrő széles és a fonókra dült. A zár környezete koldokszerűen kidomborodó, bőrös és csak szelen egy \perp forma, vörössárga megfekvő lemezzel ellátott.

Mertekek: ♀ Törzs	5 $\frac{m}{m}$ ebből
fejmell	1.9 »
1 lábpár	4 »
A háttest magassága	3.5 »

♂-je előttem ismeretlen.

Csak kétszer találtam s mind a kétszer erdélyi részekben: Sárpatakon a gf. Teleki Károly-fele fiatalos erdőben, hol bokrok között meglehetősen merész keretű csonka hálót szőtt (a példány az erdélyi muz. egyll. gyűjteményében), és Szász-Vesszősön a gr. Degenfeld-fele fiatalosban hasonló körülmények között (a péld. saját gyűjteményemben). Az állat. hálója vezérfonalán előre és hátra kinyújtott lábakkal lesekedett (mintegy araszt, honnan magyar elnevezése).

SUBORDO II. ALREND.

R E T I T E L A R I A E.

(rete = háló, Netz; tela = szövet, Gewebe.)

HUROKKÖTÖK.

A fej mell fejeresze nem lapul le; a homlok szele és az alsó szemsor középszelei között elterülő ter szelesebb annál, a mely a két szemsor középsői között terül el.

Csupa apró alak, vékony, karesű lábbal, hármass karomrendszerrel; a sánjakarom egy vagy két, soha több fogacscsal.

A test gyéren szőrös; a végtest rajzai a bőrtől erednek.

A fonalszűrő és a nyüst hiányzanak.

A hálózatok berendezése különböző¹; általános tulajdonság az, hogy hegyes csucsban összeerő kötött hurkok soha sem hiányzanak.

*

A hurokkötők alrendje alak és szervezet, ennelfogva hálózat szerint is eltéréseket mutat; nem oly egyenletes, mint az előző alrend.

A mennyire alakjai a háló berendezésében állandóságot mutatnak, az alrend alakjai e hálózatokkal szinten az üres hezagokon uralkodnak, de szűkebb helyiségekkel erik be és a hálózat fogóeszköze nem alkot egy sík lapot, hanem erzekenyen feszített huroktömkeleget, melyhez egy lefelszerűen szőtt ernyő — vitorla — vagy gyakran idegen testekből összerakott rejtekhely csatlakozik.

Igen szűk helyeken epen egynehány, a helyiség körülményeihez szabott hurok szerepel; nemely alakok, úgy látszik, egy bizonyos kerületben alkalmazzák hurkaikat, s látszólag kóbor életmódot folytatnak.

A lábvegek hajlekonyágánál fogva nemcsak fonalaton, hanem a sík földön is meglehetősen biztossággal és gyorsasággal mozognak.

A hálózatokon, úgy rejtekhelyeikben is, mindeg háttal lefele csüngő állást foglalnak el.

Alaknagyságra nézve a kisebb borsószem nagyságtól alig mákszem nagyságig csökkennek.

Tevékenyséjük leginkább nappali; nemely részek eppen csak a napsugarak direct behatását keruli, más rész határozottan keresi az árnyekot s kedveli a félhomályt, sőt a barlangok teljes sötétseget is.

Az érintés elől némelyek leejtéssel, mások futással s elrejtéssel menekülnek.

Ketseges esetekben szinten meg-megrezzentik hálóikat; a predát lehurkolják, oly módon, hogy a végtest csucsával feléje fordulnak, a negyedik lábpárral felváltva fonalat huznak ki s ezt a predára reávetik. Csak a nagy predát költik el a megfogódzás helyén; a kisebbet kioldják, egy rövid fonallal a negyedik lábpár egyik feléhez erősítik, s függőben tartva, a leshelyhez viszik; gyakran fonalak segítségével vonszolják is.

Tartózkodásra nézve, szinten az aljakra esik a legnagyobb szám; de a magasba felhatolnak a rend képviselői a havasok fatenyészövének határáig s azon felül is; a föld meheben az aknák és barlangok melységebe sőt legmélyebe is.

¹ A mennyire eddig ismeretes.

Tevekenysegökben igen szabadok: úgy a fonalröpítés mint a lebocsátkozás segítségével minden képzelhető helyiséget elérhetnek. Az ingaszerű tova haladás szinten hatalmukban van. Ez abban áll, hogy lebocsátkozva, s szabadon függve a szél odaviszi őket az irányába eső tárgyakig².

A pók-tevekenyseg rendszerében, szinten az átröpülő rovarokra czéloznak s ezeknek apró és legapróbb alakjait korlátozzák; fonalzataikkal azonban nem csak hogy átfogják, de többnyire ki is töltik az alkalmas helyiségeket.

A nemzedékek sorát illetőleg nem kelnek ki kizárólagosan áttelelt petekből, hanem nagyobb részben áttelelt alakok folytatják a faj életét és szaporítását.

Úgy szervezet mint életmód s a nemzedékek sora tekintetében számos átmenetet mutatnak az előző és következő alrend között.

FAM. I. CSALÁD. THERIDIIDAE. TÖRPEHURKOLÓK. WIRKSPINNEN.

(*θῦρίδιον* = kis állat; az alakok apró voltára vonatkozik.)

GEN. 1. NEM. PACHYGNATHA. SUNDEVALL.

(*παχύς* = vastag; *γάθος* = állkapocs; a rágók vastagságára vonatkozik.)

Syn. 1823. *Pachygnatha* SUNDEVALL «Gen. Ar. Succ.» p. 16.

Vide: THORELL «On Europ. Spid.» pag. 77.

A rágók az első lábpár czombjánál kétszernél is vastagabbak, mindjárt tövüktől kezdve szétterpeszkedők. A lábak karesuk, sűrűn szőrösek (igen ritkán és kivetelesen alul egy sor tüskevel fegyverzetek), hosszarány szerint 1, 2, 4, 3. A szemek három csoportba osztottak. A közepesoport párnán álló négy szeme egy előre felé kissé szűkülő trapezben áll, a ket-ket szemből álló oldalesoportok szemei a középsőktől akkora vagy nagyobb távolságra mint a hátsó sor középszemei egymástól; az oldalszemek érintkeznek. Kis alakok (legfeljebb 6 $\frac{m}{m}$ ♀), melyek kövek alatt, magas füben igen közel a földhöz vagy közvetlenül rajta és leginkább kissé nyirkos helyen tartózkodnak s ügylátszik egész életüket barangolva töltik, csak egyes fonalakat eresztenek, állandó hálót nem szőnek. Nemely faj mint fonalröpítő és léghajós, tavaszkor, a legszorgalmasabbak közé tartozik. Ivarérett állapotban áttelelnék s enyhébb teli napokon mozgásban vannak (legalább magyar földön így).

SPEC. 1. FAJ. PACHYGNATHA CLERCKII. SUND. CLERCK FOGÓSPÓKJA. CLERCKS ZANGENSPINNE.

(Clerck, az Araneologia megalapítója tiszteletére.)

Syn. 1823. *Pachygnatha Clerckii* SUNDEVALL «Spec. ac. Gen. Aran. Suec. exh.» pag. 16.

Vide: THORELL «Remarks» p. 75.

♀ Barnássárga, vörössárga fejmellel, sárga lábakkal. A fejmell fejlett; egy sötét közép- és szegélyesikkal diszítve. A vegtest szabályosan szeles-körded, a lábak karesuk és arányosak. A fej vastag, elől elkerekített, kissé kiemelkedő, kávéasan elválasztott. A mell kevésbé szélesedő, domboru. A középszem-

² Ez újabb észleletem. A pók ilyféle helyváltoztatása szerfelett érdekes és vonzó jelenség, jelesen az, hogy a fonal hosszát kísérletileg határozza meg, majd hosszabbra ereszti, majd felmötöllálja, mindaddig, amíg az uralkodó szellő hajtó erejének megfelelő s lehetségessé válik a pók biztos megkapaszkodása. A fonal és pók közötti viszony megközelítőleg az ingaszár és ingafej közötti lévén, a közlekedés e módját ingaszerűnek nevezem.

esoporttól, a csekely hátgödrről keresztül egy sötét vörösbarna szalaggal; a fejet a mellől elválasztó barázda, hossza közepében rendesen vörösbarna. A mellvert vörössárga. A rágók vörössárgák, aránytalanul vastagok, tövüktől fogva szétágazók, hosszú csipőkörömmel és igen erős fogakkal fegyverzett becsapóréssel. A rágók széthajlása olyan nagy, hogy előlről tekintve az állkapcsok megláthatók (II. k. IV. t. 82. b). Az csipőköröm erős, majdnem sarlóalakú, igen éles, az állkapocs tövének felehosszát meghaladó. Az állkapcsok keskenyek, vegeikkel összehajlók és kissé harántbenyomásuak, vörössárgák; az alajk erős, vörösbarna, az állkapcsoknak felehosszát érő. A tapogatók sárgák, alap és térdizük rövidke, a czomb, szár és végiz egyenlő hosszaságúak, az utóbbi sertetüskevel elegyesen szőrös. A lábak sárgák, karesuk, szőrösek és tüskeneküliek. A végtest szabályos-szeles kördéd, kissé lenyomott; középmezeje barnássárgán-porozott, egy sötét, hasitekszerű, elmosódva világosan szegélyezett közepsikkal, mely sem elejét sem végét nem éri a végtestnek; a sötétebb középmező az oldalak felé szelesen, világosabban szegélyezett, s e szegély az oldalakban elmosódik.

Az oldalak és a has egyszínűen sárgásbarnák, az utóbbin két világos, néha enyésző, egyenközü hosszcsík.

A szemek három csoportban; az alsó sor kömnyedén kihajló, a hátsó kömnyedén behajló. Az alsó sor szemei a homlok szelétől, illetőleg a rágók beigtatásától körülbelül annyira, mint e sor középszemiei a hátsó sor középszemeitől. A középszemesoport előrefele kissé szűkülő trapezben elhelyezett; az alsó sor középszemiei az egymással érintkező oldalszemektől sokkal nagyobb távolságra esnek, mint a mekkora a távolság a hátsó sor középszemiei között.

A zár hártvás, hátrafele haránt elmetstett \square alakú mező, mely a lezörest kette választja, úgy, hogy e res kétoldalt külön stigmaszerűnek látszik lenni.

Mertekek: ♀ Törzs (rágók nélkül)	6 $\frac{m}{m}$ ebből
fejmell	2.8 "
I lábpár	8 "

♂ karesu, egészben sötétebb törzsszel, és hosszúra fejlett fejmellel, melynek rajza megfelel a nőstényének. A rágók rendkívül fejlettek, csipőkörömük hosszú, olyformán kettős hajlása, hogy közép hajlása, befelé, majdnem foggá csücsösödik. A kis végtest középmezeje barna, hosszhasiteka fekete és szakadozott sárgásfehér, finom szegélylyel diszitett; oldalszegelye sárgásfehér; a has barna. A tapogató nyulánk és hosszú szár íze hosszabb a térdiznél, kupalakú, vékonyabb végével a térdbe esuklódó; valamennyi íz sárga; pikkelye kettős; a keskeny, esonka, szőrös mellek-pikkely felfekvő; a szelesebb, kanálalakú, kinyuló végű fő-pikkely oldalt befelé fordított; nemzösszerve hagymaalakú, síma, vörössárga gyűjtőt, csős alakú, kissé csavarodott oly embolust mutat, mely a főpikkely kiálló részénél rövidebb; a felfekvő mellek-pikkely a hagymaalaku gyűjtőnek két harmadát éri el.

Mertekek ♂: Törzs (rágó nélkül)	4 $\frac{m}{m}$ ebből
fejmell	2.5 "
I lábpár	8.8 "

A *Pachygnatha* nem e legnagyobb faját, mely Svécziában épen oly honos mint hazánkban, leginkább tavaszkor, igen jókor (márczius) kaphatni ivareretten és saját tapasztalásom szerint leginkább karókon stb. hol fonalaít szorgalmasan röpti és leghajózva vándorol. A fűben, nyirkosabb helyeken és rendesen töblédmagával barangol s fonalat csak járaskelése biztosítására húz; allandó szövetet az eddigi megfigyelések nem bizonyíthattak be. Párzását és peteinek lerakását nem ismerem.

Találtam magyar részeken: Doroszlón és Apatinban; továbbá «Ungvár környeke» megjelöléssel a Muz. gyűjteményben (Vidra Ferd.), Kassán igen nevezetes körülmények között gyűjté Dr. Horváth Geza t. barátom; ugyanis 1874. január 5-en, kemény fagyok idején, egy reten egy heverő elhullott lópata alatt, ivarerett hímek vigan nyüzsögtek s a nevezett buvár által pontos lejegyzes mellett beszerezettek.

SPEC. 2. FAJ. PACHYGNATHA LISTERI. SUND. LISTER F. LISTER S.

(LISTER, úttörő angol Araneologus tiszteletére.)

Syn. 1830. *Pachygnatha Listeri* SUNDEVALL «Svensk. Spind. Beskr.» p. 210.

Vide: THORELL «Remarks» p. 75.

♂ A him tapogatójának fedőpikkelye három negyedét éri a hagymaalaku gyűjtőnek. Kisebb alak sötétebb színezettel. A fej mell barnászörös, sötétebb közep- és oldalesikkal, a fejresz kisse felvetett; a mellvert vörösbarna. A lábak és a tapogatók sárgák. A végtest közeptere sötétbarna, hasiteka fekete, hosszú és kétoldalt láthatóan párosan álló sárgásfehér foltokkal szegélyezett, mely foltok mindjárt a végtest elején kezdődnek s hosszának negy ötöden folytatódnak; oldalszegelye sárgásfehér, a hátfele igen élesen s a hasfele is élesen határoló, hátul, a fonók felett, megszakadott. A has sötétbarna, elmosódó párhuzamos csikkal. A rágók tövüktől fogva szétágazók, vörösbarnák, csipőkörmük kettőshajlású, a hajlás fogszerű. A tapogatók ízeinek aránya a *P. Clerckii*hez hasonló, így a gyűjtő is: a mellékpikkely azonban hosszabb és az embolus sem csőralaku, hanem arformára vékonyodó és csavart végű.

Mértekek: ♂ Törzs (rágók nélkül) 3.5 m_m ebből

fej mell 1.8 »

1 lábpár 7.5 »

♀ előtünk ismeretlen.

A *P. Clerckii*hez hasonló viszonyok között es ezzel együtt ismerem Doroszrólól, hol karókon fonalakat röpitett (1873 márczius 4-en).

SPEC. 3. FAJ. PACHYGNATHA DE-GEERII. SUND. DE-GEER F. DE GEERS S.

(DE-GEER, kitűnő svéd pókbiológus tiszteletére.)

Syn. 1830. *Pachygnatha De Geerii* SUNDEVALL «Svensk. Spind. Beskr.» p. 211

Vide: THORELL «Remarks» p. 76.

♀ Előteste sötét gesztenyebarna, végteste sárgásbarna, világos, csipkézett oldalszegelylyel, közepen rendszerint enyésző, hasitekszerű hosszcsikkal.

Kis alak. A fej mell jól fejlett, fejeresze felemelkedő, elkerekített, kavásan elválasztott, a mellresz kevésbé kiszélesedő; az egész szép sötét gesztenyebarna, sűrűn és könnyen kivehető módon pontozva. A mellvert vörösbarna. A rágók barnavörösek, igen vaskosak, szétálló; az állkapcsok vörösbarnák, összehajlók, kisse haránt benyomásúak. A tapogatók vörössárgák, szárazúak a végiznél valamivel rövidebb. A lábak sárgák, vagy vörössárgák egyszerűen szőrösök. A végtest szabályosan körded, barnássárga vagy sárgásbarna, az előttesthez kepest azonban mindég feltűnően világos, közép tereben néha enyésző hasitekszerű csikkal, mely enyészően fehér pontokkal szegélyezett; néha egészen hiányzik is. Az oldalszegely, különösen a sötétebb példányoknál eltűnő, széles, a hasfele élesen, a hátfele hullámosan határolt, a fonók felett megszakított, a végtest elején keskenyen és homályosan összeérő.

A has néha egyszínűen barna, néha párhuzamos világos csíkok maradványaira emlékeztető pontokat visel.

A szemek a homlok széletől kisse hátratóltak; az alsó sor a homlok szélétől távolabbra esik mint középszemei a hátsó sor középszemeitől. A hátsó sor középszemei az oldalszemektől akkora távolságra vannak, a mekkora a távolságuk egymás között.

A zár bőrös, tarisznyaszerű, a légzőrest kétrészsre osztó, hátul elmeteszt. Azon a helyen, a hol a légzőrest metszi két kerek, pontszerű bemélyedéssel.

Mértekek: ♀ Törzs (rágók nélkül) 4 m_m ebből

fej mell 1.8 »

1 lábpár 5.5 »

♂ valamivel karsubbb: fejmele nem feltűnően fejlett, színezete a nőstényével azonos, rendszerint valamivel sötétebb. A végtest élesebb rajzu, oldalszegélye neha kissé rózsaszínes. A tapogató mellekpikkelye árformára csúcsos és a gyűjtőn túl érő. A gyűjtő almaalakú, kicsiny, embolusa tompavegű, mindjárt a gyűjtőtől kezdve csavarodó.

Mertekek: ♂ Torzs (ragó nélkül)	3·8 $\frac{m}{m}$ ebből
fejmele	1·8 "
1 lábpár	5 "

Megfigyelesem szerint ez a Pachygnathák leggyakoribb faja; füves helyeken, kövek alatt majdnem mindenütt kapható s úgy látszik, hogy három nemzedéke van: egy áttelelő, mely tavasszal párzik és vándorol, egy nyári, melytől az ismét áttelelő származik. Telire mindenféle rejtekhelyeken kapható; diszkerékben, a melyekben fenyvek állanak, gyakran a földrehullott tobozok pikkelyei alatt nagy számmal kaphatni tel derekán is.

Párzását és szaporítását nem ismerem. Tavasszor, mielőtt melegebb szellők járnak, a fonalröpítéshez lát s neha kerti karókon 4—6 is egyszerre teszi kísérleteit.

Találtam eddig: erdélyi részekben: Kolozsvárt (Muzeum kert), Torda (hasadék), Szász-Vesszős (Bedőházi kert), Csiki havasok (Balánbánya), Mező-Zahon és Nagy-Szebenben; magyar részekben: Doroszlón (Mosztonga mellett, tavasszor százával leghajózva), Pancsován, Lykanka (Liptó, váralja), Kőrmöczbányán, Balaton-Füreden, Buda vidéke (Muz. gy. Pavel János), Ungvár (Muz. gy. Vidra Ferl.), Komjáti (Abauj, Dr. Horváth Géza), Kassa (1874. jan. 5-en, Dr. Horváth Géza).

GEN. 2. NEM. EPISINUS. WALCK.

(ἐπισινύς = kártevő, vagy inkább σινύσιος = csonkítani, rabolni, ἐπισίνος = valami után leselkedő; lehet vonatkozással az életmódra, de a végtest alakjára is.)

Syn. 1809. Walckenaer in Latreille «Gen. Crust. et Ins.» IV, p. 371.

Vide: THORELL «On Europ. Spid.» p. 79.

Az oldalszemek szétállók; az alsó sor középszemei s az oldalszemek közötti távolság meghaladja a középszemek közötti távolságot. A lábak vékonyak; az 1-ső és negyedik pár hosszú; hosszarányuk 1, 4, 2, 3. A végtest nyújtott alakú, hátul kiszélesedő, a vége tompa csúcsba metszett. E nemnek eddig csak egy faja ismeretes, mely neha barangolva, neha egyes szájakon igen sajátos módon nyújtózkodva, neha mohá és száraz levelek alatt tartózkodva lelhető s nem gyakori.

SPEC. 1. FAJ. EPISINUS TRUNCATUS. WALCK. CSONKA LESŐPÓK. ABGESTUTZNE LAUERSPINNE.

(truncatus = csonkított; a végtest látszólagos csonkaságára ezélez.)

Syn. 1809. *Episinus truncatus* WALCKENAER in LATREILLE «Gen. Crust. et Ins.» IV, p. 371.

Vide: THORELL «Remarks» p. 96.

♀ Előteste vörösbarna, végteste szürkés; az első lábpár ezomb, terd és száríze vörösbarna, a negyedik lábpárnak terde és szára is ilyen színű; valamennyi lábuk a végze a szárhoz kepest hirtelenül vékonyodó, világos-vörössárga.

Nyulánk alak, rövid elő- és nyújtott, közel hosszötszög végtesttel. A fejmele laposan domború, fejezete kicsiny, határozatlanul elválasztott, a mellreszel kissé alacsonyabb; a mellresz a csekély, de terjedelmes hatgódor táján dagadozó. A mellvert sötét vörösbarna, gyéren szőrös, finoman, reczesen ráncolt.

A rágók gyengek összeállók, függőleges állás mellett vörössárgák. Az állkapcsok vörössárgák, keskenyek, összehajlók; az alajk széles, rövid, elől elkerekített, a mellverttől csak egy rancz által elválasztott, vörössárga. A tapogatók sárgásak; végzik a szárnál sokkal hosszabb elegyesen és sűrűn szőrös tuskés; a szár iz a terdnel csak kevésbé hosszab. Az első és negyedik lábpár hosszú, czombja, terde és szára kissé kiereszódve, sűrű, apró szemölcszerű ripacsokkal borított, melyekből kurta szőrök indulnak. Az első lábpárnak czombja, terde és szára sötét vörösbarna, a másodiknak terde és szára halvány vörös, a harmadik egészen sárgás, a negyediknek czombvege keskenyen, terde és szára egészen sötét vörösbarna a többi iz mind világos vörössárga.

A végtest nyújtott; eleje el- és közepén kissé kimetszett, oldalai hátrafele egyenletesen szélesedők s elejétől számítva a hosszúság második harmadrésze végén két csücsökbe átmenők, mely ponton a végtest a legszélesebb. A két csücsökön túl a végtest a fonók fele meredeken lecsapott, tompa szögű, csücskét a fonók képezik. A csücsök hátsó ele kissé bebarnított, a végtest többi része sajátos szürkessárgás (világos chamois szín). A has valamivel sötétebb, három, enyésző, világosabb hosszcsíkkal, melyeknek közepsoje a zártól indul s a vörösbarna fonókig tart; a két oldalesik még a fonók mellett is eltart.

A szemek egy tömegben és meglehetősen kiemelkedve helyezkednek a fej búbjára; mind a két sor, felülről tekintve, kihajló. Az alsó sor a homlok szeptől meglehetősen távolságra esik s a közte és a rágók töve közötti tér kissé csatornás. A szemesoport többi viszonya a nem jellemzésében előadatott.

A zár egy hátrafele nyitott köldökszerű bemélyedés, melynek alapján, helyesebben feneken, a két tojócső nyílik.

Mertekek: ♀	Törzs	4.5—5	m_m ebből
	fej mell	1.8	"
	I lábpár	9	"
	IV "	7.5	"
	III "	4.5	"

♂ sötétebb, karesű; egyenközü, hátul tompa csücsbe végződő végtesttel, melynek csücskei letörpülők; fej melle a nőstényéhez képest kissé fejlettebb; fejeresze igen kicsiny. A tapogatók hosszú nyelen, melynek czombja a leghosszabb, terdize igen rövid, szárizza meg ennél is rövidebb s csészeszerű. A nemzőszerv aránytalanul vastagon, bunkószerűen kidagadva, sötét vörösbarna; pikkelye oldalt-befele fordított, kanalakakú; belső szervezete hasonlít egy dióhéj negyedéhez; alul egy haránt és csavaros csatornával, végefele egy nehezen kivehető, kurta, karesű, fekete embolussal.

Mertekek: ♂	Törzs	4.5	m_m ebből
	fej mell	1.8	"
	I lábpár (peldanyomon hiányzik)	?	
	IV "	8.4	"

E nem épen gyakori pók nyári alak, augusztusban ivarérett; előttem abban a gyanuban áll, hogy kerekhalót sző, tehát az Orbitelariák közé tartozik. Ogradena mellett (Dunaszoros) a Csukár máre sziklatöven egy ifjabb nőstényt egy kis kerekhaló vezérfonalán kaptam sajátos nyújtózkodása közben, mely abból áll, hogy a két első lábpárt előre, a két hátsó lábpárt egészen egyenesen kinyújtva és szorosan egymáshoz illesztve a fonálra lapul; minthogy azonban e helyen sok apró Orbitelaria is szöve halóját s nem rendelkeztem annyi idővel, hogy pontos megfigyeleést tölhessek, beerem a kifejezett gyanúval, annyival is inkább, mert más helyeken ismét lenyegesen más körülmények között leltem ez állatot, u. m. moha között barangolva.

Ismerem magyar részekből: Pozsonyból (Dunaligetek, fák töve), Apatinból (Galagonyás erdő), Ogradena (Csukár máre szikla töve), Tokaj (Kopasz szőlő öve, mohában), S.-A.-Ujhely (Magos alja, mohában), Buda vidéke (Farkas völgy, Muz. gy. Pável).

GEN. 3. NEM. LINYPHIA. (LATREILLE).

(λίον = len, ὄφαινω = szőni; a szövetre vonatkozik).

Syn. 1804. LATREILLE «Dict. Nouv. d'Hist. Nat.» XXIV. p. 134

Vide: THORELL «On Europ. Spid.» p. 81.

A szemek inkább egy mint három csoportban állók; a középső negy szem egy előre szűkülő trapezben elhelyezett; az alsó sor a homlok széléhez nem áll közelebbre mint állnak e sor középszemei és a hátsó sor középszemei egymáshoz. Az oldalszemek közötti ter kisebb annál, a mely az alsó és hátsó sor középszemei között letezik. A fejmell módosan domboru, a fejresz (kivetelesen, kúpszerűen kimagasló) rendesen módosan kiemelkedő. A lábak karesuk, meglehetősen hosszúk, sertetűskékkel gyéren fegyverezettek. Az állkapesok egyenközüen kinyújtottak, vagy az alajk felett könnyeden összehajlók.

E nembe tartoznak a tulajdonkepeni vitorlaháló-szövőök (I. köt. II. t. 51): kivetelesen nemely barlangban lakó alakok, melyek szájakat vonva, hurkokat kötnek s egyelőre csak ideiglenesen maradnak a nemben. Valamennyi alak gyors mozgású; nemely fajai némi társulást mutatnak, a mennyiben egy és ugyanazon fajnak sok egyene egyazon helyiségben es tözsomszedságban szövő vitorlás hálóját.

SPEC. I. FAJ. LINYPHIA MONTANA. (CL.). HEGYI VITORLAPOK. BERG-SEGELSPINNE.

(montana = hegyen lakó; a tartózkodásról így, elég helytelenül).

Syn. 1757. *Araneus montanus* CLERCK «Aran. Suec.» p. 64.

Vide: THORELL «Remarks» p. 44.

♀ Barna: a vegtest felülete sötetebben mintegy felhőzött, elejen es oldalt egy széles, világos, hátrafele elmosódó szegelylyel. A lábak világos vörösessárgák, barna gyűrűzettel.

A fejmell mellresze a fejreszhez kepest nem feltűnően szélesedő, módosan domboru, vörösbarna. A fejresz kisse kiemelkedő, kavásan elválasztott. A mellvert szivalakú, sötet vörösbarna, gyéren szőrös. A rágók vörösbarnák, végök fele kisse szétállók es az állkapesokra hajlók. Az állkapesok vörösbarnák, meglehetősen szélesek, nem egymásfele hajlók, szeleik fele valamivel világosabbak: az alajk rövid, meglehetősen széles. A tapogató végze oly hosszú mint czombize, a szár ize ennél sokkal rovidebb; a végiz szőrösseg mellett sok, hosszú sertetűskével fegyverzett. A rágóköröm erős, hajlott, sötetvörösbarna, hegyen kisse világosodó; becsapórése fogakkal fegyverzett, ezek között a felső három fog a többinel nagyobb. A lábak vörösessárgák, sűrű barnas gyűrűzettel; nyulankság mellett meglehetősen erősek. A gyűrűzet nem a csuklókra, hanem az izek közepere van elosztva. A czombok felül 2—3 tüskevel; a szár es lábvegezék több (5—7) tüskevel fegyverzetek. A vegtest a fonók fele csüsesodó-tojásdad, felül barna, sötetebb színnel mintegy felhőzve, es elejen oldalt két széles, feheres folttal, mely elől majdnem összeér, hátrafele csak két harmadáig ér a háttestnek, hol elmosódik; szele a hátfele eles, a has fele elmosódó. A has feketebarna, két oldalt világosabb, határozatlan, feheres színnel határolt, mely szín felhőzetesen az oldalakba is nyomul.

A szemesoport a fej bubján áll, alatta a homlok a rágók fele menedekesen lecsapott s szelesebb a ternel, mely az alsó sor középszemeit a felső sor középszemeitől elválasztja. A két sor középszemei előrefele szűkülő trapezbe elhelyezve s a hátsó szemek nagyobbak. Az oldalszemek érintkeznek; a hátsó oldalszemek a hátsó középsőktől annyira, a mennyire e középsők egymástól állanak. Felülről tekintve az alsó sor könnyeden kihajló, a hátsó könnyeden behajló.

A zár keményszerűen kiemelkedő, gegeszerűen hornyolt eső, felülről tekintve a két tojócsőnyilas s az elválasztó lemez világosan látható, úgy a tojócsövek belső hornyoltsága is kivehető.

Mertekek: ♀ Torzs	9 $\frac{m}{mm}$ ebből
fejmell	3.8 »
1 lábpár	14 »

Hosszaránya a lábaknak 1, 2, 4, 3.

♂ sokkal karesubb fejmele fejlettebb; szemezetre a nostonynek megfelelő. (Nemzőresze szerkezetét lásd: I. köt. I. tábla. 10; párzó állását ugyanott III. tábla. 65.).

Mertekek: ♂ Törzs	8 $\frac{m}{mm}$ ebből
fejmele	4 »
I lábpár	16 »

A kertek kerítésein, zugokban, rekeszekben, továbbá ligetekben a fűzfák odúiban, gyökerei között közönseges alak, melynek tavaszi és őszi nemzedéke van, s mely Svecziában (CLERCK és WESTRING szerint) inkább bokros helyeken tartozkodik.

Hálójának vitorlareszt a helyiségre kepest igen nagyra szövi; a hurok rész is épen úgy a magasba mint a mélysebbe messze terjed. Mozgása hirtelen, gyors, gyakran megszakadozott. Veszély perczében vagy agra vagy zugba menekül. Az 1872. év telen Kolozsvárt áttelelést észleltem. Az áttelelő ivarérett példányok egy fűskamra zugaiban megvonulva egészen szabadon, de mereven függetek néhány szálon s erintes iránt érzéketlenek maradtak. A szoba melegében 1 óra alatt visszanyertek természetes elenksegüket; ismét a fűskamrába teve zugot kerestek, megvonultak s csakhamar visszaestek a lethargicus állapotba. Az első tavaszi napok csakhamar életre és szaporításra öblesztettek.

Ismerem. erdélyi részekből: Kolozsvárról (muzeumkert), Nagy-Czegről, Görgény Szt Imreről, Nagy Szebenből. (Sill és Bergleiter gyűjtmeny), Szász Vesszősről és D.-Szt.-Mártonból; magyar részekből: Apatin (Dunaliget füzei), Doroszló (kerítések), Zimony (teherhajók belseje), Pancsova (wojlovitzi erdő), Orsova (Cserna folyam füzesei), Ungvár környéke (Muz. gy. Vidra Ferd.).

SPEC. 2. FAL. LINYPHIA BUCCULENTA. (CL.) POFÁS V. BACKIGE S.

(bucca = pofa; bucculentus = felfűtt-pofájú; a fejmele fejezésére vonatkozik.)

Syn. 1757. *Araneus bucculentus* CLERCK «*Aran. Suec.*» p. 63.

Vide: THORELL «*Remarks*» p. 53.

♀ Világos; a vegtest felülete barnán, erezetesen, mintegy reczezett; három szakadozott, határozatlan, sötét hosszcsikkal, melyek közzül a középső a leghatározottabb és mindegy megvan, a két oldalas néha hiányzik és többnyire inkább foltos mint csik. Az előtest és a lábak barnássárgák, az előbbi sötét közep- és szegélyvonallal.

A fejmele módosan fejlett, fejezése alig kiemelkedő, kávésan elválasztott. A hátsó sor középszemeitől kezdve a hátgodron keresztül egy szembekötő, sötét csik, mely a fej beigtatása helyen kisse tágitott; a mellrész szinten sötéten szegélyezett, e szegély a fejreszre nem megyen át és befele kisse elmosódó; a jól benyomott hátgodorból, a lábak fele, igen határozottan kivehető sugaras barazdak indulnak. A mellvert vörösséssárga, gyeren szőrös.

A rágók meglehetősen erősek, vörösséssárgák, az állkapcsokra hajlók, az utóbbiak vörösséssárgák, szeleiken kisse kivilágosodók; vegeikkel nem hajlanak össze. Az alajk rövid, szeles, elkerekített. A tapogatók sárgasak; szárizük rövidebb a vegiznel, s az utóbbi sűrűn szőrös, keves sertetűsével, s ez utóbbiak inkább alapja körül csoportosultak. A lábak sárgasok, az ízek vegein alig észrevehetően bebarmitottak (ritkán gyűrűsek); az első lábpár czombja felül 3 ∙ formán álló sertetűsével. A vegtest csucoson tojásdad, elől meglehetősen magas; földje szemyes fehér, barnával finoman reczezett, közepen es elejétől kezdve egy finom, mintegy metszett, barna középsík, mely néhány rövid keresztvonást is mutat; de csak foltokra szakadozottan es elmosódva eri a szemölcsöket; kétoldalt föle es vele párhuzamosan két sötétes, határozatlan, foltokból alakuló csik, mely szinten a fonókig ér, néha pedig hiányzik. A has feheren es barnán márványozott.

A középszemek hossznegyszegbe állítottak: a hátsó sor, felülről tekintve, egyenes; az alsó sor középszemei távolabbra állanak a homlok széletől, mint a hátsó sor középszemeitől; az oldalszemek érintkeznek, s a hátsó sor középszemeitől oly távolságra esnek, a mekkora a távolság a mondott középszemek között. A zár barna, lelapított, köldökszerű és ripacos; különös kitüntető tulajdona nincsen.

Mertekek: ♀ Törzs	6	$\frac{m}{m}$ ebből
fejmell	2·6	»
I lábpár	8	»
IV »	9	»

Hosszárnya a lábknak, 4, 1, 2, 3.

♂ karsu, kiszélesedett fejmellel; a végtest kicsiny, közepesíkjá igen határozott, szélesedő és kétoldalt mintegy fogacsolt.

A tapogató, hosszúnyelű, ezombize a leghosszabb, térdize a szárízzal egyenlő; az egész sárgás; pikkelye oldalt, befelé fordított, alapján kanálalaku, vége nyelvyszerűen keskenyedő; az egész vöröses sárga, erős szőrözettel borított; a nemző szerv vörösbarna, nagyon szövevényes; a pikkely nyújtott végébe befekvő része kaczor alakú, kettős-kampós hegygyel, alatta az egyesavarodású, tányer alakú gyűjtő, s ez előtt és hozzá csatolva egy ekevas alakú széles lemez, melyen, a felső végén három vékony, alsó végén egy széles, hosszú, csavaros és kampósan végződő nyújtvány látható.

Mertekek: ♂ Törzs	4·0	$\frac{m}{m}$ ebből
fejmell	2·4	»
I lábpár	8·2	»
IV »	10	»

Áttelelő, az előbbinél valamivel ritkább faj, mely a nagy füvet és oly helyeket kedvel, a hol az szilárd tárgyak körül terem (sirkövek stb. mellett). Ismerem: Doroszlóról (sirkert), Kassa vidéken Dr. Horváth Geza barátom gyűjte 1874 jan. 5-kén Pachygnátákkal együtt (lásd Pachygnatha Clerkii és De Geerii) ivarerett állapotban s meg az által is kitüntetve, hogy a színezet általában sötétebb, a lábak gyűrűsek voltak. Erdélyi részekből ismerem: Kolozsvárról (Muzeumkert) és Nagy-Szebenből.

SPEC. 3. FAJ. LINYPHIA MARGINATA. C. K. SZEGÉLYES V. GERANDETE S.

(margo = szegély: itt a mellrész világos szegélyére czéloz.)

Syn. 1834 *Linyphia marginata* C. Koch in Herrich Schaffler «Deutschl. Ins.» 127, 21, 22.

Vide: THORELL «Remarks» pag. 51.

♀ Fekete-sárga tarka végtest; az előtest vörösbarna széles fehér szegélylyel; sárgás-zöldes, karsu, hosszú lábakkal. A fejmell módosan kiszélesedő, módosan domború mellrészszel, mely kétoldalt feheres, széles, belső szelén kissé csipkés szegélylyel ekesített; a szegély a nyelecske felett szélesre megszakított, a fejre sem megyen át. A fejresz igen élesen elválasztott, kiemelkedő, de nem bubosan felvetett, elől laposan elkerekített. A mellvert aránylag széles, fekete, gyeren szőrös. A rágók vörösbarnak, tövüknel módosan kidagadók, végökkel az állkapesokra behajlók; csipőkörmük barnászvörös, erős és hegyes. Az állkapesok feketek, aránylag erősek, kávasok (kidomborodók) s a széles, elkerekített alajk felett összehajlók. A tapogatók karsúak, zöldessárgák; végizük bebaránított, alapján gyűrűzetesen elrendezett, fekete sertetüskékel fegyverzett. A száríz rövidebb a végiznél, ez közel egyenlő e ezombizzal; az utóbbi fegyvertelen. A lábak zöldessárgák; a ezombok fegyvertelenek, a többi iz gyeren szőrös és igen gyeren álló sertetüskékel. A végtest tojásdad, előrefele kissé szűkülő, oldalról tekintve felkörüien íves, fekete alapszinnel; felülről tekintve egy keskenyes, fekete középterese oldalt szélesen, feheren szegélyezettik s e szegély a hát közepe táján keskeny

kiágazásokkal összeér, az oldalakra pedig 2—3 harintesikot és elől egy rövid hosszesikot bocsát. A has fekete, () szerűen de szakadozottan feheren szegélyezett; e szegély a légzőrés külsarkaiból indulva, a fonókig tart.

Az alsó szemsor kétszer távolabbra esik a homlok széletől, mint a mennyi a távolság a két sor középszemei között. A középszemek előre szűkülő trapezben, a hátsók szembetünőleg nagyobbak és világosak, az alsók kicsinyek és feketék. Az oldalszemek közös kiemelkedesen, de nem érintkeznek, a hátsó középszemektől kétszer nagyobb távolságra mint az utóbbiak egymás között. A homlokresz nem csatornás.

A zár egy széles, domboru, hátrafele ívesen kimetszett koldokból áll, sötét vörösbarna; a kimetszés egyszersmind széle a hosszörred nyílásnak, mely a fonók felé néz, belsejében két felre van osztva s az osztó lemez feven egy igen kis, elkerekített nyújtványt visel, mely valamivel világosabb.

Mértékek: ♀ Törzs	7.5—8 $\frac{m}{m}$ ebből
fej mell	3 "
I lábpár	14.8 "

Hosszarány 1, 2, 4, 3, (a 2. és 4. láb közötti különbség igen csekély).

♂, kisebb, karsú; végteste hengerded. Fejmelle meglehetősen szélesre fejlett, élénk vörösbarna, rozsdavörös szegélylyel; mellrésze lelapított; fejrészelesen elválasztott, kissé felvetett; a homlok magas, annyira, hogy a hátsó és alsó sor középszemei közötti távolság legalább háromszor fordul meg benne. A végtest színezete nőstényének megfelelő, de mindig halaványabb és kevesebbe fejlett; a fehér oldalszegélyek ritkán folynak össze a hat közepén, a has () szerű disze vagy igen enyesző, vagy epen hiányzik.

A lábak vörössárgák; az állkapcsok és a rágók a nőstényének megfelelők, sötétebbek. A tapogató karsú nyelen, mely zöldes vagy vöröses sárga; a száríz fejlett, vastag, rövid és a terddel közel egyenlő hosszúságú; a szárízen, felül, egy felálló szőrűstök. A pikkely kanálalakú, barna, szőrös, oldalt és befele fordított; a nemzőszerv sötét vörösbarna, gyűjtője párnaszerűen dagadó és szegletes, embolusa kicsiny, szaruszerűen áttetsző szennyesfehér, egy rövidebb éles, és egy hosszabb, kissé kampós véggel.

Mértékek: ♂ Törzs	4.5 $\frac{m}{m}$ ebből
fej mell	2.5 "
I lábpár	13 "

Nyári alak, mely különösen a bokros helyeket és sövényeket kedveli, hol tipikus vitorlás hálóját szövö. Deli Magyarország területén különösen gyakori, határozottan az aljakat tartja. Párása a *L. montana*-val azonos, a mint erről gyakori megfigyeléseim meggyőztek. Párása Orsova körül jun. hó elejére esik.

Ismerem, erdélyi részekből: Kolozsvárról, Parajdrol, Mező-Záhról, Nagy-Czegről, Nagy-Szebenből (Sill és Bergleiterfele gyűjtemények); magyar részekből: Doroszlóról, Panesovárol, Orsováról, Ogradenáról (a Csukár mare szikla alján júniusban különösen gyakori), Báziáról, Tokajról, Tarczáról, Alsó-Hánor (Borsod).

SPEC. 4. FAJ. T. LYNPHIA EMPHANA (WALK.). CZÍMERES V. GESCHILDETE S

(*ἐμφανίζω* = felmutatni; itt alkalmasint a végtest szembetünő rajzára célel.)

Vide: THORELL «Remarks» p. 47.

MENGE «Preuss. Spinnen» I. p. 110. sub. *L. scalarifera*.

♀ Feher; világos vörössárga, rajznelküli előtesttel; a végtest vege $\frac{1}{2}$ -szerű barna rajz; lábai zöldessárgák, karsuk. A *L. phrygiana* C. Koch fajrokon. Az előtest módosan fejlett, feje része a mellrészről lankásan kiemelkedő, elől igen laposan íves; a mellvert egyszínűen vörösbarna. A rágók tövükkel kissé terdszerűen kidagadók, igen csekély mértékben az állkapcsokra csapottak; világos vörössárgák; csipőkörmük vörösbarna. Az állkapcsok egyenközüek, vegeiken elmetsették, világos szennyesárgák, az

alajk törpe, széles, elkerekített, vörösbarnás. A tapogató zöldessárga; bebarmitott végize, szár- és czomb-
ize közel egyenlő hosszúságú; a két utóbbi fegyvertelen; az előbbi, különösen tövén, gyűrűzetesen
elrendezett, hosszú, barna sertetűskekké fegyverzett. A lábak zöldessárgák, czombjaik alsó felükön fegyver-
telenek, a többi iz gyeren és elálló sertetűskevel fegyverzett. A végtest csucoson-hossztojásdad fehér vagy
sárgásfehér, hátán a fentebb jelölt barna rajzzal. A fehérség ágszerűen lenyomul az oldalakba is; a fonók
körüli az oldalak sötétebbek s a fehér szín ágai kirivóbbak. A has barnássárga, fehér szemecsekkel; a fonók
előtt többnyire egy fehér foltocskával.

A hátsó sor oldalszemei e sor középsőitől továbbra állnak mint e középsők egymástól. Az alsó
sor a homlok szeletől legalább kétannyi távolságra, mint amennyi a távolság az alsó és hátsó sor
szemei között.

A zár egy széles, hátrafele ívesen kimetszett s e kimetszésen ripacsos köldök, mely közbül világos
barnássárga, ketoldalt vörösbarna.

Mertekek: ♀	Törzs	6.8 $\frac{m}{m}$ ebből
	fej mell	2.4 „
	I lábpár	12 „

Hosszaránya a lábknak 1, 2, 3, 4.

♂ Igen karesú; végteste hengeres, fehér rajzai elmosódottak; a végén rendszeren a nőstény háttestet
ekítő barna rajzzal vagy töredékeivel. A rágók előfelen, tövükkel egy kis dudorodás és hosszúságuk
második felén (tehát a csipőkörömhöz közelebb) egy rövid, erős, éles tövis. A tapogató nyele zöldessárga,
karesú, nemzőszerve sötét vörösbarna. A száríz hosszabb a terdiznél. A tapogató pikkelye makk-alaku
befelé oldalt fordított; szerkezetéből felülről tekintve, oldalt-kifele egy keskeny, sarlószerűen hajlott, hosszú
lemez áll ki.

A végtest hasfelen a légzőrés környezete tetemesen kidagadó.

Mertekek: ♂	Törzs	5 $\frac{m}{m}$ ebből
	fej mell	2 „
	I lábpár	14 „

E faj nyár derekán ivarérett, és fiatalos erdőkben, bokros helyeken, ledöntött fák ágai között
rendszeren nagy társaságban szövi aránylag kis, de tipikus vitorlahálóját. Szaporítását nem ismerem.

Eddig csak Alsó-Hámor és Diósgyőr körül találtam, hol meglehetősen gyakori, jelesen a diósgyőri
melegforrások táján, és az Alsó-Hámorhoz tartozó Feketesár, Disznóspatak, Jávorkút nevű magaslatain.

SPEC. 5. FAJ. T. LINGPHIA PHRYGIANA. C. K. HÍMZETT V. GESTICKTE S.

(Phrygius = phrygiai, ó-kori nép, mely himzéseiről volt nevezetes; itt a végtest diszére vonatkozik.)

Syn. 1836. *Lingphia phrygiana* C. Koch «Die Arachniden» III. p. 83.

Vide: THORELL «Remarks» pag 48.

♀ Világos: a végtest zöldes-fehér, a hátfelen végig, a fonókig terjedve, egy lencz- vagy inkább
babérszerűen összetett, sötét szalag. A lábak sárgabarnák, a terdek táján kissé füstösödők.

A fej mell mellresze a fejrészhez képest nem föltűnően szélesedett, sárgásbarna, egy sötétbe foglalt,
világosodó közepesikkal, mely a szemcsoporthoz indulva a hátgödörbe enyészik. A fejrész jól elválasztott,
kissé emelkedett. A mellvert egyszínűen vörösbarnas, szivalaku, gyeren szőrös. A rágók sárgabarnások,
a csipőköröm beigtatása táján füstösök, végük fele alig szétállók. Az állkapcsok sárgabarnások. A tapogató
végize hosszabb a czombiznál; szőrös, sok hosszú sertetűskevel.

A lábak czombjai néhány apró, fekete ponttal.

A végtest egészen tojásdad, de esuesba végződő, meglehetősen hátság; felül zöldesfehér, mintegy szemcsés, közepén egy láncszerűen összetett közepesikkal; a has világos, közbül egy egyszerű, hosszabban futó szalaggal.

A szemecsoport a fej bubján áll; oldalszemei közös, nagy dudorodáson állanak. A két sor közep-szemei egy előrefele szűkülő trapezben állanak, a hátsók kevéssel nagyobbak, oly távolságra egymástól mint az oldalszemektől. Az alsó sor kissé kihajló, a hátsó kissé behajló.

A zár egy feltűnő, \sim alakú kivájtást mutat; a két kivájtást elosztó lemezen egy erős, hüvelykujj-forma nyújtvány ágaskodik fölfele.

Mertekek:	?	Törzs	4-8 $\frac{m}{mm}$ ebből
		fej mell	1-9 "
		I lábpár	8 "

♂ Elöttem ismeretlen. Koch C. id. h. kisebbnek, karesubbnak, a nősténynyel egyező színezetűnek mondja; szerinte a tapogató nemzőszerve gesztenyebarna, szerkezetét azonban nem írja le.

Ismerem a Nemz. Muz. gyűjteményéből két ? példány után, melyet Frivaldszky János Tatra-Füreden gyűjtött.

SPEC. 6. FAJ. T. LIXYPHIA TRIANGULARIS (CL.), HÁROMSZÖGES V. DREIECK S.

(triangularis = háromszögletű; itt a végtest némely rajzára talál.)

Syn. 1757. *Araneus triangularis* CLERCK «Aran. Suec.» p. 71.

Vide: THORELL «Remarks» p. 46.

♀ Az előtest olajsárga, közepén egy fekete-barna csikkal, mely a szemek közelében villásan két ágra oszlik; oldalai szélesen, fekete-barnán szegélyezve; e szegély az oldalszemekig nyomul. Fehér és fekete rajzú barna, néha ibolyaszímbé játszó végtest, a hátán végig egy csikkal, mely egymásba tolt háromszögből állónak látszik (), e háromszögek szárvégei felváltva feketék és fehérek. A lábak olajsárgák, a száríz végén gyűrűzetesen bebarnitva. A fej mell módosan fejlett, a nyelecsketől a fejesúcsig lankásan, egyenletesen emelkedő; olajsárga; közepén egy barnafekete közepesikkal, mely a hátgödör előtt két ágra oszlik s meg jóval a hátsó sor középszemei mögött elenyészik, --- szeleim hasonló színű szegélylyel, mely azonban nem a legszélen fut, az oldalszemeket azonban közvetlenül megközelíti. A mellvért egyszínűen barna. A rágók végükön karesuk, kissé szétállók, egészen módosan az állkapesokra csapottak, vörössesárgák csipőkörmük sötét vörösbarna. Az állkapesok szelesek, egyenközüek, elmetszettek vörössárgák. A tapogatók olajsárgák, végizők bebarnitott, sok sertetüskével fegyverzett, a fegyvertelen czommbal egyenlő hosszúságú. A száríz rövidebb; rajta 2—3 és a térdizen 1 hosszú sertetüske. A lábak olajszínűek, néha vörössesbejátszók, izeik csuklói táján kissé barnitva, ezek között a száríz vége szembetűnően bebarnitott. A czombok alul fegyvertelenek, felül, tövükhöz közel 1—2 sertetüskével. A többi íz gyéren és elálló sertetüskékkel fegyverzett.

A végtest esúcsosan tojásdad, oldalról tekintve magasán íves. Hátfelen, közbül, a fentebb említett rajz, melynek fehér közei az oldalakban összefolynak. Az oldalak barnásak; a has barna, elől tágasan () szerű fehér foglalatban, hátrább egy felálló, az oldalakba futó fehér folttal. A fonók a hátfelől többnyire két () szerű fehér vonás közé fogva, néha ívesen bekerítve. A végtest színezete leginkább a fehér szín terjedésével változik, de a rajz jellegzetessége kivethető.

A középszemecsoport egy előrefele igen szűkülő trapezbe elhelyezett; hátsó szemei nagyobbak, mindenike külön keretbe foglalt, alsó szemei kicsinyek; közös keretben; az oldalszempárok szintén közös fekete keretben. Az összes csoport párnaszerű kiemelkedésen. Az alsó sor középszemei a kissé kihajló homlok szelétől több mint kétszer oly távolságra a minő a két sor középszemei közötti. A hátsó sor oldal-szemei a középsőktől alig állanak távolabbra mint a mekkora a távolság e sor középsői között.

A zár egy széles, harántrovátkolt köldök, hátrafele kisse szögösen \ kimetszve, e kimetszes alatt kettős nyílással, melynek osztója kisse dudorodik.

Mertekek: ♀ Törzs	6 $\frac{m}{m}$ ebből
fejmell	2.5 "
I lábpár	14 "

Hosszaránya a lábaknak 1, 2, 4, 3.

♀ Igen karesu, hosszulábú; lábai rozsdasárgák; végteste karesu, hengerded, a nőstény rajzát jelleg szerint, de elmosódva és töredekesen viseli, a fekete színű részletek (\) leginkább megmaradnak és rendszerint a fonók fehér () szerű foglalatja is. Az előtest vörössárga, villás közep, és széles szegélyesikkal. A rágók hosszuk, karesuk, végeik felé tetemesen szétállók, vörössárgák; csipőkörmük vörösbarna; különben a tapogató ezombizénél rövidebbek (varietas: micrognatha MENGE), vagy hosszabbak (var. macrognatha MENGE), mely esetben egész alakjuk is nagyobb. A tapogató nyele vörössárga, térdize igen rövid, száríze valamivel hosszabb és vastkosabb, felül egy sarlóalakra hajtott, oldalt ki és előrefele álló, hosszú, áttetsző lemezzel; a pikkely kanálalakú, a nemzőszerv csucsat egy vastag, csigaszerűen csavarodó embolus kepezi, mely alatt kisse oldalról tekintve egy külső végén horgas lemez látható; e lemez szaruszerűen átlátszó fehér, az embolus sötét barnavörös.

Mertekek:

Kisebb ♂ (var. micrognatha MENGE) Törzs	4.9 $\frac{m}{m}$
fejmell	2 "
I lábpár	15 "
állkapocs	1
Nagyobb ♂ (var. macrognatha MENGE) Törzs	7.5 $\frac{m}{m}$
fejmell	3.2 "
I lábpár	21 "
állkapocs	2.6 "

E két nagyság között sok átmenet letezik; a szervezet egy és ugyanaz. Őszi alak, mely bokrokon el.

Ismerem, magyar részekből: Alsó-Hámmor (Borsodmegye), Csorba (Liptó) illetőleg Kárpát: Rakitou Wreh a fenyőövben és Prvnyiszka ingovány; Pribilina (Liptó), Zakameniszko és Hlina havas alja, Lykauka (Liptó) várkörnyek; Rutka körül, Körmöczbányáról, Selmezbányáról, Veszpremből, Buda vidékéről (Muz. gyűjt. Pável); erdélyi részekből: Szász-Vesszősről, a Körösszoroshól (Brátka körül), Kolozsvárról és Nagy-Szebenből.

SPEC. 7. FAJ. LINGPHIA FRUTETORUM. C. K. BOKOR V. STRAUCH S.

(frutex = bokor, frutetum = bokros hely; a tartózkodási helyről van véve.)

Syn. 1834. *Lingphia frutetorum* C. KOCH in Herrich-Schäffers «Deutschl. Ins.» 127, 19, 20.

Vide: THORELL «Remarks» p. 49. (Artic. L. hortensis).

♀ Sötétfekete; oldalai, sárgásfehér, fésűszerű és ríkitó diszszel, mely a hát fekete mezejét szegélyezi s a fonók felett haránt ágak által ketszer összeér; a has szélén, elől egy-egy különálló néha, enyésző vagy megszakított sárgásfehér csík. Az előtest vörösbarna, a lábak vörössárgák. A végtest a fonók felett magas, a fonóktól majdnem függőlegesen emelkedő, oldalról tekintve tehát nem egyenletesen íves. A fejmell egy színűen vörösbarna, feje része módosan kiemelkedő; a mellvért sötétfekete. A rágók vörösbarnák, végeikkel kissé szétállók; az állkapcsok szélesek, egyenközü oldalakkal és elől elkerekítve, az alajk széles, rövid, ívesen elmetstett; az előbbiek és az utóbbi vörösbarnák. A tapogatók vörössárgák, végizük füstös, a ezombnál hosszabb, sok sötét sertetüskevel fegyverzett. A lábak vörössárgák, ezombjaik fegyvertelenek, a többi izen, igen gyeren állva, néhány elálló sertetüske, mely könnyen letöredezik, úgy, hogy venebb példányokkal a lábak fegyvertelenek. A végtest, oldalról tekintve, egy elkerekített sarku hosszánegyszöghez hasonló

es hatvonala csak igen módosan domborodo; sötetfekete; ketoldalt es mindjárt elejen ket sárgásfehér csik indul, mely a haffele kisze csípkés, s mely az oldalakra, de csak a haffest hátsó felén, sűrűn álló három vagy negy csikot bocsát, úgy hogy egy nyeles fesűhöz hasonló, igen rikító oldalrajz támad. E rajz hátulról tekintve kétszer ér össze, még pedig közvetlenül a fonók felett, neha két — — szerű fehér foltoeska es valamivel magasabban \sqcap szerű foglalat által.

Az oldalakban, közel a hashoz es ott, a hol a fesűszerű rajz meg nem kezdődött, egy finom, neha enyésző hosszcsík, mely sem a végtest elejét, sem a rajz fesűfogait nem éri el. A has tiszta fekete.

A középszemek csoportja hossznegyszögben áll, olyszerűen, hogy az alsó es hátsó sor középszemei közötti távolság sokkal nagyobb annál, a mely a hátsókat egymásközött elválasztja. Emmelfogva az alsó szem-sor alig másfelszer áll távolabbra a homlok szeletől, mint a mennyi a távolság a két sor középszemei között; es open ez okon a hátsó sor egyenes, az alsó sor kihajló.

A zár egy vörösbarna köldök, mely hátul ivesen kimetszett; e kimetszésből egy fenyés, füstösen feheres gomb áll ki es kepezi voltakepeni legmegbízhatóbb jegyet e faj nőstényeinek.

Mertekek: 4	Törzs	5.2 $\frac{m}{m}$ ebből
	fej-mell	2 " "
	I lábpár	9 " "

Hosszaránya a lábakra 1, 2, 4, 3.

♂ Karsu, hengerded végtesttel, mely a fonók felett határozottan felemelkedő; előteste vörösbarna, végteste feketebarna, az oldalakban szürkés es elől nemi elmosodó feherességgel; lábai barnászörösek, karsuk. Megkülönböztetése leginkább a nemzőszerv berendezesen fordul meg, tehát: a tapogató aránylag rövid, nyelű, terdize kurt, szárize cseszszerűen kivastagodott, mind kettő néhány fölfelé álló sertével; a pikely kanálalakú, kisze nyújtott végű, sötét vörösbarna szőrös; a benne elhelyezkedő nemzőszerv igen szövevényes. Oldalról (kívülről) tekintve, három, sarló alakra összehajló hosszú lemez tűnik ki, melyből kettő a tő felől indul, a harmadik a szelről kanyarodik, ez utóbbin egy serteszerű igen hosszú embolus áll mely előbb be es lefele azután ismét előrefele kanyarodik s alulról látható legjobban, körülbelül ily hajlással: ∞ , e serteszerű embolus szaruszerű, a többi rész sötét feketebarna.

Mertekek: 4	Törzs	4 $\frac{m}{m}$ ebből
	előtest	2.1 " "
	I lábpár	9 " "

A mint már neve is mondja, e pók leginkább bokros helyeken tartozkodik; gyakori; az ország deli részeiben tavaszi, éjszakra nyári alak. Hálója tipikus vitorlaháló. Párzásat egész lefolyásában nem ismerem s csak annyit bizonyíthatok, hogy az ivarok állása a *L. montana*-hoz hasonló.

Ismerem Palánkáról (Trnovác erdő, május), Illokrol (a var mögötti dombok *Juniperus* bokraín, május), Orsováról (Graczká völgy, május), Mehadia körül (május), Ó-Ogradenáról (Csukár-mare szikla töve, június), S.-A.-Ujhelyről (Magos alja, június), Alsó-Hámor (Borsod, július), Pecs vidékről (Muz. gy. Frivaldszky es Pável). — Erdelyben Kolozsvár körül találtam.

SPEC. S. FAL. LINYPHIA HORTENSIS. SUNDELL. KERTI V. GARTEN S.

(hortus = kert, illen hortensis, kerti; a tartózkodásról).

Syn. 1830. *Linyphia hortensis* SUNDELL «Svensk. Spindl. Beskr. p. 213.

Vide: THORELL «Remarks» p. 48.

♀ Sötét fekete; a végtest oldalában egy rikítóan sárgásfehér széles, hátrafele élesen kicsúcsosodó horogforma (\hookleftarrow) rajz, melynek szelei füreszesek. A végtest, oldalról tekintve, ives. A lábak rozsdasárgák.

A fej-mell módosan fejlett sötét vörösbarna, fejeresze lankasan kiemelkedő, kisze csúcsosodó; a mell-

vert vörösesfekete. A ragok a homlok alól terdszerűen kiállók, végük fele kissé szétállók, vörösbarnák. Az állkapcsok vörösbarnák, egyenközüiek, elől kissé ívesen elmeteszettek. A tapogatók igen kacsusú, vörössárgák, végük füstös s a szárral együtt néhány sertetűsével fegyverzett. A lábak rozsdasárgák, czombjaik felül, tövükhöz közel egy vagy két sertetűsével; a többi iz gyéren és elálló sertetűskekkel fegyverzett. A végtest csücsösen tojásdad, sötét fekete; oldalaiamban, tehát a hát felületét bekerítve, egy füreszes szélű csik, mely a végtest elején keletkezve, kissé ívesen fut a fonók irányában, jóval a fonók felett kihegyesedik és éles horog formán visszafordulva, has eleje fele tart; e horogresz a felsőnél rövidebb. A két oldalra helyezett ily horograjz csücsüi a fonók felett érintkeznek. A has tisztafekete.

A középszemek egy előrefele igen szűkülő trapezben elhelyezettek, a hátsó sorai nagyobbak; az alsó sor a homlok szeletől bőven kétszer akkora távolságra, a mekkora a távolság a két sor középső szemei között. A hátsó sor középszemei egymásközött távolabbra állanak, mint állanak az oldalszemektől. A zár egy széles, lapos, vörösbarna köldök, hátul laposívesen kimetszve, e kimetszés alatt egy = szerű nyílás, mely függőleges irányban kétféle van osztva, az osztó lemezen alul egy parányi gonboeska látszik.

Mertekek: ♀ Torzs	5 $\frac{m}{m}$ ebből
fej mell	1·8 »
I lábpár	9 »

Hosszaránya a lábaknak: 1, 2, 4, 3.

♂ előttem ismeretlen.

Ismerem mint tavaszi alakot Doroszlóról, mint nyári alakot Tokaj környekeről (trakamazi eserdejek) és Alsó-Hámorból (Borsod, puskaportorony).

SPEC. 9. FAJ. LINGPHIA CLATHRATA. SUND. RÁCSOZOTT V. GEGITTESTE S.

(clathratus = rácsozatos, gátoros; a végtest rajzaira ezélez.)

Syn. 1830. *Lingphia clathrata* SUNDEVALL «Svensk. Spind. Beskr.» p. 218.

Vide: THORELL «Remarks» p. 45.

♀ Barnás, kissé ibolyaszímbé játszó végtesttel; a hasfelen több sárgás pont ketoldalt sorakozva (6 minden oldalon), a pontok elmosódók. Az előtest barna, feje részén kiemelkedő; a mellvert elénk vörösbarna. A rágók módosak, nem domborodók vörösesbarnák; az állkapcsok vörösbarnák, szélesek. A tapogató vörössárga, végük kissé füstös, a czommbal egyenlő hosszúságú, töven tuskesertékekkel, melyek a szárral is átmennek. A lábak rozsdasárgák, czombjaik felül 2 sertetűsével; ily tuskek, gyéren, a többi izen is. A végtest, felülről tekintve szélesen tojásdad, a fonók fele csücsösödő, oldalról tekintve laposan íves, elől magasabb; felszínen barnas, kissé ibolyaszínes s oldalról benyomuló, ekalaku, homályos cikkek által tarkítva; az oldalakban szennyesen világos. A has fekete, két oldalt s kissé az oldalak fele - különben a légzőrés és fonók közé elhelyezve, apró, párosan álló, fehéressárga, enyésző pontocskákkal. A középszemek egy előre igen szűkülő trapezbe elhelyezve, az alsó sor a homlok szeletől oly távolságra mint középszemei a hátsó sor középszemeitől.

A zár egy kissé kiemelkedő, barna köldök, melynek nyílása lefele nevez. tágas, egy tatott emberi szájról emlékeztető.

Mertekek: ♀ Torzs	3·8 $\frac{m}{m}$ ebből
fej mell	1·7 »
I lábpár	3 »

Hosszaránya a lábaknak: 4, 1, 2, 3.

♂ kacsusú, a nősténynél hosszabb; sötétbarna színezetű; végtete hengeres, hossza közepén (oldalról tekintve) nyergesen behajló. A fej mell hosszára és szélesre fejlett, vörösbarna, a fej részén bubosán csücsösödő.

a homlok sapkaszerűen borul a rágókra, melyek igen feltűnően az állkapesokra, hátra csapottak. A végtest barna, elejen két elmosódó fehéres foltocskával. A lábak barnászörösek. A tapogató aránylag rövid nyelű, terdize rövidke, szárize csészeszerűen összetörpített, sertekkel ellátott; pikkelye oldalt és befele fordított, kanálalaku, szőrös, füstös; nemző szerve sötét vörösbarna, belső oldaláról tekintve, egy széles, rugószerűen csavart lemez látható, mely kifele — szerű, eles csúcsba végződik.

Mértékek: ♂ Törzs	4·6 $\frac{m}{mm}$ ebből
fejmell	2·3 »
I lábpár	7·2 »
IV »	8 »

Ez érdekes fajt csak egy lelhelyről ismerem, mint kora tavaszi alakot: találtam Zomborban a temetők sírkövein, hol a keresztek homáljaiba szövő szerény vitorlás hálóját (Április).

SPEC. 10. FAJ. LINYPHIA PUSILLA. SUND. PIC'ZI V. WINZIGE S.

(pusilla = igen kicsiny; az alakra vonatkozik.)

Syn. 1830. *Linyphia pusilla* SUNDEVALL «Svenska Spind. Beskr.» p. 214.

Vide: THORELL «Remarks» p. 50.

♀ Fekete; a végtest egyenetlen sárga pettyekkel, a fonók felett egy ilyszínű harántvonással; fejmele vörösbarna; lábai vörössárgák. Zömök alak szélesen tojásdad végtesttel. A fej jól kiemelkedő, vörösbarna, homlokrésze sötétebb; a mellvert fekete. A rágók láthatólag az állkapesokra csapottak, az utóbbiak barna-vörösek. A tapogatók karesuk vörössárgák, vég- és szárizók füstös, sertetűskes. A lábak vörössárgák, karesuk; a czombok, felül, egy sertetűskevel fegyverezettek.

A végtest, oldalról tekintve, laposan íves; fekete. Elejen () szerű két sárga folt, ezek mögött egy sárgás petty, e mögött egy sárgás pont, az utóbbi két jegynek párjaul megfelelő foltok még az oldalakban is állanak. A fonók felett egy sárga haránt vonás látható. A has tiszta fekete.

A középszemek egy előrefele igen szűkülő trapezben elhelyezve, az alsó soréi kicsinyek, a hátsóé nagyobbak; az alsó sor a homlok széléhez alig oly távolságra a mekkora a távolság középszemei és a hátsó sor középszemei között. A hátsó sor középszemei távolabbra esnek egymástól mint az oldalszemektől.

A zár egy barna, lenyomott köldök, mely harántrovátkolt és a közepében behorpasztott, úgy, hogy két módosan domborodó felből állónak látszik; hátrafele elmeteszt s ez elmetezés alatt nyílnak résszerűen a tojócsövek, melyeket egy közös lemez elválaszt; ez alapján lapiczkás és a köldök keretéből kiálló.

Mértékek: ♀ Törzs	3·7 $\frac{m}{mm}$ ebből
fejmell	1·8 »
I lábpár	5·5 »

Hosszaránya a lábakra: 1, 4, 2, 3.

♂ előttem ismeretlen.

Mint nyári alakot, Tarczal környéken (Hegyalja) egy mely bevágású út bomladozó martján találtam, hol az üregekben állott kis vitorlahálója. Erdélyben Kolozsvárról és Mező-Záhról ismerem.

SPEC. 11. FAJ. LINYPHIA ALTICEPS. SUND. FEJES V. HOCHKÖPFIGE S.

(alticeps = magas fejű; a hím fejének magas kiemelkedésére czéloz.)

Syn. 1833. *Linyphia alticeps* SUNDEVALL «Svenska Spind. Beskr.» f. 1832. p. 261

Vide: THORELL «Remarks» p. 59.

♀ Elötteste világos veresessárga, a végtest fehéres testszín, a fehér szín szemcsésen lerakodva és csoportosítva; a lábak karesuk és sárgák. A fejmele módosan fejlett, fejezésze kissé kiemelkedő, elől és follele

kissé csúcsosan összefutó. Messze a szemesoport mögött s a hátgödöröt metszve egy finom fekete vonás. A mellvért testszínes-sárgás; hosszacska, gyér és felálló szőrökkel. A rágók nyulánkok, végök fele könnyedén kihajlók, vörössesárgák, esipőkormük kisse hirtelen hajlásu és sötétebb. Az állkapcsok sárgák, végeikkel a meglehetősen széles alajk felett összehajlók. A tapogatók karesuk, sárgák, a végiz a száriznál valamivel hosszabb, szőrös, végén beharmitott és több feketés sertetüskével fegyverzett. A lábak élénk- kissé vörösses-sárgák, végeiken különösen kivékonyodók; az első lábpár ezombja, felül, egy feketés sertetüskével, a többi ezomb, felül, fegyvertelen, az első és második páron, alul, sorosan álló szőrökkel. A száraz gyéren és ellálló sertetüskékkal fegyverzettek.

A végtest csúcsosan tojásdad, elől meglehetősen magas, világosabb vagy sötétebb testszínes, szemcsesen elhelyezett fehér foltokkal tarkulva, elejen néha egy gyorsan enyésző, hasitekszerű közepesikkal. A has valamivel sötétebb, kitüntetés nélküli.

Az alsó és hátsó sor szemei közötti távolság körülbelül egy harmadrészét teszi annak, mely az alsó sor és a rágótó között fekszik; ez a homlokresz haránt kivájt, úgy hogy a rágók töve épen úgy mint a szemesoport is, oldalról tekintve, kiálló. A két sor középszeme hosszukás, előre felé szűkülő trapezben elhelyezett; a hátsó szemsor, felülről tekintve, egyenes; a hátsó sor oldalszeméi ugyane sor középsőtől alig észrevehetőn távolabbra mint a középsők egymástól; az oldalszemek érintkeznek és közös, keskeny fekete keretbe foglaltak; a hátsó sor középszeméi külön-külön szinten keskeny fekete keretben; az alsó sor középsői keretnélküliek s így látszólag a legkissebbek.

A zár egy kissé kiemelkedő, vörösbarna elhítkeret, durva rovatkolás mellett, a két tojócső nyílása látható; elől elkerékített, hátul egy rövid, kissé felemelt, széles-nyelvalaku nyujtvánnyal, mely a keret szeleiből indulva a fonók felé irányul.

Méretek: ♀ Törzs 4 $\frac{m}{mm}$ ebből

fej mell 1,9 »

I lábpár 8 »

Hosszaránya a lábknak 1, 2, 4, 3.

♂ kicsiny, karesu, hosszabb láb, fejlett előtesttel és sajátágosan alakított fejrésszel. A fejresz egy kissé hirtelenül és igen magasra emelkedő, előreálló kup, melynek csúcsán a szemek állnak. A fekete, finom közép vonás, mely a hátgödöröt metszi, előre felé egészen a hátsó szemekig nyomul. A szín a nőstényéhez hasonló, igen világos sárgás-testszín. A szemek sorai a kup elkerékítéséhez képest boltozatosan hajlók, az elrendezés egyébként a nőstényéivel azonos. A szemek tere előre meredező, gyéren álló, fekete szőröket visel. Maga a kup néha csúcsos és ez esetben a csúcs épen a négy középszem között meredezik felfele. A tapogató aránylag rövid nyelű, ezombíze dagadt, közel vagy oly vastag mint az I lábpár szára; terde és szárizze egyforma, rövid; térdíze végen, felül, egy vörösbarna, hosszú, vékony, tompavegű nyujtvány; pikkelye kanálalakú, befelé fordított kissé vörösbarna lehelletű; nemzőszerve igen szövevényes; oldalról tekintve, közel a pikkely tövéhez egy beharmitott hegyes, széles fog (czápafoghoz hasonló) meredezik kifelé.

Méretek: ♂ Törzs 3,5 - 4 $\frac{m}{mm}$ ebből

fej mell 2 »

I lábpár 10,5 - 11 »

Ez érdekes alaknak eddig csak egy lel helyét ismerem: a Jama tó környékét a Kriván töven, közel a fenyves felső szelénél, hol augusztusban keves ivarérett példányát leltem a fenyvek alatt álló bujabb fűben és az áfonya párnáin. Hálóját nem ismerem.

SPEC. 12. FAL. LIXYPHIA ALPINA. N. SP. HAVASI VITORLAPÓK. ALPEN S.

(alpina = havasi; a tartózkodásról.)

VII-ik tábla, 152, a szemesoport, b a ♀ végteste oldalról, c a zár hátulról, d a ♂ tapogatója oldalról tekintve.

♀ Kicsiny. Előteste világos barnás-sárga, hajszállinom feketés szegelylyel. Lábai világos barnás-sárgák. A végtest felülete feheres, szemnyes-barnás crezettel behálózott, közepén egy elmosódó barnás

csikkal, két oldalt egy-egy barnás mezővel, mely a feketes hastól egy feheres csik által elválasztatik. A mellvert barna.

A fejmell szivalaku, fejeresse kisse kiemelkedő, jól kiálló. A mellvert szélesen-pajzsalaku, szőrös. Az állkapocs és ragópár barnássárga, az alajk barna. A tapogató barnássárga, karesú, végze nem rövidebb mint terde és szára együtve; a terd, szár és végiz gyeren szőrös, néhány sertével. A labak karesuk, hosszuk barnássárgák, egyszínűek, gyeren álló, hosszszaeska sertetüskekkal rakottak. A vegtest tojásdad, elege boltozatos, hátul csucosodó.

Az alsó szemsor középsői közös fekete foltban, a két oldal két-két szemc szinten közös fekete foltban, a hátsó sor középsői külön-külön egy finom fekete gyűrűben állanak. A két sor középsői egy előrefele tetemesen keskenyedő trapezbe elhelyezettek. A hátsó szemsor majdnem egyenes, az alsó kihajló; az alsó sor oldalszemei a középsőktől igen bőven szemátmerőnyi távolságra, az utóbbiak valamennyi szem között a legkisebbek.

A zár, oldalról tekintve, köldökszerűen, hátulról tekintve, karajszerűen kiemelkedő, bubján gyantaszzerűen áttetsző; e gyantaszzerű bub két oldalán egy-egy benyomás.

Mertekek: ♀	Törzs	3	$\frac{m}{m}$ ebből
	fejmell	1-1	»
	I lábpár	5-2	»
	II » 	4	»
	III » 	3	»
	IV » 	4-7	»

♂ Alig kisebb. Előteste és lábai vörössesárgák, vegteste a nőstény rajzaival, de fehersege tisztább. A tapogató karesú, bunkós, száruze rövidebb és vastagabb mint a terdiz, pikkelye kamilalakú, befele oldalt fordított; nemzőszerve igen complicált, elől egy patkószerű, kiálló embolussal (lásd VII. t. 152 d a bal-tapogató külső oldaláról).

Mertekek: ♂	Törzs	3	$\frac{m}{m}$
	fejmell	1-2	»

E csinos kis pókot a Kriván tömbön fekvő Jama tó környéken, a fenyőöv felső határán hálóztam ki a buja fű közül. Augusztusban ivarérett. Dr. KOCH LAJOS úr, ki úgy mint THORELL tanár úr is e fajt felül-vizsgálta, arról is tudósított, hogy ugyane fajt a tiroli havasokon is észlelte.

SPEC. 13. FAJ. LINYPHIA ALACRIS. BLACKW. FÜRGE V. LEBHAFTE S.

(alacer, alacris = élénk, fürge, eleven; a magatartásról.)

Syn. 1853. *Linyphia alacris* BLACKWALL. «Descr. of some newly disc. spec. of Aran.» in Ann. and Mag. of Nat. Hist. 2. XI. pag. 20.

Vide: THORELL «Remarks» pag. 57.

♀ Kicsiny. Előteste sötét sárgásbarna, feketes küllővonásokkal; lábai egyszínűen sárgásbarnák; vegteste, hátfelen sárgabarna, elől egy hossza közepén kisse táguló fekete vonal, mely a vegtest felehosszáig ér, e mögött fekete, háromszögletes foltok, melyek a fonókig érnek, — oldalt kettfelől egy-egy íves szegely-vonal; az oldalak s a has feketek.

A zár, oldalról tekintve, egy erős, elkerekített dudorodást mutat, melynek csuca vorosesbarna; a zárkeret hátulsó szelen egy apró fekete fogacska.

Mertekek: egész állat	3—4-5	$\frac{m}{m}$.
---------------------------------	-------	-----------------

♂ Hasonló színezetű. A tapogató szárrésze vastagodott; a terdreszen egy hosszú, könnyeden hajlott serte, mely a szárrészen álló kisebb, gyengébb sörtevel párhuzamosan áll.

Nagy-Szeben környekeről «*Linyphia terricola* KOCH» nev alatt elősorolja SILL V. Magam nem ismerem.

SPEC. 14. FAJ. LINYPHIA LEPROSA. OHL. CSINOS V. HUBSCHE S.

(lepor v. lepos = csínosság; talán az alak finomságáról).

Syn. 1865. *Linyphia leprosa* OHLEBT «Arachnol. Stud» pag. 12.

Vide: THORELL «Remarks» pag. 35, 56¹.

♀ Kicsiny; barna; a végtesten több Λ alakú fehéres szögesikkel, mely oldalt egy-egy hosszcsík által összefűzetik; a hosszú lábak vörössárgák sötétebb csuklókkal. Fejmelle sárgásbarna, feketés, szegelylyel a mellreszen; fejeresze jól elválasztott, a mellreszből alig kiemelkedő; a szemek a fej bubján és jól kiállók. A mellvert és alajk sötét vörösbarnák.

A rágók módosan fejlettek, függőlegesen állók, barna-sárgák; sarlóalakú, eles körmük vöröses. Az állkapcsok vörössárgák, szelesek, végeiken elkerékítettek, oldalaik meglehetősen párhuzamosak. A tapogatók szennyesárgák, végük sertetűskés, a czombizzal egyenlő hosszúságú. A lábak karesuk, hosszúk, szennyesárgák, a csuklóban meglehetősen határozott barnás gyűrűvel, az ízek közepén néha elmosódó füstös gyűrűvel ekesítve; czombjaik fegyvertelenek, a szárak ellenben hosszú, sugáregyenes, csak kevesse el- és gyeren álló sertetűskekkel fegyverzetek.

A végtest csúcsosan tojásdad, oldalról tekintve íves, hátfelen 8-9 Λ alakú fehéres szögesikkel, melyek a fonók fele kisebbedve, mind határozatlanabbak. A hatodik csík táján egy fehéres vonás nyomul le a has felé; elől, az oldalakban egy finom, szinten fehéres hosszcsík látható. A has barna.

A szemek, a kis alakhoz képest, nagyocskák és igen sűrűn sorakozottak. A közepesoport egy előrefele kisse szűkülő trapezbe elhelyezve s az alsó szemek a hátsóknál valamivel kisebbek; az oldalszemek a legnagyobbak. Az alsó sor távolsága a homlok szeletől körülbelül másfélszer annyi a mennyi a sor középszemeinek a távolsága a hátsó sor középszemeitől. A hátsó sor középszemei távolabb állanak egymástól mint a középszemek. A zár egy aránytalanul terjedelmes és magasan kúpos, ripacsos köldök, egy sima, horgonyalakú (J), világos és felfekvő lemezzel, melynek nyele előrefele áll.

Mertekek: ♀ Törzs	3-3.8 $\frac{m}{m}$ ebből
fejmell	1.3 »
1 lábpár	7 »

Hosszaránya a lábknak 1, 4, 2, 3.

♂ csak valamivel karesubb, kisse fejlettebb előtesttel, egyszínűen rozsdasárga hosszú lábakkal, egybként a nőstényhez hasonló színezettel. A tapogatók módosan hosszú, vöröses-sárga nyelen, melynek terd és száríze rövid; mindkettő felül egy-egy kiválóbb, karesú, felálló, hosszú sörtevel; pikkelye kanálalakú, oldalt és befele fordított, szennyes sárgás, szőrös; nemzőszerve barnászörös, igen szövövényes, felülről és kisse hátulról tekintve egy befele kanyargó, horogforma és hegyes köröm (C) látható, mely sárgás-vörösszínű.

Mertekek: ♂ Törzs	3 $\frac{m}{m}$ ebből
fejmell	1.4 »
1 lábpár	8.5 »

E kis pók, a homályos helyiségeket kedelve, a nyári alakok közé tartozik: pinczegádorokban.

¹ Thorellnél a synonymák között tollhibából áll: *Leptyphantus muscicola* Menge, helyesen kell, hogy álljon *Leptyph. crypticola*, a mire az idézet többi része «p. 133. pl. 25. t. 54.» vonatkozik is.

kisebbszerű barlangokban, tarnák szájában és istalókban nem ritka: kis vitorlás hálóját olykor igen szűk helyiségekbe alkalmazza: júniusban (a delibb részekben) már ivarérett.

Találtam, magyar részekben: a Veterani barlang belső romjai között, a Tarczáról Tokajba vezető hegyi ut martjában, Alsó-Hámorban (Borsod «Hollós» fenyves, gyökerek alatt), Luesivnán (Liptó, Szakmár-Donát park, zugokban), Selmeczbánya (Klingertarna előtti köhalmok), Pribilina (Liptó «Zakameniskő» Pongrácz Adolf-fele major istállója); Ungvár környekeről (Muz. gy. Vidra Ferdinand), Erdélyben Sill említi Nagy-Szebenből.

SPEC. 15. FAJ. LYNPHIA ROSENHAUERI. L. K. ROSENHAUER V. ROSENHAUER S.

(ROSENHAUER, kitünő német természetbúvár tiszteletére.)

Syn. 1872. *Lynphia Rosenhaueri* L. KOCH «Apterolog. a. d. fr. Jura»

♀ Igen kicsiny: előteste halavány rozsdasárga, végteste szürkés. A fej mell fejerésze egészen elkerített, a rágókra sapkaszerűen ráboruló; a mellresz kissé lelapulva szelesedő. A szemek igen kicsinyek (csak mikroskóppal vizsgálhatók), világos rozsdasárgás színökkel az előtest színebe enyészők, határozottan három csoportban állók. A közepes csoport negy szeme egy előrefele igen szűkülő hossztrapezben; az alsó középszemek a homlok szelétől kétszer akkora távolságra, a mekkora a távolság köztök és a hátsó sor középszemei között; az oldalszemek nem érintkeznek, a hátsók a hátsó sor középszemeitől sokkal távolabbra mint a középszemek egymás között. A fejresz elválasztása a mellől igen sajátos oldalbenyomások által történik, úgy, hogy a fej hátulja nyújtványképen a mellreszen felfekvő. A rágók kiszélesedők és végükön láthatólag szétállók, rozsdasárgák: csipőkörmük erős töből indulva igen hegyesen kifutó és rozsdavörös. Az állkapcsok a széles, felkörü alajk felett összehajlok, rozsdasárgák. A mellvert széles-szívalakú s a *negyedik lábpár csipői között nem hegyesedő, hanem tágult*. A végtest csucososan tojásdad, világos szürkés s ily színű a has is. A zár egy aránylag nagy, kiemelkedő köldök, hátsó szele fele, tehát a fonok fele tekintve, szépkörded (ellipticus) nyílással; az egész zár színe rozsdavöröses.

Mertekek: ♀ Törzs 2.5 $\frac{m}{m}$ ebből
fej mell 1 »

E kevesse ismert fajt dr. HORVÁTH GEZA kedves barátom az aggteleki barlang új ágából, mintegy 2500 ölnyre a bejáratától, fedezte fel a cseppgő köveken s több példányban szerze meg, melyek azonban, fájdalom, nagyobb alakokkal egy üvegbe tevé, elpusztultak s csak egy ivarérett nőtény, bár lábaitól és tapogatóitól megfosztva, mégis oly állapotban maradt meg, hogy a faj megkülönböztetése biztosan keresztülvihető volt. A szemállás és zár, a fej alakja és oldalbenyomásai, színe, kétségtelenül teszik a KOCH L. fajával való azonosságát.

SPEC. 16. FAJ. LYNPHIA THORELLII. N. SP. THORELL V. THORELLS S.

(THORELL kitünő svéd Araneologus tiszteletére.)

(VII-dik tábla, 153, *a* szemes csoport, *b* szövőkarmok, *c* a végtest hasfele a zárral, *d* a him tapogatója belülről.)

Igen kicsiny. Előteste és lábai egyszínűen, elenken barnászörösek; végteste borsósárga. Semmi rajzok.

Fejmelle szívalakú, fejerészen kisse szelesedő, elkerített; a fejresz, oldalról tekintve, alig emelkedő s mindkét oldalról sekélyen, csatornásan határolt; a hatgödör tetemes. A mellvert igen szélesen szívalakú, barnászörös, alig néhány szőrrel. A rágók erősek, barnászörösek, oldalról tekintve kisse hátrakapottak, alig egy-két szőrrel, sinak. Az állkapcsok és az alajk barnászörösek. A tapogató karesu, barnászörös; terde, szára és különösen végze sok, részben sertetüskeszerű szőrzettel rakott; *bordákörme nincsen*. A lábak

karesuk : ezombjaik felülete igen keves sertekkel : száraikon, a felszínen, 2—3 tapintó szőr, alul meglehetősen bő serteszőrözet; a lábvegek serteszőrökkel rakottak : a lábveg bordás-körmei igen finomak, karesuk, sarló-szerűen hajlottak, bordaük szerfelett finomak : a samjakorom igen karesu, egy bordájú (lásd VII. t. 153. *b*). A végtest igen szabályosan tojásdad. A hátsó szemsor könnyeden behajló, az alsó könnyeden kihajló : a két sor középsői egy előrefele szűkülő trapezet alkotnak : az alsók kicsinyek : az oldalszemek egy közös, lapos, feketes emelkedesen állanak s továbbra állanak az illető sorok középsőitől, mint a középsők egymás között egymástól.

A zár egy szivalaku, vörösbarna terese, melynek csúcsán (hátrafele), egy közel felkörű, tátongó kis nyílás látható (VII. t. 153. *c*).

Mertekek : ♂ Törzs	2.6 $\frac{c}{m}$ ebből
fej mell	1 "
I lábpár	3.8 "
II "	3 "
III "	2.8 "
VI "	4 "

♂. Kisebb, különösen karesubb : szemezetre a nősténnyel egyezik. A tapogató karesú, bunkós : terdize rövid, vékony, szárizze rövid es egyszerűen, eszeszerűen vastagodott : pikkelye keskeny, kanál-alaku, szőrös, oldalt befele fordított : nemzőszerve egy haránt es kigyózdva rovátkolt gyűjtöt mutat, melynek elején egy kocsonyas dudor áll, a melynek alsó fele egy feketes, horgonyyszerű hajtókat visel. (VII. t. 153. *d*. a baltapogató külső oldaláról.)

Mertekek : ♀ Törzs	2.4 $\frac{m}{m}$ ebből
fej mell	1.2 "

Ez az érdekes kis pók barlanglakó s kivált a «Szeleta» nevű, Borsodmegyében az Also-Hamorban fekvő barlangot lakja. A barlangnak inkább szinter- mint esepkőképződményei közül a legripacsosabb helyeket kedveli, hol a ripacsokon szövi szalait, s a ripacsok köze menekül. A legsötétebb, szárazabb helyeket kedveli. Ezenkívül Schneebányán a Glauzenberg altárna aknájának 148-dik ölben is megtaláltam. Eddig ismeretlen volt.

GEN. 4. NEM. ERIGONE. SAV. ET AUD.

(*Ηριγόνη* = mythol. név.)

Syn. 1825—27. SAVIGNY ET AUDUIN «Descr. de l' Egypte» (Ed. 2.) XXII, p. 319.

Vide : THORELL «On Europ. Spid.» pag. 85.

Igen kis alakok, rendszerint egyszínű végtesttel. A rágók a labezomboknál vastagabbak, végük fele szétállók. Az állkapcsok töre igen kiszélesedett.* A lábak nem tüskesek, hosszarányuk 4.1, 2.3. A nőstények tapogatója rendszerint nélküli a fogaskörmöt : a hímek feje sokszor kirívó módon tornyosuló.

SPEC. 1. FAJ. ERIGONE ALTIFRONS. (CAMBR.). HOMLOKOS ERIGONEPÓK. GESTIRNTE E.

(alti-frons = magas homlokú ; a hím kiemelkedő fejrészére ezélez.)

Syn. 1863. WALCKENAEER altifrons Cambridge «Descr. of 24 new Spec. of Spid» p. 33.

Vide : THORELL «Remarks» pag. 115.

(IX. tábla 194 ♂ erősen nagyítva).

♀ Törzse sötét : lábai clenken sárgavörösek : tapogatói hasonló színűek, végük bebarmtott : a rágók füstösen sárgák. A zár egy barnavörös, kevesse kiálló, terjedelmes, elfolyó szelű köldök, melyben egy, a test

* Rokon nem a «Walckenaeera», mely szintén csupa apró alakot foglal magában s keskeny rágók által különbözik.

hossztengelyéhez haránt fekvő, egy zart emberi szájhoz nemileg hasonlító, duzzadozó szelű rés látható. A koldók a test hossz tengelye irányában egyenetlenül behorpasztott.

Mértekek: ♀ Törzs	2	$\frac{m}{m}$ ebből
fejmell	1	"
I lábpár	2.5	"

A fejmell modosan fejlett, fejeresze felvetett, bubos; a szemek rendes állásban a bubon elhelyezettek. Az alsó szemsor a homlok szeletétől amilyen áll, a mekkora a szemesoport szélessége (előlről hátrafelé és nem a test tengelyéhez értve). A középszemek egy előre szűkülő trapezben elhelyezettek; a hátsó sor középszemei közötti távolság kisebb annal, mely a két sor középszemei között letezik, a trapez tehát szélességénél magasabb. Az oldalszemek nem érintkeznek s a hátsók valamivel közelebb állanak a hátsó középszemekhez, mint a mekkora a távolság ezek között.

A fejmell sötét vörösbarna, a mellvert fekete, a végtest szintén ilyen színű. A rágók vastosak, végük felé kissé szétválók, néhány erős szőrrel ellátottak; a fejresz, tövükre sapkaszerűen borulva, homlok-résével tetemesen visszahanyatlík, úgy, hogy a rágók – oldalról tekintve – a szemek előtt tetemesen kiállók.

♂ karesűbb; színezete a nőstényével megegyező; feje kuposan és igen tetemesen kimagasló; a szemállás rendetlen. A kup, oldalról tekintve, előfelen majdnem függőleges, esüese alatt kissé behorpasztott, hátfelen a mellből nyergesen és hirtelenül kiemelkedő, esüesin sisakszerűen elkerékített. Két szem a kup esüese előszélén áll; két szem, előre nevezve, a behorpasztás alsó szélén foglal állást. A kup esüese, előre-fele nező lapján megfekvően szőrös. Tapogatója olajsárga nyelű, terdize a czombíznek fele hosszát kissé meghaladja, száríze igen rövid, esészeszerű, felül egy szőrüstökkel; pikkelye kerek orru, kamalakuku, szőrös, befelé és oldalt fordított, füstbarna; nemzőszerve meglehetősen egyszerű; oldalról tekintve egy vastag, kettős esavarodásu, tömlőszerű, barnavörös gyűjtőt mutat, melynek esüese alatt és alafele nevezve, egy széles, nyelvyszerű nyújtvány látható.

Mértekek: ♂ Törzs	2	$\frac{m}{m}$ ebből
fejmell	0.6	"
I lábpár	2.2	"

E parányi, szép pókot mint tavaszi alakot (májusi) Panesováról ismerem, hol a wojlovitzi erdő szelén ölbe rakott tölgyfahasabok kergén sürgött és szorgalmasan fejte ropuló szalaít. Biztosan meghatározott faj, melyet THORELL tamár is igazolt.

SPEC. 2. FAJ. ERIGONE APICATA. (BLACKW.). SÜVEGES E. KAPPIGE E.

(apicatus = esüesos, papisüveggel díszített; a ♂ fejének alakjára vonatkozik.)

Syn. 1850. *Nerieue apicata* BLACKWALL «Deser. of some newly discov. spec. &c. in Ann. and Mag. of Nat. Hist.» 2 Ser. VI. p. 339.

Vide: THORELL «Remarks» p. 112.

♀ Az előtest sötétes, szemyes rozsdavörös, a hátfest sötét olajbarna, a lábak vörössesárgák. A végtest rövidke és gyéren álló, megfekvő, feheres szőrökkel. A zár egy vörössesárga alig kiemelkedő ter, melyben a két tojócső nyílása stignaszerűen nyílik; e két nyílás között egy patkóalakú, metszesszerű rés egy nyelvvalaku téreset körít ().

Mertekek: ♀ Törzs	2.7	$\frac{m}{m}$ ebből
fejmell	1	"
I lábpár	2.5	"

A fejmell igen módosan fejlett; feje, oldalról tekintve, a mellrészből lankásan, egyenletesen kiemelkedő, elől elkerekített; az egész előrészt szennyesen sötét-szordavörös, barnás ereszettel. A mellvért vörösbarna. A rágók erősek, végükön kisze szétválók, rozsdabarnák. Az állkapesok és az alajk vörösbarnák. A tapogatók vékonyak, vörössessárga színűek, végük hosszabb a czombíznel. A lábak vörössessárgák; a czombok, alul, hosszabb szőrökkel, a többi iz tömöttebb szőrzetű. A végtest közel körded, felül-alul egy színűen olajbarna. A szemcsoport közelebb áll a homlok szelehez, mint a mekkora a magassága. A közép-szemek egy előre felé kissé szűkülő trapezbe elhelyezve, a trapez szélességénél valamivel magasabb. Az oldalszemek nem érintkeznek. Az alsó sor szemei körülbelül egyforma távolságra egymástól, a sor kissé behajló. Valamennyi szem egyenlően nagyocskó, a mikroskóp alatt kissé zöldesen esillámló.

♂ kisebb; színezete talán a nőstényével; szemcsoportja csak kevésbé rendetlen. A fej bulján egy hirtelenül kiemelkedő, csecsszerű, szőrös kis kup (innen a név: *apicata*), ez alatt a hátsó közép szempár, sokkal távolabb egymástól, mint a mennyire az alsó sor középszemeitől áll; az oldalszemekkel egyenes vonalban esik. Az alsó sor szemei egyenlő távolságra egymástól, a sor könnyedén kihajló. A középszemek trapeze előre felé igen szűkülő, magasságánál szélesebb. A tapogató a pikkelyvel és nemzőrészszel együtt vörössárga; térdize a czombnak felehosszát éri, szárize rövid, csészeszerű; a pikkely tompa orru, majdnem kerekdeden és mélyen kanálalakú, szőrös, fölfelé fordított; nemzőszerve egyszerű szerkezetű; alulról tekintve egy dióbszerűen behorpasztott gyűjtőt mutat.

Mértékek: ♂ Törzs	1.9 $\frac{m}{m}$ ebből
fejmell	0.8 "
I lábpár	2.2 "

Tavaszi, igen korai alak (márczius), melyet különösen a Bácskából ismernek. Mihelyt az enyhébb szelek megindulnak, a fajnak ezrei kezdik meg a fonárröpitést; leginkább a puszták köröin, ezek között pedig különösen az ernaős virágok ernaő maradványain és *Licium* kerítéseken nyüzsgönek s némely helyen 20—30 is található; ily helyeken azután a fonálmaredekok egész szőnyeget alkotnak.

Ismerem magyar részekből: Doroszlóról és Páncsováról.

SPEC. 3. FAJ. *ERIGONE DENTIPALPIS* (WID.), FOGASKEZŰ E. STACHELHÄNDIGE E.

(Dens = fog, palpus = tapogató; a tapogató czombízének fegyverzetére ezéloz.)

Syn. 1834. *Theridium dentipalpes* REUSS. «Zool. Misc. in Mus. Senckenb.» I, p. 242.

Vide: THORELL «Remarks on Syn.» pag. 101

♂ Feltűnően hosszú tapogató, melynek czombíze alul hat vagy hét erős foggal fegyverzett, térdize a végén egy lefelé álló, kapaszerű nyújtványnyal ellátott (lásd II. köt. IV. t. 83. d.). A fejmell sötét vörösbarna; a végtest feketebarna; a lábak sárgászörösek, czombjuk néha sötétebb.

A fejmell fejlett; mellrésze köröskörül felvetett szélű; fejerésze sisakszerűen kimagasló; világos barnászörös rágói, oldalról tekintve, előszökők.

Mértékek: ♂ Törzs	2.5 $\frac{m}{m}$ ebből
fejmell	1.3 "
I lábpár	3.6 "

A rágók (II. köt. IV. t. 83. b b.) erősek, végük felé elválók; az állkapesok (II. köt. IV. t. 83. c.) tövükkel kiszélesedők, úgy mint a mellvért szépen sötét vörösbarnák. A végtest kissé nyújtott nyelecskével függ össze az előtesttel; különben fojásdad. A szemcsoport a fej sisakszerű emelkedésén s azon kissé előre foglal helyet. Az alsó szemcsor és a homlok széle közötti magasság közel akkora, a mekkora a rágók hossza. A négy középszem negyszögbe elhelyezett, az oldalszemek nem érintkeznek.

A tapogató hosszú, czombíze, alul a töve felé, fogacsolt és hajlott; terdize elől egy lefele álló, kapaszerű nyújtványnyal, száríze fölesérszerűen kivastagodott, alul egy kis, csapszerű foggal. A pikkely a nemzőszervvel együtt úgy illeszkedik a szár föleserébe, mint a makk eszéjebe. A pikkely kánálakú, szőrös; nemzőszerve egy ketesavarodású vastag gyűjtőt, ennek a végén két tompa, kupalakú fogat mutat.

♀ előttem ismeretlen.

Magyar részekből ismerem Tokaj környekeről (június), «Pest muzeunkert» jelzessel a nemzeti muzeumban, gyűjtte Frivaldszky János; erdélyi részekben csupán csak Szász-Vesszősön találtam.

SPEC. 4. FAJ. ERIGONE ISABELLINA. (C. K.). IZABELLSZINŰ E. ISABELLFARRIGE E.

(isabellina=szemnyes sárga szín, mely a megsárgult fehérméhhez hasonlít; a test színére vonatkozik.)

Syn. 1841 *Micryphantes isabellinus* C. Koch «Die Arach.» p. 109.

Vide: THORELL «Remarks» pag. 129

♀ Világos. Előteste sárgászörös; végteste szemnyes-szürkéssárga; lábai halvány vörössesárgák. A zár egy elől kisse szívalakra kímetszett, hátul a legzőrés által elmetsett terjedelmes bemélyedés, melyben egy, a test hossz tengelyének megfelelő fekvésű, széles lemez látható.

Mertekek: ♀ Törzs 2·8 $\frac{m}{m}$ ebből
fejmell 1·2 »
I lábpár 4·5 »

Hosszaránya a lábknak: 4, 1, 2, 3.

A fejmell kisse szélesre fejlett, sárgászörös, szemnyesedő; fejresze oldalról tekintve kissé bubosodó. A mellvert vörösbarna. A rágók erősek, végükön kisse szétállók; az állkapcsok vastagok, elől elkerekítettek, szemnyessárgák. A tapogatók sárgák; végükön csúcsán alig észrevehetően füstösek, e végiz a czombnal sokkal rövidebb. A végtest kissé csúcsosodó-tojásdad szőrös, sárgásszürke színű.

A szemesoport a fej bubján; alsó sora a homlok szélével amnyira, a mekkora a szemesoport magassága. A négy középszem egy előrelel igen szűkülő trapezbe elhelyezve; az alsó sor középszeme kisebb. A hátsó sor szemei egymás között egyenlő távolságra s a sor kisse behajló.

♂ előttem ismeretlen.

Eddig mint nyári alakot a Kárpátokból, a Csorbai tó környekeről ismerem. Erdélyben Kolozsvár és Nagy-Szeben környeken is előfordul.

SPEC. 5. FAJ. ERIGONE BITUBERCULATA. (WID.) IKERFEJŰ E. DOPPELKÖPFIGE E.

(bis és tuberculus = kettős dudor; a ♂ fejére vonatkozik.)

Syn. 1834. *Theridium bituberculatum* REUSS «Zool. Misc.» p. 216. (222).

Vide: THORELL «Remarks» p. 106.

♂ Előteste vöröses sárgásbarna; végteste fényes, fekete, gyéren álló sárgás szőröcskével; lábai barnászörösek.

A fejmell fejerésze, oldalról tekintve, sisakszerűen emelkedett, az emelkedés bubján egy pár hossztojásdad, sima, világosabb dudor, egy keskeny köz által elválasztva; az e két dudor alatt majdnem függőlegesen lecsapott, széles homlokreszen, a szemek rendes csoportban állanak. A két sor középső szemei egy előrelel szűkülő trapezben állanak, mely távolabbra esik a homlok szélével, mint a mennyi a magassága.

A tapogató karsu; terdize legnagyobb vastagságánál kétszer hosszabb; a szár rövid, felülete kivajt, a kivajás szélén egy előrelel görbült, karsu túske, belső oldalának a végéből egy hosszú, karsu,

végig egyenlő vastagságú és előre irányozott nyújtvány áll, mely igen domboru; nemző szerve igen szövés-vényes, egészben véve csavaros gyűjtővel.

Mértékek: ♂ Törzs 2.5 $\frac{m}{m}$ ebből
fejmell 1.3 »
I lábpár 4 »

♀ A nőtény fején semmi dudor, a fejrész azonban emelkedett; színezete a hímével azonos.

A zár aránylag terjedelmes, köldökszerűen domboru, barnászörös; közepén egy lemezszerű hossz-betét, mely a légzőrés felett \perp szerűen elágazik, a betét két oldalán egy-egy barnás, kerek terese látható.

Mértékek: ♀ Törzs 3 $\frac{m}{m}$ ebből
fejmell 1.3 »
I lábpár 3.6 »

E csinos kis pókot, mint igen kora tavaszi alakot, (márczius) csupán csak Erdélyből, Mező-Zah-nadasaiból ismerem, hol a nádszálakon előfordul.

SPEC. 6. FAJ. ERIGONE RUBENS. (BLACKW). VÖRÖSLŐ E. RÖTHLICHE E.

(rubens = vöröslő; a test színére vonatkozik.)

Syn. 1823. *Nerione rubens* BLACKWALL «Character, etc.» in London and Edinburg Phil. Mag.» 3. Ser. III, p. 189.

Vide: THORELL «Remarks» p. 129.

♀ Az előtest szép barnászörös; a végtest szürkés. A lábak téglavörösek. A zár vörösbarna; két szemszerű, párban álló nyílás között egy nyelvalakú, széles cikckely látható, mely a légzőrés előtt egy = alakú nyílásban végződik.

Mértékek: ♀ Törzs 3.3 $\frac{m}{m}$ ebből
fejmell 1.3 »
I lábpár 4 »

Hosszaránya a lábaknak: 4, 1, 2, 3.

A fejmell igen módosan fejlett, egyszínűen barnavörös; oldalról tekintve fejeresze egyenletesen es nem bubosán emelkedik. A mellvert barnászörös, egyszínű. A rágók vörössesárgák, végükön széthajlók; az állkapcsok erősek, hasonló szín mellett domborodók, elkerekítettek. A lábak karesuk, végzeik szembe-tűnően vékonyodók; egészben élénken téglavörösek.

Az alsó szemsor közelebb áll a homlok széléhez, mint a mekkora a köz középszemei és a hátsó sor középszemei között. A négy középszem egy előre felé igen szűkülő trapezben elhelyezve, mely legnagyobb szélességénél sokkal magasabb. Az oldalszemek közel érintkezők, emelfogva a hátsó sor könnyeden behajló; az alsó sor tetemesen kihajló.

♂ előttem ismeretlen.

Ismerem mint nyári alakot (junius) S.-A. Ujhelyről a «Kopasz» hegy csúcsa növényzetről.

SPEC. 7. FAJ. ERIGONE RUFIPES. (LIN). VÖRÖSLÁBÚ E. RÖTHFÜSSIGE E.

(rufus és pes = vörös láb; a lábak színére vonatkozik.)

Syn. 1758. *Aranea rufipes* LINNÉ «Syst. Nat. Ed. X.» I. p. 621.

Vide: THORELL «Remarks» p. 126.

♂ A törzs sötétszínű; a lábak rikitóan sötetes-rozsdavörösek. A tapogatók térdize gömbszerűen kivastagodott; a rágók végei tetemesen az állkapcsokra esapottak (inclinatae).

Mértékek: ♂ Törzs 3 $\frac{m}{m}$ ebből
fejmell 1.4 »
I lábpár 4 »

A fejmell szelesedő, sötét vörösbarna; fejeresze módosan, lankásan emelkedő. A mellvert sötét vörösbarna. A ragok tövüknel igen vaskosak, végükön módosan szétállók s oldalról tekintve tetemesen az allkapesokra csapottak, vörösbarnák. A tapogató erős nyelű, rozsdavörös; terdize dagadt, a szárizzal egyenlő hosszúságú; pikkelye tompa orru, melyen kanalakaku, rozsdavörös, csuklója fele kisse füstös; nemzőszerve, alulról tekintve egy szeles, csavaros gyűjtőt mutat, mely egy kurtu, csőralakú, többször hasított embolusba végződik; a száríz szinten alulról tekintve egy befelé es oldalt álló, nyújtott sarkot tüntet fel.

A végtest feketebarna, kisse tompa-tojásdad.

Az alsó szemsor távolabbra esik a homlok szeletől mint a mekkora a csoport magassága. A közep-szemek egy előre-fele szűkülő trapezbe elhelyezettek; az oldalszemek közel érintkezők. Az alsó sor könnyeden kihajló a hátsó sor könnyeden behajló.

♀ előttem ismeretlen.

Csupán csak egy példányt ismerem a magyar nemz. Muzem gyűjteményében; Nagyvárd körül gyűjte Mocsáry S.

SPEC. S. FAL. ERIGONE CORNUTA. (BLACKW.) SZARVAS EL. GEHÖRNTE F.

(cornu = szarv; a fej bubjának kettős kiemelkedésére czélez.)

Syn. 1833. *Neriene cornuta* BLACKWALL «Character of some undescrib. Gen. and Spec. etc.» Lond. and. Edinb. Phil. Mag. 3. Ser. III. p. 490.

Vide: THORELL «Remarks» p. 165.

♂ Törzse sötét szmü; lábai barnásvörösek. A fej bubján két egymás mellett álló, kupszerű, elkerekített hegyű kiemelkedes (innen a cornuta). A tapogató száríze egy hosszú, a pikkely domborúságához alkalmazkodó nyújtványnyal.

Mertekek: ♂ Törzs 2·4 $\frac{m}{m}$ ebből
fejmell 1 »
I lábpár 3 »

Hosszaránya a labának 4. 1, 2, 3.

A fejmell vörösbarna; oldalról tekintve, fejerésze bubosan kiemelkedő s e bubon két, valamivel világosabb, kupos, felül elkerekített, simafenyű emelkedes, mindket oldalt mellettök meg egy-egy kis domborodas. A tapogató vékonyas, vörösés sárga szmü nyelen; száríze kehelyszerű, oldalról tekintve egy hosszú, szarvszerű nyújtványba kifutó, mely nyújtvány a kerekded orru, melyen kanalakaku, aránylag kis pikkely domborúságához illeszkedik: — nemzőszerve, alulról tekintve egy egyszerű, hagymaalaku gyűjtőt mutat, melyből egy rugómodra kanyarított serte indul, a nélkül, hogy a pikkely alól kiállna.

A végtest fekete, keklő zománczezal.

♀ Fejmelle barnafekete; végteste majdnem gömbölyű; fekete, fenyű, finoman pontozott; lábai elenken teglavörösek. Fejmelle, oldalról tekintve, elől módosan felvetett; szemállasa rendes. Az alsó sor középszemei annyira a homlok szeletől, a mennyire a hátsó középsőktől s ezekkel oly negyszöget alkotnak, mely szélessegenel magasabb; mind a két sor középszemei kevesebbire mint szemátmerőnyire egymástól; — az oldalszemek érintkeznek.

A zár egy harantfekvő, hosszánál szelesebb barnás köldök, melynek legzőres felőli szelen egy prizma alakú, igen kis benyomás látható.

Mertekek: ♀ Törzs 2·9 $\frac{m}{m}$ ebből
fejmell 1·1 »
I lábpár 3·3 »

A hmet mint tavaszi alakot Pamesovaról, a wojlovitzi erdő szeleről, bokrokról ismerem; a nőstényt Tokaj mellett tölgyfakról ráztam le. A hmet Dr. THORELL azonosítja a nőstényt nem merte meghatározni, Dr. KOCH L. ellenben a nőstényt határozottan *E. cornuta*-nak Bl. mondta (in. litt.).

SPEC. 9. FAL. ERIGONE FUSCIPALPIS (C. K.) FÜSTÖSKEZŐ E. RAUCHHÄNDIGE E.

(fuscus = feketés, komor, palpus = tapogató; a tapogató színéről.)

Syn. 1836. *Micryphantes fuscipalpis* C. Koch «Die Arachn.» III. p. 46.

Vide: THORELL «Remarks» p. 140.

♀ A törzs sötét színű; lábai olajzöldesek. A zár kevesse kiemelkedő, két tojócsőve szemszerűen nyílik egy széles nyelv alakú lemez oldalain, mely lemez, a legzöres táján végződve, kivágott; a tojócsövek nyílása alatt és az illető oldalak fele szolgálva két domboru borda. Egyike legkisebb alakjainknak.

Mertekek: ♀ Törzs 1.7 $\frac{m}{m}$ ebből
 fejmell 0.9 »
 I lábpár 2.8 »

A fejmell jól fejlett, sötét olajbarna; feje része egyenletesen emelkedő, elöl szélesedő és *tompán elkerített*. A mellvert feketes, hátul hegyesen kicsücsösödő. A tapogatók olajsárgák, szőrösök; végük kisze füstös, néhány sertével ellátott s oly hosszú mint a szár és terd együttve. A lábak szárai a szőrzet között szinten 1—3 erősebb serte. A szemek aránylag nagyok. A középsők egy előre fele csak kevesse szűkülő trapezben elhelyezettek; a két sor középszemei közötti távolság közel olyan, a milyen a távolsága az alsó sornak a homlok szeptól. Az oldalszemek megközelítettek. A hátsó sor könnyeden behajló, szemei egyenlő távolságra egymástól. A végtest kicsiny, kisze nyújtott-tojásdad, sötét barnás-fekete.

♂ előttem ismeretlen.

Csupán csak egy példány után ismerem, melyet a Gellérthegy Duna felőli oldalán, a silány növényzetben gyűjtöttem.

GEN. 5. NEM. NESTICUS. THORELL.

(νεστικος = ügyes szövő. Geschickter Weber.)

Syn. 1869—70. THORELL «On europ. Spiders» pag. 88.

A rágók a czomboknál gyengébbek; az állkapcsok az alajk felett összehajlók, elkerítettettek. A nőstény tapogatója karesu bordáskörömmel ellátott (H. k. IV. t. 84. c). Az oldalszemek érintkeznek, a középsők egy előre fele igen szűkülő trapezbe elhelyezettek. A lábak hosszaránya 1, 4, 2, 3; hosszuk és karesük. Barlang-, pince- és akna-lakó.

SPEC. 1. FAL. NESTICUS CELLULANUS. (CL.). BŰVŐ TAKÁCSPÓK. KAMMER WEBERSPINNE.

(cella = a rómaiaknál belső udvari eseléd szoba; talál az életmódra.)

Syn. 1757. *Araneus cellulanus* CLERCK «Aran. Suec.» p. 62.

Vide: THORELL «Remarks» p. 79.

♀ Szennyes szürkessárga, feketes rajzokkal; lábai vörössessárgák, halaványak, sűrű gyűrűzettel tarkítottak. A mellreszeben széles, kerekded fejmell közbul egy előre és hátra fele kisze táguló barna hosszcsikkal. Zömök, kisze puffadt hasú alak, hosszú, karesu lábakkal. A fejmell, felulról tekintve, szélesen szív alakú, feje része igen kicsiny, mellresze lelapított; az egész szennyes sárga; a sekely hátgödörből, a szemek és a nyelecske fele is, egy szélesedő, szennyesbarna, neha elmosódó csik indul, mely hátul a mell szelet eri, elöl pedig a szemecsoportba feloszlik s a homlokon ismét előtűnik; a mellresz oldalai egy keskeny barna szegelylyel, mely a fejrész oldalaiiban megszakad, de a homlokon ismét feltűnik. A mellvert halaványsárga,

szelein elmosódva barnás, igen rendesen szívalakú. A ragok aránylag veznek, az első lámpar czombjánál láthatóan vékonyabbak; oldalról tekintve, tövüknel igen kis mértékben terdszerűen kialsók — egyebiránt sárgásak s a csipőköröm táján vörösödők. Az állkapcsok szelesek, elől elkerekítettek, belső szelükön kisze kivágottak s ezért az ajk felett kisze összehajlók, vörössárgák s közepük táján kisze besötétítve. Az alajk alacsony, szeles, elkerekített, vörössárga. A tapogatók halványsárgák, az izületek vegei határozatlan gyűrűzettel; a végiz kisze vöröslő, oly hosszú mint a czombiz, előreálló, hosszú szőrökkel borított, a végén egy karesu bordás körömmel fegyverzett.

A lábak hosszúk, karesuk, gyűrűsök; a czomb- és szárizek vegeiken és kozbúl is gyűrűsök. Valamennyi láb fegyvertelen, de meglehetősen hosszú, erős szőrözettel — még pedig tövetől vegeig — borítva. A végtest elől kisze keskenyedő, közepe táján puffadozó, végén kisze csuesosodó, hosszánál csak valamivel keskenyebb, oldalról tekintve igen domború; színe szennyessárga s e szín a feketes szímmel úgy elválasztva, hogy párosan álló sárgás foltok keletkeznek. A fonók felett egy élénken kensárga folt, felette néhány sárga alaku, hasonló színű rajz (ez utóbbi színezet a borszeszben elveszti élénkseget). A has szennyessárga a fonókból kiinduló V-szerű fekete rajzzal, melynek szárai a legzőres táján az oldalakra is felnyomulnak.

Az alsó szemsor középszemei kicsinyek, feketek (nappali), a többi szem nagyobb és opalizáló (éjjeli); a negy középszem egy előrelele igen szűkülő trapezbe elhelyezett; az alsó és hatsó szemek közötti távolság körülbelül akkora, a mekkora a hatsó középszemek közötti. Az oldalszemek érintkeznek, az alsó sor középszemeinél kétszerre nagyobbak. Az alsó sor, előlről tekintve, egyenes s a középszemei közötti távolság egy oldalszem átmérőjét kisze meghaladó; távolsága a homlok szeletől nagyobb, mint a mekkora a középszemei s a hatsó sor közötti ter. A szemek teren néhány felálló hosszabb szőr.

A zar egy a legzőres felett elterülő, sárgászörös, közel felkör idomu lemez, két oldalt egy-egy sötétebb, vesealaku benyomással (a tojócsövek).

Mertekek: ♀	Törzs	5.2—5.5	$\frac{m}{mm}$ ebből
	fej mell	2	»
	I lámpar	16	»
	A végtest magassága (terhes)	3.5	»

♂ karesu, kicsiny; hosszú, vékony lábú. A lábak vörössárgák s a gyűrűzet legtöbbszörre enyészett (meha a szárag végén észrevehető). A végtest szürkessárga, a fonók felett néhány enyésző, sötét harántfoltal. A mellvert egyszínűen vörössárga. A tapogató vörössárga, nemzőszervének nyújtványai vörösbarnak; czombize hosszú, terd- és szárize rövid, az utóbbi kisze duzzadt; pikkelye kanálalaku, oldalt és befele fordított, csuesan egy szőrecessettel, töven egy szarvszerűen oldalt és kifele elvaló nyújtvánnyal, mely egy finom tövisbe végződik; a belső nemzőszerv jellemzőve van egy sötét vörösbarna, vastag, befele kanyarodó nyújtvány által, mely előtt egy világosabb, horgosvégű, finom és hegyes embolus áll (a szövet oldaláról tekintve különösen szembetűnő).

Mertekek: ♂	Törzs	4	$\frac{m}{mm}$ ebből
	fej mell	1.6	»
	I lámpar	16	»

E pók a barlangokat, pinczeket és aknákat lakja s minél nagyobb a melység, a melyben tartózkodik, illetőleg a távolság, a mely a nap világotól elválasztja, annál inkább csökkenniék feketes rajzai, amnyira, hogy meha csak a fonók feletti kensárga folt mutat nemi sötetes keretet. Tartózkodási helyein a nyirkosabb zugokat és üregeket kedveli, hol rendetlen, vitorla nélküli hurkolását alkalmazza. Az aknában oly melységbe nyomul, a meddig meg élőlenyek előfordulnak. Nevezetes jelenség az, hogy a barlangokban tartózkodó Tipulidák e pók hálójának szálain pihenőt tartanak úgy, hogy előlábaikkal a szálakra akaszkoznak, a nélkül, hogy oda ragadnának, vagy a pók ezért nyugtalanodnak.

Ismerem mint nyári alakot magyar reszekből: az Alsó-Hamor (Borsodmegye) barlangjaiból, u. m.: Szeleta és az u. n. Hermanbarlang, továbbá az ottani tuffkepletbe vájt pinczekből, Egerből a «Skopetz-ház»

pinczeiből; Selmeczbányáról a Glanzenberg altárnából és ennek aknájából, lefele a mélység 148-dik öleig. «Biharmegye» jelzettel (Muz. gy. Frivaldszky János gyűjtése). Erdélyben Kolozsvártt, a muzeum épületében található.

GEN. 6. NEM. ERO. (C. K.).

(Valószínűleg *Ηρό* gör. személynév.)

Syn. 1837. C. KOCH «Uebers. d. Ar. Syst.» I. p. 8.

Vide: THORELL «On Europ. Spiders», p. 89.

A középszemek derek negyszögbe elhelyezettek. Az állkapcsok keskenyek az alajk felett erősen összehajlók. A fejmell magasan domboru, majdnem felgömb alakú. A lábak ritkásan elhelyezett sertetűs-kekkel fegyverezettek; az első pár kisse meghosszabbított. A vegtest magas domborodású, majdnem gömb-szerű, neha páros csücskökkel. Közepes nagyságban aluli alakok. Két faj.

SPEC. I. FAJ. ERO THORACICA. (WID.). VASKOS EROPÓK. BRUSTIGE ERO.

(thorax = mellkas; a fejmell fejlettségére vonatkozik.)

Syn. 1834 *Theridium thoracicum*, REUSS «Zool. Misc.» p. 213

Vide: THORELL «Remarks» p. 77.

♀ Sárga-barna tarka; lábai sárgák, sötét vörösbarna és sűrű gyűrűzettel. A fejmell szélességre és magasságra nevezetesen igen fejlett, sárga földön barna szegélylyel és középrajzzal. A vegtest felül egy pár szemölcszerű csücsökkel. A fejmell magasan domboru, fejeresze csak keskenyedes által elváló; az egész olaj-sárga. Az oldalszemek mellett egy-egy terjedelmes barna folt; a sekely hátgödörben egy sötét folt, kereszt-szerű, finom kisugárzással (+); az egész mellresz szélesen, befele egyenetlen szelű szegélylyel bekerítve, mely szegély a szemek fele vékonyodva, a homlok szelet is bekeríti. A mellvért vörössárga, elmosódó barna foltokkal tarkított. Az állkapcsok vörössárgák, keskenyek s a nyelv alakú alajkra, mely az állkapocs hosszúságának kétharmadát meghaladja, reahajlók. A tapogatók sárgák, minden izük felül-alul barnán gyűrűzött, a végiz füstös, a czombiznel hosszabb. A lábak karesuk, vékonyan végződők. Az első pár czombja erős, legnagyobb részében vörösbarna, két sárgás gyűrűs folttal, a többi pár és ízülete sárga, barnán gyűrűzött; a czombszár és második végizen három gyűrűs, ez utobbin tövenel két igen hosszú sertetűske.

A vegtest gömbölyű, felül két párban álló, szemölcszerű; apró csücsökkel, e csücsökök előfelükön bebarmitottak, hátul sárgák, mely szem a vegtest vegeig terjed. Az oldalak és a has sötét barnasárgán mintegy porzottak.

A negy középszem dereknegyszögbe elhelyezett s a homlok szeletől oly távolságra áll, a mekkora a szemnegyszög magassága. Az oldalszemek érintkezők s a hátsók, e sor középsőtől valamivel távolabbra esnek mint a mekkora a távolság e középsők között.

A zár sötét vörösbarna, közbul egy nyelv alakú lemezzel, mely előrefele kikanyarodva a két tojó-esőnyilást pápaszem módra bekeríti.

Mertekek: ♀ Törzs	3	$\frac{m}{m}$ ebből
fejmell	1-6	»
I lábpar	6-6	»

Hosszaránya a lábknak 1, 2, 4, 3.

♂ előttem ismeretlen.

E csinos kis állatot csupán csak egyszer, mint kora tavaszi (márczius) alakot kaptam Doroszlón (Bácsmegye), nevezetesen peteburkát ellenben több ízben találtam ugyanott, rendszeren teglárakásokban. E burok a legszebb készítmények egyike: barna, mintegy 4 $\frac{m}{m}$ átmérőjű gömböcske, mely egy finom, neha 18 $\frac{m}{m}$ hosszú nyelecsken csüng.

SPEC. 2. FAL. ERO TUBERCULATA. (DE GEER). CSÜCSKÖS E. HÖCKERIGT E.

(tuber = púp; a végtest felületén álló púpokra vonatkozik.)

Syn. 1778. *Aranea tuberculata* DE GEER «Mem. pour serv. &c.» p. 226.

Vide: THORELL «Remarks» p. 77.

♀ A végtest igen magas, felületén két pár szemölcsszerű emelkedés. Sárgásan-barnán mintegy porzott. A fejmell módosan fejlett, felgömböszzerűen domborn, halványsárga színű, barna szegelylyel, középesikkal és szemrajzzal.

A fejrészt a mellől inkább csak a színezet által elválasztott. Az egész szemesoport ugyanis barnás tereseiben elhelyezett, mely tereseiből az oldalszemektől a mellrész felé egy-egy szarvszerű folt kinyúlik s horgosan a hátgödör felé hajlik. A mellrész széle barnán szegelyezett, e szegély a nyelecske felett tágasan megszakitott, a homlokon ellenben finomulva összeérő. A mellvért barna, a csípők állásának megfelelően sárga foltokkal díszített. A rágók sárgák, széleik kissé füstösek. A tapogatók vékonyak, sárgák, ízületek vége barnán gyűrűzött, a többi rész itt-ott barnán foltos, a végiz a czombnál valamivel hosszabb. A lábak karesuk, sárgák, barna diszszel: az első pár czombja a végén barna gyűrűs, hosszában rendetlen barna foltokkal borított; a száraz és második lábvégizek három-három barna gyűrűvel. A második lábvégiz töven két gyenge sertetüske.

A végtest gömbölyű, hátrafele igen meredek, felületén két pár, egy előrefele szűkülő trapezben álló csücsökkel, melyek közül a hátsó pár az elsőnél valamivel magasabb és csücsösöbb.

A zár két tágnylású tojócsövet mutat, mely közbül egy keskeny lemez által választatik el; a lemez fel- és aláfele horgonyszerűen kikanyarodó.

A közep szemesoport egy hátrafele kevésse szűkülő trapezbe állítva: a hátsó sor oldalszemei ugyane sor középszemeitől körülbelül kétszer akkora távolságra mint a mekkora a távolság e sor középszemei között.

Mértékek: ♀ Törzs	3.5 $\frac{mm}{mm}$ ebből
fejmell	2 »
I lábpár	7.5 »

Hosszaránya a lábknak: 1, 2, 4, 3.

Keves példányt csupán csak egy lelhelyről ismerem: Rakamazról (Tokaj mellett), hol is mint nyári alakot a kincstári cserjések leveleiről szedtem.

GEN. 7. NEM. MIMETUS. HENTZ.

(μίμητος: utánzott; valószínűleg a sok alakkal való rokonságra ezélez.)

Syn. 1832. HENTZ «On North Amer. Spid.» in the Amer. Journ. of Scien. and Arts. XXI, p. 104.

Vide: THORELL «Remarks» p. 602 et PAVESI «Catalogo syst. del ragni del Cant. Ticino» 1873, p. 77.

A középszemesoport egy hátrafele szűkülő trapezbe elhelyezett, az alsó sor középszemei valamenynyinel nagyobbak, egymástól saját átmérőnyi távolságra állók. Az első lábpár *nekiröszödött* és aránytalanul hosszabb a többinél (legalább a 2-nél); e pár és a második pár szára és második lábvégize (metatarsus) egyenetlen, hosszú sertetüsekkel fegyverzett. (A nemet, az előttem fekvő magyar példány szerint jellemzem, kritikajába anyag hiányában nem bocsátkozhatom.)

SPEC. I. FAJ. MIMETUS LAEVIGATUS. (KEYS). SIKOS SZINÉSZPÓK. GLATTE MIMENSPINNE.

(laevigatus = megsimított; az alak némi csúposzságára látszik vonatkozni.)

Syn. 1863. *Ero laevigata* KEYSERLING «Besch. neuer Spinn.» in Verh. der k. k. zool.-bot. Ges. Wien, XIII, p. 378.

Vide: THORELL «Remarks on Syn.» p. 602. PAVESI l. c. p. 78.

♂ Az első és második lábpár czombja a többi párhoz képest erősödött és meghosszabbított; szára és második lábvégize hosszú, elálló tüskékkel fegyverzett; valamennyi lábezomb felül 3—4 tüskes, alul fegyvertelen. A fejmell vörössesárga vagy sárga, a fejresz egy barnás áttört rajzzal besötétítve. Az állkapcsok függőleges állás mellett keskenyek, párhuzamosak (felül-alul egyenlő szélességűek), tövüknél világosak, egyébként (a hosszúság felső harmadrészetől lefele) barnások. A végtest sárgásbarna és gyéren álló, barnás gyűrűkből induló szőrökkel ellátva; az oldalak világosabbak; vége némi ezímerrel díszített. A fejmell hátul széles, a fejfele jól csúcsosodó-szívalakú, boltozatos; a fejresz nem barázdák, hanem szín által elválasztott; e szín halavány szemyesbarna, a hátgödörből indulva a szemek felé ágasan, áttörötten terjed. Az egész testrészen gyéren álló szőröcskék, a melyek barnás, kerek és kiemelkedő szemölcsökben gyökereznek. A mellresz oldalai szegélynélküliek. A mellvért keskeny, sárgás, az I és II lábpár espője előtt egy-egy barnás foltal. A rágók hosszúk, hengeresek, a kurta, erős csípőköröm táján alig lelapulók, finoman haránt ránczoltak, közepük táján foltszerű besötétítéssel, tövüknél világosak, azon alul sötetebbek. Az állkapcsok keskenyek, kissé csúcsosodók, a rágók végét elérik, sárgások; az alajk az állkapcsok felét érve meglehetősen széles, elkeresztelt.

A lábak közül az első és második pár igen hosszú, jelesen czombrészében erősödő. Az első pár czombjának vége vörösbarna karikával, a czomb egyébként alfele nagyobb, oldalt kisebb, felül igen kis barnás foltocskákkal tarkított. A negyedik pár szára és második lábvégize hossza közepén és a végén is egy barna gyűrűvel; valamennyi láb inkább tarka mint gyűrűs. Az első lábpár szára és második lábvégize sok hosszú és evvel elegyesen kisebb tüskékkel fegyverzett. A végtest az előtestnél csak valamivel szelesebb és nem hosszabb, kerekded, a végefele alig csúcsosodó, hátfele barnássárga, gyéren szőrös, a szőrök szemölcsöszerű, sötét emelkedésekből és karikákból indulnak; oldalai világos szemyesfehérek, a végtest közepe táján a hát lapjába benyulók; e benyulás hátrafelé feketén szegélyezett s oldalt és lefele folytatódva hátarát köpezi az ékalakú ezímernek, mely a fonókig lehatol. A fonók alulról és mindkét oldalról feketesen bekerítve. A has sárgás.

A középszemes csoport egy hátrafelé szűkülő trapezbe elhelyezett, az alsó középszemek külön, nagyoeska, barna dudorokra elhelyezve kiálló és nagyobbak, a hátsók kicsinyek. Az oldalszemek közös, barna dudorra elhelyezve, érintkezők; a hátsók a hátsó középsőktől valamivel távolabbra, mint a középsők egymás között. Az alsó sor a homlok szelétől alig áll távolabbra, mint a mekkora egy középszemének az átmérője. Felülről tekintve az alsó sor erősen kihajló, a hátsó kömyeden behajló. A tapogató nyele sárga; térdize a száriznál rövidebb, csúcsán, felül egy felálló, egyenes, hosszú, fekete sertetüskével; pikkelye oldalt befelé fordított, kanálalakú, felső szélén kömyeden kivágott, szőrös; nemzőszerve vörösbarna, előlről tekintve egy hegyes, horgosan hajlott és gyorsan vastagodó köröm látható.

Mértékek: ♂ Törzs	4.4 $\frac{mm}{m}$ ebből
fejmell	2.2 »
I lábpár	17.5 »
Hosszarány: 1, 2, 4, 3.	

E nevezetes pókot mint nyári alakot csak egyszer és csak egy ♂ példányban kaptam a Tokaj és Rakamaz közötti legelők fölgyein. A nemet Hentz, amerikai jeles araneologus, amerikai alakokra alapítva; egyik faja, az épen tárgyalt, azonban Európában is előfordul, de eddig inkább csak a legdelibb részekből (Sicilia) volt ismeretes. A nem elnevezéseket illetve lásd: THORELL «Remarks on Synonyms» pag. 602.

GEN. 8. NEM. DIPOENA. THORELL.

(Διποενα = görög név.)

Syn. 1869–70. THORELL «On Europ. Spid» pag. 91.

A hátsó szemsor, felülről tekintve, láthatólag kihajló; az első labpár a többinél hosszabb; a végtest gömbös. A fejrés homlokrésze a rágók hosszánál magasabb. A lábakon semmi tüske. A rágók az első láb czombjánál gyengébbek; az állkapcsok erősen összehajlók.

SPEC. 1. FAJ. DIPOENA MELANOGASTER. (C. K.) FEKETEHASÚ DIPOENAPÓK. SCHWARZBÄUCHIGE D.

(μελας = fekete, γαστήρ has; a has színéről.)

Syn. 1845. *Atca melanogaster* C. Koch «Die Arachn.» X, p. 143.

Vide: THORELL «Remarks» p. 516.

♀ Előteste barnásfekete; végteste oldalain és hasfelen fehér, barnásan porozott. Lábai fehéresek fekete gyűrűzettel.

Előteste kicsiny meglehetősen domborodó; fejezése egy barázda által meglehetősen elválík, kicsiny s előrefele keskenyedő. Az egész előtest erősen fenylik. A végtest aránylag nagy, olyan hosszú a milyen széles, hátfelen igen csekély mertekben lapított.

A végtest barnás porozata néha elmosódo harantesikokká is tömörül.

A szemállást lásd II. kötet IV-dik tábla 88 a.

A zár egy keresztbefekvő hosszukás dudorodás, a két végén világosabb sargásbarna, a közepén sötétebb és sekelyen behorpasztott.

Mertekek: ♀ Törzs 3:3 $\frac{m}{m}$ ebből
fejmell 1 »

A ♂ előttem ismeretlen.

Az egyetlen példányt találta Mocsary Sándor Homonna tájékon, *Pinus sylvestris*en; egyezik azokkal a példányokkal, a melyeket Simon ur szívessegeből deli Franciaországból bírok.

GEN. 9. NEM. PHYLLONETHIS. THORELL.

(φυλλων = levél, νειθις = szövő, fonó; a levelek összeszövésére czélelőz.)

Syn. 1869–70. THORELL «On europ. Spid.» p. 90.

A középszemek közel dereknegyszögben állók; a hátsó sor középszemei ugyan e sor oldalszemeitől közel kétszer távolabbra állanak, mint a mennyire állanak a középsők egymástól. Az állkapcsok keskenyek nyulánkok, alul kissé tágulók, az alajk az állkapcsoknak egy harmad hosszát erő felkörü. A végtest szépen hossztojásdad, egyenletesen boltozatos. A lábak igen hosszúk és vékonyak. Világos elenk színezet. (A ♂ rágói nagyon fejlettek és sajátságosan fegyverzettek).

SPEC. I. FAJ. PHYLLOETHIS LINEATA. (CL.) VONALAS BOKORPÓK. LINIRTE STRAUCHSPINNE.

(lineata = vonalzott; a rajzra vonatkozik.)

Syn. 1757. *Araneus lineatus* CLERCK «Ar. Suec. p. 60. + ovatus p. 59. + redimitus p. 58.

Vide: THORELL «Remarks» p. 78.

♀ Világos ezitromsárga, vagy fehéres végtest, előrefele egyenletesen elágazó két sor fekete ponttal, minden sorban öt-öt pont.

Válfaj: fehéres végtest, a pontsorok közötti tér vagy egészen vagy csak szélein, de szélesen, karmínpiros.

Az első lábpár szárának vége többnyire kirívóan feketés gyűrűvel. A világos fejmell hajszálfinom, fekete szegélylyel. A has közepe keskenyen feketés, elmosódó, széles, fehér szegélyzettel.

A fejmell módosan fejlett, fejerésze elválasztott, oldalról tekintve nem emelkedő: elől majdnem egyenesen elmetsett; az egész sárgás fehér; a mellresz hajszálfinom fekete szegélylyel. A mellvért közel háromszögletes, sárgás, közbül egy feketés halvány hosszsesikkel. A rágók sárgásak, tövükkel kissé duzzadóok egyébként párhuzamosak; csipőkörmük rövid, erős, vörösbarna. Az állkapcsok (lásd a nem jellegeit). A tapogatók sárgásak végizük barna-szőrös, oly hosszú mint a szár és térdiz együttevén. A lábak hosszuk, karesük, a végek a czombokhoz képest nem igen vékonyodók, — különben sárgásfehérek, szinte áttetszők, szőrösök és fegyvertelenek. Az első lábpár szára a végén kirívóbban füstös, vagy feketesen gyűrűs.

A fonók körül négy fekete pont.

Az alsó sor középszemei feketék (nappali), a többi opalizáló (éjjeli): az alsó sor a homlok széletől oly távolságra, a mekkora a középszemek négyszögének a magassága. Az oldalszemek egy fekete, közös domborodáson elhelyezve, érintkezők, a hátsók a hátsó középsőktől közel kétszer oly távolságra, mekkora a távolság a középsők között.

A zár egy alig kiemelkedő, aránylag kis, sötétbarna köldök, egyszerű fenylő, felvetett kerettel, mely a légzőrés táján megszakított.

Mértékek: ♀ Törzs	6—6.5 $\frac{mm}{m}$ ebből
fejmell	2.3 »
I lábpár	17 »

Hosszaránya a lábaknak: 1, 4, 2, 3.

♂, igen karesu, hosszukábú: rágói rendkívül fejlettek, szetallók, hosszuk; csipőkörmük hosszu, a hegyén horgosan haljott; tövükhöz közel be és lefele irányozva egy gyilokforma sárga, erős tövis (II. köt. IV. t. 85. b). Az első, második és negyedik lábpár szára végén egy feketés gyűrű. Az előtest veressárga, egy fekete középséssikkal, mely a nyeleleske felett keletkezve a szemek közeleiben elenyeszik, a szélesebb mellresz hajszálfinom fekete szegélylyel. A lábak vörössárgák és hosszuk. A végtest keskeny, hengerded igen elenken sárga, nagy, majdnem láncszerűen összefüggő, inkább folt- mint pontsorrall. A has feketés, kétoldalt egy-egy széles, párhuzamos, sárga hosszsesik. Vörös rajzu himeket nem ismerlek. A tapogató vékony nyelű, térd íze rövid, felül egy felálló vézna sertével; az egész ízület sárga; pikkelye csak módosan oldalt fordított, vörössárga, kanálalakú igen szőrös; nemzöszerve módos nagyságú; vöröses gyűjtője egyszerű domborodású, rajta — oldalról tekintve — egy kurta, éleshegyes, árforma és kissé hajlott köröm látható, mely a kanal csücsa alatt meredezik.

Nagyságra kissé változó.

Mértékek: ♂ Törzs	4.8—6.4 $\frac{mm}{m}$ ebből
fejmell	2 — 3 »
I lábpár	15 — 17 »

(A törzs mértéke a kissé előre álló rágók kizárásával).

Rágó a nyitott körömmel együtt, a nagyobbaknál 3 $\frac{mm}{m}$.

Mint tavaszi és nyári alak e szép pök bokros és magasfüves helyeken, a havasok fenyőöveiben nem igen ritka, úgy kertekben is található, meg pedig mind két színváltozata ugyanazon a helyen. A sárga változat gyakoribb. Tulajdonságai közé tartozik a barangolás és más, jelesen Linyphia fajok hálózatainak a bitorlása. Párzását nem láttam. Peteit rendszeren egyszerűen összeszótt levelekbe rakja a ♀, s kikelesőikig, mely három hét múlva megtörténik, gondosan őrzi; a peték száma 50—60.

Ismerem erdélyi részekből: Kolozsvárról (Museum kert), Szovátról (Mezőhavas fenyőöve 3000 láb), Gyergyó-Szt.-Miklós (Várhegy); magyar részekből: Pancsováról (Wojlovitzi erdő szele), Bázsiásról, Tarczáról, Tokajból (a «Kopasz» alji szőlőkből), S.-A.-Ujhelyről («Magos» alja), Alsó-Hámor (Borsodmegye «Puskapor torony» retje, «Mely völgy,» «Lustavölgy,») Mocsolyásról (Borsodmegye), Selmeczbányáról «Biharmegye» jelzővel (Muz. gy. Frivaldszky János), Pestről (Rakos «Zsivora mező» Muz. gy. Pavel János)

GEN. 10. NEM. THERIDIUM. (WALCKENAER).

(*θηρίδιον* = kis állat; az alakok apróságára vonatkozik.)

Syn. 1805. WALCKENAER «Tabl. d'Aran.» p. 72.

Vide: THORELL «On Europ. Spid.» p. 92.

Kisebb szemek. A hátsó szemsor könnyedén behajló; e sor középszemei ugyan e sor oldalszemeitől oly távolságra esnek, mely a legnagyobb szem átmérőjének megfelel, vagy ezt kissé meghaladja. Az alsó sor középszemei feketek (nappali) a többi szem opalizáló (éjjeli). A végtest, a nőstényeke különösen, igen magasra domborodó, gomb vagy körtve alakú. A Theridium-nem fajai tisztán hurokkötők s hálójuk közepébe idegen anyagból ernyőt vagy harangot készítenek, a melyben lesnek s egyszersmind peteiket is őrzik (I. kötet II. tábla 52) Peteiket több versen tojva, minden részletet külön borsóalakú burokba szövik.

SPEC. I. FAJ. THERIDIUM TEPIDARIORUM. C. K. VIRÁGHÁZI TÖRPEPÖK. GLASHAUS ZWERGSPINNE.

(*tepidus* = lágy meleg, innen: *tepidarium* = meleg virágház; a tartózkodásra czéloz.)

Syn. 1844. *Theridium Tepidariorum* C. Koch «Die Arachn.» VIII, p. 75.

Vide: THORELL «Remarks» p. 80.

♀ A Theridiumoknak nálunk legnagyobb faja (8 m_m törzs). Földszürke; a végtest legtetején egy haránt fekvő, csucsával hátrafele fordított, felhóldszerű fekete foltoeska, e foltoeska mögött egy kis enyésző sárgaság, mely a fonók fele meg néhányszor feltűnik, anélkül, hogy sávot kepezne. A labák sárgás-feheresek, a negyedik lábpár a végén vörösesen vagy barnásan, láthatólag gyűrűs. A végtest igen magasán domboru, hosszánál rendszeren valamivel magasabb.

A fejmellem módosan fejlett, mellrésze a fejresznel nem alacsonyabb, az utóbbi csucsosodó, jól elválasztott; az egész egyszínűen szennyes barnássárga. A szivalaku mellvert világos barnássárga. A rágók gyengék, hengerdedek, párhuzamos oldalakkal, sárgásvörösek. Az állkapcsok keskenyek, hosszuk, majdnem párhuzamosak, vegeik reszint és kifelé elkerekítettek s a rágók végével összecsök; az alajk az állkapcsoknak alig egy negyed hosszát éri, széles és felkörüli. A tapogatók aránylag rövidek, módosan fejlettek; sárgásfeheresek; ezombizuk csupasz, a többi iz mindinkább szőrösödő, a végiz sűrűn szőrös; a szőrözet rövid és fekete.

A labák szennyesárgák, feheresek, az izületek vegei alig kissé füstösödők, a negyedik pár szára végén egy meglehetősen szembetűnő vörösesbarna gyűrű; egyenként feketes szőrökkel borítottak, fegyvertelenek. A végtest, oldalról tekintve, majdnem körök s csak igen a fonók táján kissé csucsosodó; hosszánál valamivel

magasabb és tetemesen keskenyebb, földszürke az említett fekete folttal, neha a folt mögött határozottan, fekete λ szerű ágrajzzal. A has barnás; széles, határozatlan, feheres \sqcup szerű szegélyvel.

Az alsó sor középszemei feketek (nappali) kisebbek, a többiek opalizálók (éjjeli) nagyobbak. A negy középszem derek négyszögbe elhelyezve, a hátsó középsők közötti ter egy hátsó középszem átmerőjének megfelelő; hasonló a távolság a hátsó oldal és középszemek között. Az oldalszemek érintkeznek. Az alsó sor a homlok szélétől távolabbra esik, mint a mekkora a távolság a két sor középszemei között. A homlok elkerekített, az alsó szemek előtt kiálló. Pelülről tekintve az alsó szemsor kihajló, a hátsó behajló. — A zár egy egyszerű kerülekídomu vörösbarna keret, mely a legzörös feletti részen leginkább kiemelkedik; a keretben egy egyszerű domborúság látható.

Mertekek: ♀ Törzs	8 $\frac{m}{m}$ ebből
fejmell	3.5 »
A vegtest magassága . . .	5 »
I lábpár	15.5 »

♂ karesú, aránylag kicsiny; elenk rozsdavörös előtesttel es hosszú lábakkal: körtve alaku, hosszánál alacsonyabb vegtesttel, melyen a fekete foltocska neha igen kicsiny, a földszürke alapszínezet neha világos.

A tapogató rövid, rozsdavörös, terdize igen rövid, kitüntetes nélküli, száríze kehelyszerű s a pikkely úgy mint másfelől a gyűjtővel is mintegy összeforradt; a pikkely a szárba egy tompa nyújtvánnyal csuklódik, befele es oldalt fordított kanálalakú, kisse tompa orrú. A nemzőszerv, kívülről oldalról tekintve, egy egyszerű hengeres gyűjtőt mutat, mely a pikkelyt teljesen kitölti s elül egy egyszerű, csavarodó, sötét-színű, szárválaku, hosszában esatornás embolusba vegződik.

Mertekek: ♂ Törzs	5 $\frac{m}{m}$ ebből
fejmell	2.1 »
I lábpár	18 »

Egy alak, a melyről azt tartja a tudomány, hogy külföldi növényekkel hozatott be Europa virágházaiába s meghonosulván, elterjedett. A virágházakat azonban mindenek előtt kedveli, hol a sarkokban terjedelmes hurokhálót sző. A nőstény 3—5 borsó nagyságú, barnás burokba helyezi el peteit s e burkokat a hálóbá neha szetszórtan is elhelyezgetve, gondosan őrizi. Ismerem eddig, erdelyi részekből: Kolozsvárról (regi botanicuskert virágháza), Görgeny-Szt.-Imreről (kastely zugai); magyar részekből a Dunaszorosból (Ó-Ogradena mellett Bachmayer-fele füresztelep barakjai). — Juniusban ivarérett.

SPEC. 2. FAJ. THERIDIUM FORMOSUM. (CL.). DÍSZES T. GESCHMÜCKTE Z.

(formosus = jóltermett, szép; itt a színezett ékességéről.)

Syn. 1757. *Araneus formosus* + *lunatus* CLERCK «Ar. Suec.» p. 56, 52.

Vide: THORELL «Remarks» p. 81.

♀ A Th. tepidariorumnál állandóan kisebb (5—5.5 $\frac{m}{m}$ törzs); vegteste hosszánál sokkal magasabb (4.4 $\frac{m}{m}$), elenk es sokszínű rajzokkal borított, a rajzok a hát csücséből indulva λ szerűen boesátkoznak az oldalakba. Az alapszín sokfelekepen változó; egy a fonók felett kezdődő s a hát legmagasabb pontját megközelítő, nyelvalakú, szélességénél magasabb, világos czímer állandó. A negyedik lábpár szárának vege mindig élesen, söteten gyűrűzött; a lábak mindig világos színűek, neha elmosódottan-gyűrűsek.

A fejmell módosan fejlett, fejeresze a háttal egy szívonálban s ékszerűen elválasztott, a mellreszhez kepest keskenyedő; színezete az alapszínhez kepest változó; a sötét, neha fekete alapszínezetű példányoknál rendesen szennyesbarna, a vörössesárga alapszínűeknél legtöbbször rozsdabarna s ez utóbbiaknál neha a fejrészen áttört füstös rajzzal. A mellvert színe a fejmell hátrészevel megegyező. A ragok hengerdedek, párhuzamos oldalakkal, az alapszínezethez kepest világosb vagy sötétebb vörössesbarnák. Az állkapcsok

hosszuk, az alajk felett majdnem érintkezők, a rágók alatt néha csekély mertekben kiállók, rendszeren ezekkel egyenlően kinyújtottak. A tapogató kurtá, végize kuposodó, sűrűn szőrös, a czombbal egyenlő hosszu-ságu, a szárnál kétszer hosszabb.

A lábak módosan fejlettek, sárgásak, vagy vörössesárgák; az első lábpár szára néha besötétített, a negyedik lábpár szára végén mindig egy szembetűnő, sötétebb gyűrű.

A végtest magasan domborodó, oldalról tekintve egy hasas körtehez hasonlít, melynek csucsán a fonók kepezik. Alapszínezete feketes vagy elenken vörössárga, az uralkodó szín a végtest csucsán sötét foltokat kepez, melyek néha egy emberi ábrázatra emlékeztető csoportosítást mutatnak. E foltok közül rendszeren egy feheres \propto szerű világos ágrajz nyomul mindket felől az oldalakra; szárai közé zárva, de nem általuk szegélyezve terül el a nyelvalaku czímer, mely ritkábban (a világos példányoknál) elmosódó. A has barnás vagy sárgás; a légzőres mögött rendszeren egy feheres harántfolt, oldalról néha egy-egy rövidke, feher szegélycsík.

Az alsó sor középszemei feketek (nappali), tetemes dudorokon fekvők, a többi szem gyengén opalizáló (éjjeli). A hátsó sor közel egyenes, a középszemei közötti távolság a legnagyobb szem átmérőjét meghaladja s nagyobb annál a körnél is, mely a hátsó oldalszemeket a hátsó középsőktől elválasztja. Felülről tekintve, az elkerekített homlok a szemek előtt kiálló.

A zár egy kerülekidomú, kisse felvetett, keskenyszelű egyszerű nyilást mutat (\subset).

Mertekek: ♀	Törzs	5.5 $\frac{m}{m}$ ebből
	fej mell	2 »
	végtest magassága	4.5 »
	I lábpár	10 »

Hosszaránya a lábakra: 1, 4, 2, 3.

♂ kicsiny, karesű, mindig (legalább saját tapasztalásom szerint) elenken rozsdavörös előtesttel és lábakkal; a végtest alapszíne rozsdabarna, rajzai összefolyók, a \propto szerű feher ágak azonban mindig megvannak. A negyedik lábpár szára a végén sötét gyűrűvel. A tapogató rozsdavörös; terd- és szárize igen rövid, az utóbbi csészeszerű, pikkelye oldalt befelé fordított, kanálalakú, a közel gömbölyű és benyomott, egyszerű gyűjtő felett kinyúló. A gyűjtőből egy csőralaku, fekete, esavart s előre irányzott — a pikkely orrát meghaladó — embolus meredez kifelé.

Mertekek: ♂	Törzs	3 $\frac{m}{m}$ ebből
	fej mell	1.2 »
	I lábpár	7.5 »

Az aljakban mindenütt közönséges alak, mely kertekben a kerítések zugaiban, a kerti lakok gerendázatán, az őlfa közeiben, erdőkben bokrok között, ernyővel ellátott hurokhalóját (I. kötet, II. t. 52) feszítgeti, rendszeren az ernyő alatt tartózkodik s a hálónak más mint preda általi megrezzenésére a földre ejti magát, hogy később a maga után fejtett fonalon ismét felkapaszkodjék. Nyár elején ivarérett. A nöstény 2—3 kis burokba szövő peteit s a burokat az ernyő alá helyezve gondosan őrzi.

Ismerem, erdélyi részekből: Kolozsvárról, Mező-Záhról és Dicső-Szt.-Mártonból; magyar részekből: Doroszlóról, Apatinból, Pancsováról, Palánkáról, Mehádiáról, Suppanekről, Orsováról, Jeselnitzáról, S.-A.-Újhelyből, Ungvárról, az Alsó-Hamorból (Hollós), Diós-Győrből.

SPEC. 3. FAJ. *THERIDIUM DENTICULATUM*. (WALCK.). FÜRÉSZES T. GESÁGTE Z.

(dens = fog, denticulatum, diminutiv = apró fogas; a végtest rajzára czélez.)

Syn. 1802. *Aranca denticulata* WALCKENAER, Faun. Paris. II, p. 208.

Vide: THORILL. «Remarks» p. 83.

♀ Szürke (sárgásfeheresen es feketén porozott) gömbölyű végtest, felül egy, sárgásfehér, kirívó, mindket szelen csipkes szalaggal, mely a végtest elejétől a fonókig terjed. A fej mell barnás. A lábak sárgás-

feherek, barnásan, sűrűn, inkább foltozva mint gyűrűzve. — A fejmell kicsiny, szivalakú; fej és hátrésze egyenlő magasságu, a fejrész keskenyedő, ekalakra elválasztott, bekelődése végén sötettedő; az egész test-rész szennyesbarnás. A mellvert aránylag széles szivalaku, barna. A ragók aránylag hosszúk, hengeresek, párhuzamos oldalúak, vörösesbarnak. Az állkapcsok keskenyek, a felkörü, alacsony alajkra hajlók, az állkapcsok végét erőik, különben barnák.

A tapogató sárgás, kurta, végze kisse kupos, szőrös, szára rövid, a végén egy keskeny barnás gyűrűvel. A lábak karesuk és vekonyak, halvány sárgásfeherek; ezombjaik néhány barna folttal, végzeik széles barna gyűrűvel díszítettek.

A vegtest majdnem gömbölyű, hosszánál csak igen kevéssel alacsonyabb és alig keskenyebb; rajza mint fennebb. A has fekete, a fonok előtt egy nagy sárgásfehér folttal.

Az alsó sor két középső szeme fekete (nappali), módos dudorokon elhelyezett; a többi szem igen csekély mertekben opalizáló (éjjeli). Az alsó sor középszemei megkülönböztethetőleg távolabbra egymástól, mint a hátsó sor középszemei; ez utóbbiak közötti köz alig szem átmerőnyi. Az oldalszemek érintkezők, a hátsók a hátsó középsőktől valamivel távolabbra mint a középsők egymástól. A homlok széle a szemek előtt kisse kiálló, igen csekély mertekben behorpasztott.

A zár egy éles szelű, szépen kerekded, homorú kivájas (\supset).

Mertekek: ♀ Törzs	3·8—4 $\frac{m}{m}$ ebből
fejmell	1·4 „
I lábpár	6·8 „

Hosszaránya a lábknak: 1, 4, 2, 3.

♂ igen karesú; fekete eres, különben barna fejmelle szélesedő; vegteste fekete, enyesző csipkes szalagát világos, ríktő foltok jelölik; karesu labai olajsárgák, sötetbarna foltokkal és gyűrűvel ekesítettek. — A tapogató rövid; terd- és szárizei különösen rövidkek; pikkelye oldalt befele fordított, kanálalaku, jól domborodó; nemzőszerve egy vaskos egyszerű gyűjtő, mely a pikkely ürt egészen kitölti, a végén két feketes, kicsiny dudorral.

Mertekek: ♂ Törzs	2·8—3 $\frac{m}{m}$ ebből
fejmell	1·3 „
I lábpár	6·5 „

E csinos faj a köveket és sziklákat különösen kedveli, de ereszek alatt is előfordul, hol tavaszkor és a nyár elején hurokhalóját szövő nyugvó helyetrendesen resekben és ripacsok alatt keresi; ernyőt készíteni nem láttam. Juniusban ivarérett. Ismerem magyar részekből: Orsováról (Allion-hegy), Meladia (fehér kereszt sziklái, Damoclet csuca), Ogradema (Csukár máre szikla), Baziásról, Szajol (csarda eresze), Tokajból (kőbánya), Alsó-Hámorból (Szeleta szikla), Pest vidéke (Muz. gy. Frivaldszky Janos), pesti temetők (Muz. gy. Pavel).

SPEC. 4. FAJ. THERIDIUM RIPARIUM. BLACKW. PARTI T. UFER Z.

(ripa = part, folyókról és patakokról; a tartózkodásról.)

Syn. 1834. *Theridium riparium* BLACKWALL «Researches in Zool.» p. 354.

Vide: THORELL «Recherchs» p. 82.

(MENGE, «PREUSS. SPINN.» II, p. 153 sub. *Stentodon saxatilis*.)

♀ Előteste világosabb vagy sötétebb gesztenyeszínű; vegteste szinten ilyen színű, hátfelén fehéres pontokkal és övekkel tarkított, az utóbbiak közül legjobban kirívó a vegtest közepe táján keresztbefutó öv, mely közepén meg van szakadva; hasfele gesztenyeszínű, ritkan nemi fehéres pontozattal. Labái világos-

sárgák világosbarna gyűrűzettel. A zár egy egyszerű elliptikus nyílás, mely parzás idejen meglehetősen kiemelkedik.

Mertekek: ♀ Törzs	3 $\frac{m}{m}$ ebből
fejmell	1.5 »
I lábpár	7 »

♂ valamivel karesubb, hasonló színezetű. A tapogató térdizén egy hosszabb és egy rövidebb serte; a gyűjtő karikaakaku; az embolus a töven széles, végefele hirtelenül arformára vékonyodo, mellette egy széles, levelalakra kimetszett tarto, egy erős, köbökakú oldalfoggal.

Mertekek: ♂ Törzs	3 $\frac{m}{m}$ ebből
fejmell	1.2 »
I lábpár	7.5 »

Nagy-Szeben videkeröl «Th. saxatile Koch» nev alatt felsorolta SILV. V. Peldányokat nem láttam.

SPEC. 5. FAJ. THERIDIUM VARIANS. HAHN. VÁLTOZÓ T. VERÄNDERLICHE Z.

(varians = változó; a színezet állhatatlanságára czéloz.)

Syn. 1831. *Theridium varians* HAHN, «Die Arachniden» I. p. 93.

Vide: THORELL «Remarks» p. 85.

♀ Zöldessárga. A végtest hátfelén néha két fekete, egyenetlenszelű hosszcsík, néha az egész felület tiszta fekete s csak az oldalak és a fonók feletti rész zöldessárga. A vörössessárga fejmellen egy széles barna középsík s ez állandó. A végtest jól kinagyasodott, olyan magas a milyen hosszú.

A fejmell kicsiny, szivalaku; fejerésze egyszerűen elvasasztott, a mellrészszel egyenlő magasságu. A hátsó középszemektől indulva egy széles barna csík vonul a nyelecskéig vagy legalább a hátgödörig, hol rendszeren kissé összeszorul. A mellvert sárgászörös, egy hajszálfinom, a csipőknek megfelelően megszakasztott fekete szegélylyel. A rágók keskenyek, hengerdedek, párhuzamosak, sárgászörösök. Az állkapcsok keskenyek, az alajkra hajlók, a rágókkal egyenlő hosszúságúak és sziműek. A lábak karesűk, igen vékonyak, világos zöldessárgák némi igen halvány gyűrűzettel. A végtest gömbölyű, halvány zöldessárga, változó fekete rajzzal, mely, ritkán, egészen is hiányzik, legtöbbször () szerű, egyenetlen szélű csíkot kepez, gyakran pedig egy fekete folt, mely két rövid szárát bocsát a fonók felé. A has zöldessárga.

Az alsó sor két középső szeme fekete (nappali), a többi szem opalizáló (éjjeli). A négy középszem derek négyszögben elhelyezve; a hátsó szemátnérőnyire egymástól s a hátsó oldalszemektől egy szemátnérőnel valamivel távolabbra. A hátsó szemsor sugáregyenes, az alsó kihajló s a homlok szeletétől körülbelül oly távolságra, a mely középszem négyszöge magasságának megfelel. Felülről tekintve a homlok csak kevesse kiálló.

A zár egy sötét vörösbarna, a has világos színezetéből kirívó, aránylag terjedelmes és kiemelkedő köldök, mely egyszerűen kivájt; kerete, a légzőres legemelkedettebb oldaláról tekintve ~ szerűen kinetszett.

Mertekek: ♀ Törzs	3 $\frac{m}{m}$ ebből
fejmell	1 »
I lábpár	7 »

Hosszaránya a láboknak: 1, 4, 2, 3.

♂ karesű, színezetre és annak változataira nevezve a nősténynyel egyező; a fejmell barna csíkja sokkal élésebb, a szivalaku mellvert szegelye megszakadás nélküli. A hason a légzőres feletti rész barna, köldökszerűen kidomborodó. A lábak és a tapogató vörössessárgák. A tapogató rövid; térd és száríze igen rövid; pikkelye kanálakaku, jól bemélyedő; a több kígyózó forradást mutató, vörössessárga gyűjtő a pikkely

ürét egészen kitölti; oldalról tekintve a gyűjtő közepe táján egy belülről es lefele álló fekete, eltompított végű nyujtvány látható.

Mértékek: ♂ törzs	2·8 $\frac{mm}{m}$ ebből
fejmell	1·3 »
I lábpár	6·5 »

E csinos kis pókot magyar részekben csak egyszer találtam mint nyári alakot (junius) több példányban, még pedig a Tokaj és Rakamaz közötti egyes tölgyfák koronáján, hol kis hurok hálójat szöve; ernyőt nem vettem észre. Erdelyben Kolozsvár körül bokrokon gyűjtte Schusztzer Karoly.

SPEC. 6. FAJ. THERIDIUM SISYPHIUM. (CL.). SISYPHUS T. SISYPHUS Z.

(Sisyphus, a mythos kőgördítője; a kis állat peteburkaira, vagy arra vonatkozik, hogy gyakran leejti magát s ismét az ernyőhöz kapaszkodik.)

Syn. 1757. *Araneus sisyphius* CLERCK, «Aran. Suec.» p. 54.

Vide: THORELL «Remarks» p. 86.

♀ Levelalakú színes hátmezővel, melynek fehér bordái a fehéres oldalakból nyomulnak be; a végtest vége fele egy, a fonóig lehatoló fehér közepesik; a hason, közel a fonókhoz, állandóan egy tompa háromszögletes fekete folt. A végtest gömbölyű s csak a fonók képeznek némi csücsösödést. Az oldalak mindig szennyesfehérek. A hátmező közepe legtöbbször fahéjbarna, szélei szélesen feketek, az oldalakból benyomuló fehér ágak által levélmódra bordázottak. Az előtest és a végtagok sötétes vörössárgák, barnával jegyzettek. A fejmell szívalakú, fejerésze módosan elválasztott, keskenyedő; az egész sötétes vörössárga. A hátsó szemsortól, s oly szélesen mint e szemsor, egy barna csik indul s a hátgödörön át a nyelecskeig tart; a mellresz szélei barnulók. A szívalakú mellvert egyszínűen vörössárga. A rágók keskenyek, párhuzamosak s ilyenek az állkapcsok is, melyek az alajkra hajlók, vörössárgák. A tapogató rövid, sárgászöröses; végíze kissé kúpos, hosszabb mint a térd és szár együttve. A lábak karesuk, vörössárgák, a czomb-tövek kivételével valamennyi csukló barnavörös gyűrűvel ékített. A végtest gömbölyű, színezete fennebb leiratott. A has, úgy mint az oldalak, szennyesfehér, néha barna foltos; a fonók előtt egy fekete, tompa-háromszögű folt. Az alsó sor középszemei feketek (nappali), a többi igen gyengén opalizáló (éjjeli), valamennyi közel egyforma nagyságú s egyformán kiálló. A négy középszem derek négyszögbe elhelyezett, a hátsók közötti köz több mint szemátmérőnyi s egyenlő avval, a mely a hátsó oldal és középszemek között létezik; felülről tekintve, az alsó sor könnyedén kihajló, a hátsó könnyedén behajló.

A zár egy egyenletesen és alig kiálló barna keret, mely egy kerekded \subset egyszerű kivajást bekerít.

Mértékek: ♀ Törzs	4·5 $\frac{mm}{m}$ ebből
fejmell	1·7 »
I lábpár	8 »

Hosszaránya a lábknak: 1, 4, 2, 3.

♂ előttem ismeretlen.

Mint nyári alak és olyan, a mely a havasok fenyőövébe is felhatol, de az aljakban és síkon is található; gyakran előfordul. A havasokon jelesen a Juniperus-bokrokat kedveli, melyeken hurokhálójat feszítgeti, sűrűn és finoman bélelt, fészekszerű, lefele néző ernyőjét rendszeren egy kiálló ág tűi közé szövi, illetőleg magyaktól is összeszövőgeti, itt őrzi 1—2 gömbölyű, zöldesszürke peteburkát, mely mindössze 30—40 petét tartalmaz. Fiait eteti, úgy, hogy a hálóból akadtt prédát hátsó lábához kötve, az ernyő alá viszi, ott megerősíti, mire a fiak elborítják s csakhamar ki is szívják az áldozatot. Hímjét találmom nem sikerült.

Ismerem magyar részekből: Szajolról (Alföld), az Alsó-Hámorból (Borsodmegye), esorbai tó, (Liptó, Kárpát, a fenyőövény), Luesivnárol (Szepesmegye, Szakmár Donát parkja), Pribilínáról (Liptó, «Zakameniszko» Pongrácz-fele major), Likauka (Liptó, várhegy); erdélyi részekből: Kolozsvárról és a csiki havasokról (Nagy-Hagymás alja).

SPEC. 7. FAJ. THERIDIUM PICTUM. (WALCK.). FESTETT T. BEMALTE Z.

(pictum = festett; a színezet élénkségéről.)

Syn. 1892. *Arauca picta* WALCKENAER «Faun. Par.» II, p. 207.

Vile : THORELL «Remarks» p. 83.

♀ A végtest gömbszerű, felül tiszta fekete alapszínű; a háton végig egy elenk vörösbarnás hosszcsík, mely két oldalt levelalakra fogacsolt és finoman, hófeheren szegelyezett; a fogacsok eles-hegyesek; oldalai szürkék s a hát fekete színebe hegyes fogacsokkal benyomulók, úgy azonban, hogy a közepesíkot nem érik s csipkézetők és a közepesik fogacsai között a fekete alapszín szélesen elterül. Az előtest és a lábak világos barnásvörösek, az előbbi közepesikos és szegelyes, az utóbbiak barnák, sűrű gyűrűzettel. A fej mell módosan fejlett, kissé szélesedő; fejrésze ekalakra elválasztott, keskeny, bebarmitott, homlokrésze, felülről tekintve, a szemek előtt nem áll ki. A fejrész bebarmitása esíkszerűen folytatódik a hátgödrön át a nyelecskeig. A mellrész oldalai szélesen és elmosódva bebarmitottak. A rágók hengerdedek, keskenyek, párhuzamosak, barnásvörösek. A mellvert szivalaku, barnásvörös, szelei szeles, elmosódó barna szegelylyel. Az állkapcsok keskenyek, a rövid elkerékített alajkra hajlók, a rágókkal egyenlő hosszúságra kinyulók. A lábak czomb- és száríze tövén, végén és valamivel a közepén felül sötétbarna gyűrűs, a gyűrűk szabálytalanok, cikázók. A has fekete.

Az alsó sor középszemei feketek (nappali), a többi szem kevéssé opalizáló (éjjeli); a négy középszem derek negyszögbe elhelyezett, a két hátsó közötti köz egy szemátnérőnél tágasabb; a hátsó oldal szemek a hátsó középsőktől valamivel távolabbra esnek, mint az utóbbiak egymástól. Az alsó sor és a homlok szele közötti ter a szemnegyszög magasságát alig meghaladó. A zár ket, a legzőres felett fekvő hosszukás, barnásvörös dudorodást mutat; inkább hártás mint chitines.

Mertekek: 4 Torzs	4 $\frac{mm}{m}$ ebből
fej mell	1.8 »
I lábpár	10 »

♂ előttem ismeretlen.

Mindössze egyszer találtam a Kárpátok alján a csorbai tó környéken, Juniperuson, mint nyári alakot.

SPEC. 8. FAJ. THERIDIUM FRIVALDSZKYI. N. SP. FRIVALDSZKY T. FRIVALDSZKYS Z.

(Frivaldszky János jeles magyar term. búvár tiszteletére.)

(VII. tábla 154, a szemállás, b törzs, c első lábpár, d a ♂ tapogatója, e mérték.)

♂ Előteste világos barnássárga, szelei barna finom szegelylyel, közepén egy finom barnás hosszvonással, mely a fejrész felé villára oszlik, a szemesorportot azonban nem éri el. Lábai világos barnássárgák, minden íz vege széles, feketes gyűrűvel díszítve. A végtest felülete fehér, hat vagy hét fekete ponttal, melyből három a közepre esik; a végén, két oldalt egy-egy terjedelmesebb fekete folttal. Hasa barnás. A foltok rendszeren kirívóan elesek, csak néha kissé összefolyók.

A fej mell szélesedő; mellrésze körded, közepén, hosszában, kisse esatornásan benyomott, a fej módosan emelkedett. A mellvert szivalakú, barnássárga, finom, fekete szegelyű. A szájrészek vörösesbe húzó-barnássárgák. A lábak hosszuk, igen karsuk, gyűrűzetük kirívó; minden terdiz csucsán egy finom tapintó szőr. A végtest tojásdad, oldalról tekintve kisse magas-íves emelkedesű.

A két sor középső szemei derek negyszögben állanak, az alsók kisebbek és feketek, a hátsók opalizáló. A hátsó szemsor alig észrevehetően behajló, az alsó kihajló; a hátsó sor szemei egyenlő távolságra egymástól; az alsó sor középsői távolabbra a homlok szeptől, mint a hátsó sor középsőitől.

A tapogató karesu; terdize vastagságánál nem hosszabb, száríze meg ennél is rövidebb s külső oldala végéből egy hosszú, keskeny, tompavegű nyújtványt bocsát, mely, a nemzőrészhez alkalmazkodva, előre irányul. A gyűjtő külső oldala körtealakú, kissé lapított s e lapján egy kigyózó sötétebb csíkot visel.

Mertekek: ♂ Törzs	3.5 $\frac{m}{\mu}$ ebből
fej mell	1.5 „
I lábpár	11.5 „
II „	7.3 „
III „	5.2 „
IV „	7.5 „

♀ Elöttem ismeretlen.

E szép fajt a Tokaj és Rakamaz közötti tölgyeken találtam júniusban; Frivaldszky ur Pees környéken gyűjtött szinten egy ♂ példányt. Júniusban ivarérett. Eddig sehol sem íratott le.

SPEC. 9. FAJ. THERIDIUM TRISTE. HAHN. GYÁSZOS T. TRAUFER Z.

(tristis = gyászos; a sötét színre ezélez.)

Syn. 1831. *Theridium triste* HAHN, Die Arachniden, p. 89.

Vide: THORELL «Remarks» p. 93.

♀ Sötét, fényes-fekete. A csipők, ezombok és lábvegek szennyes vörössesárgák. Kis alak, kis fej-mellel és hólyagszerű, nagy vegtesttel, mely hosszánál sokkal alacsonyabb és fénylő, a fonók felett messze kiálló. A fej mell módosan fejlett, feje része emelkedett, mell része a nyelecske fele lecsapott; az egész sötét-barna. A hátrafele csak kevesse csücsösödő mellvert kissé domborodó, fekete-fényes. A rágók kevesse hengerdedek, párbuzamosak, barnák; az állkapcsok és az alajk fényesfeketek, az előbbiek az utóbbi felett összehajlók s a rágókkal egyenlően kiálló. A tapogatók vaskosak; a végiz csücsösödő, a szárízzal egyenlő hosszúságú, alsó felén megfekvően szőrös. A lábak rövidek, kissé vaskosak; csipőik és ezombjaik szennyes vörössesárgák, az utóbbiak végükön barnan füstösek; a terd- és szárízek füstbarnák, a lábvegek vörössesbarnán világosodók. A vegtestnek hát- és hasfele fényesfekete. Az alsó sor középszemei feketek (nappali), a homlok felett kiálló tetemes dudorokra helyezettek; a többi szem elenken opalizáló (éjjeli). Mindkét sor középszeme hátrafele szűkülő trapezbe elhelyezett, a hátsó sor középszemei közötti távolság egy szemátmérőnél kisebb; ugyan e sor oldalszemei a középszemeknél másfel szemátmérőnyi távolságra állanak.

A zár egy barnafekete negyszög terese, mely a legzőres előtt egy hosszukás, keskeny, harántfekvő, egyszerű dudorodást mutat.

Mertekek: ♀ Törzs	3 $\frac{m}{\mu}$ ebből
fej mell	1 „
I lábpár	3 „

♂ előttem ismeretlen.

A lábak hosszarányát pontosan megalapítanom nem sikerült, MENGE szerint («Preussische Spinnen» pag. 176.) 1, 4, 2, 3.

Alakja szerint közelebb áll nemely Singákhoz, jelesen a *Singa pygmaea* SUNN.-ra emlékeztet; az éjjeli és nappali szeme közelebb hozzák a *Theridium*okhoz, míg a szemállás, jelesen a középszemek trapeze, ismét eltávolítja azoktól. Mindössze, a rendszerezés szempontjából, a nehezen beosztható alakok egyike, mely nemely Singakkal együtt az *Orbitelariak* és *Retitelariak* között mintegy átmenetet kepez.

Egyedül csak a Tokaj melletti legelők magános tölgyeiről ismerem, mint nyári alakot.

SPEC. 10. FAJ. THERIDIUM BIMACULATUM. (LIN.). KÉTPETTYES T. DOPPELPUNKT Z.

(his és macula = kétszer pettyezett; a végtest felületén álló két világos pontról.)

Syn. 1767. *Aranca bimaculata* LINNÉ «Syst. Nat.» Ed. XII, I, 2, p. 1033.

Vide: THORELL «Remarks» p. 87

♂ Karesú; rendkívül hosszú, vékony első lábpárral. Fejmelle vörösbarna; végteste tiszta fekete; lábai halavány szalmasárgák, tapogatói erősek, barnák. Fejmellének fejezése, oldalról tekintve, meglehetősen magasra felvetett; homloka a szemektől kifelé — a rágók tövére — rézsútosan leesapott. (A magyar példányoknál a végtest két pettye merőben hiányzik.) — A mellvért szélesen szívalaku, vörösbarna, az alajk mögött kissé csücsösen domborodó (mintegy golyvásodó). A rágók hengeresek, nyújtottak, párhuzamosak. A vörösbarna állkapesok keskenyek, egymásfelé hajlottak, a rágókkal egyenlő hosszúságúak; az alajk széles, alacsony, elkerekített. A lábak vékonyak, karesúk, egyszínűen szalmasárgák. A végtest keskeny, kissé hengeres, végevel igen módosan a fonók felett kiálló s úgy mint a has tisztafeke.

Az alsó szemsor két középszeme fekete (nappali), a többi szem esekely mértékben opalizáló (éjjeli); a négy középszem derék négyszögben áll. A hátsó sor négy szeme egyenlő távolságra egymástól, a közök körülbelül két szemátmérőnek megfelelők; e sor egyenes; az alsó sor, felülről tekintve, kihajló, a homlok széletől nagyobb távolságra, mint a mekkora szemnégyszög magassága.

A tapogató hosszú, aránylag erős, egészen barna; nemzösszerve hosszukás-bunkósan kivastagodott. A pikkely kanálalakú, oldalt befelé fordított s fekete, erős szőrözettel borított. A száríz messzire, nyújtva nyosan a pikkely ürebe nyomul, kívülről, oldalt tekintve, a pikkely vége fele egy oldalt kiálló, könnyedén hajlott, vastag, fekete és módosan hegyesedő embolus látszik ki.

Mértékek: ♂	Törzs	3	$\frac{m}{m}$ ebből
	fejmell	1.5	"
	I lábpár	9.3	"

Hosszaránya a lábaknak: 1, 4, 2, 3.

♀ előttem ismeretlen.

Mint nyári alakot csupán csak egyszer találtam a Tokaj és Rakamaz közötti tölgyeken. Erdélyben találtam Nagy-Szeben környékéről a Sill V. gyűjteményben.

SPEC. 11. FAJ. THERIDIUM PULCHELLUM. (WALCK.). CSINOS T. HÜBSCHÉ Z.

(pulchellus = esinos, szépséges; a végtest díszére vonatkozik.)

Syn. 1802. *Aranca pulchella* WALCKENAER «Fann. Par.» II, p. 208.

Vide: THORELL «Remarks» p. 89.

♂ Karesú, hosszalábú. A végtest sárgásfehér, felületen egy meglehetősen széles, levelmódra fogasolt, elejétől a fonókig nyúló, fahéjbarna közepesik, mely hegyesen indulva gyorsan szélesedik, a fonók fele ismét egyenletesen keskenyedik, végre csücsösen végződik. A fejmell és a lábak elenken vörössárgák.

A fejmell fejezése szélesedő, oldalról tekintve, kissé kiemelkedő, a mellrésznél sötétebb; a mellrész kissé lapuló, világos vörössárga. A szívalaku mellvért közbül világos vörössárga, szélein szélesen és elmosódva sötétebb. A rágók hengerdedek, párhuzamosak, jól kinyulók, vörössárgák; ilyen színűek az állkapesok is, melyek keskenyek, az alacsony, elkerekített alajkra hajlók, a rágókkal egyenlő hosszúságúak.

A lábak közül az első pár a többihez képest igen hosszú, kissé neki erősödő, elenken vörössárga czombokkal, halványabb szárakkal, melyeknek végei ismét elenkebb vörössárga színűek; a többi lábpár halavány vörössárga czommal. Valamennyi lábón a két lábvégig egy finom, barna gyűrű által elválasztott. A végtest az oldalakban egy, a nyelecske felől jövő, elmosódó bebarmitással. A has szennyes sárga-

barnás. Az alsó sor két középső szeme barna (nappali), a többi szem módosan opalizáló (éjjeli). A közep szemesoport derék négyszögbe álltva; a hátsó sor középszemei közötti távolság egy szemátmérőnél sokkal nagyobb, ugyane sor oldalszemei a középsőktől körülbelül másfel szemátmérőnyi távolságra elhelyezve. Az alsó sor a homlok széletől körülbelül annyira, mint a mekkora a szemegyszög magassága. A homlok függőleges.

A tapogatók nyele halványsárga, vékony; a nemzőszerv vörössárga, tetemesen kivastagodó és nyújtott; a térdiz a szárhoz kissé horgosan görbítve áll, a száríz kehelyszerű, kívülről és oldalról tekintve, kimetszett; a pikkely nyújtott, esüesosan-kanálalakú, befelé oldalt fordított; a nemzőszerv egy esavaros vörössárga gyűjtőt mutat, melynek végén egy serteszerű, hosszú, tisztafekeete embolus felülről le- és befelé, majd a pikkely csúcsa felé kanyarodik s így egy vörössárga, a pikkely csúcsába belefekvő, törsszerűen lapos és hegyes nyújtványt körülfog.

Mértékek: ♂ Törzs	3 $\frac{m}{m}$ ebből
fejmell	1.5 "
I lábpár	7.5 "

Hosszaránya a lábaknak: 1, 2, 4, 3.

♀ előttem ismeretlen.

Mint kora tavaszi alakot (ápril) csak egy himét ismerem Palánkáról (Bácsmegye). Erdelyből említi dr. Seidlitz és Sill.

GEN. 11. NEM. STEATODA. SUND.

(*στέαρ ὄλης* = faggyús, zsíros; a test zsíros fényére vonatkozik.)

Syn. 1833. SUNDEVALL „*Conspectus Arach.*“ p. 16; (ad partem).

Vide: THORELL „*On europ. Spid.*“ p. 93

Az oldalszemek érintkeznek; a hátsó sor behajló; valamennyi szem nagyobb mint a *Theridium* nemé. A hátsó sor középszemei ugyane sor oldalszemeitől oly távolságra állanak, mely kisebb a legnagyobb szem átmérőjénél. A végtest legtöbbször kurta-tojásdad, felületén kissé lelapított.

A rágók a lábak czombjánál vékonyabbak. A lábak fegyvertelenek. Ritkás, de annál terjedelmesebb vitorlát szövő fajok; a háló hurokkészlete, felül-alul terjedelmes, többnyire reszűntösen fekvő.

SPEC. 1. FAJ. STEATODA CASTANEA. (CL.). GESZTENYESZINŰ FAGGYÚPÓK. KASTANIENBR. FETTSP.

(castanea = gesztenyebarna szín; az általános színezetre ekezőz.)

Syn. 1757. *Araneus castaneus* CLERCK, „*Aran. Suec.*“ p. 49.

Vide: THORELL „*Remarks*“ p. 91

♀. Gesztenyebarna, szürkővel elegyítve. Az előtest és a lábak agyagsárgák vagy barnások, sötétebb gyűrűkkel. A végtest hátfelel a világosabb gesztenyebarna szín, egy az egész hátlapot elborító mezőt képez, mely a sötétebb oldalak felé, egy a végtestet vízszintes irányban körüljáró, hullámzatos fehér vonal által határoltatik. E körded mező egy, az egész hátfelel hosszában végig vonuló, finom, fehér középesik által két fele oszlik, a fehér csíkot a fonók felé 2—3 rövidke, finom, fehér harántvonalka keresztezi.

A has feheres, a fonók és légzőrés közé eső középterén két () szerűen álló barna foltal; a fonók két oldalán egy-egy commaszerű barna vonalka. — A fejmell mellrészre szélesedő-kerekded, módosan boltozatos, a hátgödörből csillagszerűen elrendezett barázdák futnak a lábak felé s e barázdák közei sötétesek; a fej keskenyedő, ekalakúra elválasztott, szemyes agyagsárga. A mellvert agyagsárga, kissé füstösödő szelekkel; különben szívalakú.

A rágók hengerdedek, aránylag kissé veznek, vörössárgák, a csipőköröm táján vörösbarnák. A keskeny állkapcsok az alacsony, elkerékített alajk felett összehajlók, a rágókkal egyenlő hosszúságra kiállók, agyagsárgák, a végük fele vörösbarna, kissé határozatlan szegélyvel.

A tapogatók agyagsárgák, a szár és végiz vege kissé füstösödő, szőrözetük jelentéktelen; a végiz a száznál hosszabb, a czombnál rövidebb. A lábak agyagsárgák (az elő állatnál a szín sajátos füstösséggel fedett, mely a borszeszben gyorsan elenyészik); a czomb és száríz határozatlan, elmosódó közép és határozottabb véggyűrűvel; a második lábvég (metatarsus) vege szinten barnagyűrűs; különben arányos fejlődésűek, szőrösök; a szőrök apró, fekete gombocskákból indulnak. A végtest az előtesthez képest puffadozó, szélesen-tojásdad, kissé lelapított, faggyúfényű, majdnem csupasz (színezetét lásd fennebb).

A szemek nagyocskák. Az alsó sor két középszeme fekete (nappali), a többi szem opálizáló (éjjeli). A négy középső szem deréknégyszögben elhelyezve egymástól egy szemátmérőnél kisebb, távolságra; a hátsó sor oldalszemei a hátsó középsőtől alig szemátmérőnyire. A hátsó sor — felülről tekintve — közel egyenes, az alsó kihajló; az utóbbinak a távolsága a homlok szelétől a középső szemnéyszög magasságánál valamivel nagyobb.

A zár egy világosvörössárga, jól kimagasló, kissé haránt elnyúló köldök, élen egy emberi zárt szájhoz hasonló hasitékkal, melynek közepéből egy terjedelmesebb benyomás nyulik hátra fele (A).

Mertekek: ♀ Törzs	7 $\frac{m}{mm}$ ebből
fejmell	2·7 „
I lábpár	1·2 „

Hosszaránya a lábknak 1, 4, 2, 3.

♂ Keresőbb, kerekdedre fejlett, elenkebb vörössárga színű előtesttel és lábakkal, egyébként a nőténynek megfelelő rajzzal.

A tapogató aránylag hosszú nyelű; térdize rövid, határozottan görbített, a száríznél sokkal rövidebb; a száríz a pikkely felé egyenletesen erősödő, úgy hogy a pikkely kapcsolati pontján a pikkely vastagságába mintegy átmenő. A pikkely kanálalakú, igen nyújtott, vekonyodó esüesbe kifutó, szőrös; a nemzőszerv sárgászöld, világos, a pikkely üregét kitöltő és kissé esavaros; oldalról tekintve, a gyűjtőhöz illeszkedve és előre irányozva egy erős, sötét-vörösbarna nyujtvány látható, mely kisse oldalt görbült és hirtelenül esüesosodó.

Mertekek: ♂ Törzs	6·6 $\frac{m}{mm}$ ebből
fejmell	3 „
I lábpár	13·8 „

E faj szorosan illeszkedik az ember háztartásához s csak igen ritkán található erdők szélén, ott is rendszeren emberi lakok közelében. A házak zugaiban, a szobákban épen úgy mint az élestárakban, istállóban, nevezetesen pedig az árnyékszékekben, egész éven át bőven található. Ritka vitorláját nagy terjedelemre szövi a sarkokba; a vitorla felett és alatt terjedelmes hurok-hálózatot készít s a helyiséghez képest majd a falon, majd tágasb repedésekben lesi a prédát. Több példány hálója neha összeér, úgy, hogy több állat érzi meg azon egy préda beakadását s valamennyi kirohan. A legerősebb rendszeren elveszi kisebb szomszédja prédáját, melyet a fonalak elragása által kiszabadítva, hátulsó lábainak egyikéhez köt s így hálójába átezeget. A legnagyobb legyfelekkel, sőt erős bogarakkal (*Harpalus rufipes*) könnyedén megküzd s legyőzi. A préda beburkolását a hátsó lábpárral végzi. Sok ivarérett példánya réseken áttelel. Kora tavasztól késő őszig kapható s legalább két nemzedéke fejlődik ki egy idény alatt. Ritkás, gömbölyű, fehér peteburkát a sarkokba alkalmazza és gondosan őrzi. A hímek a párzás után gyorsan elpusztulnak; a nőstények az ifjú nemzedékek kikelését bevárják, s fiakat a második vedlésig gondozzák, mire elpusztulnak.

Ismerem erdélyi részekből: Kolozsvárról, Mező-Zárlról, Görgény Szt.-Imreről, Sárpatakról, Oláh-Fenesről, Parajdrol, Gyergyó-Szt.-Miklósról, Nagy-Szebenből (Sill és Bergleiter gyűjtemények) s még számos más pontról; magyar részekből: Doroszlóról, Apatinból, Ujvidekről (setahely akácza), Zimonyból (te-

herhajók belseje), Pancsováról (Wojlovitzi erdő széle), Meliádiáról (kutházak), Orsováról (Contumacia), Bázisról, Szajolról, Rakamazról, S.-A.-Ujhelyről, Ungvárról, Parádrol, Veszpremből, B-Pestről (Muz. gy. Pavel és Moesáry).

SPEC. 2. FAJ. STEATODA BIPUNCTATA. (LIN.). KÉTPONTOS F. ZWEIPUNCT F.

(bis et punctum = két pont; a végtest fehér rajzára ezélez.)

Syn. 1758. *Aranca bipunctata* LINNÉ «Syst. Nat.» Ed. X, I, p. 260.

Vide: THORELL «Remarks» p. 91.

♀ Megyszínbarna; a végtest felülete legtöbbször elmosódva világosabb. A végtest elejét egy fehéres vonal köríti; közepén, hosszában egy meglehetősen széles fehér esik vonul végig, mely közepe táján vagy megszakasztott vagy 2—3-szor kiszélesített, olykor elmosódott, gyakran pedig hiányzik is. A has közepe keskenyen barna, a fonókat — keskenyen — ugyane szín keríti; a barnaságban a légzőrés alatt egy világos folt; a has külső szélei szélesen sárgásfehérek s e szín a fonókat is bekeríti. A fejmell sötét vörösbarna, a lábak sárga vörösek, vörösbarnán sötétítve. Az egész test és végtagok szőrösek. A végtest az előtesthez képest igen puffadt, szélesen kördel, kissé lenyomott, élénken zsírfényű.

A fejmell szélesre fejlett, majdnem kördel, boltozatos; fejerésze ékalakra elváló, könnyedén emelkedett, keskenyedő, elől elkerekített. A mellvért vörösbarna, durván pontozott, szőrös. A rágók aránylag véznák, hengerdedek, vörösbarnák. Az állkapcsok kissé szélesedők, egészen az alacsony, félkerek alajkra hajlók, vörösbarnák, végök felé kissé világosodók. A tapogatók vörössesárgák, végizük bebarmitott, szőrös, a szárnál sokkal hosszabb, a czombnál sokkal rövidebb. A lábak meglehetősen vaskosak, aránylag rövidek (a *St. castaneáéhoz* viszonyítva), sárgászörösek, barnásan inkább sötétítve mint gyűrűzve.

Az alsó sor két középszeme fekete (nappali), a többi szem élénken opálizáló (éjjeli); az élő állatnál az opálizálás szabad szemmel is látható; a két sor középszemei derék négyszögbe elhelyezve, az alsók meglehetősen kidomborodók. Felülről tekintve, a hátsó sor valamennyi szeme közötti közök szemátmérőnyiek, a sor közel egyenes, az alsó sor oldalszemei a középsőkhöz igen közel állók s e sor a homlok széleitől oly távolságra esik, a mekkora a középső szemnégyszög magassága.

A zár sötétbarna, nem kiemelkedő; két tojóesővének kerek nyílása látható és egy **L** forma lemez által választatik el, illetőleg hátulról körítettik.

Méretek: ♀ Törzs 6.5 $\frac{m}{m}$ ebből
fejmell 2.5 «
I lábpár 8 «

Hosszaránya a lábknak 1, 4, 2, 3.

♂ Kisebb végtesttel, fejlettebb fejmellel, aránylag hosszabb, erős lábakkal. Színezete talál a nőstényével. A tapogató hosszú; térdize rövid, görbített, a módosan kivastagodott szárizzal *egyenlő hosszúságú*, mindkettő, felül, hosszú, erős szőrözettel borított. A nemzőszerv bunkószerűen s a szárnál sokkal vastagabbra kidagad, pikkelye oldalt befelé fordított, kanalakú, a vége felé kissé reszűntösen elmetsett; a nemzőszerv, a pikkely oldaláról s kissé előlről tekintve, egy szerfelett erős, hegyes, félkörbe görbített, vörösbarna nyújtványt tüntet elő, mely egy tűhegyes, finom, fekete embolust körít.

Méretek: ♂ Törzs 5.2 $\frac{m}{m}$ ebből
fejmell 2.3 «
I lábpár 9.5 «

Ennel valamivel kisebb is előfordul.

A *St. castaneáénál* sokkal ritkább s leginkább a szabadban, nevezetesen a fák elálló kérge alatt található, hol a szűk helyiséghez szabja hurokhálóját. Leginkább nyári alak. Szaporítását nem ismerem.

Találtam eddig, erdélyi részekben: Tordan (hasadek), Sárospatakon, Kolozsvárt, Nagy-Szebenben (Sill és Bergleiter gyűjtemény), Görgény-Szt.-Imren és a Csíkban (Balanbányán); magyar részekben: Doroszlón, Zomborban, Apatinban, Orsován, Pribilinan (Lipto, «Zakameniszko» Pongrátz-fele major), B-Pesten (Muz. gy. Frivaldszky I.), Ungvárt (Muz. gy. Vidra Ferdinand).

SPEC. 3. FAJ. STEATODA TRIANGULOSA. (WALCK.). HÁROMSZÖGÖS F. DREIECK-F.

(triangulus = háromszög; a végtest fehér rajzaira ezélez.)

Syn. 1802. *Aranca triangulosa* WALCKENAER «Fam. Par.» II, p. 207.

Vide: THORELL «Remarks» p. 505.

♀ Előteste vörösbarna; a végtest felülete szép sötétbarna, fehéres diszszel ékesített; e disz szembe-tünő része a közep csik, mely rendszeren négy Δ szerűen összetett háromszögekből áll, melyek nagyságsze-rint, a fonók fele, mindinkább csökkennék. A labak rozsdasárgák, az izek vegei gyűrűsen sötétedők. A fej mell kerekded, domboru, fejresze ekalakra elválasztott, keskenyedő, elől elkerekített. A mellvert vörös-barna, pontozott, gyéren szőrös. A rágók jól kinyújtottak, hengerdedek, párhuzamosak, barnavörösek; az állkapcsok a meglehetősen magas aljakra hajlók, szeleledők, világosb-vörösbarnák.

A tapogató rozsdasárga, módosan szőrös; végze a czomb hosszát megközelítő s oly hosszú mint a szár- és terdiz együttevve. A labak karesuk, arányosak, rozsdasárgák, az izek vegei láthatóan sötétebb gyűrűsök. A végtest rendes-tojásdad, nem lenyomott, barna; felülete közepen a fennebb leirt csik-kal, oldalaiiban egy-egy ekalaku és foltszerű darabokra szakgatott fehéres csikkal. A has barna, a fonók előtt két világos, commaszerű vonalkával díszítve.

Az alsó sor két középső szem fekete (nappali), a többi szem opalizáló (éjjeli). A négy középszem derek negyszögbe elhelyezve. A hatsó sor egyenes; a szemek közötti távolság egy szemátmérőnél valami-vel kisebb. Az alsó sor, felülről tekintve, könnyedén kihajló; távolsága a homlok szélétől másfélszer akkora, mint a mekkora a szemnegyszög magassága.

A zár egy a legzöres felett keretszerűen emelkedő barna koldók, a keretresz mögött egy egyszerű kivájjással.

Mertekek: ♀ Törzs	6	$\frac{m}{m}$ ebből
fej mell	2.5	»
I labpár	12.5	»

Hosszaránya a labáknak 1, 4, 2, 3.

Valfaj: ♀ szemnyes fehér hassal és oldalakkal; a közepesik háromszögei elfolyók, igen kiszélesedet-tek, éppen csak két barna, hullámos csik közze foglaltak.

♂ a nőstényhez képest igen kicsiny, karesu, fejlett előtestű. Labái és tapogatói sárgák, nem gyü-rűzöttek. A kis végtest eleje fehéres, mire egy csik következik, mely csak két nagyobb Δ -ból áll; a többi szin és rajz talál a nőstényével. A tapogató hosszú; szárze a terdiznél kétszer hosszabb, előre-fele egyenletesen vastagodó; a szár- és terdiz együttevve a czombnál rövidebbek. A pikkely kamalalakú, hir-telenül csücsökbe kifutó, szőrös, oldalt befele fordított; nemzőszerve sárga; a külső oldalról tekintve egy csatornás, vastag, száryszerűen hajlott nyújtványt mutat, mely a pikkely hegyet nem éri el.

Mertekek: ♂ Törzs	3.5	$\frac{m}{m}$ ebből
fej mell	1.6	»
I labpár	9	»

Deli alak, melyet Thorell tanár (l. e.) Flórencz és Nizza környéken gyűjtött, s melyet magam hazánk deli részeiből ismerék, hol a háztajakat, jelesen a kerti lakok cserzeit, az arnyekszekeket is lakja, s nyár derekán 1—2 ritka szövetű, hófehér peteburkot őriz, melyeket rendszeren gerendák és deszkák aljára erősít. Nem épen gyakori. Gyűjtöttem Doroszlón, Orsován és Pancsován.

SPEC. 4. FAJ. STEATODA GUTTATA. (WID.). CSEPPES F. GETRÖPFTE F.

(gutta = esep; a végtest világos rajzára vonatkozik.)

Syn. 1834. *Theridium guttatum*, WIDER «Zool. Misc.» p. 235 (241).

Vide: THORELL «Remarks» p. 93.

♀ Igen kicsiny (törzs $2,2 \frac{m}{m}$), sötét barnásfekete; a végtest hátfelén egy négy fehér pontból álló középsor, az első két pont nagyobb; mind a két oldalon két-két fehér pontocska; a has barnásfekete. A lábak barnásvörösek sötétebb ízvegekkel. A fejmell kerekded, a nyelecske fele szívformán kivágott, domborodó, sötét vörösbarna; fejcsze ekalakra elváló, keskenyedő; az egész felület durván pontozva-ránczozott, apró, gyér szőrözettel. A mellvert szívalakú, sötét vörösbarna, igen durván pontozott, gyér szőrös.

A rágók hengerdedek, párhuzamosak, jól kinyújtottak, az állkapcsok vörösbarnák, durva felületűek, az alajkra hajlók s a rágókkal egyenlő hosszúságúak. A tapogatók barnásvörösek, végzők valamivel hosszabb mint a szár- és terdiz együttveve, módosan szőrösök. A kisze vaskos lábak czomb- és szárvégei sötétedők. A végtest közel gömbölyű, zsirfenyű, szétszórtan pontozott keményes bőrrel fedett és igen gyér és jelentéktelen szőrözetű (színet lásd fennebb.)

Az alsó sor két középszeme fekete (nappali), a többi szem gyengén opálizáló (éjjeli). A középszemek derek négyszögben állnak. A hátsó sor négy szeme szemátmerőnyire egymástól; e sor egyenes, az alsó kihajló (az alsó sor távolságát a homlok széletől pontosan meghatározni nem sikerült).

A zár egy barnásfekete, a legzőres előtt és haránt fekvő, ránczolt hossznegyszögű lemezből áll, mely minden oldalán kisze kivágott, a hosszoldalakon nyílnak a tojócsövek.

Méretek: ♀ Törzs $2,2 \frac{m}{m}$ ebből
fejmell 1 »
I lábpár 3,8 »

♂ karesubb, feljettebb fejmellel, kisebb, kerek és gömbölyű végtesttel; egyebkent a nőstény színezetének megfelelő; a végtesten clenkebb sárgásfehér pontokkal, melyek közül némelyik látszólag két felből áll. A tapogató vörösbarna, hosszú és nagyon bunkós; terdize gyenge, rövid, száríze gömbösen dagadt rövid, a pikkelytől jól elválasztott, a terdizzel együtt a czombnál rövidebb. A pikkely kanálalakú, fekete-barna, szőrös; nemző szerve kívülről s oldalról tekintve egy egyszerű gyűjtőt mutat, melyből egy éles, hegyes, kurta, szurónyszerűen hajlott nyújtvány, e mellett egy λ alakú második nyújtvány meredezik; az előbbi a pikkely végét valamivel meghaladja.

Méretek: ♂ törzs $2 \frac{m}{m}$ ebből
fejmell 0,8 »
I lábpár 4 »

Csak egy párt ismerek, melyet az Alsó-Hámor (Borsodmegye) sziklagörgetegeiben, mint nyári alakot gyűjtöttem (MENGE szerint a színezet világosba változó, lásd MENGE A. «Preussische Spinnen» sub *Crustulina guttata*, pag 168).

GEN. 12. NEM. LITHYPHANTES. THOR.

(λίθος = kő, szikla, ὄφιντης = szövő; a tartózkodásról véve.)

Syn. 1869—70. THORELL On Europ. Spid. p. 94.

Az oldalszemek nem érintkeznek egymással. Az alsó sor és oldalszemek közötti távolság sokkal nagyobb annál, a mely a középsők között fekszik. A két sor középszemei dereknégyszögbe elhelyezettek.

A homlok alacsonyabb, magassága körülbelül a rágók felehosszanak megfelelő. Az első lábpár a többinél hosszabb, * a lábak fegyvertelenek.

* A magyar fajnál, a mely előttem ismeretes; a többi fajokra nézve e jegy állandósága kétséges; lásd: THORELL «On Eur. Spid.» pag. 77.

SPEC. I. FAJ. LITHYPHANTES COROLLATUS. (LIN.). KOSZORÚS KÖSZÖVŐPOK. BEKRÁNZTER STEINW.

(corolla = kis koszorú; a végtest rajzáról véve.)

Syn. 1758. *Aranca corollata* LINNÉ, «Syst. Nat.» Ed. X, I, p. 621.

Vide: THORELL «Remarks» p. 92.

♀ Barnásfekete. A végtest hátlapja finom, fehér diszszel; közbül hosszába sorakozott, rendszeren öt szerűen rendezett fehér foltpárral, melyek a végtest elején kezdődve, közel a fonóig érnek; az oldalakban, illetőleg köröskörül, egy fehér szegély, mely a végtest előfelen egyszerűen szalagos, hátsó felen ellenben cikázó. Az előtest sötét vörösbarna.

A fej mell szívalaku, feje része keskenyedő, ekalakra, módosan elválasztott; az egész szép sötét-vörösbarna, igen gyözen álló feheres, finom szőrökkel borított. A mellvert hátul majdnem elkerekített, szép sötét-vörösbarna, sok feheres szőrökkel. Elölről tekintve a rágók keskenyek, párhuzamosak, aránylag kurtak, körülbelül oly magasak, a mely magas a homlok a szemesoporttal együtt. Az állkapcsok az alajkra rahajlók, kifele résűntösek, a rágóknál valamivel rövidebbek. Az alajk széles, kissé esuesosodó; valamennyi rész vörösbarna, elmosódva-világosb vegekkel. A tapogatók vörösbarnák, egyszínűek; végzők rövidebb a czombnál s oly hosszú mint a szár és térd együttlve. A lábak arányosak; tökéletesen kifejlett példányoknál sötét vörösbarnák, a czombok töve elmosódva sárgás, ifjabb de szinten ivarérett példányoknál sárgászörösek s az ízek vegei vörösbarna gyűrűsök.

A végtest rendes tojásdad, meglehetősen nagy; hasán egy finom, feheres, neha enyésző közepvonással, mely a legzőres táján kezdődve a fonóig halad, hol vagy elenyeszik vagy \downarrow formán oldalágakat bocsát; a has két oldalán két () formán álló feheres csik, mely hátul neha a fennebb leírt koszorúforma oldalcsikkal összefoly.

Az alsó sor két középszeme fekete (nappali), a többi szem opalizáló (éjjeli). A két sor középszeme dereknegyszögbe elhelyezve, mely szélessegenel valamivel magasab; az oldalszemek nem érintkeznek, a közöttök levő köz sokkal kisebb annál, a mely az alsó sor oldalszemeit az alsó középsőktől elválasztja. A hátsó szemsor könnyeden, az alsó jól kihajló.

A zár egy kissé bemélyedő terese, mely a nyelecske felől ∞ szerűen határolt és sárgavörös; legzőres felől e teresebe egy barna, közel négyszögletes terese nyomul be, melyben a két tojócső nyílik.

Mértekek: ♀ törzs	4.4	$\frac{m}{m}$ ebből
fej mell	1.8	»
I lábpár	5.8—6	»

Hosszaránya a lábakra: 1, 4, 2, 3.

Válaj: egészen barnásfekete, csupán csak a háttest előfelen egy \neg alakú fehér iv.

♂ karesu; végteste keskeny, fej mell'e szélesre fejlett; lábai aránylag hosszúk. Szemezte es rajzai találnak a nőstényeivel, az utóbbiak mindössze finomabbak, neha kissé enyészők. A tapogatók meglehetősen hosszúk; a térdiz igen rövid, majdnem gömbölyű, a száríz előfele tágasan kehelyakaku, mind a kettő együttlve a czombnál rövidebb; a pikkely kanálakaku, esuesosan végződő, oldalt es befele fordított; a nemző szervből, kívülről oldalról tekintve, egy, kissé előre es lefele irányozott, egy rövidkormű madárújjhoz hasonló, hosszú, sötét színű nyújtvány meredez.

Mértekek: ♂ Törzs	4.7	$\frac{m}{m}$ ebből
fej mell	2	»
I lábpár	8	»

E csomos faj nem éppen gyakori. Mint nyári alak kedveli a kőgörgötegeket, hol a kovek alsó felen tartózkodik s az üregekbe szövi kis hurokhálóját. Juniushan a nőstény lazaszövetű, hófehér peteburkat gondosan őrzi. A burkot mindig a kő alsó lapjára erősíti.

Találtam, magyar részeken: Orsovan («Graczká volgy» patak görgötegek), Bazia on es S.-A.-Uj helyen («Kopasz» körakásai).

SPEC. 2. FAM. LITHYPHANTES PAYKULLIANUS. (WALCK.) PAYKULL K. PAYKULLS S.

(Paykull jeles rovarász tiszteletére.)

Syn. 1806—8. *Theredium Paykullianum* WALCK. «Hist. Nat. d'Arad» 4, 4.

Vide: THORELL «Descr. of several Europ. and N. African Spid. 1875.» p. 60—63.

♀ Nagy. Előteste sötét vörösbarna, végteste kekesbejártszó fekete, elejenek elén egy keskeny, halvány-aránysárga körszalaggal, mely az oldalakban elenyészik; lábai sötét meggyszínűek.

A fejmei jól fejlett, jól elvalasztott fejjel, laposan domboru, gyengen fénylő, keves szőrözettel. A mellvért szélesen szívalaku, sötét vörösbarna, fenyés, szőrözete apró gombocskákból indul, mi a vertnek szűrőszerű kinezest kölcsönöz. A rágók sötétvörösbarnák, erősek, fenyések, a belső részen sárgás szőrözettel. Az állkapcsok szelesek, összeérők, fővük sötét vörösbarna, végők sárgásan elmosva-világosodó; az alajk majdnem felkerek, magasságánál szelesebb, a rágók hossza egy harmadreszenek megfelel. A tipogató karesu, sötét meggyszínbarna, módosan szőrös, végze oly hosszú, mint terde és szára együttevve. A lábak karesúk, fenyések, elegendő szőrösök, minden szőr egy kis gombból indul s így, a hol a szőr lekopott, ott apró ripacsok láthatók. A végtest nagy, domboru, kerekded, zsirfenyű.

Az alsó szemsor középsői feketek, a többi szem mind gyantásárga; a két sor középsői oly dereknégyszögben állanak, mely szeleségénél magasabb; az alsó sor középsői s a homlok széle közötti ter sokkal nagyobb mint az a mely a két sor középsői között letezik; a hátsó sor középsői közelebb állanak egymáshoz mint soruk oldalszeméhez; az alsó szemsor igen módosan kihajló, a hátsó egyenes; az oldalszemek nem érintkeznek de közös, tetemes hosszududoron állanak.

A zár aránylag egy igen kicsiny, harántfekvő, egy lányszemhez hasonló hosszukás keret, melynek belsejét egy a keretnek megfelelő alakú, fenyés, keskeny dudorodás kepezi.

Mertekek: ♀	Torzs	12.5 $\frac{m}{m}$ ebből
„	fejmei	4.4 „
	I lábpar	16 „
	II „	13 „
	III „	11.5 „
	IV „	15 „

♂ Elöttem ismeretlen.

E nevezetes, kitünően deli alak feljedezesenek az érdeme Schusztér Károly kolozsvári tanítót illeti, ki e pókot Kolozsvár környéken silány növényzetű oly dombokon gyűjti, a hol tücskök tartózkodnak. Az eddigi észleletek szerint e pók kioldi a tücsköket, és elfoglalja lyukaikat, a melyekben valószínűleg tojik és peteit is őrzi. Schusztér ur tudósítása szerint az elfoglalt tücsöklük szája semmit sem mutat, a mi a pók jelenletet elárulná. Az ásatás meg nem fogatosított s így az életmód nemely részei meg ismeretlenek.

GEN. 13. NEM. ASAGENA. SUNDEVALL.

(A = prov. $\sigma\sigma\tau\tau\eta\eta$ = hálóz; tehát hálónélküli; arra látszik ezélezní, hogy rendszeren kóborolva található.)

Syn. 1833. SUNDEVALL Conspectus Arachn. pag. 19.

Vide: THORELL «On europ. Spid.» pag. 97.

A homlok magassága a rágók hosszúságával majdnem egyenlő. Az oldalszemek nem érintkeznek. Az alsó sor közep- és oldalszemei közötti távolság sokkal nagyobb annál, a mely az oldalszemeket egymástól elválasztja. A középszemek egy előre fele szűkülő trapezbe elhelyezettek. Az első lábpar a többinél hosszabb. A rágók a lábcomboknál gyengébbek.

SPEC. I. FAJ. ASAGENA PHALERATA. (PANZ.) ÉKES KÖRÖRPÖK. GEZIERTE IRISPINNE.

(phaleratus = homlok- és mellősszel ékesített; itt a test világos rajzairól véve.)

Syn. 1801. *Phalangium phaleratum* PANZER «Fam. Insect. Ger.» pag. 78. 21.

Vide: THORELL «Remarks» p. 87.

♂ Az előtest vörösbarna, egyszínű. A végtest sötét barnafekete; hátfelén, elől, egy \blacktriangle szerű sárgás-fehér kirívó rajzzal, melynek íves része a végtest elejét körülfogja, szára a végtest középtengelyében, fekvő a végtest hosszának alig egy negyedét éri el; szemközt e szárral a fonók felől szintén egy fehér vonás nyomul a hát lapjába, mindket oldalt pedig szintén egy-egy rövid sárgás fehér vonás indul haránt irányban, úgy hogy e fehér vonások $\frac{1}{4}$ szerűen állva, négy részre osztják a végtest hátlapját. A lábak vörössárgák tetemes beharmitásokkal, vaskosak, valamennyi ezomb ahil fűrészszerű fogakkal fegyverzett; e fogak az első és második lábparon egyenetlenek és részben szerfelett erősek (II. k. IV. t. 91. c).

A fejmell szélesre fejlett, a végtestnél nem keskenyebb s nem rövidebb; fejezérsze oldalról tekintve kissé nyergesen elváló és emelkedő; az egész durván harántránczolt és karczolt, vörösbarna. A mellvert széles-paizsalakú, végén alig csücsösödő, durván szemesezett, közepén egy hasitékszerű hosszbenyomással, különben vörösbarna.

A rágók aránylag kurták, vaskosak, párhuzamosak, barnászörösek; tövük a fejrész által mintegy sapkaszzerűen borított (II. k. IV. t. 91. b). Az állkapcsok vaskosak, egészen az alajkra hajlók vörösbarnák. Az első lábparon a ezomb és szár-ízek vastagodottak, mintegy dagadtak, vörösbarnák, a térd és végzek vöröses sárgák, világosabbak; a többi lábparon csak a ezombok dagadozók. Az első és második lábparon a ezomb és szár — a többiken csak a ezombiz fűrészfogas. A végtest elől elnetszett és keskenyebb mint az oldalvonások táján, melyeken túl tojásforma csücsben végződik. A has barnafekete.

A szemek aprók. Az alsó sor két középsője fekete (nappali), a többi opalizáló (éjjeli); a két sor középsői egy előre felé módosan szűkülő trapezbe elhelyezettek; az oldalszemek közös dudorokra helyezve, de nem érintkezők; az alsó sor középszelei szintén közös dudoron állanak, a köztük és az alsó oldalszemek közötti tér sokkal tágasabb annál, a mely az oldalszemeket egymástól elválasztja. A hátsó sor alig észrevehetőleg behajló; az alsó kömnyedén kihajló s a homlok szelétől oly távolságra, a mely a szemtrapez magassága háromszorosának megfelel. A tapogató vaskos, nemzőszerve feltűnően vastag és hosszan-bunkós. A térdiz kurt, a száriz kehelyszerűen és annyira vastagodott, hogy a pikkely tövének látszik lenni. A pikkely oldalt befelé fordított, kamélaalakú, csücsösödő vége kissé esavarodó és oldalt kifele forduló; nemzőszervét egy hosszú, erős, serteszerű, a pikkely csücséhez közel induló \mathcal{C} formára görbített embolus jellemzi, mely alsó görbületevel a pikkely tövét eléri.

Mertekek: ♂ Torzs	5 $\frac{m}{\mu m}$ ebből
fejmell	2.5 »
I lábpar	5.5 »
IV »	6 »

Hosszarány tehát a hímnel voltakeppen 4, 1, 2, 3.

A nőtény előttem ismeretlen. Menge szerint («Preussische Spinnen» p. 256) színezete a híméhez hasonló, vén korában a végtesten csak a fehér ívonal maradna észl.

Saját gyűjteményemben I ivarérett hím Szász-Vesszősről Erdélyben, néhány hím a kolozsvári muzeumban, saját gyűjtésem. Egészben véve ritka s leginkább verőfényes gyepek és köves dombokon kapható, hol vagy barangol, vagy kövek alá megvonul. Ifjú nemzedekét többször találtam Doroszlón és egyszer Lykankán (Liptó) a várhegy verőfényes oldalán; ez utóbbiak harmadvedlésűek, színök azonos a leírt hím színével s csak az előtest és a lábak világosabbak, módosan fejlettek, az utóbbiakon a fűrészfogasolás merőben hiányzik; a tapogató bunkója nagy és sima. Ezekből következik, hogy a nemmel járó jegyek ezek között a lábak sajátságos fegyverzete az utolsó vedles alkalmával kepződnek. Westring e fajnak czipelő hangot is tulajdonít.

FAM. II. CSALÁD. SCYTODIDAE. CSUPASZOK. NACKTSPINNEN.

(σχυτος = bőr, εἶδος = külső; a látszólagos meztelenségről véve.)

SUBFAM. I. ALCSALÁD. PHOLCINAE. KANCsALOK. SCHIELSPINNEN.

(φολκός = kancsal; a szemesoport sajátosságáról véve.)

GEN. I. NEM. PHOLCUS. (WALCKENAER.)

(ut supra.)

Syn. 1805. WALCKENAER «Tabl. d'Arar.» pag. 80. (ad partem).

Vide: THORELL «On europ. Spiders» pag. 101.

Nyolcz szem; ezek közül három-három a homlok két oldalára csoportosítva nagyobb; a két csoport között, tehát a homlok közepén, két kisebb. A lábak igen vékonyak és rendkívül hosszúk. (A hímek nemző szervei igen szövevényesek, az egész tapogató rendkívül kivastagodott.)

SPEC. I. FAJ. PHOLCUS FORSKÅLII. THOR. FORSKÅL KANCsALPÓKJA. FORSKÅLS SCHIELSPINNE.

(Forskål jeles svéd kutató tiszteletére.)

Syn. 1870. *Pholcus Forskålii* THORELL «Remarks» p. 151.

♀ Végteste körtvealakú, szürkésfehér, feketés rajzokkal; magasságánál csak kevésbé hosszabb. A fej mell széles, tűnyeralakú, a hátgödörön túl egy mely csatorna, mely a nyelecske fele szélesedik; a mellrész szélei vastagon felgyűrődök; a fejrész keskeny, hosszas-élalakúra elválasztott, a hátgödör előtt kissé elmesztett, és egész hosszában lemezszerűen kiemelkedő (II. k. IV. t. 92. b, c); felülről tekintve, a homlok toldalékszerűen a szemek előtt kiáll.

A mellvért szélességénél alig hosszabb, a negyedik lábpár csipői között nem esücsosodó, különben vörössárga s gyéren szőrös. A rágók rövidek, hengerdedek, oldalról tekintve a homlokkal együtt térszerűen kiállók, vörössárgák és szőrösek, a csipőköröm táján kissé vöröslők. Az állkapcsok keskenyek, egészen az alajkra hajlók, esücsaikkal összeérők; az alajk széles-háromszögletes, a mellvérttel összeforrott. A tapogató vékony; végíze hegyesedő, vörössárga, a száríznel hosszabb, a czombnál rövidebb; valamennyi íz hosszú, serteféle szőrökkel ellátva, melyek a szár és végíz felső felén különösen fejlettek. A lábak rendkívül hosszúk és vékonyak, vörössárgák, a czombíz felső végén, a száríz mind két végén élénk vörösbarna gyűrűvel ékesített. A czombok alul, felül és oldalt számos serteszerű tüskevel (30—40) fegyverezettek. A végtest szürkésfehér, hátán elől rendesen két feketés folt, mely haránt és párban áll, e folt mögött 5—8 \approx szerűen rendezett feketés ágrajz, mely a fonók felé mindinkább kiszélesedik, (igen áztatott példányoknál és olyanoknál, a melyek épen vetkeztek, e rajzok néha igen határozatlanok, gyakran eltűnnek). A has szürkésfehér. A szemek barna gyűrűkbe foglaltak, gyantászerű fényűek és színűek (szürkületiek); a szemtér mindkét oldalán három-három szorosan egy csoportban, széleik azonban nem érintkezők; e két csoport közelebb egymáshoz mint a mennyi az alsó sor középső két kis szemének a térfogata (haránt ertve), e középszemek a homlok széleitől oly távolságra, mely az egész szemtér legnagyobb átmérőjét még valamivel meghaladja. A zár egy

kiemelkedő, háromszögletes, barnászörös köldök, melynek talpát az, egy zárt emberi szájhoz hasonló legzőres képezi.

Méretek: ♀ Törzs	6.5	$\frac{m}{m}$ ebből
fejmell	2.5	»
I lábpár	34—37	»

Hosszaránya a lábaknak 1, 2, 4, 3.

♂ karcosabb, kisebb végtesttel, egyébként színezet tekintetében a nőténynyel egyező, neha kissé elesebb rajzokkal. Az első lábpár czombján az alsó tüskesor erősebb tüskékből alkotott. A tapogató kurta, rendkívül vastag, majdnem hólyagos kinezesű, szalmasárga, mintegy áttetsző; nemzőszervének alkatrészei barnás vörösek. A czombíz, aránylag vékony töből indulva, kup alakra vastagodik, a térdíz igen rövid, a szár és czomb közé mintegy beekelt; a száríz, oldalról tekintve, tojás alakra dagadt, valamennyi íz között a legvastagabb; a végíz kurta és nem pikelylye alakított, csücsának külső oldalán egy hüvelykújszerűen kinyúló vörösbarna nyujtvánnyal, e mellett, a belső oldalon egy vékonyabb nyujtvánnyal; e nyujtványok alatt és befelé fordítva egy tökéletesen félgömb alakú, fehér gyűjtő dagadozik.

Méretek: ♂ Törzs	5	$\frac{m}{m}$ ebből
fejmell	2	»
I lábpár	32—35	»

E faj eredetileg is magyar példányokra alapítottatott (lásd Thorell *l. c.*), melyeket KEMPELEN LAJOS ur kapott, a melyek azonban tulságos ázás folytán a rajzokat nélkülöztek. Hazánk deli részében s itt különösen világosabb pincekben, árnyékos zugokban, istalókban igen gyakori s úgy látszik, hogy pincekben és istalókban az egész even át megszakadás nélkül előfordul; ivarérett példányai kora tavasszal épen úgy mint késő ősszel előfordulnak. A sarkokban rendetlen hurkókból álló gyér hálózatott sző, gyakran sajátságosan rezeg; párzáskor az ivarok a pincek boltozatán barangolnak. A nőstény nagy, gömbölyű peteit ritka szövettel gömbbé szövi össze s e gyömböt állkapessaival tartva folytonosan magával czipeli, a peték száma 30—36. Ismerem, magyar részekből: Zombortól lefelé Orsováig.

SPEC. 2. FAJ. PHOLCUS PHALANGIODES. (FUESL.) LÁBAS K. LANGBEINIGE S.


(φαλάγγιον = pók, kivált a «kaszáspók»; a lábak hosszúságáról véve.)

Syn. 1775. *Aranca phalangioides* FUESLIN «Verz. schweiz. Ins.» pag. 61.

Vide: THORELL «Remarks» p. 145.

♀ Végteste hengeres, magasságánál kétszer hosszabb, szürkésfehér, egyszínű. A mellrész kerek, domborodó, fehères, közbül egy terjedelmes vörösbarnás folttal, semmi csatornával. A fejrész, felülről tekintve, egyenlő oldalú háromszögletes, jól elválasztott, előtte a homlok csak kevéssé kiálló, a mellvért sárgásfehér, hajszálfinom vöröses szegélyezett. A rágók kurtak, hengeresek, kissé előre irányzottak, vörössárgák. Az állkapcsok keskenyek, egészen összehajlók; az alajk vaskos, a mellvérttel összeforrott. A tapogatók vékonyak, sárgások; a végíz csücsosodó, a száríz vele egyenlő hosszúságú, felül hosszú szőrös, a czombíznel rövidebb. A lábak rendkívül hosszúk, vékonyak, vöröses sárgák; a czombíz végén fehér, a térd barnászörös; a czombok sorban álló, szemölesszerű igen apró tüskékkel borítottak (tüskések?). A végtestet lásd fennebb; a has szürkésfehér.

A szemek fehéresek (éjjeli?), foglalatjuk csak barna foltos; a fej két oldalán álló három-három szem nagy, széleivel közel érintkező, a csoportok egymástól sokkal nagyobb távolságra mint a mekkora a közbül álló két kis, fekete (nappali) szem tereseje (haránt ertve). Az alsó szemsor csak kevéssé távolabb a homlok széletől, mint a mekkora az egész szemesoport szélessége.

A zár terjedelmesen, köldökszerűen emelkedve, szürkés fehér; nyílása a légzőrés közepe fölé esve a légzőrés szegelyével együtt  alakú és barnás vöröses.

Mértékek: ♀ Törzs	8 $\frac{m}{m}$ ebből
fejmell	2.5 "
I lábpár	47 "
IV "	31.5 "
II "	33 "
III "	25 "

♂ valamivel karesubb; színezete a nőstényével azonos; a fejmell középfoltja néha elhalványodott. A tapogató duzzadt, gyűrűze (trochanter) egy karesu tövisszerű nyújtványnyal, a száríz hengeres, a térdíz kurtá, mintegy beekelt, a száríz előrefele esüsesodó tojásdad, vastag, a végíz nincsen pikkelye alakítva, igen rövid, falgömbölyű rajta a gömbalakú fehères gyűjtő, közepén egy vörös, finom, abroncsszerű csikkal; a gyűjtő mellett s a végízből indulva oldalt és kifelé, egy a végén tetemesen szélesedett, elnetszett, ki és be nyomott nyújtvány, melynek belső ága vékonyabb, külső ága széles, mind a kettő kissé görbült.

Mértékek: ♂ Törzs	8 $\frac{m}{m}$ ebből
fejmell	2.6 "
I lábpár	48 "
IV "	34 "
II "	35 "

E pókot magyar részekben csak egyszer gyűjtöttem Sopron megye Nagy-Barom nevű községében, tyúkólakban, hol bőven előfordult; a pesti nemz. Muzeumban két ♀ Rákos-Palotáról, hol Pável János gyűjté. Erdelyből ismerem Kolozsvárról.

SPEC. 3. FAL. PHOLCUS PLUCHII. (Scop.) PLUCH K. PLUCH S.

(Pluch, mult századbeli természetbarát.)

Syn. 1763 *Aranca Pluchii* Scopoli «Entom. Carn.» pag. 404.

Vide: THORELL «Remarks» pag. 147, 148.

♀ Az előbbi fajoknál sokkal kisebb, végtete hengerded. Az egész állat világos hamuszín (borszeszen sárgásfehér); a fejmell némi halványbarnás rajzzal. Lábai vékonyak, hosszúk, sárgásfehérek, a czombyégek fehérek.

A fejmell majdnem kerek; mellrőse kávésan felvetett szélekkel és szakadozott barnás szegelylyel, közepén egy kettős csikkal, mely a fej hátsó szélét éri; fejerőse jól elválasztott, közel körded (haránt fekvő), előtte a homlok jól kiálló. A mellvert hátul elkerekített, különben sárgás, szélein a csipők állásának megfelelő világos foltokkal. A rágók rövidek, hengerdedek, oldalról nézve a homlokkal együtt ívesen kiálló. Az állkapcsok igen keskenyek, egészen a vaskos, közel háromszögletes alajk felett összehajlók, sárgások; az alajk a mellverttel összeforrott. A tapogató vékony, sárga; végize szőrös, hegyesedő, a szárnál kevéssel rövidebb. A lábak hosszúk, vékonyak, végig szőrősek. A has a végtesthez hasonló színű.

A szemek fehéresek (szürkületiek); a középső két kis szem feketős (nappali); a fej két oldalán álló három három szem nagy, jól összeérő, feketén keretézve, a két csoport egymás közötti távolsága valamivel nagyobb a két középszem teresejénél (haránt értve); előlről tekintve a két középső szem a két legalsóbb oldalszemmel kissé behajló sort képez.

A zár egy tetemes hosszúságú barnásvörös, duzzadozó, harántfekvő dudorodás mely egy vastagajku zárt emberi szájhoz igen hasonló.

Mértékek: ♀ Törzs	5 $\frac{m}{m}$ ebből
fejmell	1.6 "
I lábpár	20.5 "

♂ neha alig valamivel karesubb a nősténynél, sokszor igen karesű. A ♀-nyel egyenlő színezetű. A tapogató duzzadozó, czombíze hengerded, terdize igen rövid, mintegy beékel, száríze vastag, hossztojásdad; végíze nem pikkelyléc alakított, felgömbölyű, külső oldalán egy igen erős, vörösbarna, lapiezkás nyújtvány, melynek lapiezkája láthatólag behasított; e lapiezkás nyújtvány tövéen egy kis mellék nyújtványnyal.

Mertekek: ♂ Törzs	4·3 $\frac{m}{m}$ ebből
fejmell	1·7 »
1 labpár	22·5 »

Házak táján, jelesen ereszek alatt, zugokban épen oly otthonos mint a szabadban, hol a sziklás helyeket kedveli. Nyári alak, mely júniusban ivarérett. A nőstény 40—45 petét rejtő ritkás, kerek burkát, melynek szövete oly vékony, hogy a peték megszámlálhatók, folytonosan magával hordozza, még pedig allkapásaival tartja a burkot, melyhez igen ragaszkodik s ha elvetetik tőle, sokuig keresgéli.

Ismerem: erdélyi részekből: Kolozsvarról, Szent-Lászlóról, Tordáról (hasadék), Várfalváról (Aranyos szorosa); magyar részekből: Mehadiaáról, Orsovaról, Ó-Ogradenáról, Szajolról, Tarczalról, Ungvarról, az Also-Hámorbol és B.-Füredről; (a Muz. gyűjteményeben Ungvarról gyűjt. Vidra Ferd.).

SUBFAM. II. ALCALÁD. SCYTODINAE. HÁTASOK. BUCKELSPINNEN.

(vide «Scytodoidae.»)

GEN. 2. NEM. SCYTODES. LATR.

(vide «Scytodoidae.»)

Syn. 1084. LATREILLE «Nouv. Dict. d'Hist. Nat.» XXIV, pag. 134. (ad. partem.)

Hat szem, párosan és egy állítva, hogy az egyik pár a fej elejére, egy-egy pár a fej oldalaira esik. A fejmell hatul magasán domború. A rágók kiesények és veznek. A labák egy sánja- és két bordaskörömmel. *

SPEC. I. FAJ. SCYTODES THORACICA. LATR. HÁTAS CSUPASZPÓK. RUCKIGE NACHTSPINNE.

(thorax = mellkas; a fejmell domborodásáról véve.)

Syn. 1804. *Scytodes thoracica* LATREILLE «Tabl. méthod. in Nouv. Dict.» XXIV, p. 134.

Vide: THORELL «Remarks» p. 469.

♀ Zömök vaskos testű, vékonylabú alak. Sárgás, világos, nemi agyagyöröses lehelettel; az elő- és végtest úgy mint a labák is feketen, párduezszerűen tarkáltak. A fejmell a végtestnél valamivel magasabb, előrefele ívesen esőkkenő; a fejresz keskeny, határozatlanul elválasztott, elejen két kis csücsökkel; az egész vörössesárga, cikázó, fekete szegélyléc és hasonlószerű áttört középrajzzal, mely a szemek mezejét is elfoglalja s a mellreszen két egymás felett álló szívyszerű sz körrajzot tüntet elő. A mellvert keskeny-tojásdad, sárga; közepén egy kis, hasitekszerű benyomással, szeleim a csipők állásának megfelelő benyomásokkal. A rágók rövidek, veznek, vörössesárgák, tövüknel egy-egy fekete foltal díszítettek.

Az allkapesok egészen az alajkra hajlók, mely utobbi a mellverttel összeforrott. A tapogatók vékonyak, sárgásak, a czomb és száríz vegeen fekete gyűrűvel; a végíz árszerűen vékonyodó, a szárnál

* E jegy ellentéte a *Loxoeceles* nem jegyének, melynek szintén 6 szeme van, de sánjakarma nincs. E nem hazánkban eddig még nem találtatott.

hosszabb, szőrös. A lábak vékonyak, hosszúságra nem aránytalanok, világos agyagsárgák, elesen rajzolt, sűrűn álló fekete gyűrűkkel; az első lábpár szára négyszer gyűrűzött. A végtest kerekded, sárgás, világos; felületen a fonók felett () szerű fekete rajz, mely a hát fele pontokra oszolva, két pontsort alkot, — töle mindket oldalt még 2—3 összefolyó páros pont; — a has világossárgás több igen apró fekete ponttal, a tüdőfedők táján egy-egy nagyobb folttal.

A középső szempár a fej oldalesücskei mögé esik, s az oldalpárokhoz közelebb áll, mint állanak ezek egymáshoz. A homlok egy ekalakú nyújtvánnyal a rágók töve közé ekelődik.

A zár bőrös, a hassal egyenlő színezetű bemélyített pontpárból áll.

Mertekek: ♀ Törzs	6	$\frac{m}{m}$ ebből
fej mell	3	"
I lábpár	9.8	"

♂ előttem ismeretlen.

Ritka. Találtam Zimonyban az ottani hajóállomás penztári bodejának cserze alatt, hol Steatodák társaságában egy sarokba vonulva lesekedett; újabban Szarvason és Baján hasonló körülmények közt.

A nemz. muz. gyűjteményebe a legújabb időben Buda vidékeről került a Virányi-fele gyűjteménnyel.

FAM. III. CSALÁD. ENYOIDAE. BÚVÓK. SCHOBERSPINNEN.

(*Εννοά* = Bellona, görög istennő.)

GEN. I. NEM. ENYO. SAV. ET AUD.

(vide supra.)

Syn. 1825—27. SAVIGNY ET AUDUIN «Descr. de l'Égypte,» ed. II, XXII, pag. 349. ad. p.)

Vide: THORELL «On Europ. Spiders» p. 108.

Az alsó szemsor majdnem egyenes, különben észrevehetőleg könnyeden behajló. A szemek láthatólag három sorban állók. Az alsó szemsor négy szeme közül a két középső sokkal nagyobb valamennyivel; e két középszem közötti hezag kisebb annál, mely a negyedik sor két szeme között letezik. A fej vaskos, felgömböszzerűen elkerekített, bubján a szemesoporttal, mely messzire áll a homlok szeletétől. Az alsó fonópár a felsőnél hosszabb.

SPEC. I. FAJ. ENYO GERMANICA. (C. K.) NÉMET BÚVÓPÓK. DEUTSCHE SCHOBERSPINNEN.

(A magyar fajnév az életmódról, a német az első lelhelyről véve.)

Syn. 1837. *Lucia germanica* C. Koch «Uebers. des Ar. Syst.» I, pag. 19.

♀ Kicsiny. Előteste barnászvörös, végtestének felülete fenytelen-fekete, hasfele feheres s e szín az oldalakra is csücsökszerűen benyomul. Lábai vörössesárgák, sötétebb czombokkal. A fonók sárgásfeherék. A lábak hosszaránya 4, 1, 2, 3.

A fej mell barnászvörös, egészen vaskos; fejerésze kissé nyújtott, elől tompán elkerekített, a mellresztől csak kávas oldalbenyomások által elválasztott. Oldalról tekintve az egész fej mell a fejbubtól a nyelecskéig egyenletesen törpülő; hátgödre egy jelentektelen hosszhasíték. A mellvert széles, kissé domborodó, hátul nem csücsösödő, barnászvörös, apró, feheres, pehelyszerű szőrözettel ritkán ellátott. A rágók barnászvörösek, módosan fejlettek, oldalról tekintve ekalakuak, kissé az állkapcsokra csapottak; tövükre

a fejrészt sapkaszerűen borul. Az állkapcsok keskenyek, a háromszögletes alajkra egészen renehajlók és a mellvertnél sokkal világosabbak. A tapogató vég- és száríze a czombnál husosabb; a végiz csuesosodó s oly hosszú, mint a szár a térdizel együttvéve.

A lábak karesűk, fegyvertelenek, rövid szőrrel borítottak, esípöik világos vörössárgák, a czombok vörösbarnásan befutva mintegy füstölve, a többi izek egyszínűen vöröses sárgák. A végtest rendes tojásdad, szélességénél nem magasabb; felül fekete, alul fehéres, mely utóbbi szín a légzőrés tiján az oldalakba kikelődik. A szemesoport sajáttságos; az alsó sor két középső szeme sokkal közelebb egymáshoz mint a leghátulso két szem; ez utóbbi a többi szemtől messzire hátravetett; a két-két oldalszem az alsó sor középsőivel mintegy háromszögben áll.

A zár igen egyszerű s egy alig kiemelkedő, nyelv alakú, vékony lemezkéből áll, melynek töve vörössárga, ele beharmitott.

Mertekek: ♀	Törzs	3.5—4	$\frac{m}{m}$ ebből
	fej mell	1.5—1.7	"
	I lábpár	5	"

♂ előttem ismeretlen.

Ritka kis pók, melyet mint nyári alakot ez idő szerint csak B.-Füredről és az Alsó-Hámorból (Borsodmegye) ismerek. Az utóbbi helyen találtam lakházát, melyet palakövek alá helyez s a melyben peteburkat híven őrzi (I. köt. III. t. 56.). Vajjon azonos-e ez állat a SAVIGNY és ARDUIX Egyiptomból leírták Euryo nitidával, a mint ezt THORELL «On Eur. Spiders» p. 108 említi? ezt eldönteni nem merem; annyi bizonyos, hogy szemállítás és színezet szerint egyezik a KOCH idézett leírásával, a mint ezt THORELL tanár a revisió alkalmával el is ismeri.

SUBORDO III. ALREND.

T U B I T E L A R I A E.

(tubus = eső, tela = szövetség)

C S Ő S Z Ö V Ő K.

Mindazon tulajdonképeni pókok, a melyek szervezeti alapon a többi hat alrendbe be nem illenek, a Csőszövíők alrendjébe tartoznak. Az alrend valóságban polymorph s az átmenetekre nézve, a Kerekhálósok kivételével, minden más alrend fele hajló alakjai vannak.

A mily soknemű az alrend szervezete, oly soknemű az életmódja s oly sokneműek szövetei is; és hogyha a pókrend működési rendszerét egy szakadatlan egésznek tekintjük, akkor elmondhatjuk, hogy a csőszövíők betöltik, elfoglalják azon hezagokat, a melyek a működési módok között különben létre jönnének. Ugyanezt mutatja a soknemű alakrokonság más alrendekkel is.

A legfőbb pókszervek ez alrend körében változatosak. A szövő szervvel kettős és hármas karomrendszert találunk, mellette azt, hogy a kettőssel sajáttságos szőrtalpak együtt lépnek fel, melyek azt mutatják nekünk, hogy itt a specifiens pókműködés, t. i. a hálózás mellett, a járás-kelesnek is helye kezd lenni. A fonószerv hasonlóképen elteréseket mutat; nemely fonóparok megnyulnak, több izületet kezdenek oltani, s a cseverendszer másneműen van alkalmazva, tehát másnemű szöveteiket is leteríti.

A potrohosság az alrendből kimarad. Az erőteljes fej mellhez egy arányos végtest csatlakozik; a lábak arányosan erőteljesek s a hol nyújtottak is, ott is a járás-kelesre esik a súly. A míg a két megelőző alrend alakjainak táplálkozása legfőképen a háló berendezésétől, alkalmazásától s a türelmes leséstől függ, tehát bizonyos passivitást mutat, addig a csöszövényőknél érvényre jut már az aktivitás is, mely az orozva támadásban nyilvánkozik.

Az alrend azon csoportjaiban is, a melyekben a hálóra, egyáltalában szövetre aránylag még nagy súly esik (Agalenoidae = Illók), e szövetek jellege s így hatásmódja is lényegesen más mint a kerekhálósoknál és hurokkötőknél. Mert a míg az utóbbiak finom fonalzataikat a *repülő* rovarok útjába állítják s a rovarok épen azért kerülnek hatalmukba, mert a szövetet *nem veszik észre*, addig a Csöszövényőknél épülő hálózatok, voltaképen szövetek, a *letelepedő* rovarokra céloznak, sőt nagy részben e rovarokat a letelepedésre, illetőleg a hálóra kerülésre mintegy csábítják. A Zugpókok (Tegenaria) terjedelmes, vízszintesen feszített leplei, melyek idővel még porosakká is lesznek, szinte hívogatják a letelepedésre helyet kereső legyet; így a Tölesérpókok (Agalena) tölesérszerű leple is. Az Eretnékfélek (Amaurobiinae) oly helyiségeket raknak meg tapadós hálózattal, a melyek rovaroknak letelepedő vagy búvóhelyeket képezhetnek; így a Dictynapókok, Eretnékpókok (Amaurobius) s az Illók (Agalenoidae) legtöbbje is.

Az Orzóknál (Drassoidae) már nem a szövetre, hanem a lábalkotásra esik a fősúly. Ezeknél a kettőskaromrendszer uralkodik, a lábak talpasok; ezek vagy ellaladó rovarokra orozva támadnak, vagy üregekbe — természetes és mesterségesekbe — rejtőzve lesik a betévedező prédát. Ennek még a vízi Búvárpók (Argyroneta) is megfelel, mely búvárharangját el-el hagyogatja s az Utricularia sűrűségében orozgat.

Általános tulajdonság ezen alrendnél az, hogy szövetnél a lakhelyre nagysúly esik, némely családnál épen a főbb súly, s ez utóbbi esetben a szövet már csak a szaporodási és kifejlődési mozzanatokra s nem a táplálék beszerzésére való. Itt tehát kezdődik a lakhely állandósítása mellett, a mozgásnak bizonyos körben való szabadsága.

Lakhelyeik változtatásában kevésbe szabadok, a helyiség választásában is korlátozottabbak; és sokkal inkább a rőghöz vannak kötve, mint a megelőző két rend; azon alakok száma, a melyek kő, rög, lehullott levél stb. alatt él és hat, ezen alrendnél már tulsúlyban van.

A függőleges elterjedésre nézve a főszám az aljakra esik ugyan, de a magasba is messze mennek. A kárpáti Rejtpók (Cryphoesa carpathica O. H.) a magas Tátra csúcsain is el s viszont a barlanglakó pókok között a vak alakok, melyeket hazánkban még nem találhattam fel ugyan, de a melyek aligha hiányzanak, a föld méhében hatolnak.

A nemzedékek sora legfőképen (nem mondhatom, hogy kizárólagosan), áttelelő alakok által tartatik fenn s a biztos áttelelés feltételeiről nem az anya, hanem az ifjú nemzedék maga gondoskodik. Az anya őrzi peteit s gyámolítja ifjú nemzedékét, addig míg ez önállóan is megélhet.

FAM. I. CSALÁD. UROCTEIDAE. BORZOSOK. ZOTTELSPINNEN.

(*οὐρά* = fark, *τετρά* = szőr; a fonók szőrös voltáról véve.)

GEN. 1. NEM. UROCTEA. DUFOUR.

(vide Urocteoidae.)

Syn. 1820. DUFOUR «Descript. de cinq. Ar. nouv.» pag. 198.

Vide: THORELL «On Europ. Spid.» pag. 111.

A fej mell rövid, széles, vesecsalakú; fejeresze kicsiny. A felső fonópár a többinél sokkal hosszabb, két ízű, a második iz hosszú, összenyomott, alul cseves. Nyolez kerek, kiálló szem; ezek közül négy-négy egy szabálytalan négyszögbe állítva; az alsó sor két középső szeme a legmagyobb. A lábak vaskosak, szőrösek, végeiken három körömmel (ket bordás és egy sánjakörömmel).

SPEC. I. F. A. J. UROCTEA DURANDI (WALCK.) DURAND BORZPÖKJA. DURANDS DACHSPINNE.

(Durand francia tudós tiszteletére.)

Syn. 1809. *Clotho Durandi* WALCKENAER in LATREILLE «Gen. Crust. et Ins.» IV. p. 370.

Vide: THORELL «Remarks» pag. 503.

♀ Nagy, zömök alak. Előteste és labái vörösbarnák, végteste barna vagy fakó, hátfelen öt sárgás-fehér folttal, melyek közül kettő a végtest elején, kettő a közepénél valamivel hátrább, egy a fonók felett elhelyeztet. Az egész állat bozontosan szőrös.

A fej mell vesecakú, szélesebb mint hosszú, laposan boltozatos, szépen vörösbarna; gyér, serteszerű szőrözettel fedett. Fejeresze alig kiálló, kicsiny; két oldalt a mellresztől behorpasztások által elválasztott. A hátgodör terjedelmes, sekély, közel háromszögletes; a mellreszen a lábak fekvesének megfelelő sekély barázdák sugáranak szét. A mellvért kerek, hosszánál nem szélesebb, világosb-vörösbarna, világos szőrözettel borítva. A rügök aránylag gyengék, rövidek, majdnem párhuzamosak és serteszerű, bozontos szőrözettel fedettek, vörösbarnák. Az állkapcsok párhuzamosak, elől elkerekítettek és nagyon egymásfele dülők, úgy hogy végeikkel érintkeznek, míg töveiket a háromszögletes alajk választja el; az állkapcsok és az alajk világosabb vörösbarnák, bozontosan szőrösök. A tapogatók husosak, végük a száriznál csak valamivel hosszabb, mindkettő együttveve alig hosszabb a czombnál; a végzet rövid, serteszerű szőrözettel igen tömötten borítja. A lábak vaskosak, hosszúságuk arányos, vörösbarnák; az izek alsó fele hosszú, sárgás szőrözettel borított; az első lábpár második végíze (metatarsus), alul, het pár erős tüskevel, az első végiz 5—6 tüskepárral; a száriz alul 4 pár hosszú sertetüskevel. A többi lábpár megfelelő izei alul szintén tüskések. A bordáskörmök a kampón kívül 10 fogasok s a végső negy fog mintegy összeforrott.

A végtest szélességénél sokkal hosszabb, felül lapos, barna vagy fakó, bozontosan szőrös; elől elmesztett és keskenyebb mint a második folt pár táján; a fonók fele ismét csúcsosodó. A has barna vagy fakó, a légzőres előtt rendszeren sötétebb. A felső fonópár hosszú, a végtest végén farkszerűen kiálló, oldalról kissé összenyomott s az első iz alsó felén csévekkkel ellátott. A szemek nagyok, kerekék, jól domborúak, gyantaszínűek, két sorban és két negy-negy szemből alkotott csoportban állanak. Az alsó sor két középső szeme a legnagyobb, a közbeneső hezag egy szemátmérőnél valamivel kisebb; a hátsó sor két középső szeme oly távol áll egymástól, hogy az alsó sor középső szemével egy magasságánál szélesebb trapezt alkot. Az oldal-szemek nem érintkeznek s a középső szemekhez igen közel állanak, úgy hogy megfelelő felén a fejnek a középső szemekkel egy szabálytalan (\square) negyszöget alkotnak meg.

A zár egy jelentéktelen sötétbarna terese ∞ szerű sekély benyomással.

Mertekek: ♀ Törzs (fonó nélkül)	13	$\frac{m}{m}$ ebből
fej mell	5	»
I lábpár	16	»
IV » 	17.5	»
felső fonó	3	»

A lábak hosszaránya: 4, 1, 2, 3.

♂ előttem ismeretlen.

Deli faj, melyet eddig csak Fiume környekeről ismernek, hol is egy regibb utazasom alkalmával (1862) a Quarnero-öböl partja közelében, de szárazon heverő kövek alatt találtam. Szövege szürkésfehér, terjedelmes, lepelszerű és igen erős; rendszeren a kövek valamelyik kivájasát tölti ki; a bejárat előtt számos rovarnak a maradványa hever.

Magyarazat: II. k. IV. tabl. 95 bordáskörmök, 96 a szemállás, b a fej mell felülről c a végtest, vege a fonókkal, oldalról tekintve.

FAM. II. CSALÁD. AGALENOIDAE. ILLÓK. FLUCHTSPINNEN.

(ἀ et γαλγυγ = nyugtalan; a hálón való gyors mozgásról véve.)

SUBFAM. I. ALCSALÁD. AMAUROBINAE. ÉRETNEKEK. KETZERSPINNEN.

(ἀμαυρός = sötét, βίον = élni; a tartózkodásról.)

GEN. I. NEM. DICTYNA. SUNDEVALL.

(Δικτυνα = Diana, a vadászat istennője.)

Syn. 1833. SUNDEVALL «Conspectus Ar.» pag. 16.

Vide: THORELL «On europ. Sp.» pag. 122.

Az oldalszemek majdnem érintkezők; az alsó oldalszemek az alsó középsőktől legalább egy szem-átmerőnyi távolságra állnak. A fonalszűrő es nyüst jelen van. Az állkapcsok a közel háromszögletes alajkra hajlottak. A lábak fegyvertelenek. Csupa apró alak (legfőlebb 5 m_m), mely különösen az ernyős növények köröit es a házak falainak lapját választja tartózkodási helyül; az előbbi helyeken töleser alakú, ritka hálózatot szőnek, melyeknek vezérfonalai **Z** szerű gyapjas keresztfonalak által kötve össze; a töleser töveiben egy csőszerű sűrűbb rejt létezik; az utóbbi helyen a hálózat foltszerűen terjed s a pók alatta leskelődik, a **Z** szerű összekötő fonalak itt is meg vannak.

SPEC. 1. FAJ. DICTYNA ARUNDINACEA. (LIN.) NÁDI DICTYNAPÓK. ROHR DICTYNA.

(arundo = nád; a kedvencz tartózkodásról véve.)

Syn. 1758. Aranea arundinacea LINNÉ «Syst. Nat.» Ed. X. pag. 620.

Vide: THORELL «Remarks» pag. 210.

♀ Zomok alak, tompán tojásdad, aránylag nagy végtesttel. A végtest felülete fakó, elejen egy széles barna csíkkal, hátulján egy hasonló színű, ezüsterszerű rajzzal. Előteste vörösbarna, labai barnászörösek. Az egész törzs rövid fehér szőrözettel fedett, mely szőrőzet a rajzok alkotásába is befoly.

A fej mellé módosan fejlett, a végtest által kissé fedett, fejerésze kissé kimagasló, domboru, a mell-résztől jól elválasztott, vörösbarna; rövid fehér szőrözettel. A mellvert kissé domborodó, vörösbarna; rövid fehér szőrökkel. A rágók nyújtottak, végükön kissé szélesedők, érintkező széleik fele homorúan benyomottak, a becsapó res szélei lemezszerűen kiemelkedők, egyebkent vörösbarnák. Az állkapcsok meglehetősen szélesek, elől elkerekítettek s a közel háromszögletes alajk felett összeérők, úgy mint az alajk vörösbarnák. A tapogatók rozsdabarnák, végük füstös, szőrös, a szárnál sokkal hosszabb. A lábak aránylagos hosszúság mellett kissé vékonyak, rozsdabarnák, felületükön elmosódva füstösek, röviden szőrösök. A végtest aránylag nagy, domboru, felülről tekintve tompa-tojásdad, majdnem körded, fakó; elejen egy barna középsíkkal, mely körülbelül fele hosszát éri a végtestnek s mely alatt egy háromszögletes, ezüsterszerű, barna mező kezdődik, mely csücsével a fonók fele nyúlik s néhány világosabb harantvonal által megszakított. E harantvonalakon sorban álló fehér szőrök láthatók s elcsitítik a rajzot. Felső színezete a végtest felületének szintén rövidke, fehér szőrökkel derezett. A has közepe rendszeren szélesen, szalagszerűen barna.

A hátsó szem sor az alsónál valamivel hosszabb, úgy hogy az oldalszemek kissé rezsutós állást foglalnak el. A középszemek egy előre fele kissé szűkülő trapézben elhelyezettek s a hatsok közötti ter akkora,

a mekkora távolságuk az alsóktól; a hátsó sor szeméi egymástól egyenlő távolságra állnak. Az alsó sor a homlok szeptől oly távolságra esik, a mekkora a távolság az alsó és hátsó sor középszeméi között.

A zár egy harántfekvő hosszukás köldök, mely a közepén egy sekély benyomás által két felre oszlik és ez elosztásnak megfelelő két $=$ szerű nyílást mutat, mely hátrafele néz.

Mertekek: ♀ Törzs	4	$\frac{m}{m}$ ebből
fej mell	1.8	»
I lábpár	4	»

A lábak hosszaránya: 1, 2, 4, 3.

♂ kisebb, karesú, majdnem sisakszerűen kiemelkedő, donuboru fejű és hosszabb, karesú lábakkal. A fejen a fehér szőröcskék csikosan sorakozottak. A rágók hosszúk, oldalról tekintve vegeikkel tetemesen előrehajlók. A tapogató rövid szárizen egy kettéhasított, szemölesszerű kiemelkedés. A pikkely nagy, eszesen kanálalakú, oldalt *kijelöl* fordított; nemzőszerve egy göcsalaku vörösbarna gyűjtőből áll, melyből oldalt egy a pikkelybe befekvő s szelenek görbületehez alkalmazkodó, előre irányzott nyújtvány indul, hátrafele pedig egy erős, sötétbarna, kettős esavárodású, dugóhuzóalaku embolus meredezik.

Mertekek: ♂ Törzs	2.7	$\frac{m}{m}$ ebből
fej mell	1.3	»
I lábpár	4	»

Tavaszi és nyári alak, mely különösen az ernyős virágok száraz köröit, egyáltalában a kiszáradt növényzetet kedveli, a melyen hálóját úgy alkalmazza, hogy téleseralaku feneke az ág vagy ernyőszirmok könyökeibe essek; néha a falakon is található, hol hálójá egy poros foltéhoz hasonlít. A háló ketfele fonalból való: az egyszerű vázalkotó, néha összefutó fonalakból és gyapjas fonalakból, a melyek a vázfonalak között hágesómodra alkalmazvak s igen tapadók. Ez utóbbi fonalakat a kis állat a negyedik láppárral fejt ki s úgy veltem észrevenni, hogy e fonalak a fonalszűrőből eredve, a nyúttal fejtetnek és alkalmaztatnak. Az állat kicsinysegenél fogva észleltem nem volt egészen szabatos.

Ismerem eddig erdélyi részekből: Kolozsvárról, Sz.-Vesszősről, Tordáról, Mező-Záhról, Szében környekeről; magyar részekből: Doroszlóról, Apatinból, Palánkáról, Panesováról, Orsováról, Ogradenáról, B.-Csabáról, Tokajból, Ó-Huttáról (Borsod), Szekes-Fehervárról, Nagy-Varadról (Muz. gy. Moesáry), Budapestről (Muz. gy. Pável).

SPEC. 2. FAJ. DICTYNA LATENS. FABR. BÜVÖ D. SCHLUF D.

(lateo = elrejtve lenni; az életmódról.)

Syn. 1775. *Araneus latens* FABRICIUS «Syst. Ent.» p. 432.

Vide: THORELL «Remarks» p. 212.

♀ Előteste fekete; végteste világos hamvasszürke, hátfelen egy terjedelmes, levelalakú fekete foltal; lábai és tapogatói feketek.

Alakra nézve megfelel a *D. arundinacea*-nak, de ennél kisebb.

A fej mell fejezésze meglehetősen tömött fehér szőrözettel borítva; végteste pikkelyszőrökkel teljesen fedve. Sertetlen állapotban a terdesüklők töven egy kis, fehér szőrűstök.

A zár megfelel a *D. arundinacea* zárjának.

Mertekek: ♀ Törzs	2.5—3	$\frac{m}{m}$
-------------------	-------	-------	---------------

♂ Tapogatója a *D. arundinacea* ♂ tapogatójához kepest karesúbb, bunkója ellenben vaskosabb, szárizen egy egyszerű, kis, hegyes tüske.

Mertekek: ♂ Törzs	2.3	$\frac{m}{m}$
-------------------	-------	-----	---------------

E fajt dr. SEIDLITZ dr. KOCH L. meghatározása alapján Szében környekeről említi. Peldányokat nem láttam.

SPEC. 3. FAJ. *DICTYNA VICINA*. SIM. ROKON D. VERWANDTE D.

(vicina = szomszédos; a D. arundinaccával való rokonságra czéloz.)

Syn. 1874. *Dictyna vicina* SIMON «Les Ar. de. France» I, pag. 192.

♂ Előteste vörösbarna, végteste egyszínűen olajbarna. Karesű, kis alak, barnászörös lábakkal. A fej mell fejeresze sisakszerűen felemelkedő, domború, a mellresz letörpülő; az egész igen gyeren álló, kisse soros, fehéres szőrözetet visel. A tojásdad, olajbarna végtest egyenletesen és sűrűn álló fehéres szőrözettel borított. A hátsó szemsor egyenes; az oldalszemek majdnem szemátmerőnyire egymástól állanak; a középszemesoport majdnem dereknégyszögbe elhelyezett, elejen valamivel szűkebb, hátsó szemei nagyobbak az alsóknál.

A tapogató rövid szárú felületen egy barna, tompa csapocska áll, a pikkely igen kicsiny, kanálalakú, domború felevel felfele fordított, az alóla kiálló nemzőszerv alakja jellemzője a fajnak: oldalról tekintve egy ki- és kissé hátrafelé irányozott, ketesavarodású, egy dugóhúzóhoz hasonlító, világosvörös embolust mutat.

Mértekek: ♂ törzs	3	$\frac{m}{m}$ ebből
fej mell	1.3	»
I lábpár	5	»

A lábak hosszaránya: 1, 2, 4, 3.

♀ előttem ismeretlen.

Eddig csak Tokajból ismerem, hol mint nyári alakot a Tokaj és Rakamaz közötti egyes tolgyfák ágairól razás segítségével szedtem. Simon Ajaccio környekeről, Corsica szigeteről írja le.

SPEC. 4. FAJ. *DICTYNA UNCINATA*. THOR. HORGOS D. HACKEN D.

(uncinata = horoggal ellátott; a ♂ nemzőszervén létező horogról véve.)

Syn. *Dictyna uncinata* THORELL «Rec. crit. Aran.» pag. 82. et «Remarks» pag. 212.

♂ Előteste vörösbarna, végteste fekete, szürkés szőrözettel. Karesű, kis alak, barnászörös lábakkal. Fejmellének fejeresze felvetett, domború és elkerekített. A végtest kisse csúcsosan tojásdad, kicsiny. A középső szemesoport közel derek négyszögben áll, mely magasságánál láthatólag szelesebb. A tapogató rövid szárú egy vaskos, hegyes, meglehetősen hosszú tövis; a pikkely nagy, csúcsosan kanálalakú, az alóla kiálló nemzőszerv formája és jellemzője a fajnak: belülről és oldalról tekintve, egy hátrafelé irányozott, sarlóalakú, sötétbarna és hegyével lefele álló korom látható (innen: uncinata).

Mértekek: ♂ Törzs	2.3	$\frac{m}{m}$ ebből
fej mell	1	»
I lábpár	3.2	»

A lábak hosszaránya: 1, 2, 4, 3.

♀ előttem ismeretlen. *

Eddig csak egy példány után ismerjük Budapestről (városliget bokrai).

* Thorell szerint l. c.: ♀ ferrugineo-fusca, pedibus fusco testaceis, parte cephalica lineis tribus, e pilis canis formatis; abdo minis dorsum cinereum vel testaceum, macula antica subquadrata, aliaque supra anum in undas transversas saepe divulsa, nigris.

SPEC. 5. F. A. J. DICTYNA VARIABILIS. C. K. VÁLTOZÉKONY D. VERÄNDERLICHE D.

(variabilis = változékony; a színezet állhatatlanságáról véve.)

Syn. 1836. *Dictyna variabilis* C. Koch «Die Arachniden» III. pag. 29.

Vide: THORELL «Remarks» pag. 423.

♀ Vörössárga előtest, zöldessárga végtest, melyen a sötétebb erezet mintegy sejteket alkot; a lábak szemmyesen zöldessárgák. Zömök alak, puffadozó, tojásdad s elejével a fejmell mellrészére felfekvő végtesttel. A fejmell módosan fejlett, hátul lelapuló; fejerésze, oldalról tekintve, erősen domborodó; az egész vörössárga fehéres, gyér, kisse sorban álló szőrözettel. A mellvert laposan domború, agyagsárga, gyéren szőrös. A rágók, előlről tekintve, majdnem párhuzamosak, világos vörössárgák, sötétebb, áttetsző esípőkörömmel. Az állkapcsok egyenkint meglehetősen párhuzamosak, elkerekített csücsaikkal egymás felé hajlók; az alajk szélességénél magasabb, tompán esücsos s úgy mint az állkapcsok vörössárga. A tapogató sárgás, esücsán kissé füstös; végize oly hosszú mint a szár a térdizzel együttvéve. A lábak arányosak, szemmyesen zöldessárgák és kivált alsó felükön sűrű, fehéres szőrözettel borítottak. A végtest zöldessárga, sötétes erezzel mintegy recézve s rövid, fehéres szőrözettel borítva.

A szemnegyszög magasságánál szélesebb; az alsó sor oldalszeméi a középsőktől szemátmérőnyire állnak; a hátsó sor szeméi majdnem egyenes vonalban és egyenlő távolságra egymástól; az alsó sor a homlok szelétől oly távolságra, a mekkora a távolság a hátsó sor középszeméi között.

A zár egy hártvás térese, mely semmi kitüntető horpadást vagy emelkedést nem mutat.

Mértekek: ♀ Törzs	4·3—5 $\frac{m}{m}$ ebből
fejmell	1·8 »
I lábpár	5·6 »

♂ Kisebb, karesűbb; színezete a nőstényének megfelelő. A tapogató rövid térdizén egy rövidke csap. A pikkely esücsosan kanálalakú, domborúságával oldalt és kifelé fordított; nemzösszerve, alulról tekintve, egy lapos, lencsealakú, sárga gyűjtőből áll, mely előszélén egy serteszerű, barna s a gyűjtő körüldomához illeszkedő embolus által mintegy szegelyeztetik.

Mértekek: ♂ Törzs	4 $\frac{m}{m}$ vagy kisebb
fejmell	1·8 »
I lábpár	6 »

Mint nyári alak némely helyen gyakori; hálózátát előszeretettel friss levelekre alkalmazza s nevezetesen a *Syringa vulgaris* (orgonafa) levelein található, hol a leveleket csatornásan összehuzza, behálózza a háló alatt pedig ritkás, esőves rejtjét szövi.

Ismerem különösen Budapest vidékeről (muzeum-kert), Rákospalotáról (Muz. gy. Pável), Pancsováról, Tokajból, B.-Füredről.

GEN. 9. NEM. TITANOECA. THORELL.

(τίτανος = mész, οἶκος = ház, lakás; a tartózkodásról.)

Syn. 1869–70. THORELL «On europ. Spid.» pag. 124.

Az állkapcsok majdnem párhuzamosak. Az alajk felkerek. Az oldalszemek nem érintkeznek. A hátsó három lábpár rendesen fegyvertelen. Sötétszínű, közepes nagyságon aluli (5—6 $\frac{m}{m}$ törzs) alakok, melyek jelesen a mészhegységek kövei alatt tartózkodnak, ritkás szövetű esövet és rendetlen hálót készítenek. A fonalszűrő és nyüst megvan.

SPEC. I. FAJ. TITANOECA QUADRIGUTTATA. (HAHN.) NÉGYCSEPPES MÉSZPÓK. VIERTROPFIGE KALKSPINNE.

(quatuor és gutta = négy csepp; a hím végtestének feltűnő díszéről.)

Syn. 1831. *Therid. quadriguttatum* HAHN «Die Arachn.» I. pag. 84.

Vide: THORELL «Remarks» pag. 506.

♀ Az előtest sötét sárgásbarna. A végtest fekete. A lábak sötét füstbarnák. A fejmell fejerésze keskenyedő és kissé nyújtott, elől majdnem elmetsett, a mellrészről jól elválasztott; oldalról tekintve az egész fejmell a nyelecskétől kezdve a fej búbjáig egyenletesen, ívesen emelkedik. A mellvert szélesen-körded, sötét vörösbarna.

A rágók módosan kúpidomiak, tövükkel a homlok előtt kissé kiálló, vörösbarnák, az állkapcsoknál valamivel hosszabbak. Az állkapcsok majdnem párhuzamosak, elkerekített végeikkel egymásfele hajlók, vörösbarnák; az alajk hasonló szín mellett felkerek idomu. A tapogató végze alig csücsösödő, sertékkal elegyes szőrözettel borított, füstbarna; végze a száriznál hosszabb. A lábak arányosak, egy színűen füstbarnák, fegyvertelenek, a czombok alsó felén hosszabb szőrözetűek. A végtest rendes tojásdad, egyszínűen fekete (éretlen példányoknál néha fakó vagy füstös) s ilyen a has is. A szemek aprók; az oldalszemek szemátmérvnyire egymástól; a közép szemcsoport egy előre felé szűkülő trapezbe elhelyezett; a hátsó középsők a hátsó oldalszemektől valamivel távolabbra mint a mennyire allanak egymástól. A hátsó sor könnyedén behajló, az alsó sor egyenes.

A zár egy kissé domborodó sötétbarna térese.

Mértekek: ♀ Törzs	5	$\frac{m}{m}$ ebből
fejmell	2	»
I lábpár	5.5	»

A lábak hosszaránya: 1, 4, 2, 3.

♂ Keresőbb, kisebb. Fejmelle a végtesthez képest fejlettebb, világos sárgabarna. A végtest sötétbarna, néha fekete, felületen negy párosan, rendszeren \approx szerűen álló cseppalakú, hófehér pettytel; a végtest elején álló folt pár néha kissé enyésző. A czombok fegyvertelenek; az első és második lábpár szára és második lábvegyze alul tüskés, a többi láb mak ugyanazon ízei alul inkább sertékkal mint tüskékkel fegyverzetek; a czombok sötétebbek. A tapogató bunkós, sötét; a kurta száriz, oldalt befelé egy hüvelykszerű nyújtvánnyal, e nyújtvány s a pikkely töve között egy kissé csavart hegyű, erős, fénylő köröm; a pikkely vörösbarna, széleses kanalakú, györcs, inkább csak szeleim szőrös, domborúságával fölfele és kissé oldalt kifelé fordított; az alóla jól kidagadó nemzőszerv, alulról nézve, egyszerű domborodású, szennyessárga, barnás szegélyzetű; a pikkely külső szélén és töve felé kiálló nyújtványon két rövidke, hasas fogaacsos.

Mértekek: ♂ Törzs	4.3	$\frac{m}{m}$ ebből
fejmell	2.4	»
I lábpár	7	»

Mint nyári alakot a mész- és trachyt-képletekből ismerem, hol a lazán felfekvő kövek alsó lapján ritka szövöet készít.

Ismerem magyar részekből: Orsováról, Melhádiáról, Bazsiáról, az Alsó-Hámorból (Borsod), Moesolyásról (Borsod), Parádról, Selmezbányáról, Pees vidékeről (Muz. gy. Frivaldszky és Pavel), Buda vidékeről (Muz. gy. Pavel). Az utolbbi lel hely nem bizonyos, mert csak szerfelett esonka példányok állottak rendelkezésemre.

SPEC. 2. FAJ. TITANOECA SCHINERI. L. K. SCHINER M. SCHINERS K.

(Schiner jeles osztrák Dipterologus tiszteletére.)

Syn. 1872 *Titanocera Schineri* L. Koch «Ueb. die Spinn. Gatt. Tit.» etc. pag. 159.

Vide: THORELL «Verz. südruss. Spinnen.» S. Petersburg 1875. pag. 35.

SIMON «Ar. de France» I. pag. 212.

♂ ♀ Mind a két ivart csak harmadvedlésű példányok szerint ismerem.

Előteste világos vöröses-agyagsárga. A vegtest füstbarna; mind a két ivarnál egy pár \wedge szerűen álló, szemyesfehér folttal, mely a himmel legtöbbször határozott, élesen körvonalzott, a nősténynél néha enyésző, néha hiányzik is. A megelőző fajnál nagyobb, vaskosabb. A fejmell, oldalról tekintve, a nyeleestől lapos-ívesen emelkedő; fejeresze jól elváló, elől majdnem elnetszett, a mellreszhez képest keskenyedő és kinyúló. A mellvert vörösbarna, széles, hátul hirtelenül csúcsosodó. A rágók, előlről nevezve, majdnem párhuzamosak, vaskosak, szőrősek, oldalról tekintve ékalkuak, az állkapesoknál nem hosszabbak, világos barnászörösek. Az állkapesok agyagsárgák, elkerekített vegeikkel egymásfele hajlók; az aljuk felkerek, töven vörösbarna, a végén sárgás. A tapogató vöröses agyagsárga, kissé füstös csúcsos, végíze hosszabb a szárnál, alul sűrűn és sertékkal elegyesen szőrös. A lábak vöröses agyagsárgák, az első pár másodvégíze negy pár tüskevel. Az alsó sor oldalszeméi ugyancsok sor középsőinél nagyobbak; a hátsó sor szeméi körülbelül egyforma távolságra egymástól; a közép szemecsoport egy előre fele szűkülő trapezbe elhelyezett; az alsó sor a homlok széletől kevéssel távolabbra mint a mennyi az oldalszemének az átmérője; e sor kis mértékben, a hátsó könnyedén behajló.

Méretek: ♂ ♀ Törzs	6	$\frac{m}{m}$ ebből
fejmell	2.8	»
I. lábpar	7.7	»
» » »	8.5	»

A lábak hosszaránya: 1, 4, 2, 3.

Mint nyári (június) és őszi (október) alakot, de mindket evszakban csak mint harmadvedlésűt, magyar részekből S.-A.-Újhelyről, Tokajból és Veszprem környekeről ismerem, hol kögörgötegekben, a kövek alsó lapján szövi ritkas szövetet és csövet. E faj eldöntesenel a nagyság és a vegtesten látható két fehér petty döntött.

SPEC. 3. FAJ. TITANOECA VETERANICA. N. SP. VETERANI M. VETERANIS K.

(Veterani, régi hadvezér, innen Veterani barlang tája a Duna mellett; e faj első lelhelye.)

(VII-dik tábla 155, *a* szemecsoport, *b* a ♀ zárja, *d* a ♂ tapogatójának szára, *e* a ♂ tapogatója.)

♀ Előteste sötetes vörösbarna, keves sárgás szőrrel; lábai hasonló színűek, kissé füstösebbek. Vegteste barna, nem epen gyéren álló, de leginkább csak nagyításban feltűnő, sárgás-vöröses szőrözettel.

Fejmelle oly hosszú, mint a negyedik lábpar terde és szára együttveve; fejeresze kissé nyújtott, elől elkerekített, oldalról tekintve a tetemes hátgödörtől kezdve igen lankásan emelkedő. Az egész fejmell szele igen finoman karimázott. A mellvert körded, barna; szennyesárga szőrözettel. A rágók meglehetősen vaskosak, kissé ripacsosak s elege szőrősek; oldalról tekintve tovább kissé terdszerűen kiálló. Az állkapesok egyenesek, egyenközüen szélesek, végük elkerekített, különben vörösbarnak; az aljuk egy rágófélnél valamivel keskenyebb, elkerekített, s az állkapesoknak felehosszát eri el. A tapogató füstösen vörösbarna, végíze sertékkal elegyesen bőven szőrös, oly hosszú, mint a terd és szár együttveve. A lábak elege karesuk, szőrözetük elege gazdag és sárgásbarnás elegyitesű, fegyverzetük nem allando; az első lábpar czombján, felül a végén 2--3 megfekvő tüske, néha a szár alján, végén egy tüske. A vegtest szélesen tojásdad, kevesse lapított.

Az alsó szemsor igen könnyeden, a hátsó könnyeden behajló, oldalszemei nem érintkeznek s mind a két sor oldalszemei az illető sor középsőitől továbbra esnek, mint a mennyire esnek a középsők egymástól; mind a két sor középsői egy előrefele tetemesen szűkülő trapezbe elhelyezettek, az alsók kisebbek. A hátsó középszemek az alsóktól továbbra esnek mint a hátsó középsők egymástól.

A zár közvetlenül a legzőrés felett nyílik s két — — szerűen fekvő felből áll.

Mértékek: ♀ Törzs	5.5 $\frac{m}{m}$ ebből
fej mell	2.3 "
I lábpár	6 "
II "	5 "
III "	4 "
IV "	5.6 "

♂ Kereszubb, valamivel kisebb. Előteste igen elenk barnászörös; lábai füstbarnák; végteste fekete, némi sárga szőrözettel; rajz nélküli. Valamennyi láb szárának alsó felén egy sorban több sertetüske áll. A tapogató vaskos, bunkós; térdize vastagságánál nem hosszabb, szárize igen komplikált: belső felén egy fényesen fekete, vaskos tövű, igen finom végű nyújtványt bocsát, mely előre irányozott, e nyújtvány tövén egy befelé, hávelykszerűen álló, rövid, tompa nyújtvány áll, e mögött egy hátranyiló, fűlszerű harmadik nyújtvány látható.

Mértékek: ♂ Törzs	4.6 $\frac{m}{m}$ ebből
fej mell	2.4 "
I lábpár	7.5 "
II "	5.8 "
III "	4.7 "
IV "	5.6 "

E csinos kis pókot, mint júniusi alakot, a Dunaszorosból, jelesen a Veteráni barlang tájáról és Jeschelnitza közeléből ismerem, hol is a gypeseken heverő mészkötrömelekek halmából szedtem. Az állat igen gyeren szőtt esővecskejében kövek alján tartózkodik, a megerintésre összehúzódik s csak nagyon haborgattatva, gyors futásra veszi a dolgot. Közel rokona annak a fajnak, a melyet SIMON E. Titanocca monticola nev alatt a Pyrenaeusok keleti részéből a Provence lavaszaiból közölt (lásd: Les Arachn. de France 1874. I. p. 214. Pl. III. fig. 10). — Dr. KOCH L. is külön fajnak nezi.

GEN. 3. NEM. AMAUROBIUS. (C. K.)

(vide Amaurobiinae.)

Syn. 1837. C. KOCH «Uebersicht des Ar. Syst.» I. pag. 15.

Vide: THORELL «On Europ. Sp.» pag. 126.

Valamennyi láb tüskés. Az állkapcsok majdnem párhuzamosak; az alajk az állkapcsoknál egy harmaddal rövidebb, töve felett bekeményített (constrictum), elől el- vagy kisse kimmetszett. Az alsó sor szemei majdnem egyforma nagyságúak; a hátsó sor középsői, ugyane sor oldalszemeitől alig valamivel továbbra mint egymástól. A lábvegek két bordás és egy sánjakörömmel. A fonók felső párja ketizű.

Sötétben élő alakok, melyek néha vájnak is, rendszeren reszkben, lyukakban szövik a nemezsűrűségű, selyemfehér esövet, előtte pedig a helyiség lapját mintegy kikárpitozzak; ha sarokba esik a rejt, akkor szabálytalan hálót is kötnek, melynek váza száraz, erősebb fonalakból áll, a melyekhez selyemfehér, gyapotszerű, igen tapadós fonalak néha csipkeszerűen alkalmazkodnak, a melyek valószínűleg a fonalszűrőből erednek s a nyüst segítségével megerősítettnek. A nyüst nemely faj hinnenel hiányzik.

SPEC. I. FAJ. AMAUROBIUS FEROX. (WALCK.) VAD ÉRETNEKPÖK. WILDE KETZERSPINNE.


(ferox = vad, de szentelen is; itt a támadás hevesységére ezélez.)

Syn. 1830 *Clubiona ferox* WALCK. «Faun. Franc.» pag. 150.

Vide: THORELL «Remarks» pag. 204.

♀ Előteste vörösbarna, sötétebb fejrésszel; a végtest sötét olajbarna felülete elejen három (4) szerűen csoportosított sárgás csikkal, ezek alatt 3—4 A szerű harántirajzzal. Lábai vörössárgák, hosszúságra nevezé arányosak, kissé vaskosak. Közepesen felüli vaskos alak.

A fej mell mellrésze, oldalról tekintve, a nyelecskétől meredeken emelkedik, a többi rész a hasítócszerű hátgödörön kezdve laposan íves; feje része a mellrészről sekély barázda által elválasztott, vaskos, domború, elől tompán elkerékített, majdnem elnetszett, előre irányzott serteszerű szőrözettel borított. A mellvért paizsalakú, lapos, gyéren álló, vékony, hosszú szőrökkel. A rágók vaskosak, oldalról tekintve ekálakúak, tövük a homlok előtt térdszerűen kiálló, egyebkent sötét vörösbarnák, serteszerű szőrökkel borítottak. Az állkapcsok elől kissé lapátformára szelesedők, domborúak, vörösbarnák, erős szőrözettel; az alajk a végén elnetszett. A tapogató végize füstös, sertekkel elegyesen bozontosan szőrös, alul 3—4 tüskével s oly hosszú, mint a száríz a térdizel együttvéve. A lábak egyszínűen vörössárgák, szőrösök, alsó felükön és oldalt gyéren tüskesek. A végtest szépen kissé nyújtott-tojásdad, felületen a fentírt rajzzal, hasfelén egyszínűen olajbarna.

A középszemesoport egy előre felé igen szürkült trapezben elhelyezve: az alsó sor a homlok szeletől több mint szemátnérőnyire, oldalszeméi láthatóan kördedek s a középsőktől mintegy másfélszer oly távol ságra mint emezek egymástól; e sor, előlről tekintve, egyenes; a hátsó sor középszemei annyira állanak egymástól, a mennyire állanak az alsó sor középsőitől; a hátsó sor oldalszeméi a középsőktől kevéssel távolabbra mint ezek egymástól, — e sor ívesen behajló s az alsónál hosszabb. A zár egy szivalakú, kissé domború, vörösbarna térese, melybe a légzőrés felől, egy világos barnászörös  resz csaposan belefekszik.

Mertekek: ♀ Törzs	15.5—16	$\frac{m}{m}$ ebből
fej mell	7	»
I lábpár	20	»

A lábak hosszaránya 1, 4, 2, 3.

♂ karesőbb; aránylag hosszabb lábakkal. A fej besötétedése tetemesebb. A színezet a nőstényével azonos, a végtest rajza ritkán kissé elmosódott. A tapogató meglehetősen hosszú, kivastagodott nemzőrésszel, a czombfelületen három kis tüskével; a száríz rövid, kézforma, három ujszerű nyújtvánnyal, melyek közül az oldalt kifelé álló lapiczka, a többi kissé kampós, hegyes; a pikkely kanálalakú, domború, szőrös, tövénél (külső oldalán) kimetszett, úgy hogy a szárízzal mintegy nyel által függ össze; a nemzőrés kidagadó, s egy sima, domború gyűjtőt mutat, a melyből egy újjalaku, kissé kampósan hajló és előre irányzott, tompa végű nyújtvány kiáll, mely mögött még két rövidebb nyújtvány látható.

Mertekek: ♂ Törzs	11	$\frac{m}{m}$ ebből
fej mell	6	»
I lábpár	21	»

Leginkább házi alak, mely pincekben s egyáltalában sötétebb helyiségekben gyakori s szövettel egészen alkalmazkodik a helyiséghez. Soma falu pincekben felhasználja a repedéseket, melyeken vájár által segít, s a hova azután csövet beleszővi; a fal lapját tapadós szövettel kikárpitozza, s a rovar, mely e szőnyegen pihenést keres, biztos preda; a hol a repedések hiányzanak, ott sarokba szővi csövet s a cső elebe rendetlen hálózatát. Melegebb pincekben, úgy látszik, megszakadás nélkül tenyészik, a hímek azonban leginkább tavaszkor (Május) ivarerettek, s ekkor barangolnak. A szobákban este kaphatók, éjjel mozognak, nappal zugokban meglapulnak; a hol a házak sziklak közelel állanak, ott a sziklak odúiban is

található. Rendesen két kis peteburkot őriz csövében s fiait a második vedlesen tul is gondozza, mire elpusztul.

Ismerem, erdélyi részekből: Kolozsvárról, Mező-Záhról, Szebenből (Sill és Bergleiter gyűjtemények); magyar részekből: Doroszlóról, Palánkáról, Diósgyőrből (várrom pinceje), Miskolcraól (Avas hegy borpinceje), Diósgyőri-Tapoleza (szikla odyakban), Egerből (Skopetzház pinceje), Kőszegről, Budapest vidéke (Muz. gy. Pável), ugyanomán (Kubinyi Ferencz), ugyanomán (Frivaldszky János), Mehádia (Muz. gy. Frivaldszky J.) «Magyarország» jelzővel (Petényi Salamon János).

SPEC. 2. F. A. J. AMAUROBIUS FENESTRALIS. (STR.) ABLAKOS E. GEFENSTERTE K.

(fenestra = ablak; a végtett felületén lévő sötét rajzról véve.)

Syn. 1768. *Aranca feustralis* STROEM «Beskr. ov. Norske Ins.» IV, pag. 362.

Vide: THORELL «Remarks» pag. 205.

♀ Az *A. ferox*-nál kisebb. Előteste szemnyes vörössesárga, füstös fejrészszel. Végteste, felülete közepén élénksárga, feketén felhőzött és porozott, elején egy \square alakú barnafekete, ablakszerű folttal. Lábai vörösses-sárgák, néha elmosódó füstös foltoeskákkal.

A fejmel vaskos, a hátgödörtől a nyelecske felé menedékesen lecsapott; a fejrész igen laposan íves, serteszerű, előre irányozott szőrözettel egészen borított s a szemek felé elmosódva vörösbarnába átmenő; a mellrészről jól elválasztott, elől ívesen elkeresített. A mellvért lapos, paizsulaku, ritkásan álló feketés szőrözettel. A vaskos, oldalról tekintve ékalakú rágók a homlok előtt térdszerűen kiállók, sötét vörösbarnák, erős szőrözettel borítottak. Az állkapcsok elől lapátformára tágulók, elkeresítettek, egyenesen állók, világos vörösbarnák, sárgás szélekkel; az alajk hasonló színezet mellett elől kivágott. A tapogatók vörösses-sárgák, végizük vörösbarna, bozontosan, kefeszerűen szőrös, alsó felén 3—4 tüskével s oly hosszú mint a szár- és térdiz együttvéve. A lábak meglehetősen vaskosak, az ízek közepén néha igen elmosódó füstös foltoeskákkal, különben végig hosszú-szőrösök; czombjaik alul, a száruk és lábvégek felül fegyvertelenek, egyébként gyéren tüskések.

A végtest szépen tojásdad, elől látszólag keskenyebb mint a közepe táján; felülete közepén élénk sárga, néha vörösses lehetett; e világos terben, elől, egy közel négyszögletes barnafekete folt, mely elmosódó világosabb rajz által ablakszerűen van felosztva, s mely alatt a világosabb szín néha elmosódó \wedge szerű harántrajzokká tömörül; az oldalak sárgák, barnával és feketével mintegy porozottak. A has egyszínűen világos-cserbarna.

Az alsó szemsor egyenes, a homlok szélétől szemátmerőnyi távolságra áll; oldalszemek kerekdedek, a középsők kerek, a hátsó középsőknel valamivel nagyobbak s közelebb állanak egymáshoz mint az oldalszemekhez, a melyektől szemátmerőnyire állanak; a hátsó sor bedajló, középszemek közelebb állanak egymáshoz mint az oldalszemekhez, e sor az alsónál hosszabb, a miért is az oldalszemek nagyon resüfösen állanak; a középszemek csoportja egy előrele igen szűkült trapezet alkot.

A zár egy rövid, széles alapu, nyelvszerű, vörösses lemez, mely esücsával a légzőres fele áll, s melynek két oldalán a tojócsövek ∞ -szerűen nyílnak.

Mertekek:	♀	Törzs	10	$\frac{m}{m}$ ebből
		fejmel	5	»
		I lábpár	12	»

A lábak hosszaránya 1, 4, 2, 3.

♂ Keresőbb, kisebb, hosszabb lábakkal, a nősténnyel egyenlő színezetű. A tapogató hosszú, sárga nyelfű; rövid száríze kezforma, felülről tekintve két ujforma tompa nyújtványnyal, melyek közül az egyik oldalt kifele áll s az izzel együtt vörösses.

A pikkely dombornan kanilalakú, külső szélén, a főve fele kivágott, a szárízból jól kiálló, domborúsággal felfele fordított, kefeszerűen szőrös. Nemzőszerve kidagadó; oldalról tekintve sima gyűjtője majdnem felgömbölyű, eleinken vöröses sárga, belőle egy kurtat, lenyomott, fogószerű, felei szerint lapiezkás embolus áll ki, mely vörösbarna; elejen egy halványsárga, hártyaszerű nyújtvány látható.

Mértékek: σ Törzs	8.8 $\frac{m}{m}$ ebből
fej mell	4.3 "
1 láb pár	16.3 "

Messze elterjedett faj, mely a magasabb fekvésű helyekhez van kötve, s a havasokon a fenyő övébe messze behatol. Ezer lábnál (a tenger színe felett) alantabb helyekről nem ismerem, legalább a mennyiben magam gyűjtöttem. Különösen gyakori a kiszáradt fenyvek elálló kérge alatt, de kövek alatt is tartózkodik, sőt egy ízben a tarnák nyílását támogató faalkotmányok könyökeiben létező résekben is találtam, hol hálóját, voltaképen szövétét épen úgy készíté mint az *A. ferox*, holott a kérgek alatt sajátos, fészek-alakú lakást készít, a melyben nagy peteburkát őrizi. Éjjel barangol s ilyenkor a bokrok levelein óvatosan, maeskamódra kuszva nem ritkán látható; a lámpás fénytől meghökken de nem futamodik meg.

Ismerem erdelyi részekből: Kolozsvárról (Muzeumkert), Görgény Szt.-Imréről (Várom), Buesin és Mezőhavas fenyőöve (Hargita hegylánc), Nagy-Hagymás fenyőöve (Csiki havasok), Szeben környéke (Sill és Bergleiter gyűjteménye, továbbá Seidlitz jegyzéke szerint sub *Ciniflo atrox*); magyar részekből: Mehadia (Mucsuronye a Damoclet alatt), Alsó-Hámor (Borsod, Hollós fenyves, Kismező, Köhát, Jávorkut); Pribilina (Liptó, Zakameniszko major a Illina havas feven), Lykanka (Liptó), Selmezbanya (Klingertarna tanaszfű, de csak a mennyire meg a napvilága behatolt) «Pest» jelzővel (Muz. gy. Fridvalsky János).

SPEC. 3. FAJ. AMAUROBIUS CLAUSTRARIUS. (HAHN.) ZÁRKOZOTT F. KLAUSEN K.

(claustrum = zár, korlát, zárkészülék; a rejtett életmódról véve.)

Syn. 1831. *Clubiona claustraria* HAHN «Die Arachniden» I. pag. 114

Vide: THORELL «Remarks» pag. 503.

♀ Előteste és lábai rozsdavörösek, a fejrész eleje vörösbarnásba átmenő. Végteste olajbarna, felületen végig egy barna, fogasos közepesikkal, melyhez jobbról-balról Λ szerűen álló, előre és a fonók fele egyenletesen esökkenő, sárgás ágrajzok illeszkednek. Az *A. ferox*-ra emlékeztető, sokkal kisebb alak, kurtat, vaskos lábakkal.

A fej mell, oldalról tekintve, a nyelecsketől a fejbübjáig ívesen felemelt, s felülről tekintve, vaskos; fejerésze a mellrésznel csak kevésbé keskenyebb, módosan elvasasztott, a szemesoport táján előreirányozott, gyengébb szőrözettel borított s itt valamivel sötétebb. A mellvért paizsalakú, lapos, ritkás, gyenge szőrözettel fedett. A rágók, oldalról tekintve, igen vastag tövűek s végök felé hirtelen vékonyolók, a fő feletti vastagságuknál alig hosszabbak, tövükkel a homlok előtt terdszerűen igen kiálló, vörösbarnak és gyeren szőrösek. Az állkapcsok lapiezkások, kifele elkerekített, befelé kissé szögletes véggel, s ez utóbbival kissé az alajk felébe nyúlók, vörösbarnak; az alajk a végén kivágott, kissé világosodó. A tapogató vörössárga, végíze füstös, kefeszerű rövid szőrözettel, valamivel rövidebb mint a terd és száríz együttveve. A lábak rozsdavörösek, végig szőrösek; czombjaik, alul, a többi izek felül fegyvertelenek, máskülönben gyeren tüskések.

A végtest majdnem megfordított-tojásdad: elől valamivel keskenyebb mint hátul, oldalai igen enyészett világosb foltosorokkal, hasa olajbarna, ketoldalt elmosott sárgás szegélylyel, mely alig kivehető.

Az alsó szemsor egyenes s a homlok szélétől többre mint szemátmerőnyire áll, középszemei az oldalszemektől két szemátmerőnyire; a hátsó sor oldalszemei e sor középsőitől majdnem másfelször akkora távolságra mint a középszemek egymástól; a hátsó sor az alsónál hosszabb, úgy, hogy az oldalszemek resüntös állást foglalnak el; a közep szemesoport egy előre fele szűkült trapezben elhelyezett.

A zár két egymásmellett fekvő, hólyagos, fényes, hengerded, vörössárga emelkedésből áll.

Mértekek: ♂ Törzs	10.5 $\frac{m}{m}$ ebből
fej mell	4.4 "
I lábpár	9 "

A lábak hosszaránya 1, 4, 2, 3.

♂ kisebb, karesu, hosszabb lábakkal, élénkebb színezettel. Előteste világos rozsdasárga s ily színűek az állkapcsok is. Egyebekben a nősténynyel azonos. A tapogató hosszú; rövid szárú kézalaku, felülről tekintve három nyújtványt mutat, melyek közül a külső szelen és közepén álló rövid és elkerékített, a belső szelen álló igen hosszú, éleshegyes, a pikkely töve felébe kanyarodó; a pikkely domborúan-kanálalakú, szőrös, — tövén, külső szelen hirtelen kivágott; a nemzőszerv rozsdavörös, kidagadó, egyszerű szerkezetű felgömbölyű gyűjtőt mutat, melyen egy emelkedett borda látható; a gyűjtőn egy egyszerű göcsalakú nyújtvány látható.

Mértekek: ♂ törzs	8 $\frac{m}{m}$ ebből
fej mell	3.8 "
I lábpár	11.5 "

Egyedül a Kárpátok területéről ismerem, hol a esorbai tó és Pribilina (Liptó) környékén találtam kövek alatt (Augusztus hó). Koch L. szerint Erdélyben is előfordul (Seidlitz jegyzete sub Cimflo); rongált példányok szerint megközelítőleg meghatároztam Szébenben (Sill gyűjtemény). Eddig csak Németországból és magyar földről ismeretes faj. (lásd: «L. Koch: Die Arachniden Gattung Amaurobius, Coelotes und Cybaeus etc.» 1868. Nürnberg p. 21.).

SPEC. 4. FAJ. AMAUROBIUS PALLIDUS. L. K. FAKÓ E. FAHLE K.

(pallidus = sápadt, halavány; a színezet jellegére ezélez.)

Syn. 1868. *Amaurobius pallidus* L. Koch «die Ar. Gatt. Amaur. Coel. und Cyb». p. 26.

(IX. tábla 195 ♀, 196 ♂, 197 a ♀ zárja, 198 a ♂ tapogatója.)

♀ Előteste barnászörös, sötét fejrészszel: végtete sárgás földön barna foltokkal sűrűn tarkázva s felülete elején egy sárgás rövid esikkal, mely barnával szegélyezett, egészben kissé elmosódó. Lábai vöröses sárgák, néha sötétebbek; vaskosak.

Fejmelle igen vaskos; felülről tekintve a fejrész eleje csak alig keskenyebb a mellrésznel, — oldalról tekintve az egész a nyeleeskétől a fejbubjaig ívesen emelkedő; a fejrész igen gyéren szőrös, vörösbarnán besötétítve; a mellrész világosabb. A mellvert paizsalakú, lapos, barnás-agyagsárga, gyéren szőrös. A rágók vaskosak, oldalról tekintve körtealakúak, tövükkel a homlok előtt terdszerűen kiállók, vörösbarnák és, szőröseek. Az állkapcsok majdnem párhuzamosak, végök kifele-oldalt résűntös; az aljuk kimetszett; az állkapcsok és az aljuk barnászöröseek némileg világosodó végekkel. A tapogató vörössárga, végze füstös, kefeszerűen és tüskékkel elegyesen szőrös, rövidebb mint a szár és térdiz együttvéve. A lábak vaskosak, végig szőröseek; a czombok, alul, a többi íz felül fegyvertelen, különben gyéren erőstüskés. A végtest tojásdad, rövid szőrökkel borított, sárgás földön barna foltokkal úgy tarkázva, hogy a közepén némi határozatlan sárga rajz alakul, melyen felül egy sárgás esik, barnás szegélyben látható. A has sárgás, néha egy barna közep és két oldalesikkal, melyek néha pontsorokra bomlanak, néha elmosódnak. A középszemek, jelesen az alsó sorai, igen kicsinyek, az utóbbiak szemátmérőnyire egymástól, bőven két szemátmérőnyire a nagy, tojásdad, alsó oldalszemektől; az alsó sor oldalszemai a homlokszeletől alig a kisebb átmérőjüknek megfelelő távolságra állók; mindkét oldalszem egy tetemes, kolbászalakú közös emelkedésen áll; az alsó sor egyenes; a hátsó sor behajló, hosszabb az alsónál, oldalszemai a középsőknel sokkal nagyobbak s tavolabb allanak mint a középsők egymástól.

A zár egy zart emberi szájhoz hasonló s a nyelecske felől egy terjedelmes, magasságánál szélesebb, szemcsésen pontozott, vörösbarna téresehez esatlakozik.

Mértékek: ♀	Törzs	11.5 $\frac{mm}{m}$	noha kisebb; ebből
	fej mell	5.5 »	
	I lábpár	1.3 »	

A lábak hosszaránya 1, 4, 2, 3.

♂ Kisebb, karesubb; világosabb színezetű; végtestének rajza és tarkasága a nőstényenél elenkebb és határozottabb. A fej mell fejerése a mellresznél keskenyebb. Lábai karesubbak. A tapogató arányos; ezombja felületének végén három erős tüske; a rövid száríz kezforma; felülről tekintve három rövid nyujtványt mutat, melyek közül a belső a legrövidebb, körömszerűen hajlott, tompán csúcsos, — a külső vaskos, hengerded-csapforma, elkerekített végű, vörössárga; a pikkely domborúan kanálalakú, a csúcsán kefeszerűen szőrös, külső oldalának töve fele nagyon kivágott, domborúságával felfele fordított; nemzőszerve kidagadó; alulról szemlelve, a gyűjtő egy vaskos felkarikához hasonlít, melynek közepéből egy nyitott madárcsőrhöz hasonló, kétágú, rövidke, vörösbarna nyujtvány kiáll, míg belső feleből egy a tovon sárga, hegyen vörösbarna, egyszerű nyujtvány előre irányul.

Mértékek: ♂	Törzs	8 $\frac{mm}{m}$	ebből
	fej mell	4 »	
	I lábpár	15 »	

E jeles faj eddig csak magyarföldről ismeretes; eredeti leírása (lásd fennebb az idézetet) azok után a példányok után készült, a melyeket Dr. Paliardi Mehádia környéken gyűjtött, a melyek azonban mind nőstények voltak. A him itt iratik le először. Mint nyári alakot kizárólagosan csak az Alduma szorosaitól ismerem, hol főként a görgetegeket, ritkábban a ledöntött fak elálló kerget választja lakásul.

Ismerem: Orsováról (Allion-hegy), Mehádioról (Stubei és Mucsuronye, részben már a fenyves övben fekvő legelők), Ó-Ogradenáról és Baziásról.

SPEC. 5. FAJ. AMAUROBIUS ERBERI. (KEYS.). ERBER E. ERBERS K.

(ERBER ügyes gyűjtő tiszteletére.)

Syn. 1863. *Ciniflo Erberi* KEYSERLING «Verhandl. der k. k. zool.-bot. Ges. Wien» XIII, p. 373.

Vide: L. KOCH «Ueber die Arachn. Gatt. Amaur. &c.» p. 21. (sub *Ciniflo*).

THORELL «Remarks» p. 207. (*Ciniflo* Cyrilli).

♀ Elötteste szennyes vörössárga, sötétebb fejjel; végteste olajbarna, elmosódó-halványsárga rajzzal, mely elejen három halvány csíkot, e mögött elmosódó \wedge szerű rajzokat tüntet elő. A lábak vörössárgák. Az *A. pallidus*hoz közel álló, de kisebb, karesubb faj. A fej mell módosabb, oldalról tekintve laposan íves; a fejresz vörösbarnába átmenő, elejen a mellresznél csak kevessel keskenyebb, a szemek téresején előre irányozott szőrökkel borított. A mellvert sárgás, szélességénél sokkal hosszabb, egészben paizsalakú, lapos, gyéren szőrös. A rágók vaskosak, oldalról tekintve vastag-ékalakúak, kisse előre irányzottak, színök sötét vörösbarna; tövükkel inkább ívesen mint terdszerűen a homlok előtt kiállóak, szőrösök. Az allkapesok, tövüktől kezdve az elkerekített végig, ívesen és könnyeden egymásfele hajlók, a rágóknál sokkal rövidebbek, vörössárgák; az alajk a végén elvágott. A tapogató vörössárga, végize sötétebb, tüskekkal elegyesen szőrös, oly hosszú mint a szár- és terdiz együttve. A lábak vörössárgák, vegeik kisse sötetedők, — végig szőrösök; a ezombok alul, a többi iz felül fegyvertelenek, különben gyéren tüskések. A végtest hossztojásdad a fenterintett halvány rajzzal, mely noha majdnem egészen elmosott, mely esetben a végtest olajbarna. A has többnyire olajbarna, noha igen határozatlan világosabb csíkokkal.

Az alsó szemisor alig egy oldalszem-átmérőnyire a homlok szeletől, oldalszemei a középsőtől az oldalszem kisebb átmerőjének megfelelő távolságra; e sor egyenes, oldalszemei tojásdadok s a középsőknel nagyobbak; a hatsó sor komlyeden behajló, oldalszemei kevéssel távolabbra a középsőtől mint ezek egymástól; az oldalszemek közös, igen lapos emelkedésen s egy oldal-szemátmérőnyire egymástól.

A zár egy felkerék, kirívóan vörösbarna terese, melybe a legzöres felől egy ∞ alakú, harántfekvő, darab mintegy beekelődik.

Mertekek: ♀ Törzs	9	$\frac{m}{m}$ ebből
fejmell.	3.5	»
I lábpár	9	»

A lábak hosszaránya 1, 4, 2, 3.

♂ Kisebb, karsu, hosszabb lábakkal, világosabb elő- és hátrazottabb rajzu vegtesttel. A tapogató világos vörössárga, a czomb felületének végén két párosan álló rövidebb, ezek mögött egy hosszabb tüske; a rövid száríz kezakku, felülről tekintve, három nyujtványnyal, melyek közül a belső a leghosszabb, sötét vörösbarna, eleshegyes, a külső vörössárga, csapszerű és rövidebb, a középső vörösbarna, ujj forma; a pikkely domboruan kanálalakú, a töve külső szelen nagyon kivágott; hegven kefeszerűen szőrös; — nemzőszerve igen kidagadó; oldalról tekintve a gyűjtő karikászerű, közepén kivájt s a kivajásban egy széles rövid tompahegyű, mellette két kisebb együttálló nyujtványnyal; valemennyi nyujtvány sötét barnavörös, a gyűjtő vörössárga.

Mertekek: ♂ Törzs	6.5	$\frac{m}{m}$ ebből
fejmell.	3	»
I lábpár	12	»

Eddig kizárólagosan csak a budapesti Gellérthegyről ismeretes, hol evekkel ezelőtt magam gyűjtöttem szeptemberben kövek alól; 1873-ban Pavel János muzeumi gyűjtő is talált néhányat ugyane helységen. Koch L. és Keyserling gróf jegyzesei szerint, ezidő szerint a magyar lelhelyen kívül csak Lesina és Syra deleurópai szigetekről és a Pyreneusokról ismeretes, mely utobbi helyről Simon ismertette. Ritkas esövet a kövek alája alkalmazza. — Keyserling és Koch leírásai Lesina és Syrai példányok után készültek, melyek, mint deliek kisse elenkebb rajzokkal bírhattak.

SUBFAM. II. ALCSALÁD. AGALENINAE. TÖMLŐSÖK. TRICHTERSPINNEN.

(Lásd: «Agalenoidae». A magyar elnevezés a szövet rejtjéről.)

GEN. 4. NEM. CYBAEUS. L. K.

(cybaeus = hasas; az alakról véve.)

Syn. 1868. L. Koch «Die Arachn. Gatt. Amaur. Coel. Cyb.» p. 64.

Vide: THORELL «On Europ. Spid.» p. 127.

A felső fonópar rövidebb és egy izű; a fonalszűrő és nyüst hiányzik. A lábvegek két bordás és egy sünjakörömmel. Az állkapcsok domborúak, nem benyomottak; az alajk majdnem negyszögletes, a végén komlyeden kivágott.

E nem képviselői, melyek regebben az Amaurobiusok közé soroltattak, leginkább a fonalszűrő és nyüst hiányánál (♂ és ♀-nél) fogva egyesítettek egy külön nembe.

Életmódra nevez az Amaurobiusokhoz igen közel állanak.

SPEC. 1. FAJ. CYBAEUS TETRICUS. (C. K.). БУВО ТАРНАПОК. SCHLUPF STOLLENSPINNE.

(tetricus = komoly, sötét; színezetről és életmódról véve.)

Syn. 1839. Amaurobius tetricus C. K. «Die Arachn.» VI, p. 43.

Vide: L. Koch «Die Arachn. Gatt. Amaur, Coel. Cyb.» p. 50.

♀ Az előtest világos, halvány-vörössesbarna; a végtest sárgásszürke, barnásan porozott, felületen néhány Λ alakú sárgás rajzzal. A lábak barnássárgák.

A fejmell módosan fejlett, fejerésze az Amaurobiusokéhoz képest keskenyedő; oldalról tekintve a fejresz a résszerű hátgödörig majdnem vízszintes, igen laposan domború, a hátgödörön túl, a nyelecske felé lecsapott, elől elkerekített. A mellvért paizs alakú, majdnem oly hosszú a milyen széles, lapos, gyéren szőrös, világos-barnássárga. A rágók világos barnássárgák, a beesapó rés táján vörösbarnák, oldalról tekintve vastagon ek alakúak, tövükkel térszerűen és nagyon a homlok előtt kiállók. Az állkapcsok világos barnássárgák, tövüktől elkerekített végökig könnyedén egymásfelé hajlók; az aljuk közel négyszögletes, könnyedén kivágott. A tapogatók világos barnássárgák kissé sötétedő végizzel, mely gyéren szőrös és köröskörül tüskés s majdnem oly hosszú, mint a szár és térdiz együttvéve. A lábak barnássárgák, tövükön vastakak, vékonyodó végekkel, itt-ott határozatlan, szürkés foltokkal; a czombok alatt, a többi izek felül fegyvertelenek. A végtest rövid-tojásdad. A has egyszínűen halvány szürkésárga.

Az alsó szemsor egyenes, kerek középszemei kicsinyek, oldalszemei nagyobbak és tojásdadok, középszemei a homlok szeletől bőven két szemátmerőnyire s valamennyi szeme egyenlő távolságra egymástól; a hátsó sor könnyedén behajló, majdnem egyenes, oldalszemei közelebb a középsőkhöz mint ezek egymáshoz; az oldalszemek közös, barna, lapos emelkedesen állanak s nem érintkeznek.

A zár kissé domborodó, trapezalakú, a legzőrés szelén veset alakú barna réssel, mely felett még két szinten barna — — forma hasíték látható.

Mertekek: ♀ Torzs	7	$\frac{m}{mm}$ ebből
fejmell	3.5	"
I lábpár	9	"
IV "	10	"

A lábak hosszaránya 4, 1, 2, 3.

♂ Karsubb, valamivel sötétebb végtesttel; színezet és rajz tekintetében különben a ♀-nyel egyezik.

A tapogató térd és szárizze egyenlő hosszúságúak; a térdizen kifele oldalt kiállva s előre kanyarodva egy erős, hüvelykujj forma, tompavegű, előfelen és végén sok fekete szemölcs-tüskevel borított nyújtványúval. A jól kidagadó gyűjtő sötét-barnavörös, külső oldaláról tekintve hátul horgas.

Mertekek: ♂ Torzs	6.3	$\frac{m}{mm}$ ebből
fejmell	3	"
I lábpár	11.5	"
IV "	11.9	"

Ismerem Also-Hamorból (Borsod) hol júniusban ivarérett. Pavel Janos Maramarosban (Pietrosz) bőven gyűjte. Dr. Koch L. Bajorország és Karinthia havasairól ismertette.

GEN. 5. NEM. COELOTES. BLACKW.

(Κοιλόω = vájni; a tartózkodásra ezélez.)

Syn. 1841. BLACKWALL «The diff. in the number of eyes» p. 618.

Vide: THORELL «On europ. Spiders» p. 128. et L. Koch, «Die Arachn. Gatt. Amaur. Coelot. Cyb. &c.» p. 32.

A felső fonópar hosszabb az alsónál, kétizű, a végiz az alapiznél nem hosszabb, csúcsos, alsó felen cseves. A rágók tove térszerűen kiálló. A fonalszűrő és a nyüst hiányzik. A lábvegeken két bordás és egy sánjaköröm.

Vaskos, vajó alakok, melyek életmódra nézve sokban hasonlítanak az Amaurobiusok és Cybaeusokhoz, ezektől azonban a fonalszűrő és nyüst hiánya és illetőleg a fonók berendezése által különböznek.

SPEC. I. F. A. J. COELOTES ATROPOS. (WALCK.) VASKOS BÁNYÁSZPÓK. VIERSCHROTTIGE GRUBENSPINNE.

(ἀτρεπτος = idétlen, ügyetlen, nehézkes; az alakra czélozva; de kérelhetetlen is.)

Syn. 1830. *Drassus atropos* WALCKENAER «Faun. Franc.» p. 170.

Vide: THORELL «Remarks» p. 437.

♀ Előteste barnavörös, fejeresze feketebe átmenő. Végteste barna, sárgával elegyített, felülete elejen egy rövid, szennyessárga közepesikkal, e mögött néhány kurta, hasonló színű α szerű rajzzal. Lábai sárgászörösek, vaskosak.

A fejmell vastag; fejeresze elől felfömbbszerűen domború; az egész oldalról tekintve, a nyelecskétől egyenletesen, lankásan emelkedő, alig íves; a fejresz fényes, gyeren és finoman szőrös; a szemek terén néhány előre álló erősebb szőr. A mellvert tágasan pajzsalakú, sárgásbarna, lapos és gyeren szőrös. A rágók vaskosak, oldalról tekintve, körtvealakúak, vörösbarnák és bőven szőrösek; tövükkel a homlok előtt térd-szerűen kiálló s végeikkel azután kissé az állkapcsokra csapottak. Az állkapcsok lapiczkasok, elkerekítettek, kissé egymásfele hajlók, vörösbarnák, hosszú szőrökkel; a széles alajk hasonló színű s közel két harmadát eri el az állkapcsoknak; elől elmetsett. A lábak erős czombjai alul, a többi ízek felül fegyvertelenek, különben erős tüskekkal fegyverezettek. A végtest elől elmetsett, közepén a legszélesebb, hátul elkerekített, felületén a fennirt rajzzal, mely neha hiányzik, a mely esetben az egész hátfele barna, szennyes sárga színnel kevert; ritkán a földje szennyes fehér barnásan porozva. A has egyszínűen olajbarna.

Az alsó szemsor közel a homlok szélehez, a távolság egy oldalszem kisebb átmérőjének megfelelő, majdnem egyenes (behajlásra hajlandó); szemei majdnem egyforma távolságban egymástól; a hátsó sor hosszabb az alsónál, szemei egyenlő távolságban egymástól, középszemei valamivel nagyobbak az alsó sor középsőinél; az oldalszemek egy kolbász alakú, reszűntösen álló közös emelkedésen.

A zár egy nyelvvalaku fényes középdarabból áll, mely egy, a legzőres fele nyitott keretbe van foglalva s a legzőres táján kissé beszögellik.

Mertekek: ♀ Torzs	13 $\frac{mm}{mm}$ ebből
fejmell	6.5 "
I labpar	14.5 "
IV "	15.5 "

A lábak hosszaránya 4, 1, 2, 3.

♂ Sokkal kisebb, karesú; világos barnássárga előtesttel és lábakkal; a végtest rajzai mindig megvanmak es elesebbek. A tapogató berendezése elűt az Amaurobiusétól. Térdize vastagodott, külső oldalán egy farkasfűlhöz hasonló, csücsös nyujtványnyal, a száríz vékonyabb, töven es vegen reszűntösen metszett; a pikkely kevésse domború, hosszú, csücsösen kanalakú, a vegen szőrös, belső szelen néhány tüske; a nemzőszerv módosan kidagadó, többszor behorpasztott gyűjtővel, melyből — külső oldaláról és felülről tekintve a pikkelyt — egy vaskos nyelvforma, töven fehères, vegen feketes nyujtvány kiáll.

Mertekek: ♂ Torzs	8.5 $\frac{mm}{mm}$ ebből
fejmell	4.5 "
I labpar	13 "

Hegyi faj, melynek kifejlődése vagyis ivarérettsege a nyár derekára s azon túl esik, s a mely az előhegysegtől a havasokon körülbelül 6000 lab magasságig, tehát a fa tenyeszőven túl is előfordul s termőhelyein gyakori. Az előhegyseghen inkább a fatönkók gyökerei mellett vajja tönkeleges lakását, gyakran az

elálló körgeket is felhasználja; a havasok magaslatain leginkább azokat a köveket kedveli, a melyek az idők folyamában a gyepekbe bemélyedtek. A lakást leirtam az építmények tárgyalásánál (lásd I. köt. III. t. 57). Koch L. «Die Arachn. Gatt. Am. Coel. und Cyb etc» pag. 46 csak egy peteburokról emlékezik, én legtöbbszörre kettőt, néha hármat is észleltem. Az anya bevárja a fiak kikelesét s azokat sokáig gondozza.

Ismerem, erdélyi részekből: Görgény Szt.-Imréről, a Mezőhavasról (Hargita hegyláncz), Szében környékéről (valószínűleg «Praesbe» Sill gyűjtemény); magyar részekből: Orsováról (Allion hegy), Ó-Ogradena (Mragonya völgy), Alsóhámor (Borsod a «Bükk hegység» sok pontjáról), a «Magas Tátráról» nevezetesen a «Csorbai tó» környékéről, a «Kriváuról» az ugynevezett «Prjelubák» legmagasabb pontjáig, Pribilimáról (Liptó-Pongrácz Ede-fele «Zakameniszko major»), Ruttkáról, Selmeczbányáról, Tatra Füredről (Muz. gy. Frivaldszky J.) «Biharmegye» jelzővel (Muz. gy. Frivaldszky J.)

SPEC. 2. FAJ. COELOTES INERMIS. L. K. FEGYVERTELEN B. UNBEWEHRTE G.

(inermis = fegyvertelen.)

Syn. 1855. *Amaurobius inermis* L. Koch «Zur. Charact. des Artenunterschl. etc.»

Vide: L. Koch «Die Ar. Gatt. Amaur. Coel. Cyb.» pag. 33.

♀ Előteste barnászörös, a homlokon füstöslebb; végteste szennyessárgás, barna rajzzal, mely néha különösen a himmel, néhány \wedge szerű világos rajzot letesít; hasa szennyessárga; lábai barnászörösek, a ezombok barnássárgába átmenők, a két első lábpár szára és végizei valamivel sötétebbek.

A fej mell vaskos, kissé nyújtott, elől ívesen elkeresztelt; a fejrész két csekély barázda által jól elválasztott; a hátrés hosszú, körülötte a sugaras benyomások jól láthatók, a fejrész közepén egy sor hosszabb szőr látható. A mellvért barnászörös, pajzsakú, kissé domborodott, különben sima, gyér szőrözettel. A rágók erősek, élénk barnászörösek, tövük térszerűen és igen tetemesen kiálló, végük kissé szétálló, a szőrözet csak a becsapóres szelén tetemes, egyelőtt kurt, gyér. Az állkapcsok élénken barnászörösek, végük sárgás, egyébként szélesek, kissé összehajlók; az alajk ívesen elmetezett, elég széles s a rágók felehosszának bőven megfelel.

A tapogató karesű, elég szőrös, végizen, különösen alul, néhány hosszú tüske, e végiz bőven oly hosszú, mint a térd és szár együttvéve.

A lábak aránylagosak; az első pár szárán és másodvégizen alul három-három tüskepár, a második lábpáron hasonlóképen; a harmadik pár szárán alul, két pár — a negyediken ismét három pár tüske, e két utóbbi párok másodvégizein is több tüske. A végtest hosszkörded, elég magas.

Az alsó szemsor egyenes, szemek egyenlő nagyságúak, és egyenlő távolságra egymástól; az oldal-szemek tojásdadok; a hátsó sor könnyedén behajló, szemek egyenlő nagyságúak, a középsők közelebbre egymáshoz mint az oldalszemekhez, az oldalszemek tojásdadok s az alsó oldalszemekkel egy közös módon dudoron elhelyezettek.

A zár, a nyeleske felőli végén egy kis, kerekded nyílást mutat, e nyílástól a legzörésig egy szalagszerű, szélessegenél hosszabb sima betét észlelhető, az egész zár kissé domborodó.

Mertekek: ♀ Torzs	11·7 $\frac{m}{m}$ ebből
fej mell	5·2 "
I lábpár	11·2 "
II "	10·5 "
III "	9·7 "
IV "	12·7 "

♂ Élesebb rajzzal, a végtest elején egy kurt orsó foltal, mely mögött a szöges rajzok sorakoznak; lábai hosszabbak, teste karesubb. A tapogató elég karesű, ezombja felületen három tüske egymás mögött.

terde szélességénél nem hosszabb, szára még valamivel rövidebb, külső oldalán farkasfülszerűen végződik; a pikkely hosszú, esües, esüese kissé lekonyult, töve fele a külső oldal szélén egy mély csatorna; nemzőszerve egy hosszukás gyűjtőt mutat, mely elől, a pikkely esüese alatt, egy horgosan befelé kanyarodott tetemes nyújtványt visel.

Mértékek: ♂ Torzs	10·2 $\frac{mm}{mm}$ elből
fejmell	5·2 "
I lábpár	13·5 "
II "	12 "
III "	11 "
IV "	14 "

Koch L. tudoraz idézett (második 1868) helyen egy ♀-ról emlékezik meg, a melyet PALLIARDI tudor Melhadia körül gyűjtött, s a melynek zárja, különösen nyílásának terjedelmesb volta által különbözik a tipikus *Coelotes inermis* zárjától; a tudor ur későbbi vizsgálatoknak hagyta fenn annak az eldöntését, vajjon a melhádiai faj új faj vagy csak változata-e a *C. inermis*-nek? Én úgy véltem észlelhetni, hogy a magam nőténye a zár szerint inkább talál a PALLIARDI mint a Koch példányához; de a különbség, melyet más jel nem támogat, oly csekély, hogy új fajt felállítani nem mernék. Úgy látszik, hogy itt csak avval a különbséggel van dolgunk, mely a záron a peték lerakása után mutatkozik, a mikor t. i. a zár kissé sorvadni szokott, minek folytán a nyílások kissé összeszűkülnek. Az en ♀-nyem még nem tojta le petéit. Természetesen kérdéses, vajjon a Dr. Koch példányai melyik állapotban vannak? Én részemről az érintett különbséget csak az állat állapotából magyarázom s a fajt nem változtatom, már azért sem, mert a hím a Koch leírásával azonos és arra nézve is biztos, hogy nőtényemhez tartozik, mert avval egyszerre, egy helyiségből került.

A fajt, mint őszi alakot, Erdélyben, nevezetesen Görgény Szent-Imrén a Várhegy oldalán kövek között szedtem, egy példányát unokaöcsém, Vlkolinszky Jenő Schneezbányáról küldte be, hol a Klingertarna előtti közhalmokban is előfordul.

SPEC. 3. FAL. COELOTES ROSCIDUS? (C. K.) HARMATOS B. THAUÛGE G.

(roscidus = harmatos, megnevésített; talán a végtest porozottságáról.)

Syn. 1837. *Amaurobius roscidus* C. Koch «Herr. Schäff. Deutsch. Ins.» pag. 141, et «Die Arachniden» X, pag. 113.

Vide: L. Koch «Die Arach. Gatt. Amaur. Coel. Cyb.» pag. 40.

♂ Elötteste barnássárga, fejerésze alig sötétedő; az egész a végtesthez képest igen fejlett; végteste sárga földön barna foltokkal, melyek határozatlanul \wedge formára sorakoznak. A lábak vörössárgák sötétebb lábvégekkel.

A fejmell fejerésze a mellrészhez képest keskenyedő, elől elkerékített, oldalról tekintve lapos-ívesen emelkedett, a hátgödör résszerű, hosszú. A mellvért majdnem körded, szélességénél sokkal hosszabb, gyéren finoman szőrös. A rágók barnászörösek, vaskosak, oldalról tekintve, ekalakúak, igen gyéren szőrösek. Az állkapcsok lapiezásos, elől elkerékítettek, belső szeleiken a széles alajkhoz képest ívesen kivágottak, hosszan szőrösek, barnássárgák; a majdnem négyszögletes alajk hasonló színű, elől elnetszett s az állkapcsok felhosszát éri el. A lábak vörössárgák, vörösbarnásba átmenő végekkel; a czombok alul, a többi iz felül fegyvertelenek, különben párosan álló tüskékkel (az I. pár szárán 3 párral) fegyverezettek.

A végtest kicsiny, majdnem hengerded, a végén a felső fonószemőlempár farkszerűen kiáll, két íze egyenlő hosszúságú. A has szennyessárga földön apró, barna pettyekkel.

Az alsó szemsor kissé behajló, oldalszeméi tojásdadok, a középsőknél nagyobbak, valamennyi szeme egyenlő távolságra egymástól s e sor a középszemek táján a karajosan benyomuló homlok szelétől

oly távolságra esik, a mely az oldalszem hosszabb átmérője két-zeresének megfelel; a hátsó szemsor könnyedén behajló, szemei egyformák s az oldalszemek láthatólag távolabb állanak a középsőktől mint ezek egymástól; az alsó és hátsó középszemek közötti távolság nagyobb annál, a mely a hátsó középszemek között elterül.

A tapogató hosszú, szerkezete éles jellemzője a fajnak; barnássárga, a czomb felületének végén három erős tüske; a térd és száríz rövid, egyenlő hosszúságú; a száríz külső oldalon egy farkasfülforma kis nyujtvány; a pikkely rendkívül hosszú, tövével kissé kampósan hajló, keskeny, csücsöses kanálalakú, bőven szőrös, csücske előtt külső szélén kivágott; nemzőszerve szövевényes; a kidagadó barnás vörös gyűjtő a külső oldal felé nyitott, elején egy hirtelen hajlású sarlóalakú nyujtványnyal, mely a pikkely csücske alatt megfekszik, hátsó felelől egy esecsszerű emelkedés áll ki, melyből egy igen hosszú, serteszerű, le- és hátrafelé görbülő embolus indul úgy, hogy legörbülő csücskével a pikkely tövének külsejét éri el.

Mértékek: ♂ Törzs	10.5 $\frac{m}{m}$ ebből
fejmell	5.5 "
I lábpár	15.5 "

A IV-ik lábpár második végze hiányzik, a többi iz azonban határozottan hosszabb az I pár megfelelő ízénél s e szerint a labak hosszaránya 4, 1, 2, 3.

Egyetlen példányát 1868-ik évi szeptember havában a Körösszoróban, Brátka helység táján, a mézsgörgetegekben találtam. A fajnevezhez alkalmazott kérdőjelre az indított, hogy a *Coelotes roscidus* C. Koch = *segestriformis* Dufour mindeddig csak nőstények után ismeretes s minthogy magam csak a leírt himet találtam, kérdéses: vajjon ez C. roscidushoz tartozik-e? Amnyi bizonyos, hogy az eddig ismert *Coelotes*-fajok himeitől úgy nagyság mint szemállás és a tapogató által lenyegesen különbözik. A «roscidus» fajjal leginkább azért tettem érintkezésbe, mert ennek nőstényei, fajrokonuk nőstényei között, a legnagyobbak s az előttem fekvő him is a legnagyobb az eddig ismert *Coelotes* fajok himei között.

SPEC. 4. FAJ. COELOTES SOLITARIUS. L. K. REMETE B. EINSIDLER S.

(solitarius = magányos, egyedülálló; a ritkaságra vonatkozik.)

Syn. 1868. *Coelotes solitarius* L. Koch «Die Arachn. Gatt. Amaurob., Coelotes, Cybaeus» in Abhand. d. Naturh. Ges. zu Nürnberg IV, pag. 38.

♀ A fejmell mellrész sárgabarna, fejerésze vörösbarna; a rágók, az állkapcsok, az alajk és a mellvert sötét vörösbarna; a végtest felülete fekete, barnasárgás foltokkal, melyek a hossz tengely irányára szerint 6—7 \wedge állású, a fonók felé fokozatosan kisebbedő foltokká sorakoznak. A végtest hasfele barnássárga, feketés foltokkal. A labak czomb- és térdizei barnássárgák, a többi izek vörösesbarnák. A fonók barnássárgák.

A homlok alsó széle és az alsó szemsor közötti tér nem szélesebb egy oldalszem átmérőjénél s hosszú sertékkal borított. Az alsó szemsor kissé behajló, a szemközök egyformák; a középszemek kerek, az oldalszemek kördedek, nagyobbak. A hátsó szemsor behajló, a szemközök egyformák. A két sor oldalszemei egy közös dudorodáson állanak.

A rágók becsapórése kívül és belül három foggal fegyverezett. Az alajk az állkapcsoknak felhosszát éri el, alapján szélesebb.

A zár keresztbefekve kördel, betetije szélességénél magasabb, ettől kétfelől a záralapban egy-egy fog.

Mértékek: ♀ Törzs	?
fejmell	4.5 $\frac{m}{m}$ ebből
I lábpár	11 "
IV "	12 "

Dr. H. Zimmermann (Limburg) gyűjteményében a Tatrából, hol is de Rottenberg rovarász gyűjtötte; Dr. Seidlitz gyűjtötte N.-Szeben körül. Leírta és meghatározta Dr. Koch L. Peldányokat nem láttam.

GEN. 6. NEM. TEGENARIA. (LATREILLE.)

(τεγγαρον = tepsi vagy τεγος = háztető; mindenesetre a szüetről.)

Syn. 1804. LATREILLE «Nouv. Dict. d'Hist. Nat.» XXIV. p. 134 ad. part.

Vide: THORELL «On Europ. Spid.» p. 129.

Az alsó szemsor majdnem egyenes vagy könnyedén behajló. A felső fonószemőlespár második íze az alapíznél rövidebb. A fonalszűrő és a nyüst hiányzik; a felső fonópár végíze alsó lapján cséves, a lábvégek két bordás és egy sámlja körömmel. Hosszu lábu, többnyire élénk színezetű alakok, a melyek zugokban vagy sarkokban lepelszerű, bemélyedő hálót készítenek, melynek egyik sarkában a háló lapjára nyíló csövet alkalmaznak, a mely hátul is nyitott; e cső szájában elhelyezkedve lesik prédáikat, mindig felfele álló háttal (soha sem esüngő helyzetben). Legnagyobb részben házi alakok, melyek azonban részben sziklás helyeken a vadonban is előfordulnak; a vadonban élők a fák gyökereit is kedvelik.

SPEC. 1. FAJ. TEGENARIA DOMESTICA. (CL.). HÁZI ZUGPÓK. HAUS WINKELSPINNE.

(domestica = házi; a tartózkodásról véve.)

Syn. 1757. *Araneus domesticus* CLERCK «Aran. Succ» p. 76.

Vide: THORELL «Remarks» p. 155.

♀ Hosszú, erős lábú, közepesen felüli alak. Borszeszben előteste vörössesárga, kissé sötétebb fejrészszel s világos közép és szegélyrajzzal; végteste olajbarna, felületén egy téglavöröses közepesikkal, mely elején élénk sárga keretbe foglalt; száraz állapotban az egész alapszínezete agyagsárga, mely szín a tömött, megfekvő szőrözettől ered. Lábai szürkésfehérek, sűrű, sötét gyűrűzettel. A fejmell fejerésze elől szűkülő, elkerekített, jól elválasztott, a mellrész szélesedő, laposan domború; két oldalán világosabb, befelé esikés szegélylyel, mely a homlokra is átnyúlik; a résszerű, hosszú hátgödör világos szegélylyel, melyből az oldal-szegély felé határozatlan sugárvonalak csillagszerűen oszlanak. A rágók vörösbarnák, erősek, oldalról tekintve ekalakúak, tövükkel a homlok előtt alig kiálló, bőven és hosszú szőrökkel fedettek. Az állkapesok párhuzamosak, középek táján módos behorpasztással, elől elkerekítettek, különben vörösbarnák világos csücesal; az alajk széles, kúpalakú, elől keskenyebb, elnetszett, a rágók felehosszát meghaladja. A mellvért szélesen körded, sárgásbarna, sárga szőrökkel majdnem borított. A tapogató vékony, hosszú; végíze sötétebb s oly hosszú mint a szár és terdz együttvéve, hosszú szőrözettel fedett, töve körül 5—6 hosszú, elálló sertetüskével; a száríz végén egy sötét gyűrű. A lábak hosszúk, erős czombokkal s vékonyan kifutó vegekkel, végig szőrösek; a czombok alul, a többi íz felül fegyvertelen, különben gyéren, hosszú tüskékkel fegyverezettek; a ket első pár czombja alul barnafoltos, felül egyenetlen szélű gyűrűs folttal, a többi láb és íz egyenetlen szélű, sűrűn álló sötétebb gyűrűzettel. A végtest elől elnetszett, keskenyebb, közepetáján a legszélesebb, hátul elkerekített; felülete olajbarna, közepén egy téglavöröses széles hosszecikkal, mely elől szélesen, élénk-sárgásan szegélyezett, hátrafelé sárgás pontok között fut. A has barnás, szakadozott keskeny, sárga szegélylyel, közepén néha sárgás foltpárokkal. Az alsó fonópár vörössesárgás, a felső fonópár alapíze barna, végíze világos, rövid.

A szemesoport a homlok széletől majdnem akkora távolságra, a mekkora a magassága a közep szemesoportnak. A szemek nagyoeskák; az alsó sor középszemei az oldalszemeknél nagyobbak, a sor kissé behajló, szemei egymástól egyforma távolságra; a hátsó sor szemei egyenlők, a sor behajló, oldalszemei a középsőktől kevéssel távolabbra mint ezek egymástól; az oldalszemek közös emelkedésen állva nem érintkeznek.

A zár egy elenk vöröses, felhóldszerű, keskeny bemetszes, mely homoru oldalával a nyelecske fele áll.

Mertekek : ♀ Torzs	13—17	$\frac{mm}{m}$ ebből
fej mell	6.5	»
I Láb pár	27	»
IV	28	»

A lábak hosszaránya változó, néha 1, 4, 2, 3, néha az I. és IV. pár egyenlő, néha 4, 1, 2, 3.

♂ Kisebb vegtest mellett fejlettebb előtesttel. A tapogató hosszú, erős, csúcsosan bunkós, — sötét színezetű; a terd es száríz egyforma hosszúságú, a száríz külső oldalának vege fele két sötét-feketebarna, rövid, vaskos fogacs; a pikkely szépen csúcsosan kanálalakú, domborúságával fölfele fordított, rókavörös szőrrel bőven borított; felülről tekintve a nemzőszerv a pikkely mindket széle alul kiáll; alulról tekintve a külső szelen egy előre irányozott széles, sarlóalakú, sötét-vörösbarna, hosszú nyujtvány látható, mely domboru szelével a pikkely alól kikanyarodva, végével a pikkely csúcsa alá kerül, külső széle felhajtott csatornás; a pikkely töve fele egy esecsalakú vaskos nyujtvány indul, mely hirtelen egy hosszú, vékony serteve alakul, a pikkelyt belső szelen megkerüli s végével a sarlóalakú nyujtvány csatornás szelébe belefekszik.

Mertekek : ♀ Torzs	12.5	$\frac{mm}{m}$ ebből
fej mell	6	»
I láb pár	27.5	»

Nyári alak, mely az aljakban, jelesen házakban, istállókban, padlásokon stb stb. gyakori, felhatol a tornyok fedelei alá is; de sziklafalakon, fák tövében, a mely utak martjain is előfordul s terjedelmes lepelhalójával ügyesen alkalmazkodik.

SPEC. 2. FAJ TEGENARIA DERHAMII (Scop.). DERHAM Z. DERHAMS W.

(Derham, mult századbéli term. barát.)

Syn. 1763. *Aranea Derhamii* Scopoli, Eutom. Carn. p. 400.

Vide : THORELL «Remarks» p. 157.

♀ A megelőző fajnál sokkal kisebb; porosan szürke; vegteste feketés foltokkal párduecszerűen tarkázva. A lábak sárgásszürkek, a czombok es száruk elmosódó, sűrűn álló sötétebb gyűrűzettel. (Borszeszben az előtest barnásvörös, a lábak vörössesárgák).

A fej mell szívalaku, fejeresze a mellreszhez kepest keskenyedő, jól elvlasztott, elől elkerekített; az egész oldalról tekintve, íves; a resszerű hátgödörből indulva a szemekig egy sor előre hajló serte, mely könnyen leválik; a mellresz finoman feketén, azután beljebb szélesen sárgásszürken és esipkesen szegelyezett; a hátgödör környeke szinten világosabb. A mellvert vörösbarna, közepe világosodó, minden esipő előtt egy határozatlan, világos folt. A rágók erősek, oldalról tekintve ekalakuak, tövükkel a homlok előtt kissé kiállók, bőven szőrösök, vörösbarnák. Az állkapcsok egyenesek, elől elkerekítették vörösbarnák, az alajk majdnem négyszögletes, a rágók felhosszának megfelelő, elől elmetszett. A tapogatók vékonyak; valamennyi íz szőrös, közben elálló, hosszú sertekkel, a terd es száríz vege gyűrűs. A lábak hosszúsága nem aránytalan; czombjaik alul, a többi íz felül fegyvertelenek; az első láb pár szárán alul két pár tüske. A vegtest elől elmetszett, keskenyebb hátul szélesedő, végén elkerekített, felülete közepén egy sor \wedge sárgásszürke rajz, mely feketes foltok által választatik el, s e sor mellett ismét feketes foltosorok; a has apróbb foltoes-kákból alakult három sorral. Valamennyi fonó halványsárgás, kocsonyásan áttetsző.

A szemesoport es a homlok szele közötti távolság alig felet teszi a középszemek negyszöge magasságának. Az alsó szemsor egyenes, szemei egyenlő nagyság mellett egyforma távolságra egymástól; a hátsó sor könnyeden behajló, szemei egyenlő nagyság mellett egyforma távolságra egymástól; a két sor középszemei egy előre fele kissé szűkült trapezben elhelyezettek, mely legnagyobb szélességénél magasabb.

A zár egy felkörü terese, mely elején a legzőres szelenek megfelelően kolbaszakakra begöngyolt; e begöngyölés két végén a tojócsövek apró, barnásvörös nyílásai állanak.

Mértékek: ♀ Törzs	10.5 $\frac{m}{m}$ ebből
fej mell	5 "
I lábpár	18 "
IV "	18.5 "

A lábak hosszaránya 4, 1, 2, 3.

♂ Kisebb; szivalaku, széles fejmellet, kis végtesttel, hosszabb lábakkal, besötétített czombokkal. A végtest foltjai néha összefolynak s feketes alapszínezetet letesítenek. A tapogató karesú; hegyes, kis bunkóba végződő; száríze a térdiznél hosszabb, végén egy kurtá sötét fogaacsallal; a pikkely kinyújtott keskeny hegyes veggel, bőven szőrös, szeleesebb töve jól domboru; nemzőszerve alulról tekintve egy lapos, közepén kerek, nyitott gyűjtőt mutat, melyet belső szele tövétől fogva egy felkörbe kanyarodó keskeny egyszerű nyújtvány körül fog.

Mértékek: Törzs	9.5 $\frac{m}{m}$ ebből
fej mell	4.5 "
IV lábpár	22 "

Nyári es kitünően házi alak, mely a pincek ablakaiban, az istállók gerendázatán és zugaiban, olákban stb. lepelszerű, olykor roppant terjedelmű halóit szövi, esőveivel a helyiségekhez ügyesen alkalmazkodik s mindenütt elterjedt.

SPEC. 3. FAJ. *TEGENARIA CAMPESTRIS*. C. K. MEZEI Z. FELD W.

(campestris = mezei; a tartózkodásról.)

Syn. 1841. *Tegenaria campestris* C. Koch, Die Arachn. VIII, p. 34.

Vide: THORELL «Remarks» p. 157.

♀ Kicsiny. Előteste világos-agyagsárga szegély- és középrajzzal; végtestének felülete egy szép tegla-vörös közepesíkkal, mely két elenksárga pontsor által szegélyeztetik. Lábai világossárgásak, sűrű, sötét szőrözettel. Alakban és a színezet beosztásában a *T. domesticának* megfelel, nagyságra nézve azonban ennek alig fele részét éri el.

A fej mell szivalaku, széles mellrészszel, keskeny fejreszszel; sárgás; a fejtető, a mellrész szelei és a reszerű hátgödör környéke világosabb. A mellvert keskeny, paizsalakú, barnás, a közepén egy világosabb keskeny ekkal, a csipők előtt világos foltokkal; a csipők barnás foltokkal. A rágók, oldalról tekintve, ekalakú, vörössárgák, szőrösek. Az állkapcsok sötétebbek, egyenesek, elől elkerekítettek; az aljuk bőven szelesedő, elől elmetszett, vaskos-széles. A tapogató karesú, szőrös, közben elálló sertekkel fegyverzett, végíze sötétedő, oly hosszú mint a szár és térd együttvéve. A lábak karesúk, sárgások, foltokkal elegyesen sűrűn gyűrűzöttek, czombjaik alul, a többi iz felül fegyvertelenek; az első lábpár szára alul egy tüsképárral. A végtest kisse hengeres; olajbarnán pettyezetett felülete közepén a fennírt rajzzal; hasa sárga, barna pontokkal diszített.

Az alsó szemsor igen gyengén behajló; középszemei az oldalszemeknél kisebbek s a homlok szélétől oly távolságra állnak, mely a középső szemnégyszög magasságának felet meghaladja, szemei egyenlő távolságra egymástól; a hátsó sor behajló, szemei egyformák, egymástól egyenlő távolságra állók; az egész csoport szorosan együtt áll.

A zár egy kerekded terese, melyet egy patkóalakú, a nyelecske felé nyitott, keskeny, vörösbarnás res körül fog.

Mértékek: ♀ Törzs	7.2 $\frac{m}{m}$ ebből
fej mell	2.4 "
IV lábpár	13 "

A lábak hosszaránya 4, 1, 2, 3.

♂ Valamivel kisebb, a végtesthez képest fejlettebb fejmellet; színezetre nézve a nősténynyel azonos. Tapogatója bunkós; terd- és száríze egyforma hosszúságú, az utóbbin, külső oldala végén, egy kicsiny, farkas fűlszerű nyujtvánnyal; a pikkely hosszú csúcsba kifutó, bőven szőrös, felülről tekintve a nemző szervnek egy része a pikkely külső szélén kiáll; a nemzőszerv berendezése, alulról tekintve, a *T. domesticæ*-val azonos, avval a különbséggel, hogy a sarlóalakú nyujtvány az állat magyságához képest roppantúl szélesre fejlett, a serteszerű embolus töve pedig nem hirtelenül vékonyodott, hanem az illető hátsó nyujtványba egyenletesen bele enyésző.

Mértékek: ♂ Törzs	5·5 $\frac{m}{mm}$ ebből
fej mell	2·5 „
IV lábpár	13·8 „

E fajnak egyedüli biztos megkülönböztetője voltaképen csak az alak állandó kicsénységében rejlik; a többi lényeges jelleg csak diminutivuma a *Tegenaria domesticæ*-nak s azt tartom, hogy a *Tegenaria campestris* eredeti alakja a *T. domesticæ*-nak, mely utóbbit a kedvezőbb táplálkozási viszonyok nevelték nagyobbá s az eltérést azután állandósíták is.

A *T. campestris* a lápolyban épen úgy mint az előhegységben s a havasokon körülbelül 3000 magasságig fordul elő, hol lepelszerű hálóit kőhalmokban, a fak gyökerei közé s rendszeren úgy szövi, hogy csöve a mohába levezet.

Ismerem, erdélyi részekből: Kolozsvárról es Szebenből (Bergleiterfele gyűjtemény); magyar részekből: Doroszlóról (Hosszúmegeye erdő a síkban), Orsováról (Alliónhegy), Bázsiáról, az Alsó-Hamorból (Borsod «Hollós»), Pribilina (Liptó «Hliva-Havas» 3000' labig), Pest környékéről fiatal példányok (Muz. gy. Frivaldszky Jánostól).

GEN. 7. NEM. CRYPHOECA. THOR.

($\kappa\rho\acute{\upsilon}\zeta\omicron\varsigma$ = elrejtve, $\omicron\iota\acute{\zeta}\acute{\zeta}\omega$ = élni; a tartózkodásról véve.)

1869—70 THORELL «On europ. Spid.» p. 131.

A hátsó szemsor igen könnyedén, az alsó erősen behajló. A felső fonószemőlespár végíze az alapíznek alig felehosszát teszi. A fonók egy a hasfele szélesedett trapezbe elhelyezettek (legalább annál az alaknál, a melyre e jellemzést alapítom.) Kis alakok, melyek rendszeren kövek alá rejtve élnek s laza, ritkás cső mellett rendetlen hálót kötnek. A magyar alak havasi s kizárólagosan a fenyőöv felett s azon túl 6—7000 lab magasságban fordul elő.

SPEC. 1. FAJ. CRYPHOECA CARPATHICA. N. SP. KÁRPÁTI REJTPÓK. KARPATHEX SCHLÜPESPINNE.

(carpathica = a tartózkodásról.)

(VII-ik tábla, 156 a szemesoport, b ♀ zár, c ♂ tapogató, d mérték.)

♀ Az előtest és a lábak zöldessárgásak. A végtest olajbarna; sárgás, részben \propto szerű rajzzal. Valamennyi lábon a szár és másod végiz (metatarsus) alul hosszú, megfekvő, világos tüskekkal fegyverzett, melyek az első és második lábpáron két egyenes sorban s párosan elhelyezkedve állnak. Az alsó szemsor erősen behajló, középszemei az oldalszemeknél sokkal kisebbek; a hátsó sor igen könnyedén behajló, szemei egyenlőek; az alsó szemsor középszemei a homlok széletől oly távolságra, mely egy oldalszem átmérőjét bőven meghaladja.

Az első lábpár szárán 4—5 pár tüske, a másodvégizen 3 pár.

A fejmell zöldessárga, hosszukás-szívalaku, a fej jól elválasztott, keskenyedő és elől elkerékített; a hátgödör pontszerű; a mellrész a lábak fekvésének megfelelő csillagszerűen oszló barázdákkal. A mellvért hosszukás puizsalaku, a negyedik lábpár csípői között kihegyesedett, kissé domborn. agyagsárga és gyéren szőrös. A rágók agyagsárgák jól fejlettek, az első lábpár czombjánál vékonyabbnak; tövükkel nem állanak ki a homlok alól, oldalról tekintve, tetemesen az állkapcsokra esapottak. Az állkapcsok agyagsárgások szélesek, elől elkerékítve nem hajolnak egymásfelé s gyéren szőrösök; az alajk hasonló színű, széles, elől elmetszett, az állkapcsok fele hosszát nem éri el egészen.

A tapogató zöldessárga; végíze húsos, oly hosszú mint a száríz, kétoldalt több megfekvő, hosszú tüskével.

A lábak czombjai zöldessárgák, a többi íz vörösödő, a harmadik lábpár térdize csücsön (felül) egy felálló hosszú tüske, egyebekben mint fentebb.

A végtest olajbarnás, nyújtott-hossztojásdad, a vége kissé csücsös; felülete közepén és elején egy szabálytalan világosabb folt, mely alatt \wedge szerű feheres, elmosódó rajzok állanak s hullámosan az oldalakra enyésznek, neha alig kivethetők; a has egyszínűen olajzöldes, az egész végtest megfekvően nem épen sűrűn szőrös.

A fonók trapezben állanak, sárgások, egyenlő hosszúságúak, a felső pár végíze csücsös és igen rövid, mintegy negyedrésze az alapíznek. A zár az alak kicsinységéhez képest terjedelmes, vörösbarna, kidomborodó, majdnem szívalakú, a nyelecske felé elmetszett. Közepén, hosszában benyomott, úgy hogy két karajyszerű felet képez.

Mértekek:	♀	Törzs	4.2 $\frac{ml}{mm}$	ebből
		fejmell	1.9	»
		I lábpár	5	»
		IV	»	5.8 »

A lábak hosszaránya tehát 4, 1, 2, 3.

♂ Valamivel kisebb, karesűbb lábakkal s világosabb előtesttel. A lábak fegyverzete gyengébb. A tapogató aránylag igen fejlett, térd és száríze egyenlő hosszúságú, a száríz törének külső oldalán egy előre és oldalt irányozott fülszerű függelék; a pikkely tojásdad, igen domborn, fehéres és gyéren szőrös, alóla a nemzőszerv tetemesen kidagad; a nemzőszerv, alulról tekintve, oldalt egy nyújtványt mutat, mely lassanként egy finom, fekete, serteszerű nyújtványba vékonyodik s így a pikkely belső szélehez alkalmazkodva ezt töveig órarúgószerűen körülfogja.

Mértekek:	♂	Törzs	3.5 $\frac{ml}{mm}$	ebből
		fejmell	1.6	»
		IV lábpár	5.4	»

A Krivánon augusztusban nem ritkan és majdnem a csücsig előfordul. Mindig a kövek alsó lapján, igen ritka szövetű csőben található s könnyen gyűjthető, mert nem menekül, hanem lábait szorosan a testhez illesztve vesztig marad. THORELL tanár látta és szintén ismeretlennek állítja.

GEN. 8. NEM. AGALENA. WALCKENAER.

(vide Agalenoideae.)

Syn. 1805. *Agelena* WALCKENAER «Tabl. d'Aran.» pag. 51.

Vide: THORELL «On europ. Spiders» pag. 132.

A hátsó szemsor behajló; az alsó erősen behajló. A felső fonópár kétízű, a végíz karesú, az alapíznel hosszabb és alsó fele hosszában eséves (lásd I. köt. II. tábla 41). A fonók majdnem négyszögben

állanak; a felsők a test végén farkszerűen kiálló. Közepnagyságu alakok, melyek magas fűben bokrokon és sövényeken toleseralaku terjedelmes hálót szőnek, a melyek aljában egy-egy cső nyílik, mely hosszan és néha tömkeleges kanyarulatokban a fűvek, ágak közé, néha üregekbe is vezet.

SPEC. 1. FAJ. AGALENA LABYRINTHICA. (CL.) ILLÓ TÖLCSEÉRPŐK. FLUCHTIGE TRICHTERSPINNE.

(labyrinthus = tömkeleg; a háló tömkeleges esővéről véve.)

Syn. 1757. *Araneus labyrinthicus* CLERCK «Aran. Suec.» pag. 79.

Vide: THORELL «Remarks» pag. 159.

♀ Előtete sárgásszürke, a mellreszen csillagszerűen oszló, barnás vonásokkal, melyek azonban a közepén nem egyesülnek s a szeleket sem érik el. A végtest barnásszürke: felületén 6—7 finom \wedge szerű feheres rajzzal, melyek néha \blacktriangledown szerűen szakadozottak. A lábak sárgás-szürkések, az izek végén barnulók, elálló, hosszú szőrözettel. A has sárgásszürke, ketoldalt egy-egy enyesző barnás csikkal szegélyezve. Meglehetősen nyulánk alak farkszerűen kiálló felső fonópárral.

A fej mell hosszúkás, módosan domború; a fejresz a mellreszhez kepest keskenyedő, teteje elkerekített, a rágók felett kisse pofás; oldalról tekintve az egész laposan íves, közepén egészen végig egy feheres szalag; a mellresz szelei fehéres szegélylyel, s e rajzok megfekvő, ágas szőrözettől erednek (lásd I. köt. II. tábla 22). A mellvert majdnem kerek, hátul hagymaszerűen hirtelenül csücsösödő, lapos és megfekvő feheres s evvel elegyesen felálló sötétes szőrözettel fedett. A rágók vaskosak, oldalról tekintve tövükkel kisse a homlok előtt kiálló, barnásvörösek, módosan szőrösek. Az állkapcsok szélesek, domborúak, agyagsárgások, elől elkerekítve, csak külső széleik fele szőrösök; az alajk négyszögletes és széles, barnás, az állkapcsok felehosszát éri el.

A tapogató karesu, sárgás; végze barnuló sertekkel elegyesen szőrös, hosszabb mint a szár és terdiz együttveve. A lábak elég erősek, szőrösek és hosszúk, sárgásszürkék (borszeszben vörösek), az izek végén elmosódva barnulók, szőrösek igen gyeren inkább sertekkel mint tüskekkal fegyverezettek; a száraz alsó felen legfeljebb három pár sertetüske. A végtest megfekvően szőrös, hossztojásdad. Mind a két szemsor erősen behajló, nagyoeska szemekkel: az alsó szemsor középszemei a homlok széléstől majdnem akkora távolságra, a mekkora a középső szemnégyszögnek a magassága; e középszemek a többieknel valamivel nagyobbak; az alsó sor szemei egyforma távolságra egymástól, az oldalszemek kisse tojásdadok; a hátsó sor középszemei valamivel közelebb egymáshoz, mint e sor oldalszemeihez.

A zár egy terjedelmes vörösbarna köldök, melybe a legzőres felől egy nyelv alakú lemez benyomul, mely azután két oldalt és a nyelecske felől egy széles keretbe foglalva evvel összeillik.

Mertekek: ♀ Törzs	11—12 $\frac{m}{m}$ ebből
fej mell	5.5 »
I lábpár	16.5 »
IV »	20 »

A lábak hosszaránya 4, 1, 2, 3.

Bőven tápláló helyeken nagyobb példányok gyakoriak.

♂ valamivel kisebb, karesubb; színezete a nőstényével azonos. A tapogató hosszú, bunkos és szőrös; terdizen, oldalt, egy, szárizen alul egy erős fogacs; a pikkely csücsösen kanál alakú. A nemzőrész kevésbé kidagadó, egyszerű gyűjtővel, melyen elől egy tulókforma csavaros, vaskos és hegyes rész látható.

Mertekek: ♂ Törzs	9 $\frac{m}{m}$ ebből
fej mell	4 »
IV lábpár	22 »

Gyakran nagyobb: törzs 12.5 $\frac{m}{m}$, IV lábpár 29 $\frac{m}{m}$.

Ez általánosan, de inkább csak az aljakban, neh a havasok fenyő öveben elterjedett fajnak tavaszi és őszi nemzedéke van. Terjedelmes olykor 3 □ dm. terfogatú hálóját, melynek töleser alakú leple sűrű szövetű bokrokon, magasabb növények esoportjaiban, sövényeken sőt olykor magas fak ágai között (fenyveken neh 4—5 méter magasságban pl. a kolozsvári muzeumkertben) található, rendszeren számos példányát mintegy telephen. Párzását, melyet a lepelen vegez, bőven és behatóan tárgyaltam az erd. muzeum egyeslet évkönyveiben (lásd «Adatok Erdély pókfaunájához II.» Erd. Muz. egyeslet evk. IV. köt. p. 38).

Ismerem erdélyi részekből: Kolozsvárról, Mező-Záhról, Nyárad-Szeredáról, Gyergyó Szt.-Miklósról, Tölgyesről, Szebenből (Sill és Bergleiter-fele gyűjtemények); magyar részekből: Doroszlóról, Pancsováról, Jeselnitzáról (Orsova mellett), a Veterani barlang körül, Ó-Ogradena körül, Rakamazról, Tokajból, S.-A. Uj-helyről, az Also-Hámorból (Borsod, «Bükk»), Pribilinaról (Hlina havas fenyő öve), Lykanka (Liptó, várrom), Selmezbányáról, «Pest vidékeről» (Muz. gy. Friváldszky János), Ungvárról, (Muz. gy. Vidra Ferd.), Dabásról, (Muz. gy. Metelka Ferencz).

SPEC. 2. FAJ. AGALENA SIMILIS. KEYS. ROKON T. VERWANDTE T.

(similis - hasonló; az előbbi fajjal való rokonságra czéloz.)

Syn. 1863. *Agalena similis* KEYSERLING «Besch. neuer Sp. etc.» pag. 6.

Vile: THORELL «Remarks» p. 160, 565.

♂ Az előbbi fajnál kisebb; karesubb lábakkal. A has *közepe* szélesen szalagszerűen barna, a szalag belseje neh elmosódva világosodó; a has oldalai világos sárgások. A tapogató végze oly hosszú, mint szár-es terdize együttve. A hátsó szemsor szemei egymástól egyenlő távolságra. A zár egy terjedelmes, vörös-barna, durva keret, közepe tetemesen kivájt, e kivajás feneken egy sárgás lemez, mely a két tojócsőnek látható, tágas nyílását ketfele osztja. A vegtest felülete vörösesbarna, \wedge szerű rajzai elmosódók és egymás-után sorakozottak. Az egész állat igen gyeren szőrös, a lábak szőrözete elálló. Ezek azok a különbségek, a melyeknél fogva e faj nőstényei a rokon fajtól könnyen megkülönböztethetők.

Mertekek: ♀ Törzs	10—11	$\frac{m}{m}$ ebből
fej mell	4	»
IV lábpár	14	»

♂ Karesu, hosszalábú; színezete a nőstényével azonos, a vegtest \wedge szerű rajzai elesebbek. A tapogató bunkója igen fejlett; terde vastagságánál nem hosszabb, külső oldalának a vége dudorszerűen kinyújtott, szára a terdnel rövidebb, külső alsó oldalán egy erős, tompa nyújtvánnyal; a pikkely mélyen kanalakú; ivarszerve igen complicált; egy sima gyűjtőből egy csővekből álló, gomolyagszerűen esavarodott embolus illeszkedik, felette egy széles, nyelv alakú, elkerekített lemez hajlik és irányul előrefele, az egész szerkezet tetemesen kidagad.

Mertekek: ♂ Törzs	9	$\frac{m}{m}$ ebből
fej mell	4.4	»
I lábpár	22.5	»
II »	20.5	»
III »	17.5	»
IV »	21.9	»

Mint nyári és különösen őszi alakot Kolozsvárról ismerem, hol a kertek bokrain fajrokonával együtt található. Előfordul Pozsony vidéken is, homán Böckh Gy. útján a becsi es. állattani muzeumba «*Agalena labyrinthica*» nev alatt került. Dr. Böckh a két fajt egynek nezte.

GEN. 9. NEM. HISTOPONA. THORELL.

(ιστός = szövet, πονέω = csinálni; a szövetre vonatkozik.)

Syn. 1869—70. THORELL «On Europ. Spid.» p. 133.

A hátsó szemsor, felülről tekintve, egyenes; az alsó szemsor behajló. A felső fonópár ketizű, végíze árforma s a hengeres, vastag alapíznél rövidebb. Közepes nagyságon aluli alakok, melyek erdős helyeken a mohában s elálló kergek alá szövik csöveiket.

SPEC. 1. FAJ. HISTOPONA TORPIDA. (C. K.) MEREV KÁRPITOSPÓK. STEIFE LAPPENSPINNE.

(torpidus = merev; úgy látszik az Agalenák ellentétjére értve.)

Syn. *Textrix torpida* C. KOCH «Die Arachniden» VIII, pag. 48.

♀ Előteste barna, világos közepesikkal es oldalszalaggal, mely a mellrész szeleit nem éri. Végteste olajbarna, teglászörössel elegyített, felszine elejen két rövidke, világosabb csikkal. Lábai sárgászörösek a czombok barnulok.

A fejmell jól fejlett, módosan domboru, mellresze kerek; fejerésze jól elválasztott, majdnem párhuzamos oldalakkal, rajzait megfekvő feheres szőrozet alkotja. A mellvert szivalaku, barna; közepe elmosódva világosodó. A rágók czombvastagságuk vörösbarnások, módosan szőrösök, oldalról tekintve ekulakuak, tovükkel igen kis mertekben kidomborodók. Az állkapesok egyenesek, szelesek, elöl elkerekítettek, az alajk széles a rágók hosszát bőven erő. A tapogató karcu, sárgás, czombja felső es alsó lapján füstös, a többi iz legnagyobb részben füstös, a végiz szőrös, oly hosszú, mint a terd es szar együttveve. A lábak karcuk es meglehetősen hosszuk, sárgás-vörösek, a czombok fel- es alszine füstös, a többi izeken sötetebb lehelettel.

A száraz es másodvégzek ülül gyeren álló, megfekvő, vekony es meglehetősen hosszú tüskekkal fegyverzetek. A végtest hossztojasdad, elöl hátul tompa veggel, a femt emlitett rajzzal. A has sárgás, az oldalak barna szine által hatarolt, a fonok előtt egy elmosódó sötetes foltpárral.

Az alsó szemsor láthatólag behajló, középszemeinek távolsága a homlok szeletől megfelel a középső szemnegyszög magasságának, középszemei az oldalszemeknél kisebbek. A hátsó sor egyenes, szemei majdnem egyenlőek s egyforma távolságra egymástól.

A zár egy igen terjedelmes, majdnem kerek, vöröses koldók, melyben egy feheres, szeles majdnem szivalaku es lapos lemez fekszik.

Mertekek: ♀ Törzs	7	$\frac{m}{m}$ ebből
fejmell	2.6	»
I labpár	8.8	»
IV »	11	»

A lábak hosszaránya 4, 1, 2, 3.

E fajt csak egy ♀ példány után ismerem, a melyet nyár derekán Doroszlón («Hosszumege» erdő) kéreg alatt találtam, hol sűrű szövetű, lapos, kerek, mintegy $6\frac{m}{m}$ átmérőjű peteburkát őrzé.

GEN. 10. NEM. TEXTRIX. SUNDEVALL.

(textrix = takácsnő; a szövésre vonatkozik.)

Syn. 1833. SUNDEVALL «Conspectus Arachnidum» pag. 19.

Vide: THORELL «On europ. Spid.» p. 134.

Az alsó szemsor kihajló, a hátsó sor, melynek középszemei az oldalszemeknél nagyobbak, erősen kihajló. A fejmell fejerésze hirtelenül felvetett; a homlok a rágók felett kidül. A felső fonópár karcu, az alapíznél hosszabb. Közepesen alóli alak.

SPEC. 1. FAJ. TEXTRIX DENTICULATA. (OLIV.) FOGAC SOS SZÖVŐPÓK. GEZÁHNTÉ WEBERSPINNE.

(denticulata = fogacsos; a végtest rajzára czélez.)

Syn. 1789. *Aranca denticulata* OLIVIER «Encyclop. meth.» V, pag. 213.

Vide: THORELL «Remarks» p. 160.

♂ juv. Előteste sötet-vörösbarna egy fehér közepesikkal, mely a szemektől a hátdodron túlig terjed. A végtest sötétbarna, felületen egy vörösbarnás, széles, nyelvalaku hátmezővel, mely oldalain fogacsolt, fehér szegélyű, s a belsejében látszó feketes pontok következtében fonottnak látszik. Lábai zöldes sárgások barna gyűrűzettel.

A fej mell nyulánk, mellrésze módosan domború; fejerésze a hátdodortól kezdve kiemelkedő, bubos és e bubbal a rágók felett kiálló, — e bubon allanak a szemek is; felülről tekintve, a fejresz a rágók felett tetemesen pofás. A mellvert majdnem kerek, laposan domború, barna és módosán szőrös. A rágók erősek a fej magasságánál hosszabbak, az első lábpar czombjánál vaskosabbak, barnássárgák, gyéren álló világos szőrözettel. Az állkapesok domborúak, az alajk felett összehajlók, sárgások és bőven szőrösek; az alajk szélességénél alig hosszabb, elől elkerékített, barnás; a rágók felehosszát nem egészen eri el. A tapogatók és lábak alapszíne zöldessárga, helyen közön összefolyó nagyobb barna foltokkal és az ízek végén gyűrűkkel. A végtest körded; has fele (borszeszben) vöröses alapszínnel, sűrűn barna foltokkal elegyítve; (szárazon: deres).

A szemek állása igen jellemző s elénken emlekeztet a «Futók» (Citigradae) alrendeben általánosán elterjedett csoportosításra, a mennyiben t. i. a szemek inkább három mint két sorban allanak. Az alsó sor módosan kihajló, középszemei sötétebbek az oldalszemeknél s oly távolságra allanak a homlok széletől, mely megfelel egy szem kettős átmérőjének, a világos oldalszemek nagyobbak a középsőknel; a hátsó szemek nagyobbak az alsó sor legnagyobb szeménél, a középsők épen a fej bub fokára esnek, s az oldalszemekkel egy alacsony és széles alapu trapezet (∇) foglalnak el.

Mertekek: ♂ juv. Torzs 5.7 $\frac{mm}{m}$ ebből
 fejmell 2.7 "
 IV lábpar 8 "

E rendkívül gyors póknak csak egy ifjabb (harmadvedlesű) himjet ismerem, melyet nyár derekán Doroszlón («Hosszumégye» erdőresz) egy fatónk gyökerének elálló kerge alatt kaptam, hol csövet úgy szövö, hogy az a földbe levezetett. Az alak és ismertető jegyeinek jellegzetessége, mely megengedi, hogy az ifjabb példányra alapított leírás után az ivarerett alakok is felismertessenek, reabirt arra, hogy e mű kerebe belévonjam.

GEN. 11. NEM. AGROECA. WESTRING.

(ἀγροῖκος = falusi, mezőnlakó; a tartózkodásról véve.)

Syn. 1861. WESTRING «Ann. Suec.» p. 311.

Vide: THORELL «On Europ. Spid.» pag. 134.

A lábvegeken csak két bordasköröm; a sámljaköröm hiányzik. A fonók felső és alsó párja majdnem egyenlő hosszúságú; a végzek csúcsaikön csévessek. A felső fonópár megkülönböztethető két izzel.

SPEC. I. F. A. J. AGROECA HAGLUNDI. THOR. HAGLUND PARASZTPOKJA. HAGLUNDS FELDSPINNE.

(Haglund svéd természetbarát tiszteletére.)

Syn. 1871. *Agroeca Haglundii* THORELL «Remarks» p. 162. 565.

♀ Cserbarna. Az előtest közepén egy deres csikkal, a mellrész szelein hasonló szegélylyel; e rajz elmosódó. A végtest finom, megfekvő, sárgás és fehéres szőrőzet által deresedő. A lábak egyszínűen cserbarnák.

A fej mell vaskos; mellrésze a fejhez képest terjedelmes, a fejrész elkerekített; oldalról tekintve az előtest hátvonala majdnem egyenes, a hátgödörön túl a nyelecske felé lecsapott; a mellrész deres szegélye, a lábak fekvésének megfelelően (belső szélén), csipkézett (borszeszenben e csipkék barna 0 szerű, csillagosan oszló rajzok által határoltak). A mellvért cserbarna, fehéres szőrőzettel borított. A rágók, oldalról tekintve, majdnem körtve alakúak, tövükkel a homlok előtt tetemesen kiálló, cserbarnák, fehéres szőrőzettel. Az állkapcsok kanálalakúak, cserbarnák; az alajk nem éri el fele hosszát a állkapcsoknak, cserbarna, elől lapos ívesen elvágott. A tapogató cserbarna, szárán, felül, tömött szőrőzet között három sertetüske; végíze sűrűn szőrös, rövidebb mint a szár- és térdiz együttvéve. A lábak erősek és hosszúk, cserbarnák, végig szőrösök, györen tüskések; a ezombok alul fegyvertelenek; az első lábpár ezombja felületén két tüske, szára alsó felén 2 pár — második láb végíze alsó felén szintén két pár hosszú, megfekvő tüske. A végtest elől elnemszett keskenyebb, hátrafelé szélesedő, hátul elkerekített.

A has sárgás deres, egyszínű. A fonók rövidek, vaskosak, majdnem egyenlő hosszúságúak; a felső pár végíze kicsiny, csúcsos, fehéres.

A két szemsor behajló. Az alsó szemsor középszelei a homlok szélétől oly távolságra, mely egy szemátmérő kétszeresének megfelel; e sor szelei egyforma nagyságúak, az oldalszemek alig észrevehetőleg távolabb a középsőktől mint ezek egymástól; a hátsó sor tetemesebben behajló szelei egyenlő távolságra egymástól.

A zár egy villás, sötétbarna bemetszes, melynek szára a legzörés szélén kezdődik, ágai a nyelecske felé állanak (V) az ágak végeiben nyílnak a tojócsővek.

Mértékek: ♀ Torzs	9 $\frac{m}{mm}$ ebből
fej mell	3.5 »
I lábpár	10 »
IV »	12.5 »

♂ Kisebb, karsú; egészben sötétebb cserbarna. A tapogató ezombja sárgás, a térdiz rövid, vastagodott, a száríz barnás a térdiznél valamivel hosszabb és vékonyabb külső oldalán, elején, egy sötétvörös-barna nyújtvány, mely a pikkely tövéhez illeszkedik; a pikkely rendes kanálalakú, barna; — megfekvő fehéres szőrőzettel borított; nemzőszerve kevésbé kiálló, sötét vörösbarna, s egy dióbel felére emlékeztető hornyoltságot mutat, melyet sem nyújtványok, sem körnök nem jellemzenek.

Mértékek: ♂ Törzs	6.5 $\frac{m}{mm}$ ebből
fej mell	2.7 »
IV lábpár	11 »

E fajt eddigelé csak két ♀ és egy ♂ példány után ismerem. A nőstényeket tavaszkor (május) az apatini pagony «Gája» nevű erdőreszében száraz levelek alatt találtam, a ♂ erdelyi s július hónapban Szász-Vesszősön a «Dumbrava» nevű erdő reszekben találtatott általam. A faj szövetét nem ismerem.

SUBFAM. III. ALCSALÁD. ARGYRONETINAE. BUVÁROK. TAUCHERSPINNEN.

(ἀργυρος = ezüst, νῆω = szőni; a buvárharang ezüstös esillogásáról véve.)

GEN. 12. NEM. ARGYRONETA. LATR.

(vide «Argyronetinae.»)

Syn. 1804. LATREILLE «Nouv. Dict. d'Hist. Nat.» XXIV, pag. 134.

Vide: THORELL «On europ. Spiders» p. 136, 137.

A felső fonópár kétizű, a végiz kiesiny rövid; a felső és alsó fonópár majdnem egyforma hosszúságú. Az alsó szemsor majdnem egyenes, a hátsó szemsor könnyedén kihajló. Víz alatt élő alak, mely buvárharangszerű szövetet készít, lábain pillászerű úszó szőröket visel és a rendes légzőrésen kívül meg egy köldökszerű legszűrővel van ellátva (lásd I. köt. I. tábla 16.)

SPEC. I. FAJ. ARGYRONETA AQUATICA. (CL.) VIZI BUVÁRPÓK. WASSER TAUCHERSPINNE.

(aquatica = vízben élő; a tartózkodásról.)

Syn. 1757. *Araneus aquaticus* CLERCK «Aran. Suec.» pag. 143.

Vide: THORELL «Remarks» pag. 203.

♀ Előteste és lábai barnásvörösek. A végtest olajbarnás, néha sárgásszürke; a has néha a hátest felszínét mutatja, néha feketes.

A fej mell vaskos domború, a keskenyedő fejrész jól elválasztott; oldalról tekintve a fejrész hátsó fele a hátgödörből majdnem púpos-ívesen kiemelkedő; a hátgödörből a szélek felé a lábak fekvésének megfelelő, csillagosan oszló barázdák jól láthatók; a fejtetőn végig, a szemektől a hátgödörig, egy sor, ettől két oldalt még egy-egy sor felálló finom szőr. A mellvert hagymaalaku, vörösesbarna, gyéren álló hosszú szőrökkel. A rágók élénken barnásvörösek, végeikkel kissé szétválók, hosszú erős csipőkörömmel; oldalról tekintve körtvealakúak, inkább hasasan mint térdszerűen, de igen tetemesen a homlok előtt kiállóak. Az állkapcsok vörössesárgák, elől ívesen elvágottak; az alajk barnás, elől nyelvforma, csücsös, az állkapcsok hosszának két harmadát meghaladja. A tapogatók aránylag vékonyak, sárgásak, végizök barnuló, módosan szőrös, rövidebb mint a térd- és száríz együttvéve. A lábak töveiken erősek, a végek felé egyenletesen vékonyodók; a czombok alúl, jelesen a IV-ik lábpáré, hosszú pilla-szőrökkel, melyek e lábpáron felül-alul s a szárízen is tetemesek és sorban állók; a szárak és végizek alsó fele igen gyér, jelentéktelen tüskefegyverzettel.

A végtest magas, szélesen tojásalakú; felületen az ingödörpárok mint sötétebb pontok láthatók. A fonók rövidek és vaskosak.

Az alsó szemsor két középszeme fekete, a két oldalszem gyantaszínű és nagyobb, a sor majdnem egyenes (kihajlásra hajlandó); a hátsó sor igen kis mértékben kihajló, szemei egyenlőek.

A zár két vörösbarna, kerek, apró nyílás, mely a nyelecske töve alatt két oldalt a légzés felett áll (I. köt. I. t. 16, o, o).

Mértékek ♀ Törzs	10	$\frac{m}{m}$ ebből
fej mell	4.3	»
I lábpár	12.5	»
IV »	11.5	»

♂ Nagyobb, hosszabb lábakkal és bozontosabb, különösen a lábakon fejlett szőrözettel; többnyire sötétebb a nősténynél. Neha világos, a nősténynél alig nagyobb, kevésbbe fejlett szőrözettel. A tapogató karesű, bunkója kicsiny, csúcsos. A terd és száríz egyenlő hosszúságúak, a terdiz vastagodott, a száríz vékonyabb, alsó felén hosszú pillaszőrökkel; a pikkely töve kerekded, domboru, vége keskenyen és hosszan kifutó, felszine sertekkel elegyesen szőrös; nemzőszerve, alulról tekintve, egy gyűrűszerű vörösbarna gyűjtőt mutat, melynek belseje sárgásfehér, és a melyből, oldalról tekintve, egy bárszerű vörösös nyújtvány áll ki.

Mertekek: ♂ Törzs	14	$\frac{m}{m}$ ebből
fej mell	5	»
I lábpár.	18.5	»
IV »	15.5	»

(E nagyobb himmel a fej szélesre fejlett és kevésbbe bubos.)

A legerdekesebb fajok egyike, melynek életmódját már fennebb (lásd I. köt. III. t. 60. és szövege az «Életmód» szakaszban) tárgyaltam. Úgy látszik, hogy a magyar felhelyeken az ivarak áttelelnék, tavaszkor a negyedik vedlest vegrehajtják és azután szaporítanak. A hímek rendszeren nagyobbak a nőstényeknél, mi sajátságosnak látszik azért, mert állandó a jelenség, hogy a pókoknál általában a hím keves esetben akkora mint a nőstény, a legtöbb esetben azonban kisebb. A buvarpóknaál észlelhető megfordított viszonyt leginkább onnan magyarázom, hogy a ♂ a nőstény felkeresésénél a sűrű vízi növényzet között sok akadályra talál, melyet csak erősebb testalkatával győzhet le.

Ismerem eddig erdélyi részekből Szamosfalváról (Kolozsvár mellett, a sós tavak melletti pocsolyák-ból), Szász-Vesszősről; magyar részekből: Doroszlóról (Mosztonga vize) és a budapesti melegforrások kifolyásából, honnan Dr. Wissinger volt muzeumi s. ör szívessegeből bírom.

FAM. III. CSALÁD. DRASSOIDOE. ÓRZÓK. MEUCHELSPINNEN.

(*ζῶρσσοποι* = fogni, ragadozni; a támadó természetéről véve.)

GEN. 1. NEM. ZORA. (C. K.)

(*ζωρός* = heves - a támadásban; valószínűleg a lábak fegyverzetéről.)

Syn. 1848. C. Koch «Die Arachn.» XIV, p. 91. (ad part.)

Vide: THORELL «On europ. Spid.» p. 140.

A lábak tüskések. A két sor oldalszeméi közötti távolság nagyobb annál, a mely a két sor közép-szeméi között létezik; a négy hátsó szem sora annyira kihajlo, hogy az egész szemesoport inkább három mint két sorban állónak tetszik. Kis alak, mely leginkább bokrok töven, lehullott levelek alatt barangolva található.

SPEC. 1. FAJ. ZORA MACULATA. (BLACKW.) TARKA PÁRDUCZPÓK. GEFLECKTE PARDELSPINNE.

(*maculata* = foltos, a végtest tarkaságáról véve)

Syn. 1833. *Hecatege maculata* BLACKWALL «Characters etc.» pag 193, 3. Ser. III.

Vide: THORELL «Remarks» p. 168.

♀ Előteste halavány világos-sárgás-testszínű két barna hosszúsikkal. Végtestének felülete halvány világos testszínű három barna foltssal, melyek kozzül a középső a végtest eleje fele - a két oldala s a

végtest vége fele enyészik; az oldalak finom barna pontokkal mintegy freesesentve; e pontok néha résüntösen sorakozva; a has vége fele gyeren álló barna pontokkal. A lábak világos sárgás testszínűek, az első három pár szára barnuló, a negyedik páró rendszeren tisztabarna.

A fejmell csúsesos tojásdad, a csúsesot a fej képezi, mely a mellrészszel választék nélkül összeforrott. A hátgödör hasítékos; közepe táján a mellrész magasabb a fejrésznél; a hátsó sor oldalszemeitől két barna sáv ered, mely hátrafelé kissé szétválva a nyelecskéig hatol, elég széles, külső szélén egyenetlen; a mellrész szélei hajszálfinom szegélylyel. A mellvért kerek, világos sárgás-testszín, fehéres szőrözettel. A rágók az első lábpár czombjainál sokkal gyengébbek, rövidek, világosak; előlről tekintve tövükön egy barnás foltoeskával. Az állkapcsok egyenesek, végeik elkerékítettek; világosak; az alajk felkerek, magasságánál szélesebb, az állkapcsoknak egy harmadát éri el. A tapogató sárga elég húsos, végíze és szára egyenlő hosszúságúak.

A két első lábpár szára, alul 6—8 pár hosszú, lefektethető és felállítható, lándzsaszerű tüskevel, melyek mindenike egy emelkedésből indul (II. köt. V. t. 109. c); e két pár szára barnuló, czombja felszínén két barnás hosszsesíkkal; a negyedik lábpár szára és másodvégíze barna, czombja hosszsesíkokkal s azonkívül foltokkal díszített; a lábvégizeket barna gyűrűk választják el. A végtest hosztojásdad.

Az alsó sor, kevesebbre mint szemátnmérőnyire a homlok szelétől, kisebb szemekből áll, melyek jól sorakoznak; kissé felülről és előlről tekintve e sor kömvedén kihajló; a hátsó sor (inkább két sor) négy szeme nagyobb s egy hátrafelé táguló, magasságánál szélesebb alapú trapezbe elhelyeztet (e esopor-tositás a Lycosoidákra emlékeztet).

A zár egy sárgászörös köldök, mely egy villás bemetszés által (Y) három darabra van osztva.

Méretek:	♀	Törzs	6.2 $\frac{m}{m}$ ebből
		fejmell	2.4 „
		I lábpár	7 „
		IV „	8.5 „

A lábak hosszaránya 4, 1, 2, 3.

♂ Kisebb, karesűbb, tömörebb rajzokkal és gyengébb fegyverzettel. A tapogató kicsiny, sárga; térdize a száriznál valamivel rövidebb; pikkelye rendes kanálalakú, jól domború, módosan szőrös; nemzőszerve egy sárgászörös, feltojásalakú gyűjtőt mutat, melynek végeből — a pikkely csúsa alatt — egy rövid, finom, horgos, vörösbarna köröm áll, tövén egy sertealakú, szinten vörösbarna nyujtvány indul, mely a gyűjtőt a pikkely belső oldala felől bekeríti.

Méretek:	♂	Törzs	4 $\frac{m}{m}$ ebből
		fejmell	2 „
		IV lábpár	8.2 „

Válfa: ♀ élénk vörössárga alapszínnel; végtestének felszíne és hasfele sűrűn, élénk-cserbarnán elegyítve, úgy hogy sávok nem kepződnek.

E szép kis pók mint nyári alak ritka s mindég barangolva található; leginkább a bokrok és fák alján heverő száraz levelek alját ke-lyeli, jelesen ott, a hol az alsóbb szintek nyirkosak, rothadásba átmenők s így rendszeren sok apró állatnak (Podura) tenyészhelyei. Hálózatát nem ismerem. Úgy látszik, hogy az áttelelő alakok közé tartozik, a memyiben Dr. Horváth Geza t. barátom 1871. január 5-én több Pachygnathával együtt egy harmadvedlésű Zorát is talált Kassa környéken. Az apatiní pagony Gája nevű erdő-részeiből egy ivarérett hímét bírok, melynek jobboldali tapogatója reproducált, pikkely nélküli, míg a baloldali tökéletesen ivarérett; valószínű, hogy a jobb pulpust a második vedles alkalmával veszté el úgy, hogy a reproducált tag két vedléssel hátramaradt.

Ismerem eddig magyar részekből: Doroszlóról, Apatinból, Orsováról, Suppanekről (Weseleb hegy töve), Tokajból («Kopasz» bokrai), Rukamazról és Kassáról. Valfaja Orsováról való.

GEN. 2. NEM. LIOCRANUM. L. K.

(λεῖος = síma, κράνον = fej; a fejrész símaságára ezelez.)

Syn. 1866. L. KOCH «Die Arachniden Fam. der Drassiden» pag. 2

Vide: THORELL «On europ. Spid.» pag. 143.

A hátsó szemsor egyenes. A hason a légzőrés mögött semmi koldok. A rágók tove fegyvertelen. A negyedik lábpár hosszabb a többinél. Az alajk az állkapcsok felehosszát eri el. Közepesen alóli alak, mely házakban, leginkább az ember lakta helyisegekben tartózkodik.

SPEC. 1. FAJ. LIOCRANUM DOMESTICUM. (WID.) HÁZI KAZÁRPÓK. HAUS SCHEITELSPINNE.

(domesticum == házban élő; a tartózkodásról)

Syn. 1834. *Clubiona domestica* WIDER «Zool. Misc.» I, pag. 208.

Vide: THORELL «Remarks» pag. 432.

♀ Elötteste vörössárga, barnás oldalrajzzal; végteste szürke, selymes, szennyes feheres hátmezővel, melynek elejen és közepén egy rövid, sötetes csik áll, ezalatt 5—6 \wedge szerű barnás rajz sorakozik egymás után. Lábai vörössárgák.

A fejmell laposan-domboru, szelesedő, elől elvágott fejresszel; oldalról tekintve az előtest hátyvonala majdnem egyenes, a hosszú, keskeny hátresen túl a nyelecske fele lecsapott; az egész szörtelen, síma, fénylő; a fejvert kávasan és alig elvasztva. A mellresz szele finom, barna szegelylvel, beljebb néhány barnás, ekalakú, csillagszerűen elosztott a labak fekvésének megfelelő, elmosódó folt; a hátres barna. A mellvert körded, vörössárga, alig domborodó, síma és csak a szelein módosan szőrös. A rágók sárgászörösek, oly erősek mint az első lábpár czombja, oldalról tekintve, a homlok előtt ívesen kihajlók. Az állkapcsok egyenesek, elég domboruak, kanalszerűen elkeresített veggel, sárgások és módosan szőrösek; az alajk szélessegenél nem magasabb, az állkapcsok felehosszáterő, elől ívesen elvágott. A tapogató czombja és térde sárgás, szára és végíze vörössárga; a végiz alul több megfekvő, hosszú tüskevel, valamivel rövidebb mint a terd és szár együttveve. A labak módosan hosszuk erősödő czombokkal és karesu vegekkel; a lábszárak alul megfekvő, világos, hosszú tüskevel fegyverezettek; az első lábpár szárán 4 pár tüske. A végtest kissé lelapított, elől ívesen elvágott, különben hossztojásdad, a fem érintett rajzzal. A has világosszürke. A fonok egyenlők, sárgások, kissé kupalakuk.

Az alsó szemsor, felülről tekintve, kissé kihajló, szemei nagyocskák, egyenlők s a homlok szeletől nem egészen szemátmérőnyire állók; a hátsó sor egyenes, oldalszemei egy kissé kiemelkedő fekete gyűrűbe foglaltak; a két sor oldalszemei több mint szemátmérőnyire egymástól.

A zár három vörösbarna gödröcsket mutat, melyek között kettő párosan a légzőrés szélére, egy felettők helyezkedik el, a köztők letező tereset egy ∇ alakú vörössárga, síma lemez tölti ki.

Mertekek: ♀ Törzs	6.7 $\frac{m}{mm}$ ebből
fejmell	3 »
I lábpár	8 »
IV »	11 »

♂ Kisebb, karcsubb; végteste rajzai kevesebbe kifejtettek; egyebekben a nősténynyel azonos. Tapogatója sárga, kis bunkóval; a terd és száríz egyenlő hosszúsága, az utóbbi valamivel vékonyabb és külső oldalának a végén egy kis, vöröses, eleshegyes, hegyével a pikkely tove fele horgosan hajló körmöcskevel; a pikkely

kicsiny, kisse nyújtott kanálalaku, domboru, csúcsa fele szőrös; nemzőszerve, jól kidagadva, kitölti a pikkelyt, külső oldalról tekintve egy durva patkóhoz hasonló gyűjtőt mutat, mely sárgászöröses és a pikkely csúcsa fele nyíló.

Mértékek: ♂ Törzs	4.5 $\frac{m}{\mu}$ ebből
fejmell	2.5 »
IV lábpár	10.5 »

E ritka póknak csak egy parjat bírom Erdélyből Szász-Vesszősről, hol Bedőházy János házában a lakószobák falán találtam. A pókok este, a gyertya fényénél üztek vadászatukat; augusztusban fogva mind kettő ivarérett. Pozsonyban Dr. Böckh találta; a példányokat láttam.

SPEC. 2. FAJ. LIOCRANUM KOCHII. N. SP. KOCH K. KOCHS SCH.

(Koch Lajos kitűnő Araneologus tiszteletére így nevezve.)

(VI-ik tábla 157, *a* szemesoport, *b* tapogató oldalról, *c* ugyanaz alulról, *d* mérték.)

♂ Előteste és lábai világos barnássárgák; végteste szürkés, némi elmosódó, halvány, sötetes foltozattal, megfekvően szőrös.

A fejmell szivalakú; fejerésze kisse csúcsosodó, oldalról tekintve inkább lehajló mint emelkedő. A hátres igen finom, eléggé hosszú. A mellvert pajzsalaku, barnássárga, gyéren szőrös. A rágók barnássárgák nemepen erősek, eléggé szőrösek; oldalról tekintve tövükkel terdszerűen, módosan kiállók. Az állkapcsok szelesek, kisse egymásra hajlók; az alajk nyelvalakú, az állkapcsok hosszának felet bőven eléri. A lábak hosszú, karcsuk, eléggé szőrösek és fegyverzetek. A csombok felületen két megfekvő, hosszú tűske; az első pár szárán, alul, két sorban öt tűske: három a belső soron; ugyan e lábpár másodvégizen alul három pár tűske; a második lábpár szárán alul három — másodvégizen szintén három pár tűske; a hátsó lábpárok ugyanazon ízein, alul szintén 5–6 tűske. — A végtest felül-alul egyszínű, különben tojásdad, elől kisse keskenyedett; a fejmellhez képest kicsiny.

Az alsó szemsor alig észrevehetőleg — a hátsó behajló. A hátsó sor középsői sokkal távolabbra egymástól mint az oldalszemektől; az alsó sor középsői feketek s nagyobbak mint az oldalszemek, az utóbbiak ugy mint a hátsó sor valamennyi szeme opalizáló. A két sor oldalszemei érintkeznek.

A tapogató elég erős; pikkelye csúcsosan kanálalaku, külső szelen egy ujjszerű melletk pikkelylyel; a terdiz vastagságánál kevesse hosszabb, a száríz a terdnel rövidebb, egyszerű, fegyvertelen. A nemző szerv igen jellemző; a meglehetősen lapos gyűjtő hátul kigyózó csővé alakul, mely cső lassankent egy kanyarosan — horgos, finom hegybe végződik.

Mértékek: ♂ Törzs	5.2 $\frac{m}{\mu}$
fejmell	2.6 »
I lábpár	8 »
II »	7.2 »
III »	6.9 »
IV »	9.9 »

♀ Ismeretlen.

Ezt az igen érdekes fajt testver öcsöm Vlkolinszky Jenő, a selmeczbányai akadémia polgára ugyan csak Selmeczbányán találta s beküldötte. A Liocranum-nem eddig csak három fajt számlál u. m. a megelőző fajon kívül még *L. celans* Blackw. és *gracilipes* Blackw. (lásd Thorell «Remarks.» pag. 435 et 436) s az imént említett kettő ketes, úgy, hogy eddig csak a *L. domesticum* Reuss volt egyedüli képviselője a nemnek. Az itt leírt faj tehát mindenképen becses. Dr. Koch L. úr, a Csöszövök kitűnő ismerője in. litt. megjegyzi «n. sp. von *L. domesticum* specifisch verschieden.»

GEN. 3. NEM. ANYPHAENA. SUND.

(ἀννυφαίνα = szövetet felbontani, fejteni; feltünőbb hálózat hiányára ezélez.)

Syn. 1833. SUNDEVALL «Conspectus Arachnidum» p. 20.

Vide: THORELL «On europ. Spid.» p. 143.

A végtest hasfelen, a légzőres előtt egy köldök. A hátsó szemsor behajló. Az állkapcsok domborúak, semmi behorpasztással. Egy alak. Leginkább fákon, jelesen tölgyfákon tartózkodik s a leveleken üzi vadászatát.

SPEC. 1. FAJ. ANYPHAENA ACCENTUATA. (WALCK.) JEGYES BONTÓPÓK. GEZEICHNETE TRENNSPINNE.

(accentus = a hangsúly jegye; a végtest sötét jegyére vonatkozik.)

Syn. 1802. *Aranea accentuata* WALCKENAER «Faune Paris» II, pag. 226.

Vide: THORELL «Remarks» pag. 204.

♀ Előteste voróssárga, két szeles, áttört, barnás csikkal. Végteste szürkés, felülete közepén világosodó, a központban egy X alakú barna jeggyel. Zömök alak, szeles, kissé lelapított végtesttel, meglehetősen karsu voróses-sárga lábakkal.

A fej mell vaskos, mellresze szelesedő, különben a fejreszszel összefolyó; az egésznek a közepe világos voróssárga, kettől a szemektől eredő s végig futó két szeles, barnás sáv által szegelyezve; a sávok a mellreszen helyen közön világos enyesző foltokkal; az egész kopasz. A mellvert körded, kissé domborodó, szelein gyeren szőrös; sárgás. A rágók rövidék, az első lábpár czombjánál gyengébbek, szőrösök, sötétebb voróssárgák, oldalról tekintve módosan reszűntösen előreállók. Az állkapcsok sárgások, egyenesek, elkerekített végekkel, belső szelők az aljukhoz kepest kissé kivágott; az aljuk sötétebb, az állkapcsok felehosszát felül mülja, elől keskenyedő elnetszett, közepe táján kissé hasas. A tapogatók sárgák; a végiz gazdagon szőrös, oly hosszú mint a szár és terdiz együttve; a szárizen felül néhány fekete serte. A lábak karsuk; czombjaik felül, száraik alul fekete, hosszú tüskekkal fegyverezettek; az első pár szárán oldalt, elől két tüske, alul két pár tüske; valamennyi tüske barnás gomboeszkából indul.

A végtest szelesen tojásdad, kissé lelapított; hasfele világosszürke; a fonók és a légzőres között es közepe táján egy egyszerű bemélyedő harántfekvő köldök, melynek párkányán a szőrozet csillagszerűen, vegevel a melyedesbe irányozva áll.

Az alsó szemsor kihajló, oldalszemei kissé tojásdadok, középszemei nem egészen szemátmerőnyire a homlok szelétől; a hátsó sor módosan behajló, az alsónál tetemesen hosszabb, középszemei közelebb egymáshoz, mint az alsó sor középszemeihez; a két sor oldalszeme bőven szemátmerőnyire egymástól.

A zár egy vörösarna keretbe foglalt egyszerű s hasitekszerű bemélyedés, mely a nyeleeske felé kissé tágul.

Mertekek: ♀ Torzs	8	$\frac{m}{m}$ ebből
fej mell	24	»
I lábpár	11	»
IV »	9	»

♂ Karsu, hosszúlábú; a végtest rajza eles; az előtest sávjai tetemesebbek; a has közepe es az oldalak barnások s az utobbiak mintegy keretet kepeznek a hatfel világos közepe körül. A sárga tapogató, sajátyszerű fekete szőrözettel. A czomb töve elől előre irányozott, szakállszerűen álló, fekete, hosszú szőrökkel, melyek tövüknel vékonyabbak; a száriz felületen egy hasonló szőrökből álló eset (rendesen megkopva

vagy letördelve); a terdiz legesücsin szinten néhány ilyen szőr; a száríz külső oldalán azonkívül egy sor hosszú szőr, végén egy kurt, hajlott, tompa és vörösbarna nyujtvány; a pikkely kanálalakú, barnás, módosan szőrös; domboru; --- nemzőszerve egy kidagadó, felületen szemeses gyűjtőt mutat, mely előlről szélesen behasított s a behasítás folytán keletkezett külső és gyengébb fel csücsin egy igen finom, horgosan görbült, vörösbarna, hegyes nyujtványt visel.

Mertekek: ♂ Törzs	6.5 $\frac{m}{m}$ ebből
fejmell	3 »
1 lábpár	15 »
IV » 	11 »

E fajt ivaréretten mint kora tavaszi alakot ismerem s rendesen tölgyfákról szedtem lerázás segítségével, hol a leveleken lappangott, s leesés közben lábait úgy szeljelterpesztgette, hogy egészen laposan felfeküdt. Szövetét nem ismerem.

Elhelyei, magyar reszekben: Doroszló, Bogojeva, Hlok, Pancsova tavaszkor; továbbá Alsóhámor (Borsodmegye) nyár derekán fejletlen állapotban, Budapest (Muz. gy. Pável János a «Csillagvölgyből» egy fejlett ♀ júliusban.)

GENUS 4. NEM. CLUBIONA. LATREILLE.

(*Κλίων* = ág, *βίωω* = élni, de lehet *Κλίσσις* = szövet. fonal, *βίωω* = élni; leszármaztatása nem biztos; THORELL *Κλίσσις* = kalitkát tart valószínűnek; mind a három az életmódra találma, a mennyiben e nem alakjai gyakran az ágak levelein, szőtt zacskókban, tehát mintegy kalitkában tartózkodnak.)

Syn. 1804. LATREILLE «Nouv. Dict. d'Hist. Nat.» XXIV, pag 134. (ad part.)

Vide: THORELL «On europ. Spid.» p. 144.

A hason semmi koldok. Az alakj két harminát éri el az állkapcsok hosszának. A negyedik lábpár a leghosszabb. Az elősoroltak egyedüli általános értékű ismertető jegyei e nemnek. Alig közepes nagyságú, hosszukás alakok, erős előtesttel, melyek különféle módon összeszőtt vagy szövettel borított levelekben, kergek, sőt kövek alatt is laknak, igen gyorsak, veszedelem percében szökve hagyják el rejtekhelyeket s a földre esnek, a nélkül, hogy fonalfejteshez folyamodnának. A fajok megkülönböztetése szerfelett nehéz és igen nagy gyakorlottság mellett biztos szemmertekeket igényel.

SPEC. 1. FAJ. CLUBIONA CORTICALIS (WALCK.). KÉRGEZŐ KALITPOK. RINDEN-KÄFIGSPINNE.

(cortex = corticalis = kérgi; a tartózkodásáról.)

Syn. 1802. *Aranca corticalis* WALCKENAER «Faun. Paris» II, p. 429.

Vide: THORELL «Remarks» p. 225.

♀ Előtest és állkapcsok vörössesárgák. A végtest szép rajzzal: felülete elejen és közepén egy bíborbarna, hasitekszerű csík, mely a végtest közepe táján tűhegyesre kifut, körülte a tér világos sárgásfehér és szépen, csipkesen szegélyeztetik a bíborbarna oldalak által, melyeknek a színe a fonók felett is összeér. A has sárgásfehér. A lábak vörössesárgák.

Jellegei: A hátsó sor szemei egymás között egyenlő távolságra. A fejmell hosszabb, mint a negyedik lábpár szára és térdé együttveve. A negyedik lábpár szárán, felül, semmi tüske.

A fejmell egy darabból való, de a fejrész kisse keskenyedő, felülről tekintve tehát kivalik, a hátres kurt, fekete; a mellresz szele finom feketés szegélylyel; a mellvert keskeny, oly széles mint a harmadik

láb csipője. A rágók az első lábpár czombjánál alig vastagabbak, oldalról tekintve tövüktől kezdve módosan, laposívesen, nem térszerűen kiállók. Az állkapcsok elől módosan lapiezkásan szélesedők, az alajk rendes, kissé hasas, mindkettő vörössárga. A tapogató sárga, végíze kefeszerűen szőrös, valamivel rövidebb mint a térd és szár együttvéve. A lábak arányosak; a két első pár végíze gyenge talpkéfével; a harmadik lábpár szárán alul két tüske, minden czomb felületén négy-négy tüske, az első és második lábpár szárán alul két-két pár tüske. A végtest elől elhetszett, hátul csücsös, karesú. A fonók, a végtest végén állva, barnássárgások, az alsó pár vastagabb.

Az alsó sor középszemei több mint fel átmérőnyire a homlok szélétől állva valami kévéssel távolabbra egymástól mint az oldalszemektől, a sor a kihajlásra hajlandó; a hátsó sor szemei egyenlő távolságra egymástól, középsői az alsó középsőktől csak valamivel kisebb távolságra mint amazok egymástól.

A zár egy vörösbarmás, szélességénél sokkal magasabb terese, melynek felső részén (a nyeleeskefele) egy vese alakú haránt benyomás, alsó szélén (a légzőrés szélén) két kis kerek dudorodás látható, melyhez a felső benyomástól egy barázda vezet.

Mertekek: ♀ Torzs	7—8	<i>m_m</i>
fejmell	3	"
I lábpár	5·7	"
IV "	8	"

♂ Elöttem ismeretlen.

E ritka szépségű fajt csupán csak egyszer gyűjtöttem, mint kora őszi alakot: Selmezbányán a híres Kálvária hegyen, hol bazalt törmelek alatt kevés számban tartózkodott.

SPEC. 2. FAJ. CLUBIONA TRIVIALIS. (L. K.). KÖZÖNSÉGES K. GEWÖHNLICHE K.

(trivialis = közönséges; az előfordulásról.)

Syn. 1841. *Clubiona trivialis* C. Koch «Die Arachn.» X, p. 132. Tab. 359. f. 844.

Vide: THORELL «Remarks» p. 225.

♀ Kicsiny. Elötteste vörössárga, végteste halvány szürkéssárga; lábai halvány szalmasárgák; szemei sárgások.

Jellegei: A hátsó sor középszemei sokkal távolabbra egymástól mint e sor oldalszemeitől; kétszer oly távol egymástól, mint az alsó sor középsőitől. A negyedik lábpár másodvégíze kétszer oly hosszú mint az első lábpárnak ugyanazon íze. A fejmell valamivel hosszabb, mint a negyedik lábpár szára a térdizel együtt. A harmadik lábpár szárán, alul, egy tüske.

A fejmell vaskos, egy darabblól való, mellrészé alig szélesedő; fejerésze a hátsó középszemek között a hátrés fele kissé esatormásan behorpasztott, vörössárga, a szemek teren gyengén sötétedő. A mellvert a harmadik lábpár csipőjénél valamivel szélesebb, különben keskeny, hátul csücsös; szőrös. A rágók rövidek, az első lábpár czombjánál sokkal vastagabbak, tövük duzzadt a homlok előtt kiálló, meglehetősen, szőrösek, vörössárgák. Az állkapcsok sárgások, elől igen tetemesen lapátformán kiszélesedők, közepükön karesuk, együttesen lyraszerű kihajlásuk; sárgások; az alajk valamivel sötétebb, domború.

A tapogató sárgás; végíze tüskékkel elegyesen szőrös, nem hosszabb a szárnál. A lábak közül az első pár aránylag rövidke, talpkéfeje egészen a térdizig terjed. Az első lábpár szárán alul semmi tüske (?). A végtest kissé lekupított, elől elvágott, közepén túl a legszélesebb, hátul csücsösödő; felülete elején egy határozatlan vöröses foltoeska. Az alsó fonópár a felsőnél vastagabb.

Az alsó szemsor, a homlok szélére tolva, egyenes, szemei egyenlő távolságra, körülbelül szemátné-

¹ Az I. kötet jegyzékében «C. pallens» synonym alatt elősorolva.

rönyire egymástól, a sor rövidebb a hátsónál; a hátsó sor egyenes, a középszemek közötti távolság majdnem kétszer nagyobb annál, a mely a közép és oldalszemek s e sor és az alsó sor középsői között letezik.

A zár egy egyszerű, kerekded nyílás, melynek szelei vöröses-barnak s mely alsó szélén (a légzőrés mellett) csucosan kivágott.

Mértekek: ♀	Törzs	5	$\frac{m}{m}$ ebből
	fej mell	2	"
	I lábpár	5.2	"
IV	"	7	"

♂ Tapogatója Dr. Koch L. (Drassiden p. 307.) szerint: «A negyedik íz kívülről egy széles, elől elkerékített, fenyves nyújtványnyal; pikkelye oly hosszú mint a 3-dik és 4-dik íz együttvéve, erősen boltozatos, egyenes oldalakkal, elől elnicszett, felületen és oldalt gyéren, a csucsan sűrűn szőrös.

Mértekek: ♂	Fejmell	2	$\frac{m}{m}$
	I lábpár	5	"
IV	"	6	"

♂ Példányt nem láttam.

♀ Csak egyszer találtam mint tavaszi alakot a Mehádia feletti «Damoclet» hegyesucs legtetetején, egy kő alatt (tehát a bükk tenyészvonalá felett), Dr. Zimmermann (Limburg) gyűjteményében a magyar Tatrából, meghatározta Dr. Koch L.

SPEC. 3. FAJ. CLUBIONA MONTANA. L. K. HEGYI K. BERG. K.

(montana = hegyi; a tartózkodásról.)

Syn. 1867 *Clubiona montana* L. K. «Die Arachn. Fam. der Drass.» pag. 308.

♀ Előteste barnássárga, feje lassanként füstösödő, elől sötét; rágói sötétvörösbarnak. Végteste elől élénksárga, hátul bíborbarnásba átmenő, eleje közepén egy ily színű elmosódó hosszesik; hasa élénksárga. Lábai sárgák.

Jellegek: A hátsó szemsor középsői távolabbra egymástól mint az oldalszemektől. A háthasíték hosszú. A rágók simák. A fej mell hosszabb mint a IV-dik lábpár szára és térde együttvéve. A harmadik lábpár szárán, alul, több tövis, a negyedik párén, felül, semmi tövis.

A fej mell majdnem hengerded; oldalról tekintve, a nyelecskétől igen szabályos, módos ívben emelkedő; hátresétől több, küllőszerűen oszló barázda sugárzik szerte.

A mellvert hosszpajzsalakú, sárga, gyéren szőrös. A rágók vaskosak, fénylők alig egy-egy szőrrel, oldalról tekintve körtvealakúak, tövükkel tetemesen térdszerűen kidomborodók. Az alkapások barnászörösek karesúk. A tapogató sárga, végíze alig egy kevéssel sötétebb, gyéren szőrös, valonivel rövidebb mint a terd és szár együttvéve. A lábak karesúk, elég hosszúk: az első pár szárán, alul, két pár, — másodvégizen, szintén alul, egy pár megfekvő, hosszú, barna tüske; a második lábpáron hasonlóképen; a harmadik lábpár szárán alul két tüske, oldalt ugyanannyi; a negyedik lábpár szárán két oldalt két-két tüske; a harmadik és negyedik lábpár másodvégizei, alul, oldalt és végök körül több tüskevel.

A végtest hossza-közepén a legszélesebb, hátul csucosodó. A fonók egyenlő hosszúságúak, az alsó pár közel háromszor oly vastag mint a felső pár.

Az alsó szemsor egyenes, szemek egyenlő távolságra egymástól, kevesebbre mint szemátmérőnyire a homlok szeletét. A hátsó sor hosszabb, középsői valami kevéssel távolabbra egymástól mint az oldal szemektől, de sokkal távolabbra egymástól mint az alsó középsőktől.

A zár egy élesen határolt, laposan domboru, majdnem kerek, vörössárga terese, mely közepe táján két, alig feltunő dudorodást visel, a légzőres felől pedig harantul benyomott.

Mertekek: ♀ Torzs	7 $\frac{m}{m}$ ebből
fejmell	2·8 »
I lábpár	6 »
IV »	8 »

♂ Kisebb, igen karesű, sötétebb alapszínű előtesttel, kevésbé füstös fejrésszel. Végteste barnászoros. A tapogató vörössárga, szára nem rövidebb a terdnel, felülről tekintve szivalakú, szélesedő, külső oldalának csúcsa a szivalakból kinyulik s egy, szélességenél hosszabb, vaskos, elől hüvelykszerűen eltompított, sötét-színű nyújtványt alkot. A pikkely kanálalakú, csúcsán szőrös; a nemzőszerv gyűjtője hengeres, vörösbarna, elől nyitott; tövétől egy igen finom, sarlóhajlású, hegyével befelé nező, serteszerű embolus indul, mely előre irányozott s a gyűjtőre megfekszik.

Mertekek: ♂ Torzs	6 $\frac{m}{m}$ ebből
fejmell	2·7 »
I lábpár	7 »
IV »	8 »

Az egyetlen szép pár mint kora őszi (szeptember) alakot kovek alól Kormoczbányáról ismerem.

SPEC. 4. FAL. CLUBIONA HOLOSERICEA. (DE GEER.) SELYMES K. SEIDIGE K.

(holosericeus = selyemszörű, fényű az újabbkori terminológiához tartozik. A sericeus a «Ser»-től származik, egy ókori néptől, mely selyempáráról volt nevezetes.)

Syn. 1778. *Aranca holosericea* DE GEER «Mémoires» VII, pag. 266.

Vide: THORELL «Remarks» p. 217.

♀ Előteste vörössárga, feje része vörösbarnába átmenő, a rágók igen sötét vörösbarnák; a fejresz egészen megfokvő, rövid, selymes szőrösekkel ugyanmíra borítva, hogy barnulása csak borszeszben tünik elő. A végtest sárgás, zöldesszürke selymes szőrözettel borított. A lábak sárgák.

Jellegei: Az alsó szem sor közepseinek közlelebb egymáshoz mint az oldalszemekhez. A negyedik lábpár első végze hosszával hosszabb az első lábpárnál. A fejmell oly hosszú, mint a negyedik lábpár szára a terddel együtt. A harmadik lábpár szára alul két tövissel. A hátrés igen rövid.

A fejmell igen vaskos, majdnem hengeres, elől lapos-ívesen elvágott; feje része a mellreszszel tokeletesen összeforrott, oldalról tekintve az egész igen laposan és egyenletesen íves, hátul alacsonyabb. A mellvert keskeny, a III lábpár esipőjénél nem szélesebb, de majdnem kétszer hosszabb, sárga, szőrös. A rágók vaskosak, az első lábpár ezombjánál sokkal vastagabbak, oldalról tekintve a homlok előtt terdszerűen ki- és ívesen előre állók, sötét vörösbarnák, töveik belső oldalán kevés hosszú szőrrel, — durván harántránezoltak. Az állkapesok hosszúk, vörösbarnák, elől, kívül elkerekítve, befelé resuntósen elvágottak, lapiezkások, közepőkön igen karesűk; az alajk vörösbarna, elől kivágott, mindjárt kezdettől íves oldalakkal, az állkapesok hosszának kétharmadát alig eri el. A tapogató sárga, végze vörösödő, tüskekel elegyesen bőven szőrös, a szárnál hosszabb. A lábak elég hosszúk, az első két pár végzein erős, sötét talpkéfe, a hátsó két páron a kéfe igen jelentéktelen. A ezombok alul fegyvertelenek, a többi íz (a két hátsó lábpáret kivéve) felül fegyvertelen. A két első lábpár ezombja felületen negy-negy, a többin öt-öt tövis; a két első lábpár szárán alul két-két pár tövis, a harmadikon kettő, a negyediken három. A két hátsó lábpár másodvégzei koröskörül több tövissel.

A végtest majdnem hengerded, hátul esüses, a has sárgás. A fonók sárgák; a végtest csucsan állva, a felső pár valamivel hosszabb az alsónál s emel sokkal karesubb.

Az alsó szemsor középsői nagyobbak, majdnem egészen a homlok szelén állók s közelebb egymáshoz mint az oldalszemekhez; a hátsó szemsor hosszabb az alsónál, behajló, középszemei távolabbra egymástól mint az oldalszemektől s kétszer oly távolra egymástól mint az alsó sor középsőitől.

A zár egy vörösesbarnás majdnem kerek térese, mely a legzőrés széleig terjedve, itt párban álló, két egyszerű, kerek, kis nyílást mutat.

Mertekek: ♀ Törzs	11	$\frac{m}{\mu m}$
fejmell	4.2	»
I lábpár	10	»
IV »	12.7	»

♂ Elöttem ismeretlen. Koch L. szerint («Die Arachn. Fam. der Drassiden» sub. C. phragmitis XIII. tábl. 203, 204. id.) a tapogató szára egy egyszerű, nem ágas nyújtvány által különböznek a C. pallidula himetől.

E fajt eddig teljes biztonsággal csak Doroszlóról ismerem, hol kora tavasszal a C. pallidulával közös lelhelyeken, de ritkábban fordul elő.

SPEC. 5. FAL. CLUBIONA PALLIDULA. (CL.) HALAVÁNY K. BLASSE K.

(pallidula ab pallida = halavány a színe vonatkozik.)

Syn. 1757. *Araneus pallidulus* CLERCK «Ar. Suec.» p. 81.

Vide: THORELL «Remarks» p. 213.

♀ Színe es nagyságra nevezé változó. Legtöbbször az előtest halvány sárgás, sötettedő fejjel es sötet rágókkal; a végtest zöldesszürke, selymes, megfekvő, finom szőrözettel borított, a szőrözet alatt barnas-vörös. A lábak halványsárgák fekete tüskekkal gyeren fegyverezve.

Ritkán az egész állat sötet vörösbarna, vörössárga lábakkal.

Jellegei: Az alsó szemsor egyenes, a hátsó könnyeden behajló es hosszabb; az alsó sor szemátmerőnyire a homlok szelétől. Az alsó sor középszemei e sor oldalszemeinél nagyobbak s a szemek közötti távolság egyenlő; a hátsó sor szemei egyenlő távolságra egymástól. A fejmell oly hosszú mint a negyedik lábpár terd- es száríze együttve. Az első lábpár másodvégíze több mint fele hosszút teszi a negyedik lábpár ugyanazon ízének. A harmadik lábpár szárán, alul, két tüske.

A fejmell vaskos, majdnem hengerded, mellreszeben alig táguló, fej- es mellresz tökéletesen össze-forrott, az előbbi elől elvágott es elmosódva barnuló; a hátres szűk s a 3-dik es 4-dik lábpár fele barázdákat boesat. A mellvert hossztojasdad, szelén, a csápók beigtatasa előtt s ezeknek megfelelően behorpasztott, szennyessárgás, finoman szőrös. A rágók vörösbarnak, az első lábpár czombjainál sokkal erősebbek, oldalról tekintve ívesen es igen tetemesen a homlok előtt kiállók. Az allkapesok hosszúk, vegeiken lapiczkasok, közepokon karesubbak, sárgások; az alajk sötetebb. A tapogató halvány sárgás; végíze sötettedő, alsó felén gazdag szőrözettel s e között fekete sertetüskevel, oly hosszú mint a száríz. A lábak halványsárgák, valamennyin a két végíz alján fekete talpkefe, mely a két első paron tovább terjed mint a két utolsón; a czombok, alul, a többi iz felül fegyvertelen, a terdek felső csucsan egy erősebb serte. Az első lábpár czombján rendesen negy rendetlen állású tüske, a száron két pár, a másodvégízen egy pár. A végtest elől kisze elnestszett keskenyebb mint közepe táján, hol hasasodik, a vege csucsesodó; egészben vege csak kevéssel szelesebb a fejmellnel. A sárgás fonók a végtest legvegen; hengeresek; a felső pár az alsónál valamivel hosszabb es vekonyabb.

A zár egy vörösbarnás terese, mely szemesesen durva és két $S\mathcal{C}$ zerű benyomás által jellemeztetik, mely a nyelecske felé ágazik szejjel s szorosán a legzörös felett áll.

Mertekek : ♂	Törzs	10.6 $\frac{m}{\mu m}$
	fej mell	4.5 „
	IV lábpár	12 „
	(legnagyobb).	

♂ Nagyságra nézve rendkívül változó (5—9.5 m. törzshossza) úgy színre nézve is. Karesubb a nősténynél, lábai hosszabbak, talpkefei világosak. A tapogató sárga, pikkelye kissé füstös; ezombíze felületének végén három fekete túske, a száríz vastag s rövid, végének külső oldalán egy nyujtvány, mely a végén két rövid ágra oszlik, az ágak a pikkely fele hajlók, tompák; pikkelye rendes kanalakú, domboru; nemzőszerve barnavörös, néha sárgás, jól kidagadó gyűjtőt mutat, melyen egy belformára kígyózó, domboru szalag látható, a végén egy rövid, horgosan görbült, hegyes nyujtvány látható.

Mertekek : ♂ (Nagyobb)	Törzs	9 $\frac{m}{\mu m}$ ebből
	fej mell	4 „
	IV lábpár	13 „
	(Kisebb) törzs	5 „
	fej mell	2.8 „
	IV lábpár	8 „

Mint kora tavaszi és nyári alak kertekben, bokros helyeken, nádasok szélén, egyáltalán bujább növényzetben található, hol leveleket, majd eső alakra, majd teknősen összeszővőget (lásd I. köt. III. t. 58.) a melyekben nappal elrejtőzik, hogy estefelé a környeket összebarangolja. Elrejtbe rakja le petéit is, melyeket finom szövetbe burkolva őriz; a fiak kikeleséig egészen elzárja a rejtet. Párzását nem ismerem.

Előfordul: erdélyi részekben Szász-Vesszősön, Kolozsvár, Szamosfalva, Parajd, Szeben körül; magyar részekben Doroszlón (különösen tavaszkor a nádasok szélén), Apatinban, Palánkán, Illokon, Tokaj körül (a Rukamaz felőli legelők tölgyen szép barna változat), Diosgyőrben, Luesivnán, Nagy-Varadon (Muz. gy. Moesáry S.), Budapest körül (Muz. gy. Pável János).

SPEC. 6. FAJ. CLUBIONA TERRESTRIS (WESTR.) FÖLDI K. ERDEN K.

(terrestris = földi; a tartózkodásról.)

Syn. 1851. *Clubiona terrestris* WESTRING «Förtecken» p. 49.

Vide: THORELL «Remarks» p. 222.

♀ Fejmelle barnászörös, sárgásszürkés szőrzettel, a fej rész nem sötétedő. Rágói sötét vörösbarnák. A végtest barnászörös, szürkessárga szőrzettel. Lábai vörössárgák. A has világossárgás.

Jellegek: Az alsó és hátsó szemsor szemei (soronként) egyenlő távolságra egymástól. A fej mell oly hosszú mint a negyedik lábpár szára és terde együttvéve. A negyedik lábpár saját másodvégize hosszúságával hosszabb az első párnál. Az első lábpár másodvégize csak felet teszi a negyedik pár ugyanazon ízének.

A fej mell majdnem hengeres, mellrészében alig táult, elől elkerekített, egy darabból való; oldalról tekintve, a nyelecsketől lapos ívesen emelkedik. A mellvert hosszú-pauzsalakú, vörössárga, elég szőrös. A rágók vaskosak, végükön kissé szétállók; oldalról tekintve körtealakúak, tovükkel terdszerűen kiállók, igen keves szőrrel. Az állkapcsok lapiczkasok, elkerekített végük, közepükön karesuk, barnászörösek; az alajk hasonló színű, az állkapcsoknak felelhosszát bőven túl éri. A tapogatók karesuk; végizük leginkább alul szőrös.

valamivel rövidebb mint a térd és szár együttvéve. A lábak karesuk, nem épen hosszuk; az első pár második végizen, alul, egy pár, szárán, alul, két pár hosszú, megfekvő tüske; a második páron hasonlóképen; a harmadik pár szárán alul és oldalt két-két tüske, a másodikvégizen köröskörül több tüske; a czombok felületén elől 2—3 tüske haránt sorban e mögött két hosszú tüske egymás mögött. A végtest hossztojásdad. A kiálló fonók egyenlő hosszúságúak, a felső pár csak félig oly vastag mint az alsó.

Az alsó szemsor középsői szemátmérőnyire a homlok szélétől, szemátmérőnyire egymástól és az oldalszemektől; az oldalszemek nagyobbak; a sor egyenes. A hátsó sor az alsónál hosszabb, középszelei egymás között oly távolságra mint az alsó középsők a hátsó középsőktől; a szélsők a középsőktől valamivel távolabbra; a sor behajló.

A zár egy világos-sargás, közel négyszögletes térese, melyet oldalt és alulról egy vörössárga keret szegélyez; e keret négy sarkán apró barnás dudorkák láthatók.

Mértékek:	♀	Törzs	8.4 $\frac{m}{mm}$ ebből
		fej mell	3 „
	I	láb pár	6.8 „
	IV	„	?

♂ előttem ismeretlen.

A negyedik lábpair példányomon hiányzik s így a reá vonatkozó jelleget bona fide Dr. Koch után közöltem, ki a fajt megbizonyítja; e jellegek között azonban az is áll, hogy a hátsó sor szemei egyenlő távolságra esnek egymástól, holott példányomnál más a viszony, mit THORELL is észrevett. Mindazonáltal Dr. KOCH e fajt példányom után habozás nélkül annak mondta, a minék leírtam: «Cl. terrestris Westr.» THORELL e faj nőstényét nem ismeré. A zár mindenestre döntő.

Egy példányát Tokajból, a «Kopasz»-hegy kőbányájából ismerem.

SPEC. 7. FAJ. CLUBIONA COERULESCENS L. K. KÉKLŐ K. BLÄULICHE K.

(coerulescens — kéklő; a színezetről.)

Syn. 1866. *Clubiona coerulescens* L. KOCH «Die Ar. Fam. der. Drass.» p. 331.

Vide: THORELL «Remarks» p. 224. (§ Cl. brevipes)

♀ Előteste barnászörös. Végteste feketésbarna, friss állapotban kéklő (a szilva hamvára emlékeztető). Lábai vörössárgák. Nagyobb alak.

Jellegei: Az alsó és hátsó sorok szemei (soronként) egymás között egyenlőtávolságra. A fej mell oly hosszú mint a negyedik lábpair szára a térdel együtt; az első lábpair másodikvégize fele hosszát teszi a negyedik lábpair ugyanazon izének.

A fej mell egy darabból való, mellrészében módosan szélesedő. A mellvért a harmadik lábpair csipőjénél valamivel szélesebb, vörössárga. A rágók töve vastagabb az első lábpair czombjánál, oldalról tekintve a rágók inkább ívesen mint térdszerűen, de tetemesen kiállók, vörösbarnák, gyéren szőrösök, finoman harántkarezottak. Az állkapcsok vörösesbarnák, jelentéktelenül lapiczkásak, az alajk hasonló színű. A tapogató sárgás, végize vöröslő, bőven és tüskékkel elegyesen szőrös, a szárnál sokkal hosszabb; a szár belső oldalán két pár tüske. Az első két lábpair végizei talpkefével; valamennyi czomb felül négy-négy tüskével, a harmadik lábpair szára, alul, 2 tüskével; a lábak a testhez képest vékonyodók. A végtest nagy, az előtestnél sokkal szélesebb, hátul csúcsos. A fonók a test legvégén, környezetökkel együtt sárgások, a felső pár vékonyabb.

Az alsó sor szemei majdnem szemátmérőnyire a homlok szélétől, egymás között egyenlőtávolságra, mely egy szemátmérőnél valamivel kevesebb, a sor egyenes; a hátsó sor hosszabb az alsónál, könnyedén behajló, szemei egyenlőtávolságra egymástól.

A zár sajátos alkotású: egy hátrafele irányozott, vastagtövű, felálló nyujtvány, mely finoman szőrös, a végén pedig két sárgászörös, szőrtelen borda köze van foglalva.

Mertekek: ♀	Törzs	18	$\frac{m}{m}$ ebből
	fej mell	3.8	»
	I lábpár	9	»
	VI »	11	»

♂ Előtte ismeretlen.

Mint tavaszi alakot egyszer találtam Palánkan a «Gaja-Mándra» nevű erdőrészben egy a földön heverő fahasab alatt.

SPEC. 8. FAJ. *CLUBIONA LUTESCENS* WESTR. SÁRGÁS K. GELBICHE K.

(luteus, innen lutescens — sárgás, jelesen a színezeti élénkség értelmében.)

Syn. 1951. *Clubiona lutescens* WESTR. «Förteckn» etc. p. 49.

Vide: THORELL «Remarks» p. 221.


♀ Az előbbinél kisebb faj (8 $\frac{m}{m}$ törzs), aránylag gyengébb előtesttel. Előteste egyszínű vöröses-sárga, sötétebb rágókkal. Végteste vörössárga, lábai emel valamivel halványabbak.

Jellegei: A hátsó sor középszemei távolabbra egymástól mint az oldalszemektől; az alsó sor szemei egyenlő távolságra egymástól. A negyedik lábpár másodvégizének két harmadával hosszabb az első párnál. A végtest szőrözete sárgás. A fej mell oly hosszú, mint a negyedik lábpár szára a térdel együttve.

Fejmelle szélességénél egy harmaddal hosszabb, majdnem hengeres, elől ívesen elvágott, mellrész jelentéktelenül szélesedő, a fejrésszel összeforrott, jelentéktelen hátréssel. A mellvért keskeny, a harmadik lábpár csípőjénél valamivel szélesebb és bőven kétszer hosszabb, bőven szőrös. A rágók az első lábpár czombjánál valamivel vastagabbak, sötét sárgászörösek, szemesesen durvák, gyéren szőrösek, oldalról tekintve, a homlok előtt térdszerűen kiállók, végük előtt könnyedén behorpasztottak, egészben kissé előre irányzottak. Az állkapesok vörösbarnák, elől lapiezkásak, közepökön karesuk, jelesen külső oldalukról nyergesen benyomottak külső végükön elkerékítettek, belső végükön kissé kimetszettek; az alajk vörösbarna töve előtt kissé behorpasztott, hasas oldalakkal.

A tapogató czombja világossárga, a többi íze vöröses; a végiz bőven szőrös, oly hosszú mint a szár és térd együttve. A lábak arányosak, vörössárgák, az első és második lábpáron tetemes, a többin semmi talpkefevel; valamennyi czomb felül négy-négy tüskés; a harmadik lábpár szárán alul egy-egy tüske. A végtest hossztojásdad, a végén esücsös; a fonók a végtest esücsán, sötét vörössárgák, a felsők vastagsága alig egy harmadrészet teszi az alsók vastagságának.

Az alsó szemsor egészen a homlok szélére tolva, rövidebb, szemei egyformák és egyenlő távolságra egymástól; a hátsó sor hosszabb, középszemei megkülönböztethetőleg távolabbra egymástól mint az oldal-szemektől s egymástól kétszer annyira mint az alsó sor középszemeitől.

A zár egy majdnem szivalaku vörösbarnas, szőrös terese, mely a légzőrés szelét éri s itt egy  alakú, felvetett keretű kivágást mutat, mely a két tojócső nyílását körülfogja.

Mertekek: ♀	Törzs	8	$\frac{m}{m}$ ebből
	fej mell	3	»
	I lábpár	6.6	»
	IV »	8.2	»
	(Emek másodvégize	2.4	»)

♂ Igen karesu, a végtest az előtesthez képest kicsi, az előbbi majdnem hengeres; hosszú, elenk-vörössárga lábakkal; vörösbarna rágói tetemesen előreírányzottak, nem térdszerűen hajlók, az első lábpár

ezombjánál nem vastagabbak, vegeiken mintegy szétfeszítették, vékonyabbak. A tapogató izei sárgák; a ezomb felületének vegen, harantsorban négy, ez alatt egy fekete túske; a száríz külső oldalán egy sötét-vörösbarna, fénylő, tetemes nyujtvány, mely tompahegyű s hegyével kissé a pikkely tövétől elkanyarodó. A pikkely kanálalakú, hátul keskenyebb mint elől; elől, a külső szélén, kissé kimetszett s e kimetszés táján (felülről és kissé a külső oldalról tekintve) egy vörösbarna, sarlóalakra a pikkely csücske alá kanyarodó, hosszú köröm látható, melynek vége (a pikkely alatt) horgosan hajlott.

Mértékek: ♂ T rzs	6.5 $\frac{m}{mm}$ ebből
fej mell	3 "
I lábpár	8.4 "
IV "	10 "

Mint nyári alakot e fajt bokros helyeken találtam, Erdélyben Szász Vesszősön; magyar részeken előfordul: Budapest környékén (Muz. gy. Pavel János.) Tapasztalásom szerint ritka.

SPEC. 9. FAJ. CLUBIONA PARADOXA. L. K. ELÜTŐ K. PARADOXE K.

(παράδοξος = paradoxus = feltűnő, csodás, váratlan, elűtő; a hím tapogatóján létező feltűnő szerkezetre vonatkozik.)

Syn. 1867. *Clubiona paradoxa* L. Koch «Die Drassiden» p. 342.

Vide: THORELL «Remarks» p. 224. Note 1.

♂ Előteste sárgásbarna, a fejrész felé lassanként sötétbarnába átmenő; végteste vörösbarna, oldalai-ban sok világos, pontszerű folttal; hasfele világosabb. A szőrözet szürkésfehér.

Jellegei: az alsó szemsor szeméi egyenlő távolságra egymástól; a hátsó sor középszeméi távolabbra egymástól mint e sor oldalszeméitől; a két sor oldalszeméi egy szemátmerőnyire egymástól, mindegyik egy kis dudorodáson állva; az alsó sor oldalszeméi kördedek. A fej mell olyan hosszú, mint a negyedik lábpár terd és száríze együttvéve. A rágók nem szögletesek.

A fej mell egy darabból való, elől alig keskenyedett, oldalai-ban elkerékített, hátul és oldalai-ban meredek, fényes, finoman, gyéren szőrös; a szőrözet sárgásfehér. A rágók vörösbarnák, oly hosszúk mint az első lábpár másodvégize, tövükön valamivel vastagabbak mint az első lábpár ezombja, előre irányzottak, kevésse boltozatosak, külső oldalukon egyenesek, belső oldalukon kisse szétvetettek; csipő-körmük tövétől végeig egyenletesen hegyesedő. Az állkapcsok előre felé igen szélesedők, külső sarkuk elkerékített; az alajk az állkapcsoknál $\frac{1}{3}$ -dal rövidebb, keskeny, elől kissé kivágott; mind a két rész sötét sárgabarna, elől kissé áttetszően világosodó. A végtest elől kissé elnetszett, közepén legszélesebb, hátul csücsbe végződik, kevésse fénylő. A lábak barnássárgák, a IV metatarsusa $\frac{2}{3}$ részével hosszabb az egyenlő hosszúságú két első lábpárnál. Semmi talpkefe.

A tapogató negyedik ize külső oldalán egy igen sajátos nyujtványnyal, mely magánál az iznél sokkal nagyobb (ezért «paradoxa»). E nyujtvány hosszukás, gömbölyű, igen fényes, kekbejátszó-fekete; fölfele egy rövid, elől kissé kivágott karajt bocsát, alul egy hosszú, be- és fölfele görbülő sarkantyut ereszt, mely csücsán kétágú; a pikkely tövétől hegyéig egyformán széles, csücsán lenyomott, felületén gyéren, csücsán tömötten szőrös.

Mértékek: ♂ Fejmell	2 $\frac{m}{mm}$
I lábpár	4.5 "
IV "	5 "

♀ ismeretlen.

Orsova tájékáról gróf Kayserling gyűjteményében. Leirta Dr. Koch L. Peldányokat nem láttam.

SPEC. 10. FAJ. CLUBIONA FRUTETORUM. L. K. BOKOR K. BUSCH K.

(frutex = bokor; a kedvencez tartózkodásról véve.)

Syn. 1866. *Clubiona frutetorum* L. Koch «Die Arachn. Fam. de Drass.» p. 344.

Vide : THORELL «Remarks» p. 216.

♀ Előteste vörössárga, végteste szürkessárga; a lábak vörössárgák. A *C. lutescens*-nel valamivel kisebb.

Jellegei: A hátsó szemsor középsői távolabb egymástól mint az oldalszemektől. Az alsó sor szemei egyenlő távolságra egymástól. Az első lábpár másodvégize csak felig oly hosszú mint a negyedik páré; a negyedik pár egész másodvégizével hosszabb az első párnál. A fejmell oly hosszú, mint a IV-dik lábpár szára és terde együttvéve.

A fejmell egy darabból való, módosan fejlett, közepe táján módosan táguló, elejen ívesen elnetszett, hátul elkeresített, vörössárga; a fejréssz csak a szemek táján egy lehellettel barnább. A rágók vörössárgák. A mellvert keskeny — oly széles, mint a 3-ik lábpár csipője hosszú, vörössárga. A rágók tövüknél valamivel vastagabbak az első láb ezombjánál, kevésbé hosszabbak az első lábpár másodvégizénél; oldalról tekintve igen módosan terdszerűen ki — különben függőlegesen állók, gyeren szőrösök. Az állkapcsok lapiczkások, közepők módosan karesu, sárgavörösek; az aljuk hasas, barnább, tövénél kissé keskenyebb mint vegefele. A tapogató sárga, végize szőrös, sertekkel elegyes, a szárnál hosszabb, de rövidebb mint a szár és terd együttvéve. A lábak általában arányosok; az első pár kissé rövidülő; az első két pár végizei módos talpkefével; a ezombok felülről, a végök fele, harántsorban álló három és ez alatt egy tüskével; a harmadik lábpár szára, alul, egy tüskével.

A végtest csücsösen tojásdad, selymes; a fonók a végen állanak vörössárgák, a felső pár, tövén, felükkora vastagságú mint az alsó.

Az alsó sor szemei közül a középsők egészen a homlok szelén állanak; valamennyi egyforma távolságra egymástól; a felső sor majdnem egyenes, behajlásra hajlandó, középszemei távolabb egymástól mint az oldalszemektől s nem egészen kétszer oly távol egymástól mint az alsó sor középszemeitől; a sor hosszabb az alsónál.

A zár egy vörösesbarna, tojásdad, kissé domboru terese, mely a legzőrest érti s itt egyszerűen ∞ alakra kivágott (a kivágás szelei nincsenek keretszerűen felvetve).

Mertekek: ♂ Torzs 7 $\frac{m}{mm}$ ebből

fejmell 3 »

I lábpár 7 »

IV. » 7 »

♂ Kisebb, karesűbb, aránylag hosszabb lábakkal, rágói vörössárgák, egyenesek, tövük nem terdszerűen kiálló; az első lábpár ezombjánál sokkal vékonyabbak. A végtest igen keskeny, az előtestnél nem szélesebb. A tapogató sárga; ezombján, felül a végen egy pár, alatta egy tövis; a száriz külső oldala végen kettős nyujtvány, mind a kettő tompa, sötétbarna, fenyés, az alsó gyengébb a felsőnél, elágazásuk mindjárt a tövénél kezdődik.

Mertekek: ♂ Torzs. 4.5 $\frac{m}{mm}$ ebből

fejmell 2.2 »

IV lábpár 6.5 »

Mint nyári alakot Tokaj környekeről, a Rakamaz felőli legelők tölgyeiről ismerem, hol korlatolt számban fordult elő (a nemzeti muzeum gyűjteményében néhány ifjú nőstény Budapest és Ungvár környekeről, melyek azonban ketesek, a mennyiben a zár meg nincsen kifejlődve).

SEEC. II. FAJ. CLUBIONA BREVIPES¹ (BL.) RÖVIDLÁBÚ K. KUTZBEINIGE K.

(brevis = kurta rövid, pes = láb; a lábalkotásról.)

Syn: 1844. *Clubiona brevipes* BLACKWALL «The differ. numb. of eyes» p. 603.

Vide: THORELL, «Remarks» p. 224.

♀ Előteste vörösbarna, elején feketebarnába átmenve; végteste hát- és hasfelen barnássárga, hatfelen egy sötétebb orsófolttal, mely a végtest hosszának felet nem éri el.

Jellegei: az első szemsor szemei meglehetősen szötszörtak, egymás között egyenlő távolságban; a hátsó szemsor szemei egymás között egyenlő távolságban; az alsó sor oldalszemei kerekdedek, a többi szem kerek. A fejmell olyan hosszú mint a IV. lábpár terd- és szárize együttve. A harmadik lábpár szárán, alul, csak egy tüske.

A fejmell hátul meredek, oldalaiiban majdnem függőleges, fenyés, gyéren, megfekvően szőrös. A rágók vörösbarnák, oly hosszúk, mint az első lábpár szára, e láb czombljánál sokkal vastagabbak, tövükkel erősen kidagadók, külső oldalaiikon boltozatosak, belső oldalaiikon kissé szétvetettek, végök fele egy sekely benyomással, kissé fénylők, sűrűn, finoman pontozottak, kívül rövidebb szőrözettel, belül és elől hosszabb sertekkel. Az állkapesok sárgabarnák, finom, fekete szegelyvonással; az alajk sárgabarna, töven széles, eleje fele keskenyedve elől egyenesen elvágott, az állkapesoknál $\frac{1}{3}$ -dal rövidebb. A végtest öregebb példányoknál néha inkább vörösbarna színű, egyébként mindenütt megfekvő, gyér, selymes, szürkésfehér szőrözettel fedett. A lábak halavány barnássárgák, a két első lábpáron egy gyér talpkéfe.

A zár egy kisebb, kerek nyílás, inkább horpadás a legzőres fölött, e horpadástól két oldalt, a nyelecke fele, egy egy nagyobb körfogatú, sekely horpadás, melynek külső szele enyésző. A három horpadás meglehetősen egy csücsával a legzőres fele néző ∇ -ben áll.

Mertekek: ♀ Fejmell	25	μ_m
I lábpár	4	«
IV «	5	«

♂ ismeretlen.

Grof Keyserling gyűjteményében Orsova vidékeről. Ismeretes Svecziából is. Leírta Dr. Koch L. is: «Drassiden» p. 349. Peldányt nem láttam.

GEN. 5. NEM. CHIRACANTHIUM. (C. K.)

(χίρ'ον = kéz, ἀράκντων = tüske, tuskés növény, bogács; a χ^e tapogatójára vonatkozik.)

Syn. 1839. C. Koch «Die Arachniden» VI, p. 9.

Vide: THORELL «On europ. Sp.» p. 145.

Az első lábpár a leghosszabb. Az állkapesok domborúak, közepokon semmi behorpasztás. A hátsó szemsor kisebb-nagyobb mertekben behajló. A hason semmi köldök. A rágók töve fegyvertelen. (A szemek két sorba és három csoportba osztottak). A ♀ tapogatója körmen semmi borda. Életmódra nevez a Clubionákhoz hasonlítva, valamivel lassubbak. A ♀ gömbölyű peteburkait levelekből stb. igen mesterségesen összeszótt, hólyagszerű lakásokban őrzi.

¹ Az első kötet jegyzékében p. 99. mint C. fuscula Westr. elősorolva.

SPEC. I. FAJ. CHIRACANTHIUM ITALICUM. CANESTR. PAV. OLASZ KEZESPOK. ITALIENISCHE HANDSPINNE.

(italicum = olasz; az első lelhelyről.)

Syn. 1869. *Chir. italicum* CANESTRINI ET PAVESI «*Arch. ital.*» in *Atti Soc. Ital. Sc. Nat.* XI, p. 851, (114).Vide: THORELL «*Remarks*» p. 208. (in §. Ch. nutrix).

♀ Közepes nagyságon sokkal feljebb való, vaskos alak. Előteste élenk vörössárga, végteste szürkessárga. Lábai vörössárgák.

Fejmelle vaskos, oly hosszú mint a negyedik lábpár szára és térde együttvéve, szélességének egy negyedével hosszabb; fejeresze magasan-íves, elől elvágott, a mellresznel valamivel keskenyebb s emelfogva némileg elválasztott; a mellvert vörössárga, szelén barnuló, pajzsakú, szeles. Rágói vörössárgák, feketős véggel, az első lábpár czombjánál sokkal vastagabbak s ugyan e lábpár első végizénél hosszabbak, a homlok előtt kidomborodók s menedékesen előre irányzottak.

Az állkapcsok vörösbarnak, elől lapiczkások, szepen elkerekítettek, közepök táján keskenyebbek; az alajk vörösbarna, elől elvágott, inkább kúpidomu mint hasas. A tapogatók karesúk, vörössárgák, végizük esüesa fekete, a végiz rövidebb mint a szár és terdiz együttvéve. A lábak hosszúk, kopaszok, az első pár végizén tetemes talpkéfe, mely a másodvégizen is majdnem végig folytatódik. A végtest rendes tojásdad, vastag; felületen a négy mgörör látható; a has egyszínűen szürkessárga. A fonók vörössárgák, hengerdedek, a felső pár alig felig oly vastag mint az alsó pár.

Az alsó szemsor szemátmérőnyire a homloktól, középszemei szemátmérőnyire egymástól, három szemátmérőnyire az oldalszemektől; a hátsó sor igen könnyeden behajló, hátsó szemei távolabb egymástól mint az oldalszemektől és sokkal távolabb egymástól mint az alsó sor középsőitől. A szemek emelfogva határozottan három csoportba osztottak, az Epeirimakéra emlékeztetők. A közepesoport előre szűkülő trapezben elhelyezett. A zár egy egyszerű, magasságánál szelesebb, tojásdad nyilasoeska, mely a légzőrés szelén áll; felette rendszeren két feketes foltocska.

Mertekek: ♀ Torzs 15.5 $\frac{mm}{m}$ ebből
fejmell 6.5 »
I lábpár 28 »
IV » 21.5 »
(többnyire valamivel kisebb.)

♂ Karesubb, rendkívül hosszulabu, rágói hosszúk, szetágazók, előrenyújtottak, a csipőkorom hosszú, karesu és tühegyes. A végtest közepén végig neha egy szemnyes-zöldes mező. A tapogató hosszú, karesu; terdize vastagságánál valamivel hosszabb, a szár a terdnel másfelszer hosszabb, külső oldala végén egy karesu, a pikkely ala görbülő nyújtványnyal, melynek vége behasított, tehát kettős; a pikkely hátrafelé egy sarlóalakra lefelé hajló, hegyes sarkantyuba végződik, melynek hossza a szár felelhosszának megfelel; a pikkely laposan-kanálalakú, kissé barnult; a gyűjtő egyszerű, lapos.

Mertekek: ♂ Torzs 11.6 $\frac{mm}{m}$ ebből
fejmell 6 »
rágók (külön) 5 »
csipőkorom (külön) 3.8 »
I lábpár 29 »
II » 21 »
III » 16.4 »
IV » 21 »

E nevezetes, deli jellegű pók jelesen Erdélyben es különösen Kolozsvár környéken (Városlója) gyakori, hol a sáros árkok növényzeten tartózkodik. A ♀ egy igen terjedelmes, fehér, hollyagszerű zaeskot sző,

melyben azután a peteket őrzi; párzás idején mind a két ivar a zacskóban tartózkodik. A zacskó levelek vagy nádszálak közé alkalmaztatik.

Ismerem erdélyi részekből: Kolozsvárról, Szászvesszősről és Görgény Szent-Imréről; magyar részekből Buda környekeről és Doroszlóról is.

SPEC. 2. FAJ. CHIRACANTHIUM CARNIFEX. (FABR.) HÖHÉR K. HENKER H.

(carnifex = hohér; a végtest sebszerű rajzáról)

Syn. 1775. *Aranea carnifer* FABRICIUS «Syst. Entom.» pag. 436.

Vide: THORELL «Remarks» pag. 209, 210.

♀ Előteste vörössárga; végteste szennyes agyagsárga, felülete közepen végig egy vörvörös, hasitekszerű csík, mely az első ingódorpar táján keresztyszerűen tágult. Rágói vörössárgák, füstös veggel. Lábai és tapogatói vörössárgák.

Var. *a.* Rágói és lábai füstbarnák (maxillis atris Fabr.).

A fejmell majdnem hengerded, elől kevesse keskenyebb, szélessegenél hosszabb, a negyedik lábpar szára és terdzínel (együttvéve) kevesse rövidebb, jól domború, fejtálaszték nélküli; oldalról tekintve a nyelecsketől lapos-ívesen emelkedett. A mellvert pajzsalakú, közepén sárgás, szélei felé lassanként barnuló. A rágók a második lábpar másodvégizenél alig rövidebbek, karesuk, végeiken igen módosan szétvetettek. Az állkapcsok sárgák, lapiezkúsan nyújtottak, egyenesek, elől elkerekítettek; az alajk kissé sötétedő, az állkapcsok felehosszát feljúlmulja. A tapogató karesú hosszú, sárga, legcsücsán füstös; végize alig hosszabb a szárnál és rövidebb mint a terd és szár együttvéve. A labak hosszuk, karesuk; az első pár szárán és másodvégizen, alul, egy-egy tüsképar; a második lábpar szárán, alul, semmi tüske, másodvégizen egy tüsképar.

A végtest tojásdad; hasán két elmosódó, vöröses-sárga hosszcsík.

Az alsó szemsor egyenes, szemei egyenlőek; a középsők és az oldalszemek közötti ter kétszer nagyobb annál, a mely a középsőket elválasztja; az alsó középsők és hátsó középsők közötti tér egyenlő avval, a mely az alsó középsők között elterül; a hátsó középsők távolabbra egymástól, mint az alsó középsők szinten egymástól; a két sor oldalszemei majdnem érintkezők s közös dudorodáson állanak.

A zár egy módosan domború, majdnem kerek terese, melynek a legzőrés felőli szélebe egy, közel háromszögletes, csücsával a legzőrés fele fordított kis betét látható.

Mertekek: ♀ Torzs	8 $\frac{m}{mm}$ ebből
fejmell	3.5 »
I lábpar	14 »
IV »	10 »

♂ Alig kisebb, határozottabban vörösbe játszó előtesttel; a végtest csikja szélesebb, szegelye elenk sárga. A tapogató hosszú, karesú, vörössárga, pikkelye feketedő, szára a terdzínel kétszer hosszabb, karesú, külső oldala vegen, kise alulfelől, egy vörösbarna, újszerű, tompa, alulról tekintve kissé behasított végű nyújtvány látható, mely a szár vastagságánál hosszabb, előre irányozott és könnyeden a pikkely fele hajló. A pikkely kanálalakú, töve egy sarlóalakuan befele görbülő, hosszú sarkantyúba fut ki, mely a szár külső oldala mellett elhalad s kinyújtva körülbelül felehosszát érte el a szárnak. A nemzőszerv vörösbarna, igen módosan domborodó, lenese alakú; elől egy vékony, hosszú embolust bocsát, mely órárugószerűn a gyűjtő külső szélehez alkalmazkodik.

Mertekek: ♂ Torzs	7.5 $\frac{m}{mm}$ ebből
fejmell	3.8 »
I lábpar	15.8 »
IV »	11.5 »

Mint kora nyári alakot (június, biztos példányok) ismerem, Erdélyből: Kolozsvarról: a barnás változatot magyar reszből: Rakamazról. Mind a két helyen a füvek bojtját zacsává szövi össze, hol a 4 pefeit is lerakja.

SPEC. 3. *FAU. CHIRACANTHIUM PENNYI* (CAMBR.) PENNY H. PENNYS H.

(Penny angol természetbarát tisztelőtére.)

Syn: 1874. *Chiracanthium Pennyi*, CAMBRIDGE «On new and rare Brit. Spid. in Transact. of the Lin. Soc.» XXVIII. p. 533.

♀ Előteste és lábai barnássárgák; végtestenek a felületen és egész hosszán egy hasítekszerű, barnás-vörös csik, mely a fonókat eléri és kettőlől zöldesfehér, az oldalak fele elmosódó s sejtszerűen crezett szalagok által szegélyeztetik; oldalai olajzoldesek s ilyen a has közepe is, mely kettőlől igen halvány és elmosódó, szintén sejtszerűen crezett feheres szalagok köze foglaltatik.

A fej mell rövid, oly hosszú mint a negyedik lábpar terde és szára együttvéve; oldalról tekintve a nyelecsketől majdnem felkörben emelkedő, sima, enyésző hatressel. A mellvert szeles, pajzsalaku, szelein a csipők állásának megfelelő benyomásokkal, gyéren szőrös. A ragók egyenesek, nyújtottak rézsüntösen előre irányzottak, az első lábpar czombjánál vastagabbak, oly hosszúk, mint a tapogató végize, szára és terde együttvéve, vörösbarnák, oldalról tekintve nyújtott ekalakuak, s tövükkel alig valamivel kidomborodók. Az állkapcsok karesuk, végök elkerékített, lapiezkás, közepökön keskenyebbek, sárgásbarnák; az alajk, vastagodó tövel, két harmadát éri az állkapcsok hosszának. A tapogató karesu, hosszú, sárgás; végize csúcsán feketés, oly hosszú, mint a szár és terdz együttvéve. Valamennyi láb végizének a csúcsa feketedő; az első lábpar legvége gyenge talpkefevel; a lábak majdnem kopaszok, a másodvégizek gyéren álló tüskeekkel.

A végtest rendes tojásdad, a fonóknak a legvégén való állása következtében csúcsos, oldalról tekintve magas ívben emelkedett.

Az alsó szemsor egyenes, kevesebb mint szemátmerőnyire a homlok szeletől, a középszemek közelebb egymáshoz mint az oldalszemekhez; a hátsó sor könnyedén behajló, szemei egyenlő távolságra egymástól; a két sor oldalszemek közös emelkedéseken, majdnem érintkezők; a hátsó sor középszemeki tavolabb egymástól mint az alsó sor középsőitől. A zár egy egyszerű kis felkeret, mely a legzörös szelen levő, felkörü nyílást köríti s magasságánál szélesebb.

Mertekek: ♀ Törzs	8 $\frac{m}{m}$ ebből
fej mell	2.7 "
I lábpar	11.3 "
IV " "	8.5 "

♂ Fejlett, szeles előtesttel, kisebb végtesttel, a nősténynél alig rövidebb; lábai hosszabbak. Ragói karesuk, oly hosszúk mint az első lábpar első végize, végeikkel szétterpeszkedők, élénk vöröses-sárgák, fekete véggel és ily színű, hosszú csipőkörmökkel; resüntösen és tetemesen előreirányzottak. A végtest szemzete, beosztásra a nősténnyel azonos, de sokkal elesebb és tűzesebb; a középszik sötét bíborbarna, szegélye narancssárga.

A tapogató hosszú, sárga; száríze egy és egy felszer oly hosszú mint a terdz, alsó felén szakálszerű, hosszú, de gyér szőrözettel; külső oldalán, a végén, egy vörösbarna, könnyedén befelé hajló köröm, melynek csúcsa a pikkely töve alá ér, az ízek nem vastagodtak; a pikkely laposan kanálalaku, barnuló, szőrös, töve egy hosszú, lefele hajló, keskeny nyújtványba fut ki, mely a szár külső oldala mellett megyen el és a szár felehosszát éri; nemzőszerve vörösbarna s alulról tekintve egy lapos, a pikkely töve fele kerek, elől pedig kisse csúcsosan kifutó gyűjtőt mutat.

Mertekek: ♂ Törzs	7.6 $\frac{m}{m}$ ebből
fej mell	3.7 "
I lábpar	13.8 "
IV " "	12.5 "

E pókot csak keves példány után -- mint tavaszi és nyári alakot -- Palánkáról és Rakamazról ismerem, hol füves helyeken a fűvek bojtjaiból zacsószerű lakást szövögetett, a mely előtt meg néhány fonál rendetlenül volt alkalmazva.

SPEC. 4. FAL. CHIRACANTHIUM NUTRIX (WALCK). DAJKA K. AMMEN H.

(nutrix = dajka, fenntartó; arra látszik vonatkozni, hogy a faj petéit gondosan őrzi.)

Syn: 1802 *Aranca nutrix* WALCKENAER «Faun. Par.» 11. p. 220 (salt in ad part).

Vide: THORELL «Remarks» p. 207.

♀ Előtestének mellrészze szennyes-barnássárga, fejeteteje világos vörössárga, közepén elmosott, keskeny, barnássárgás, hasított csikkal. Végteste szennyes-zöldes, vörösesbarna, hasitekszerű közepesikkal, melynek szegélyzete a végtest alapszínénél elmosódva-világosabb.

A fej mell szélesre fejlett, sokkal rövidebb mint a negyedik lábpár szára és térde együttvéve, hosszúságának egy harmadával keskenyebb, oldalról tekintve, a nyelecskétől a fej felé igen meredeken domborodó.

A mellvert pajzsalakú, szennyesbarnássárga, a közepén kissé világosodó. A rágók vörössárgák, közepökön alul, végök felé lassanként barnulók, oldalról tekintve hosszú ékalakúak, majdnem egészen függőlegesen állók; tövük igen módosan domborodó. Az állkapcsok elől elkerekítve-lapiczkások, közepök táján módosan keskenyedettek, szennyesbarnássárgák, világosodó szelékkel; az alajk sötétebb, elől egyenesen elnetszett, oldalai hasasok, az állkapocsnál szélesebb. A tapogató sárga, karesű, végíze füstös és szőrös, oly hosszú mint a térd és szár együttvéve. A lábak zöldessárgák, csücsaikon füstösek; az első pár elsővégizén egy kis talpkéfe. A végtest csücsosan-tojásdad, hasfele egyszínűen szennyes zöldes. Az alsó szemsor igen közel áll a homlokszelethez, egyenes, középszemei kevesebb mint szemátmérőnyire egymástól s majdnem két szemátmérőnyire az oldalszemektől; a hátsó sor igen könnyeden behajló, középszemei kevéssel közelebb egymáshoz mint az oldalszemekhez, de távolabb egymástól mint az alsó sor középszemeitől; az oldalszemek fél szemátmérőnyire egymástól.

A zár egy felkörü, barnás térese, a légzőrés felett egy majdnem kerek nyílással, mely belsejében egy középlemez által két felre oszlik.

Mértekek: ♀ Törzs	7.5 $\frac{m}{\mu}$
fej mell	3.3 »
I lábpár	15 »
IV » 	11 »

♂ Elöttem ismeretlen.

Mint nyári alak nem ritka, különösen a réteket kedveli, hol a fűvek bojtjában zacsószerű lakást sző, melyben petéit is őrzi.

Ismerem eddig erdelyi részekből: Kolozsvárról, Mező-Záhról, Gyekéből és Szász-Veszősről. Széchenből (Sill gyűjteményében); magyar részekből: Doroszlóról.

SPEC. 5. FAL. CHIRACANTHIUM ELEGANS. THOR. CSINOS K. FEINE H.

(elegans = csinos, izléses; a finom alakról)

Syn. 1875. *Chir. elegans* THORELL «Verz. südruss. Spinnen» p. 40.

1875. Idem. «Descript. of sev. Europ. and N. Afr. Spid.» p. 88.

♀ Előteste-halvány vörössárga, közepe hosszában és oldalaiban kissé homályosodó. Végteste és lábai kénssárgák, az előbbi a fonók felett elmosódva homályosodó. Rágói tövüktől barnulók s végükön sötét, fekete-barnak.

A fej mell vaskos, rövidebb mint a negyedik lábpár szára és terde együttvéve, hosszúságának egy harmadával keskenyebb; oldalról tekintve módos ívben emelkedő. A mellvert széles, sz. valaku, zöldessárga, finom barna szegélylél. A rágók az első lábpár csomójánál alig vastagabbak, oly hosszúk, mint az első lábpár első végige, meglehetősen összeillők, sötétek, fenyések és kopaszok. Az állkapcsok, elől elkeresítve, csak alig lapiczkások, szennyes barnak, fehéres véggel; az alajk elől ívesen elcsetszett, hasas oldalakkal, szennyes barna. A tapogató karesú, sárga, végige a hegyefele füstös, oly hosszú, mint a szár- és térdige együttvéve. A lábak csúcsai kissé füstösödők, az első lábpár első végigén egy gyenge talpkéfe, a negyedik lábpáron igen gyéren álló tüskék. A végtest szélesedő tojásdad, kissé lenyomott; a fonók kissé behuzottak; a felsők az alsóknál gyengébbek. A has egyszínűen kensárga.

Az alsó szemsor középsszei szemátmérőnyire egymástól, az oldalszemeknél nagyobbak; az oldalszemek körülbelül másfel szemátmérőnyire a középssöktől, a középsszemek közös fekete térsében állanak; a hátsó sor könnyedén behajló, középsszei közelebb egymáshoz mint az oldalszemekhez s kevésel távolabb egymástól, mint az alsó középssöktől; a hátsó középssök finom fekete gyűrűbe foglalva; az oldalszemek mellett egy-egy fekete foltoeska (a középsszemek felőli oldalon).

A zár egy vörösbarna, terjedelmes, majdnem kerek térese, mely ripacsos és közepe hosszában világosodó színezet által elválasztott, úgy hogy némileg két szemközti álló vesére emelkedtet; a tojósövek ∞ szerűen nyílnak a térsén.

Mértékek: ♀	Törzs	8 $\frac{m}{m}$ ebből
	fej mell	3.4 »
	I lábpár	16 »
	IV »	13.5 »
	» » szára és terde együtt	4.5 »

♂ Valamivel kisebb végtesttel, mely felülete közepén zöldes; hosszabb lábú. Rágói csak végök felé barnások, egyebként vörössárgák, hosszú, sötét csipőkörömmel, végük szeljelterjeszkedők, az első lábpár első végigénél valami kevésel hosszabbak. A tapogató nyulánk, sárga; bunkója füstös, szárige nem vastagodott, majdnem kétszer oly hosszú mint a térdig, a végén, alul hosszú szőrökkel, külső oldalának végén egy újforma, könnyedén bekanyarodó, vörösbarna nyújtvánnyal; a pikkely laposan-kamalakú, szőrös, töve egy sarlóalakra hajtott, hosszú, keskeny és hegyes nyújtványba végződik, mely a szár külső oldalán kifut és a szár hosszúságának kétharmadát eléri.

Mertekek: ♂	Törzs	7.4 $\frac{m}{m}$ ebből
	fej mell	3.3 »
	I lábpár	2.2 »
	IV »	1.5 »

E szép fajt csak egyszer találtam: Ó-Ogradema mellett (Alduma) a «Csukár mare» mészsirt görgeteigiben, hol a kövek között hólyagszerű burokban tartózkodott, a melyben a nőstény peteit is örte. THORELL tanár a faj azonosságát elismerte. Az alak eddig a délkeleti reszekre nézve jellemzőnek látszik lenni. Dr. THORELL Deloroszorszagból írta le.

SPEC. 6. FAJ. CHIRACANTHIUM RUPESTRE N. SP. KÖVI K. FELSEN H.

(rupes = szikla; a tartózkodásról.)

(VII. tábla 158, a szemesoport, b zár, c fej mell oldalról, d mérték).

♂ Fejmelle vörössárga, a szemesoport táján kissé sötetelő; rágói barnászörösek. Lábai vörössárgák. Végteste barnászárga.

Fejmelle vaskos, domboru, oly hosszú, mint a negyedik lábpár szára és terde együttvéve, oldalról tekintve a hátvonal boltozatosan emelkedik s a fej rész bubjától felgömböszerűen lekonyul; az egész megfekvő,

finom szőrökkel borított. A hátrest egy alig észrevehető elhomályosítás pótolja. A mellvert paizsalakú, halvány barnássárga, eléggé szőrös. A rágók erősek, vaskosak, oldalról tekintve kissé előre irányzottak, a becsapórés szélén tömötten álló szőrrel ellátottak, valamivel rövidebbek mint az első lábpár másodvég-ize. Az állkapcsok szélesek, elől elkerekítve, kissé egymás felé hajlanak, barnászörösek, világosodó végekkel; az alajk vörösbarnás, széles, nyelvalakú, az állkapcsok hosszának két harmadrészét eléri.

A tapogató karesú, halvány vörössárga, végíze barnászörös, az egész eléggé szőrös; a végíz oly hosszú, mint a térd és száríz együttvéve. A lábak karesú, hosszúk; az első pár szárán és másodvégizen, alul, közepe táján egy-egy túskepar. A végtest tojásdad (a peték lerakása után ránczosan sorvadt), sárgás szőrzettel borított.

A szemesoport láthatólag három tagú; a két sor középsői egy előre felé szűkülő trapezben állanak s e trapez távolabbra esik az oldalszemektől, mint a mennyi a trapez legnagyobb szemköze; az alsó közep-szemek közös, barna foltban állanak, a többi szem külön egy barna udvarban áll.

Az oldalszemek közel állanak egymáshoz, de nem érintkeznek. Az alsó szemsor igen módosan kihajló, a hátsó könnyeden behajló.

A zár igen jellemző: egy mélyen kivágott bőrös karaj két oldalán egy-egy, gombostűfejszerű sötét-barna gömböcske látható.

Mértékek: ♀	Törzs	9 $\frac{m}{mm}$ ebből
	fej mell	4.6 "
	I lábpár ¹	15.6 "
	II "	13 "
	III "	9.7 "
	IV "	13.4 "

♂ Előttem ismeretlen.

Egyetlen példányomat Borsodmegyében, Majláth (Diósgyőr mellett) közeleiben, egy sziklás árokban-kő alatt találtam, hol terjedelmes burokba beszöve petéit őrzi. THORALL tr. és Dr. KOCH L. szerint előttök is ismeretlen.

SPEC. 7. FAJ. CHIRACANTHIUM EFFOSSUM. N. SP. FÖLDI K. ERD K.

(effossum = kiásott: a lelhelyre vonatkozik.)

(VII. tábla, 159, *a* szemesoport, *b* fej mell oldalról, *c* zár, *d* mérték.)

Fejmelle barnássárga, a szemek táján nem sötétebb; rágói barnászörösbe átmenők; lábai zöldes-sárgák. Végteste szennyes agyagsárga.

A fej mell, oldalról tekintve, eléggé domborúan emelkedő, rövidebb mint a negyedik lábpár térdé és szára együttvéve, fejerésze íves (kevesbe domború, mint a *Ch. rupestre* fajnál). A mellvert szivalakú, szenny-sárga, barnás szőrzettel, mely a széleken tömöttebb. A rágók elég erősek, nyújtottak, módosan előre nyúlók, tövük világos — végük sötétbarna, az első lábpár elsődvégizénél valamivel hosszabbak. Az állkap-csok szennyesbarnák, végeik világosodók, egyenesek, elől ívesen elvágottak; az alajk nyelvalakú, elől elmet-szett, a rágók hosszának két harmadát bőven eléri. A tapogató karesú, zöldessárga, végizenek a csuesa füstösbarna; a szőrzet gazdag, megfekvő; a végíz oly hosszú mint a térd és szár együttvéve. A lábak karesú, hosszúk; az első pár szárán, alul, közepetáján egy pár — másodvégizen alul — töve és vége köze-leben egy-egy túskepar. A végtest tojásdad, finom szőrzetű. A szemesoport három tagú; a két sor közep-szemei egy előre felé csak igen kevéssé szűkülő trapezben elhelyezettek; a hátsó sor oldalszemei csak kevéssé távolabbra e sor középsőitől mint e középsők egymástól; az alsó sor egyenes, a hátsó könnyeden behajló; az oldalszemek nem érintkeznek, mindenik egy külön, barnás udvarban áll.

¹ Példányomnál az első pár ballába és a második pár jobblába pótolta, tehát rövidebb és gyengébb.

A zár igen jellemző: egy a legzöres fele nyíló, széles keretet kepez, mely egy majdnem körded nyílást körülfog; a nyílás tátongó, melyeben egy széles osztólemez látható; a keret felső felén hat sötét vonal.

Mertekek: ♀	Törzs	10	$\frac{m}{m}$ ebből
	fej mell	3·8	»
	I lábpár	18·7	»
	II »	12	»
	III »	9	»
	IV »	14	»

♂ Elöttem ismeretlen.

E faj egyetlen példányát S.-A.-Ujhelyen, a «Kopasz» hegyen, egy kő alól ástam ki. Előfordult június vege fele. Dr. Koch Lajos tudósítása szerint az ő gyűjteményében e faj Trieszt környékéről is megvan.

SPEC. 8. FAJ, CHIRACANTHIUM CUNICULUM. N. SP. VÁJÓ K. KANINCHEN H.

(cuniculus = földalatti folyosó; a tartózkodásról.)

(VII. tábla, 160, *a* szemesoport, *b* fej mell oldalról, *c* zár, *d* mérték.)

♀ Rágói függőlegesek; a végtest felülete sárgás-testszínű, nagyítás alatt számos feheres, kásás foltoescakkal behintett. Elötteste szep-világos-barnássárga, a szemek táján sötettedő; rágói barnulók. Lábai világos-barnássárgák.

A fej mell domború, fejelesen kissé lapuló, elől elnetszett, valamivel rövidebb, mint a negyedik lábpár terde és szára együttveve; a mellvert szívalakú, halványsárgas. A rágók hosszúk, egyenesek, függőlegesen állók, végök sötétbarna, tövük elmosódva világosodó, — oly hosszúk mint az első lábpár elsővege. Az állkapcsok egyenesek, elől elkerekítettek, itt világosodók, tövük vörösbarnás; az alajk szélesen nyelv alakú, elől elnetszett vörösbarnás.

A tapogató igen karesu, sárgás, finom szőrözetű; végize kisse füstös és hosszabb mint a térd és száríz együttveve. A lábak karesuk, finomak; az első pár szárán, alul, hossza-közepe táján egy tuske, második végizen, alul, legtöven és legvégén egy-egy túskepar. A végtest tojásdad, a vege fele csúcsosodó. A két szemsor középsői egy előrefele szűkülő trapezben elhelyezettek, az alsó sora közös, barna foltba helyezettek. A hátsó sor oldalszemei továbbra a középsőtől, mint ezek egymástól; az alsó sor középsői ugyane sor oldalszemeivel sokkal nagyobbak. Az alsó szemsor egyenes, a hátsó könyveden behajló. A két sor oldalszemei nem érintkeznek egymással.

A zár egy barna, kisse domború, kettős tereseből áll, melynek felei vesel alakúak s csak felül érintkeznek, a legzöres felett pedig keretet kepezik egy szűk, világos körnek.

Mertekek: ♀	Törzs	7·5	$\frac{m}{m}$ ebből
	fej mell	3	»
	I lábpár	11·5	»
	II »	7·9	»
	III »	7	»
	IV »	9·7	»

E csinos fajt testverősem, Vilkolinszky Jenő, a selmeczbányai akadémia polgára ugyancsak Selmeczbányáról küldte, hol is a Klingertárna melletti köhalmazokban több érdekes fajjal együtt gyűjtte. Dr. Koch L. sem ismerete.

GEN. 6. NEM. PHRUROLITHUS. (C. K.).

(φρουρολίθω = őrizni, λίθος = kő; a tartózkodásra vonatkozik.)

Syn. 1839. C. KOCH «Die Arachn.» VI, p. 110, 112.

Vide: THORELL «On europ. Spid.» p. 145.

A rágókon, elöl, egy-egy finom tüske. Az állkapesok domborúak, semmi horpasztással. A hátsó szemsor egyenes. A hason semmi köldök. Apró alakok, melyek, kövek alján tartózkodva, az apró bemélyedésekbe szövik ritkás csöveiket.

SPEC. 1. F. A J. PHRUROLITHUS FESTIVUS. (C. K.). DISZES SZIKLAPÓK. SCHÖNE FELSENSPINNE.

(festivus = csinos, diszes; a test rajzairól.)

Syn. 1835. *Micaria festiva* C. Koch in Herrieh-Schäffers «Deutschl. Ins.» 129, 15.

Vide: THORELL «Remarks» p. 169.

♂ Kis alak. Előteste vörösesbarna, sötétebb, finom, szabálytalan erzetekkel és néhány fehér petytyvel. Végteste tiszta barna, egy megfordított Ψ alakú fehér rajzzal. A lábak czombjai barnásak, a többi íz világosabb. A fejmell módosan domború, majdnem kerek, a fejrész csak kevéssé csücsösödő; oldalról tekintve a hát egészen egyenes, vízszintes, a hátresen túl a nyelecske fele hirtelenül lecsapott. A mellvert szélesen szivalakú, domború, barna, közepe elmosódva világosabb. A rágók sárgásbarnások, tövükön, a külső oldalon, egy tüske; a fejrész sapkaszzerűen borul a rágókra, s ezek, oldalról tekintve, befele az állkapesokra esapottak. Az állkapesok sárgabarnások, nagy terjedelműek, szélességöknél nem hosszabbak, domborúak, elöl ívesen elvágottak; az aljuk az állkapesokhoz kepest kicsiny, majdnem csücsös és sötétebb, az állkapesok felehosszá-
nak megfelel.

Az első lábpár czombja vastagodott, a rágóknál sokkal vastagabb, barna, — a többi íze sárga; szára, alsó felén, négy pár hosszú, megfekvő, világos tüskevel fegyverzett; — a többi czomb a többi iznél alig, valamivel barnább. A végtest tisztabarna, tojásdad, elöl valamivel keskenyebb; hasfele sajátos alkotási: a legzörös felett sima, a legzörös alatt a fonókig bemélyedett s e bemélyedésben 8 (vagy kevesebb) haránt-ránczsal, mely rokon a rovarok gyűrűzetével. A fonók sárgások, igen behúzottak.

Az alsó szemsor a homlok szeletől oly távolságra, mely a szemcsoport magasságának majdnem megfelel. Középszemei az oldalszemeknél valamivel nagyobbak, a sor behajlásra hajlandó; a hátsó sor egyenes, középszemei távolabbra egymástól mint a középszemektől. Az egész szemcsoport nagyon szorosan együvé és kis terre szorítva.

A tapogató aránytalanul bunkós; czombja, terde sárgabarnás, szára barna, vastagodott, a terdnél nem hosszabb, kül-ő oldalából egy aránytalanul vastag, hosszú, sarlóalakra előre görbülő nyujtvány meredezik, mely magánál a szárnál kétszer hosszabb; a pikkely vörösbarna, kanálalakú, domboruságával kifele-oldalt fordított módosan szőrös; a nemzőszerv roppantul kidagadó s all egy kúrtforma feheres részből, melynek két szarva a pikkely fele áll, és egy tömlőszzerű, kis, fehér dudorodásból, mely a kanál közepe táján a kúrtforma darab alatt kiáll.

Mertekek: ♂ Törzs	4	$\frac{m}{m}$ ebből
fejmell	1.2	»
I lábpár	3.3	»
IV »	4	»

A lábak hosszaránya: 4, 1, 2, 3.

♀ Eddig nem ismerem.

Az egyetlen példányt az Alsó-Hámor (Borsod) a Szent-István nevű hegy csücséről hoztam, hol mint nyári alak mohában tartózkodott.

SPEC. 2. FAJ. PHRUROLITHUS SZILYI. N. SP. SZILY SZIKLAPÓKJA. SZILY S. F.

(Szily Kálmán tiszteletére.)

(VII-dik tábla, 161, *a* szemállás, *b* ♂ zárja, *c* ♂ tapogatója, *d* mérték.)

♂ Igen kiesény. Előteste barna, sok fehér szőrrel, mely nemi esillagos rajzot alakít: végteste feketés, elején két — közepén három — a fonók felett egy fehér foltal. A két első lábpár czombja barna, a többi íze, ugymint a két látsó lábpár is sárgák, a két hátsó lábpár czombjain meg nemi barnaság látható. A végtest hasfele feketes, feheres szőrözettel.

A fejmell szélesen szivalaku, kissé csücsösödő fejrészszel; a mellvért barna. A rágók erősek, barnák, gyéren szőrösek, a felültökön álló két fogacs serteszerű, csak erős nagyításban feltűnő. A tapogató elég erős, barna; végíze sok fehér szőrözettel, oly hosszú, mint a szár és terdiz együttvéve. A labak karesu vegekkel, czombjuk kissé erősödött; a két első pár czombja alul és oldalt barna, felületen nemi sárgasággal; a szár és a végiz sárgák; az első pár szárán és másodvégizen, alul, negy-negy felállítható, hosszú, sárga tuskepár. A végtest hossztojasdad, igen kis mertekben lapított.

Az alsó szemsor középsői valamennyi szem között a legkisebbek. Az alsó és hátsó sor könnyeden behajló; a szemek közötti távolságok ugy a sorban mint a sorok között is egyformák.

A zár egy a légzőresig lenyúló bőrkarakj, mely alig észrevehetőleg kivagott; kettőlől egy-egy apró gömböcske látható.

Mertekek:	I	Törzs	2.6 $\frac{m}{m}$ ebből
		fejmell	1 " "
	I	lábpar	2.5 " "
	II	"	2.2 " "
	III	"	2 " "
	IV	"	3.6 " "

♂ Alig kisebb. Lábai igen élénk színezetűek s a hátsó két pár czombján is annyi a sötétbarna szín, hogy a sárga szín hosszsesíkot képez. A tapogató vaskos, bunkós; czombja szélesedett és alulfelől egy szögletet képez, a térd is aránylag nem igen karesu, vastagságánál alig hosszabb, a szár a térdnél rövidebb, külső oldalán egy erős, szaruszerű, hegyével a pikkely fele kanyarodó, fekete nyujtványt bocsát.

Mertekek:	♂	Törzs	2.5 $\frac{m}{m}$
		fejmell	1.2 " "

E csinos kis pókot Orsován találtam, még pedig az ugynevezett «neutralis területen» előforduló buja novenyzetén. Ivarerőtsége juniusra látszik esni, Dr. Koch Lajos a faj újdonságát elismere.

GEN. 7. NEM. MICARIA. WESTRING.

(micare = fényleni; a zománczos színezetről.)

Syn. 1851. WESTRING «Förtæckn» etc. p. 46.

Vide: THORELL «On europ. Sp.» pag. 146.

Az állkapcsok közepe behorpasztott. A fejmellen a hátres hiányzik. A hátsó szemsor behajló. A hason semmi köldök. A rágók töve fegyvertelen. A törzs egy resze, rendszeren a végtest is landzsaulaku, simaszélű

pikkelyekkel, a lábak ágas szőrökkel fedettek. Karesu, kis alakok, a végtesten többnyire sok színben ragyogó zománczos fényvel, melyek kövek alatt és rendszeren nagy sokaságban, finom, selymes, ritkás csővecskekben tartózkodnak. Csinos, gyors alakok.

SPEC. 1. FAJ. MICARIA ROGENHOFERI. N. SP. ROGENHOFER FÉNYPÓKJA. ROGENHOFERS GLANZSP.

(Rogenhofer Alajos jeles entomologus tiszteletére.)

(VII-dik tábla, 162, *a* szemesoport, *b* ♀ zárja, *c* ♂ tapogatója, *d* ♂ ♀ mértéke.)

♀ Pompásan fénylő. Előteste vörösbarna, rézvörösen fénylő pikkelyekkel fedett; a mellrész végső felén, anyelvecske felett, egy Λ hófehér rajz. A végtest rezes-zöldes zománczú pikkelyekkel borítva, elől két babalaku, harántfekvő fehér folttal, közepetáján egy fehér, keskeny övvel, mely az oldalakon legjobban fejlett, az öv mögött néha még két fehér petytyel; az öv a hason megszakad; a has rezes és ibolyaszínű zománczban ragyogó pikkelyekkel fedett. A két első lábpár czombja majdnem végig barna, zománczos pikkelyzetű, — vége és a többi íz élénk-halványsárga; a két hátsó lábpár barnás.

A fejmell nyújtott; a hátrés merőben hiányzik; a fejresz keskenyedő, oldalról tekintve, kissé lekonyult. A mellvért hossztojásdad, feketebarna, fehér, kissé csillagosan elrendezett s gyér szőrözettel. A rágók nem épen erősek, egyenesek, függőlegesek, vörösesbarnák, tövük világosabb. Az állkapcsok benyomottak vörösbarnások, világosabb szélekkel. Az alajk sötét. A lábak, jelesen a két első pár — czombreszőkben erősödöttek; valamennyi lábpár szárán, alul, I—4 finom tűske, a másodvégizen, alul, a végén többnyire egy tűsepar. A végtest kissé hengerded, a végén csúcsos, a fehér öv táján csekély mértékben nyerges.

Az alsó szemsor módosan, a hátsó tetemesen behajló; a hátsó sor középsői igen sokkal távolabbra egymástól mint az oldalszemektől; az alsó sor középsői az oldalszemeknél nem kisebbek, e sor szemei egyenlő távolságra egymástól; a két sor oldalszemei közötti köz csak kevéssel kisebb annál, a mely a két sor középsői között elterül.

A zár egy sötétbarna, sekély, kerek melyedés, melynek kerete homorú, a legzöres fele szélesedő s itt, közepén megszakított.

Mértékek: ♀ Törzs	5—7	$\frac{m}{m}$ ebből
fejmell	2—2.6	„
I lábpár	6	„
II „	5.8	„
III „	5.5	„
IV „	8.5	„

♂ Karesőbb; fejlettebb, különösen szélesebb fejmellel, a nőstényéhez hasonló színezettel, melynek zománcza igen élénk. A tapogató karesu, elég erős czommbal, melynek affelén a szőrözet soros és elálló; térdize vastagságánál legalább háromszor hosszabb, a száríz a térdnél nem rövidebb s külső oldala végén egy kurtá körmöt visel; pikkelye keskeny, csúcsosan kanálalaku, nemzőszerve egy világos színű, hossztojásdad gyűjtő, melynek külső oldalán egy sötétes hosszsesík látható.

Mértékek: ♀ Törzs	5	$\frac{m}{m}$
fejmell	2.5	„

Néha igen kicsiny.

E pompás kis állatot Orsova táján gyűjtöttem június elején, leginkább kövek alatt és között; jelesen a réteken halomba gyűjtött kőhalnokoknak száraz, felső köveinek alját kedveli. Mindegyik külön, finom barokban tartózkodik, s haborgattatás esetén villámsebességgel menekül. Dr. Thorell és Dr. Koch L. urak is újnak találták.

SPEC. 2. FAJ. MICARIA RADIATA. L. K. SUGARAS F. STRAHLIGE G.

(radius = sugár egy központból; a fejmell csillagszerű szőrözetről.)

Syn. 1866. *Micaria radiata* L. Koch «Die Arachn. Faun. der Drass.» pag. 65.

♀ Elötteste vörösesbarnas; fejeresze feheres pikkelyekkel borított, melyek a mellreszen hat küllőszerű sugárba tomorúlnak és szétfutnak; végteste zöldes, zöld fényzománczezzal, közepén végig egy feher folt, mely a fonokig ér s elől egy rövidebb, közepén egy a hasig terjedő, keskeny, feher harántöv által kereszt-szerűen metszetik; az oldalakban, a közepső öv és fonok között, meg egy feher folt; az első és második lábpár czombja sötétbarna, a többi láb és illetőleg iz világos barnássárga, a czombok nemi sötetes, elmosódó hosszsesíkokkal.

Jellegei: Az alsó szemsor szemei egyenlő nagyságúak; a mellvértén semmi pikkely.

A fejmell hosszukás, keskenyedő fejjel; a mellvert barnássárga, hossztojásdad, kevéssé fénylő. A rágók pikkelyek nélkül, gyeren szőrösök. Az állkapcsok sárgásbarnak, haránt behorpasztással; az alajk valamivel sötétebb. A tapogató karesu, czombja barnas, a többi iz sárga, végze alig rövidebb mint a térd és szár együttve. A két első lábpár czombja erős, felületen 2 sertetűskezével; a hátsó párok szárain, alul, két igen finom, elálló, inkább serte mint tűske.

Az alsó szemsor erősen behajló, szemei egyenlő nagyságúak; a hátsósor behajló, közepsői távolabbra állanak egymástól mint az oldalszemektől.

A végtest hosszukás, kisse hengeres, hasfele szemnyes-olajsárgás, gyeren szőrös.

A zár egy szélessegenel hosszab terese, mely felső — a nyelecskefele álló — végén szívyszerűen kímetszett, a legzöres fele kisse összeszorulva, itt egy igen kis nyílást mutat.

Mertekek: ♀ Torzs	44 $\frac{m}{m}$ ebből
fejmell	18 »
I lábpár	34 »
IV »	48 »

♂ Elöttem ismeretlen.

E ritka szepsegű kis pókot mint kora tavaszi alakot (márczius, április) eddig esupán csak a Gombos melletti, a Dunara nező ligeterdő vágásából ismerem, hol a korhadásnak indult nyárfatönkök leváló kerge alatt, rendszeren hangyak tarsaságában fordul elő, de gyorsasága és kicsinysege miatt csak bajosan fogható.

SPEC. 3. FAJ. MICARIA CINCTA. L. K. OVES F. GERTEL G.

(cincta = övezett; a végtest feher rajzáról.)

Syn. 1866. *Micaria cincta* L. Koch «Die Arachn. Faun. der Drass.» pag. 35.

♂ Fekete; neha zöldes neha semmi zománczezzal. A végtest elején egy hófeher harantszegely hossza közepén egy hófeher harántöv, mely az oldalakban legjobban kifejezett. A labak feketek, a terdekben és végzekén nemi világosodással.

Jellegek. Az alsó szemsor szemei nem egyenlők; a közepsők nagyobbak. Az első lábpár második végze nem tűskes vagy tűskes.

A fejmell keskeny, hosszabb mint a negyedik lábpár szára és térdé együttve, fényesfekete, keves feheres szőrözettel, fejváltósztek nélküli, taguló mellresszszel. A mellvert aranylag széles-tojásdad, barnafekete, keves szőrözettel. A rágók barnafeketek, oldalról tekintve, tövükkel terdszerűen kiálló, hosszú szőrözettel. Az állkapcsok mely behorpasztással, vörösbarnafeketek, oly hosszuk mint a rágók.

A lábak hosszuk, ezombreszokban elég erősek, karesu vegekkel; az első pár szárán, alul, a végén egy pár, másodvegyen, alul, a tövén szintén egy pár tüske.

A végtest majdnem hengeres, keskeny, hosszú; az alsó fonópár fényes fekete, hengeres és hosszan kiálló. Az alsó szemsor behajló, a két középső, egy domborodásra elhelyezve, kerek s szemátmerőnyire egymástól, a szélsőknel valamivel nagyobb; a szélsők tojásdadok a középsőkhöz igen közel állók. A hátsó szemsor behajló, az alsónál hosszabb, középszemei tojásdadok, laposak, távolabbra egymástól mint az oldalszemektől, reszűtösen állítottak, úgy hogy hátrafele szétállók. E középszemek közel annyira egymástól mint az alsó sor középsőitől.

A tapogató barnafekete, csücsösen kanálalaku pikkellyel, szára nem hosszabb a térdnél, s nem hosszabb saját vastagságánál, külső oldala végén egy majdnem farkasfülszerű, vaskos, nyújtvánnyal. A nemzőszerv sötét barnafekete, módosan kidomborodó egyszerű gyűjtő.

Mértekek: ♂ Törzs	4—5	$\frac{m}{m}$ ebből
fejmell	2.4	„
I lábpár	5.5	„
IV „	5.9	„

♀ Elöttem ismeretlen.

Dr. L. Koch i. h. a másodvegyz tuskeit tagadja ugyan s ezért Dr. Thorell a fajt nem alapítá meg feltétlenül, azonban Dr. L. Koch (in litt) tudatta velem, hogy a tüskék viszonya változó, s ő is bir példányokkal, a melyeknél a mondott iz tüskes.

A faj eredetileg is orsovai példányokra (collectio Kayserling) alapítottatott. A magamét Orsova környéken, kö alatt találtam mint korányari alakot.

SPEC. 4. FAJ. MICARIA PULICARIA. (SUND.) BOLHA F. FLOTH G.

(pulex = bolha, pulicaria; az alak kicsénységéről.)

Syn. 1832. *Clubiona pulicaria* SUNDEVALL «Svens. Spind. Beskr.» pag. 140.

♂ Elötteste sötétbarna, fehér pikkelyekkel gyeren fedett, melyek a mellresz oldalain, a lábak fekvésnek megfelelő barázdák választékain tömörülnek és hófehér csillagvonalakat alkotnak (rendesen lekopva). A végtest pikkelyekkel fedett, melyek a felületen szép zöld és ibolya zománczban, a hason — különösen pedig oldalain tüzes ibolyaszín zománczban ragyognak. A végtest elején egy, pikkelyből alkotott hófehér, keskeny harántesik, mely övszerűen körülfut, közepe táján egy hasonló öv, mely csak az oldalakba ér a fonók felett egy pikkelyből álló, hófehér petty. A lábak ezombjai barnák, a többi iz sárgásfehér.

Jellegek: Az alsó sor oldalszemei nagyobbak a középsőknel; a negyedik lábpár hosszabb az elsőnél; az első, harmadik és negyedik lábpár ezombja felületének elején tüskék allanak.

A fejmell hosszukas-szivalaku, oldalról tekintve a nyelecsketől lapos-ívesen alig emelkedő, egy darabból való. A mellvert szélesen szivalaku, legnagyobb szélességeben az első lábpár csipőjét a tomporral együtt (trochanter) felülmulja, szelein csekély behorpasztásokkal. A rágók az első lábpár tövénél sokkal vékonyabbak, tövüknel barnák, végök fele sárgásan világosodók. Az állkapcsok vaskosak, szelesek, sárgásak, tövük kidagadó, azonfelül haránt behorpasztottak, elől elkerekítették; az alajk sötét, felkörü, kicsiny, alig felet éri az állkapcsoknak. A láb ezombok, különösen az első párei, vastagodottak, barnák, a többi iz karesu, halvány sárgás. A végzek alján majdnem hengeres szőrőkből való, igen ritka talpkefe, melynek egyes szőrei fűszesszelűek; a lábak pikkelyei águsok. A végtest hossztojásdad, kisse hengeres, csücsösen a sárgás, igen apró fonók. Az alsó szemsor erősen behajló, oldalszemei nagyobbak a középsőknel s a homlok szelétől több mint szemátmerőnyire allanak; a hátsó sor könnyeden behajló, középszemei távolabb egymástól mint az oldalszemektől, de közelebb egymáshoz mint az alsó sor középszemeihez; az oldalszemek is távolabb egymástól, mint a hátsó középszemek egymás között.

A tapogató czombja barna, terd és száríze sárgások, egyenlő hosszúságnak, a száríz kissé vastagodott, felül egy rövid, vaskos, tompahegyű, sárgás nyujtványba kifutó, a nyujtvány a pikkely töve domboruságához alkalmazkodik, a pikkely sárgás, kanalatalku, domboruságával felfele fordított, nemzösszerve egy módosan kidagadó, sárga, domború gyűjtő, mely a pikkely üret kitölti.

Mertekek: ♂ Törzs	3·2 $\frac{m}{mm}$ ebből
fej mell	1·5 "
IV lábpár	5 "

♀ Ivarerett nőstényt nem ismerek.

E szép kis pókot mint őszi alakot csak egyszer találtam, nagyobb mennyiségben ugyan, de csak a hímeket ivarerett állapotban, meg pedig Rőzsahegy és Lykanka (Liptó) között egy határjelző kő alatt, hol csöveik egy rakáson állottak.

GEN. S. NEM. DRASSUS. WALCK.

(vide «Drassoidae»)

Syn. 1805. WALCKENAER «Tabl. d'Aran.» pag. 45 (ad part.)

Vide: THORELL «On europ. Spid.» pag. 147

A hátres megvan. Az állkapcsok közepe behorpasztott. A hátsó szemsor, felülről tekintve, kisebb nagyobb mertekben behajló, az alsónál határozottan hosszabb. A hátsó sor középszelei kördedek, egymás fele dülve, elágazásuk (divergentia) előre irányozott. Az alsó fonópár mindig valamivel hosszabb s többnyire vastagabb a felsőnél. A csipőköröm becsapórese mellett semmi lemez. A lábak hosszaránya állandóan: 4, 1, 2, 3. Közepes és kisebb alakok, melyek nappal rejtve élnek, éjjel (vagy egyáltalában a sötétben) barangolnak; hólyag alakú, sűrű szövötű rejtkeket készítenek, a melyekben a nőstények a petéket is őrzik.

SPEC. I. FAJ. DRASSUS QUADRIPUNCTATUS. (LIN.) NÉGYGÖDRÖS KAPOPOK. VIERGRUBIGE M.

(quatuor-punctum = négy, pont; a végtest gödréről.)

Syn. 1758. *Aranca quadripunctata* LINNÉ «Syst. Nat.» Ed. X, pag. 622. 4.

Vide: THORELL «Remarks» p. 176.

♀ Előteste vörösarna, labai valamivel világosabbak. Végteste sötét egerszürke, selymes fényű.

Jellegei: Az alsó szemsor egyenes. A harmadik lábpár szárai, felül, semmi füske. A harmadik és negyedik lábpár czombja felületen három füske.

Fejmelle vaskos, nagy, domború, fényes, szívalaku, keskenyedő fejresszel, lapos; oldalról tekintve, a hátvonal egyenes; a hátres meglehetősen hosszú, mindenik oldalán három-három esekely, esillagszerűen a lábak fele irányozott barazdával. A mellvert kisse visszajára tojásdad: elől valamivel esücsosabb mint hátul; legnagyobb szélessége az első lábpár csipője hosszúságával egyenlő; vörösarna, szőros. A rágók az első lábpár elsővégizenel hosszabbak, e lábpár czombjánál aligla vastagabbak, sötétvörösarnak, gyér, felálló szőrözettel. Az állkapcsok harántbenyomásnak; közepök táján es kifelé majdnem sarokszerűen kihajlók, vörösarnak, világosodó végekkel; az alajk nyelvalaku, egy állkapocsfelével keskenyebb; elől elkerekített. A tapogató vege sötétvörösarna, serteszerű szőrözettel s néhány füskevel, végze oly hosszú mint a szár és terd együttvéve. A lábak erősek, vörösarnak; az első és második pár első végzén erősebb, a többi pár ugyanczen izein gyengébb talpkefe. A végtest elől elvágott, keskenyebb, hátul szélesedő es ivesen elkerekített, felületen a negy nagyobb mgödör ket sötétebb pontpár kepeben latható. A fonók hengerdedek, sárgások; a felső pár az alsónál sokkal rövidebb, de alig valamivel gyengébb.

Az alsó szemsor egyenes, középszemei barnák (nappali) a többi valamennyi szem opalizáló (éjjeli); az alsó középszemek meg egyszer oly nagyok mint az alsó oldalszemek s a homlok szeletől körülbelül fel átmerőjöknek megfelelő távolságra állanak, e sor szemei közel egymáshoz, a középsők alig valamivel távolabbra egymástól mint az oldalszemektől; a felső sor szemei szétszórta, a sor könnyeden behajló, középsői szabálytalan (∇) nem open tojasdad alakúak, majdnem két szemátmerőnyire egymástól s két szemátmerőnyire az oldalszemektől; a két sor oldalszemei oly távolságra egymástól, mely egy alsó középszem átmerőjének megfelelő.

A zár egy barnásvörös terese, melyen egy öblös, majdnem kerek nyílás tátong, mely belsejében egy lemez által két félre oszlik (\cap).

Mertekek: ♀ Törzs ¹⁾	11.3	$\frac{m}{m}$	ebből
fejmell	6	»	
I lábpár	13	»	
IV »	5	»	

♂ ismeretlen

Egyszer találtam Borsod megyében, Alsóhámar közsegeben, háztájon. Juliusban: a ♀ ivarérett volt.

SPEC. 2. FAL. DRASSUS RUBENS. (WALCK.). PIROSLÓ K. ROTHE M.

(rubens = vöröslő; az alapszínről.)

Syn. 1837—47. *Drassus rubens* WALCKENAER «Hist. Nat. des Ins. Apt.» I p. 617, 5.

Vide: C. KOCH «Die Ar. Fam. der Drass.» p. 79.

THORELL «Remarks» p. 178 (§ D. quadripunctatus).

♀ Előteste és lábai (lekopva) elenk barnásvörösek. A végtest sárgásszürke, selymes.

Jellegek: Az alsó szemsor egyenes; középsői valamennyi szem között a legnagyobbak. A harmadik lábpár szára felületén egy tüske. A hátsó párok czombjain, felül, ket-ket tüske.

A fejmell szívalakú, mellrészében tágult; fejeresze csúcsosodó, hátresze s küllőszerűen oszló izombarázdái tetemesek; szőrözete sárgásszürke; hátvonala vízszintes, hátul a nyelecskere lekerekített. A mellvert tojasdad, barnássárga szőrözetű. A rágók barnásvörösek, vaskosak, oldalról tekintve vastagon ekalakúak, tövükkel terdszerűen kidülök, keves serteszőrrel. Az állkapcsok tetemes harántbehorpasztással, együttesen veve előrefelé szélesedők, barnásvörösek s a nyelv alakú alajkhoz () szerűen simulók. A tapogató sárgásvörös, szára felületen ket (?) tüskevel, végíze oly hosszú, mint terde és szára együttveve. A lábak elég hosszuk és erősek; az első két páron mind a két végiz igen erős talpkefevel, mely a hátsó két páron gyöngébb; az első lábpár szárán, alul, egy tüske (vajjon mindegy?) a második lábpáron szintén, a harmadik lábpár szárán, felül, egy tüske.

A végtest hosszukóded, kisse lelapított, jól látható ingódrókkal.

Az alsó szemsor egyenes, középsői közel szemátmerőnyire a homlok szeletől s nem egészen szemátmerőnyire egymástól, egy felátmerőjöknel kevesebbire az oldalszemektől. A hátsó sor módosan behajló; középsői az oldalszemeknél nem nagyobbak, szabálytalan alakúak s leghosszabb átmerőjöknek megfelelő távolságra egymástól, de nem távolabbra egymástól, mint az alsó középsők szintén egymástól; a hátsó sor oldalszemei a középsőktől oly távolságra, mint az alsó középsők a hátsó középsőktől.

A zár egy szélességénél nem hosszabb mely kivájás, melynek szélei ketoldalt kisse felvetettek, de a nyelecske fele kerette nem egyesülnek és fenylő-vörösbarnák.

Mertekek: ♀ Törzs	10.5	$\frac{m}{m}$	ebből
fejmell	5	»	

¹⁾ Nem terhes állapotban, a melyben a has aránytalanul kicsiny.

I lábpár	11.5	»
II » 	11	»
III » 	10.7	»
IV » 	14	»

♂ ismeretlen.

E faj, mely a *Drassus quadripunctatus*-nak legközelebbi rokona, ettől leginkább a harmadik lábpár felső tüskéje által különbözik; e jelleget THORELL i. h. mint állandót ketsegebe vonja ugyan, de keves példányomon megvan s Dr. L. KOCH e fajt határozottan annak alítja, a minék leírtam.

Két sérült példánya Ungvárról (Muz. gy. Vidra Ferd.), egy birtokomban Doroszlóról.

SPEC. 3. FAJ. *DRASSUS SCUTULATUS*. L. K. HENGERES K. WALZIGE M.

(scutula = hengerke; a hosszúkás alakról.)

Syn. 1866 *Drassus scutulatus* L. KOCH «Die Ar. Fam. d. Drass.» p. 93

Vide: THORELL «Remarks» p. 181

♀ Előteste elenk vörösbarna. Végteste sárgásszürke vagy egerszürke, selymes. Lábai elenken vörösbarnások.

Jellegek. A hátsó sor középszemei távolabbra egymástól mint az alsó középsők szintén egymástól. A fej mell oly hosszú, mint a negyedik lábpár térde és szára együttvéve. A harmadik és negyedik lábpár ezombjafelületén tüske, ugyan e párok térde belső oldalán egy-egy tüske.

A fej mell szivalaku; fejerésze, a tágas mellrészhez képest, csúcsosodó, — az egész előtest laposan domború; oldalról tekintve, a hatvonal vízszintes, egyenes, csak hátul röviden a nyelecskere hajló. A hátrés tetemes. A mellvert megfordítva tojásdad, vörösbarna, szőrös. A rágók vörösbarnak, oly hosszuk mint az első lábpár szára, oldalról tekintve, körtealakúak, tovükkel terdszerűen kidomborodók, serteszerűen bőven szőrösök. Az állkapcsok elenk vörösbarnak, keskenyek, hosszúk, harántbenyomottak, a hosszú alajk széleihez () szerűen illeszkedők; az alajk hasonló színű, egy állkapocs felül alig keskenyebb s e fél hosszának három negyedet bőven eléri. A tapogató meglehetősen vaskos ezombreszszel, sötetes barnavörös, bőven szőrös; végíze alul tüskösen szőrös, a szárnál nem hosszabb. A lábak, különösen töveikben, vaskosak, bőven szőrösök (a szőrőzet legtöbbször lekopva), az első és második pár fegyvertelen, erős talpkefével; a két hátsó pár szára és másodvégíze gyéren álló tüskékkel fegyverzett, gyenge talpkefével.

A végtest hosszúkörded, láthatólag lapított.

Az alsó szemsor egyenes, szemei körülbelül egyenlő távolságra egymástól; a középsők a szélsőknél sokkal nagyobbak, jól domborúak s bőven felátmerőnyire a homlok szeptől. A hátsó sor könnyeden behajló, középszemei tojásdadok, hátrafele egymásra dülök s egy alsó középszem átmérőjének megfelelő távolságra egymástól; de közelebb egymáshoz, mint az alsó középsőkhöz. A hátsó oldalszemek alig távolabbra a hátsó középsőktől mint az alsó oldalszemektől.

A zár egy szélességénél hosszabb barnás vörös térese, rendszerint egy makkalaku, csúcsával a légző-résnek fordított mely behorpasztással.

Mertekek: ♀ Törzs	13.5	m_m ebből
fej mell	6	»
I lábpár	10	»
II » 	9.5	»
III » 	9.3	»
IV » 	11.7	»

(A törzs merteke különben 10 — 15 m_m között ingadozik.)

♂ Kisebb, a kis végtesthez képest igen fejlett előtesttel; a végtest elején egy lemezszerű, kopasz térese. A tapogató karesu, nem hosszú, ezombja felületén, elől, három tüske harántsorban s egymás mellett, egy tüske ezek mögött; a térd vastagságánál nem hosszabb, a szár a térdnél rövidebb, külső oldalán egy előre irányozott, vaskos, szaruszerű nyújtvánnyal, mely oly hosszú mint a szár maga és a pikkely szélehez alkalmazkodik; a nemzőszerv elején, a pikkely csücske alatt, egy befele kanyarodó, rugószerű, vékony, sötetszínű embolus látható.

Mértékek: ♀	Törzs	8	$\frac{m}{mm}$ ebből
	fej mell	4.2	»
	I lábpár	10	»
	II » 	9.7	»
	III » 	9.7	»
	IV » 	12.4	»

Ismerem erdélyi részekből: Kolozsvárról, Mező-Záhról, Hosszutelekéről, N.-Szebenből; magyar részekből: Budáról (Muz. gy. Pavel), Orsváról, Doroszlóról. Az utóbbi helyen leginkább hazakban tartózkodik és telen át is található. Orsova körül nevezetesen a Graezkavolgy görgetegeiben tartózkodik.


SPEC. 4. FAJ. DRASSUS MINUSCULUS. L. K. PICZI K. ZWERG M.


(minusculus = piezi; az alakról.)

Syn. 1866. *Drassus minusculus* L. Koch «Die Ar. Fam. d. Drass.» p. 119

♂ Kicsiny. Előteste és lábai barnássárgák. Végteste olajbarnás, felülete elején két, hátrafelé kisse egymásfelé irányozott hosszesikkal, ezek alatt több A szerű ágrajzzal, e rajzok igen halaványak, elmosódók s inkább foltoscskákból mint vonalakból valók.

Jellegek: A hátsó középszemek közötti köz kisebb az alsó középsők közötti köznél. Az első két lábpáron gyenge talpkefe, mely a hátsókon hiányzik. Az első és második lábpár egyenlő hosszúságú. A hátsó lábpárok szárain felül semmi tüske. A fej mell gyér szőrözete ágas szőröcskékből való. Az alsó szemsor könnyedén behajló.

A fej mell szivalakú, eléggé domború, elől tompán elkerekített; hátrése tetemes s különösen előre fele a szemekig egy középvonással folytatódik, a hátréstől igen szembetünő, kiülőszerűen oszló izomsugarak (különösen borszeszben) láthatók, a fejrész töve felé, a középvonástól két  szerű vonás ágazik el. A mellvért sárgásbarna, szélesen - vértzerű. A rágók vörösbarnák, oldalról tekintve vastagon ekalakuak, tövükkel térdszerűen kihajlók, serteszőrösek. Az állkapcsok vörösbarnák, harántul igen tetemesen behorpasztottak, szélesek, tövükön sarkszerűen kiállók, a nyelv alakú alajkat () szerűen fogják körül; az alajk az állkapcsok hosszának $\frac{2}{3}$ -át bőven éri.

A lábuk hosszúk, elég karesuk és szőrösek; az első pár fegyvertelen; a második lábpár másodvégizén, alul, egy tüske (példányomon); a harmadik és negyedik lábpár szárán és másodvégizén, oldalt és alul, néhány tüske. A végtest keskeny-tojásdad, szélességénél hosszabb. Az alsó szemsor kevésbé behajló, középsői saját átmérőjöknel valamivel nagyobb távolságra a homlok széléstől s távolabbra egymástól (bőven szemátmerőnyire) mint az oldalszemektől; a hátsó szemsor könnyedén behajló, középsői szabálytalan  alakúak, s csak mintegy az előtest középvonása által elválasztottak, a sokkal kisebb oldalszemektől leghosszabb átmérőjöknek megfelelő távolságra esnek.

A tapogató barnássárga, tetemesen bunkós, szára a térdnél nem hosszabb s hosszúságánál alig vékonyabb, elől, kissé a külső oldal felé, egy vaskos nyújtványt bocsát, mely tompavégű a pikkely tövére felfekszik s a szár vastagságánál rövidebb. A pikkely kanálalakú. A nemzőszerv módosan domborodó; alulról tekintve, a gyűjtő előffelől behasított s e hasítás egy szabálytalan bardalaku karajt határol.

Mértékek: ♂ Törzs	6·8	$\frac{m}{m}$ ebből
fejmell	2·9	»
I lábpár	7	»
IV »	7·3	»

♀ Dr. Koch szerint l. i. h. a zár egy, a nyelecske fele nyíló lyraalakú keret (U), közepén egy, kisse hasított választó lemezzel.

Mint nyári alakot csupán csak Orsováról ismerem, hol a Graczka völgyben kő alatt találtam.

SPEC. 5. FAJ. DRASSUS UMBRATILIS. L. K. KOMOR K. DÜSTERE M.

(umbra = árnyék, umbratilis = árnyékban élő; életmódra és színezetre talál.)

Syn. 1866. *Drassus umbratilis* L. KOCH «Die Arachn. Fam. d. Drass.» pag. 113.

Vide: THORELL «Remarks» p. 184.

♀ Kisebb alak, komor színezettel. Előteste vörösbarna, sötétebb állkapcsokkal; végteste sötét olajbarna, egyszínű. Lábai barnássárgák.

Jellegei: A fejmell szőrözete egyszerű (nem ágas). A harmadik és negyedik lábpár szára felületen semmi tüske. A hátsó sor középszemei közelebb egymáshoz, mint az alsó sor középsői. Az alsó szemsor kevésbé behajló.

A fejmell vaskos, fejerésze elég széles; az egész gyéren szőrös, oldalról tekintve lapos-íves; a fejresz a mellresznél sötétebb. A mellvért igen rendes tojásdad, vörösbarna, fenyves, szelein semmi behorpasztás; gyéren szőrös. A rágók sötétvörösbarnák, az első lábpár elsődvégizénél hosszabbak, eléggé és durván szőrösek. Az állkapcsok és az alajk sötét-vörösbarnák, közepökön haránt szélesen behorpasztottak; az alajk nyelvalakú, az állkapocs felül nem keskenyebb s annak hossza két harmadrészt bőven eléri. A tapogató rövid; czombja, térdje vörössárga, szára és vége vörösbarna, a végiz a szárnál kevéssel hosszabb és sokkal rövidebb mint a szár és térd együttevége. A lábak vaskosak; az első két pár végizén talpkéfe, a két hátsó paron csak sűrűbb szőrözet; az első két pár szára és végei sötétedők; a czombok felületén 2—3 tüske, az első két lábpár szára fegyvertelen, a harmadik lábpár szárán alul 3— a negyedikén 4 pár tüske s e két utóbbi páron a másodvégiz is fegyverzett. A végtest sötét olajbarna, bőven szőrös, — elől kissé elmesztett és keskenyebb, hátul szelesebb, egészben módosan lelapított. A fonók sárgások, az alsó pár a legerősebb.

Az alsó szemsor igen csekély mértékben behajló, két középső szeme bőven egy szemátmérőnyire a homlok szelétől és szemátmérőnyire egymástól, az oldalszemek alig egy fel átmérőnyire a középsőktől; az alsó sor középsői feketek (nappaliak) a többi szem igen gyengén opalizáló (esteli); a hátsó sor könnyedén behajló, középsői tojásdadok, igen egymás fele dülve közelebb állanak egymáshoz, mint az alsó sor középszemei; a hátsó sor oldalszemei valamivel távolabbra a középsőktől, mint az alsó középsők egymástól; a két sor oldalszemei annyira egymástól, mint a hátsó oldalszemek a hátsó középsőktől.

A zár terjedelmes; két párhuzamosan álló hosszukás bemélyedést egy horgony forma lemez választja kette (L), melynek nyele a választékot kezezi, keresztnyújtványai egyszersmind a légzőrés szelet érintik.

Mértékek: ♀ Törzs	7·7	$\frac{m}{m}$ ebből
fejmell	3	»
I lábpár	7·8	»
IV »	8·2	»

♂ Eddig egyáltalában ismeretlen.

Mint tavaszi alakot Orsova, mint nyárit Alsó-Hámor (Borsod) környéken mindössze két példányban találtam, mindig kövek alatt, hol egy ritkás szövetű, nagy, 7 $\frac{m}{m}$ átmérőjű burokba elhelyezett peteit őrzé (Thorell tanár Svecziában is felfedezte). Pontosabban megjelölve, Orsovánál a Jeselnicza völgy gorgetegeiben, az Alsó-Hámorban a «Köhat» meszes sziklaeszesen fordult elő.

SPEC. 6. FAJ. DRASSUS TROGLODYTES (C. K. BARLANGI K. HOHLEN M.

(troglodytes = $\tau\rho\omicron\acute{o}\gamma\lambda o\delta\acute{o}\tau\eta s$ = barlanglakó; a tartózkodásról.)Syn. 1839. *Drassus troglodytes* C. KOCH «Die Arachniden» VI, pag. 35.

Vide: THORELL «Remarks» p. 183.

♀ Előteste sötét-sárgabarna, elől feketebarnába átmenve, szeleim fekete szegélylyel; végteste feketebarna, vörössesárga zománczezzel; lábai barnássárgák.

Jellegei: A fejmell szőrözete egyszerű; a két hátsó lámpár szárain, felül, semmi tüske; a lábakon semmi csik; csak az első két páron talpkéfe. A hátsó sor középszemei közelebb egymáshoz, mint az alsó sor középszemei szintén egymáshoz; az alsó sor behajló.

A fejmell valamivel hosszabb mint a negyedik lámpár szára és terde együttveve, oldalt elkeresített, előrefele csak kevéssé boltozatos. A mellvert széles-kerekded, hátul esúcsba futó, esékely, a csipőknek megfelelő benyomásokkal, vörösbarna, igen fenyés, bőven szőrös. A rágók feketek, majdnem oly hosszúk mint az I. lámpár szára, rövidebb és hosszabb serteszőrökkel. Az allkapesok sötét vörösbarnák, tövük boltozatos, közepők melyen behorpasztott; az alajk IV-del rövidebb, széles alajból indulva vége felé keskenyedek s itt elkeresített. A tapogatók harmadik és negyedik ize majdnem egyenlő hosszúságú, az ötödik oly hosszú mint az előbbieket együttveve; a második iz görbült, felületen egy vékony, hosszú tüske. A lábak barnássárgák; az első pár alig valamivel rövidebb mint a negyedik. A végtest elől elmesztett, hátul elkeresített.

Az alsó szemsor behajló, szemei egyenlők, a középsők közelebb a homlok széléhez, mint a hátsó középszemekhez s távolabbra egymástól mint az oldalszemektől; a hátsó sor behajló, az alsónál hosszabb, középső szemei előrefele szeljelálló, rezsutosan egymásfele dülve hátul majdnem érintkeznek, oly távolságra az oldalszemektől, mint az alsó sor középsőitől.

A zár egy szélességenél hosszabb keret, melybe egy nyelv alakú, széles lemez illeszkedik, mely a keret felett erre T formára reáborul.

Mertekek: ♂ Törzs	9.8 $\frac{mm}{mm}$ ebből
fejmell	3.5 »
I lámpár	8.5 »
IV »	9 »

♂ Dr. Koch L. (Drassiden pag. 119) szerint karsubbb; színezetre a ♀-nyel egyezik; a tapogató második ize görbült, felső végén egy, tövén két tüske; a harmadik iz hosszabb a negyedikkel, végén s kifele fordítva egy bárdszerű, széles nyújtvány, belső felén két rövidke, fogszerű nyújtvánnyal; a pikkely oly hosszú, mint a második iz, külső oldalán egyenes, belső oldalán íves, vége tompa, nem kúpos.

Mertekek: ♂ Fejmell	3 $\frac{mm}{mm}$
I lámpár	7.5 »
IV »	8.5 »

Csupán csak Kolozsvárról (Bükkerdő) ismerem.

SPEC. 7. FAJ. DRASSUS LAPIDICOLA. (WALCK.) KÖVI K. STEIN M.

(lapidicola = követ lakó, kő alatt l.)

Syn. 1802. *Aranca lapidicola* (lapidosa) WALCKENAE, «Faun. Paris.» II, p. 222.

Vide: THORELL «Remarks» p. 202.


♀ Előteste barnászörös, sötetülő fejresszel, vörösbarna rágókkal; lábai vörössesárgák; végteste szürkessárga, egyszínű.

Jellegei: Az alsó szemsor egyenlő távolságra egymástól, a sor könnyeden behajló. A negyedik és harmadik lábpar szára, felül, tüskés.

A fej mell vastkos, szívalakú, mellresze szélesedő és elég domború, oldalról tekintve a fej előrefele domborúan behajló; az egész fej mell széle finom, feketés szegélylyel; felülete szürkés, megfekvően apró szőrözöttű. A mellvért tojásdad (hátról jelentéktelen csücsbe kifutó), közepe vörössárga, szélei barnulók, a lábak állásának megfelelő, csekély behorpasztásokkal.

A rágók vastkosak, az első lábpar elsődvégizénél valamivel hosszabbak, sötét-vörösbarnák, fényesek és gyéren szőrösök; oldalról tekintve majdnem körtve alakúak, tövükkel térdszerűen a homlok előtt kiduzzadozók; tövük külsején a csukló kőnczfeje tojásdad alakban tetemesen kiszökő. Az állkapcsok e az alajk vörösbarnák haránt behorpasztottak; az állkapcsok vége befelé reszűntösen elvágott, kifelé elkerekített; az alajk nyelvalakú, az állkapcsok tövénél nem keskenyebb, s ezeknek hossza két harmadrészet eléri. A tapogató vörössárga, végíze barnuló, tüskékkel elegyesen szőrös, oly hosszú mint a száríz (térdd nélkül). A lábak arányosak; csücsük kissé barnulók; az első és második páron mindket végiz — a többi páron csak az első végiz — talpkefével felszerelt; az első két pár terde es végíze fegyvertelen; a száríz alsó felén egy-egy tövis, a czombok felületén több (5—7) tövis; a hátsó két pár szárain, köröskörül elszórtan 7—8 tövis; a másodvégiz szintén bőven tövises. A végtest tojásdad, megfekvő szürkessárga, kevéssé selymes fényű szőrözettel borított. A sárgás fonók hengeresek, mind a három pár majdnem egyenlő vastagságú.

Az alsó sor szemei egy közepszemátmérőnyire a homlok szélétől; a két közepszem fekete (nappali), valamennyi többi szem opalizáló (éjjeli); az alsó sor oldalszemei harántfekvően kördedek s a közepszökökkel együtt egy igen könnyeden behajló sort kepeznek, valamennyi körülbelül egyforma távolságra egymástól; a hátsó sor behajló, közepszemei kördedek, egymásfele dőlők, nagyobbak, az oldalszemek kerek, kisebbek, a közepszemek kevesebbire mint oldalszemátmérőnyire egymástól, az oldalszemek a közepszököktől két es fel oldalszemátmérőnyire, az alsó és hátsó közepszök egy négyszögbe elhelyezve, mely szélességénél magasabb; a két sor oldalszemei oly távolságra egymástól, mint az alsó közepszök egymás között.

A zár egy sárgászöldes terese, melynek szeléből egy lapátforma () lemez kiáll, a lemez könyökeiben nyílnak a kerek tojócsövek, s egy gombostűfejhez hasonló dudorral záródnak be.

Mértékek: ♀ Törzs	15	$\frac{m}{mm}$ ebből
fej mell	6	»
I lábpar	15.2	»
IV » 	17	»

♂ Kisebb, kareszubb; hosszabb, kissé előre irányozott rágókkal, melyeknek töve nem térdszerűen kiálló; a végtest színezete rendszeren sötétebb a nőstényenél. A tapogató karesu, igen kis, alig feltűnő nemzőrészszel; a száríz a térdiznél hosszabb, rendes alkotású; belső oldalán három, felületén két közönséges tüskével, az utóbbiak közül egy az iz végén áll; pikkelye keskeny, hosszú, csücsa köröskörül szőrös. A nemzőrész egy egyszerű alig kidagadó, lencsealakú, vörösbarna gyűjtő, mely elől nyílt és egy fehéres hartyával zárt; belső oldalán egy kurta, vékony nyújtvány; a pikkely csücsa also-felén egy sertetüske.

Mértékek: ♂ Törzs	9	$\frac{m}{mm}$ ebből
fej mell	4.5	»
I lábpar	13.8	»
VI » 	15	»

Messze elterjedett tavaszi és nyári alak, a mely azonban inkább csak az előhegységben híg felfele s a bükk tenyesz-övet nem hagyja el; tanyáját kerek alatt, kövek között üti fel és a száraz görgetegeknél mindenkifelett kedvelője. Hólyagszerű, ritkás szövetű rejtjét is leginkább kövek között szövi, melyekben a nőstény a külön beburkolt peteket is őrzi. Vedléseit szinten burkokban végzi és parzáskor mind a két ivar közös burokokban található.

Ismerem eddig, magyar részekből: Doroszlóról, Orsova környékéről, Mehádiáról (a Damoclet tömlőjén egészen a Styubei és Sztana bogara magaslátig), Ó-Ogradena (Csukár máre szikla görgetegei), Báziásról, Sátoralja-Ujhelyről, Alsó-Hámor (Borsod), Uj- és Ó-Hutta (Borsod), Lykankáról (Liptó), Pécs vidékéről (Muz. gy. Frivaldszky és Pável János), Buda vidéke (Muz. gy. Pável János).

SPEC. 8. FAJ. DRASSUS ANGUSTIFRONS. WESTR. KESKENYFEJŰ K. SCHMALKOPF M.

(angustus — frons = keskeny homlok.)

Syn. 1861. *Drassus angustifrons* WESTRING «Ar. Suec.» pag. 349.

Vide: THORELL «Remarks» pag. 185.

♀ Előteste vörössesárga; lábai hasonló színűek, végök felé kissé sötétedők. A végtest sárgás, gyéren álló feketés szőrökkel.

Jellege: A szemek középesoortja szélességénél majdnem kétszer magasabb; a hátsó szemsor erősen behajló.

Fejmelle szívalakú; fejerésze igen keskenyedő, oldalas kávak által, melyek a hátrés felé ki és összefutnak, mintegy ékalakra kiemelkedő; a mellrészen csillagszerűen elosztott, a lábak fekvésének megfelelő inkább gödrök mint barázdák; oldalról tekintve, az egész a hátrés táján a legmagasabb, a fej felé majdnem egyenes és igen módosan lefelé tartó hátvonallal. A mellvert körded, vörössesárga, kissé domboró és igen gyéren szőrös; a csipők előtti benyomások alig kivehetők. A rágók vörössesárgák, az első lámpár ezombjánál sokkal vékonyabbak (körülbelül $\frac{1}{2}$ -szer), oldalról tekintve tövük kissé kidomborodó s e mellett módosan előre irányzottak, elég szőrösök s a szőr — tövükön — hosszú. Az állkapcsok sárgák, elől elvágottak, közepök táján igen kihajló, módosan haránt benyomásuak, az alajk valamivel sötétebb, nyelvalakú, azoknak fele-hosszát csak kevéssel múlja felül. A tapogató vörössesárga, végíze sötétebb, húsos, hosszabb a szárnál és valamivel rövidebb, mint a térd és szár együttvéve, különben bőven feketés szőrökkel ellátott. A lábak vaskosak, az első két pár valamivel erősebb, végizén tetemes talpkefével, mely a hátsó párokon igen gyenge. A két első pár ezombja felületén három fekete tüske, melyek közül a felső kissé előre-oldalt áll; a harmadik lámpár felületén hét tüske, egy legalól és három-három felette és egymás felett harántsorban; a negyedik páron négy tüske, kettő a végén, kettő ez alatt és egymás után; a két első pár többi ize fegyvertelen; a harmadik pár szára felül egy tüskével, oldalt és alul több tüskével; a negyedik pár szára csak oldalt és alul tüskés; a két hátulsó lámpár másodvégizei tüskések.

Az alsó szemsor behajló; középszemei feketék (nappaliak), kerekék és nagyobbak, a homlok szélétől szemátnérőnyi távolságra; a többi szem (valamennyi) élénken opalizáló (éjjeli); az alsó sor oldalszemei tojásdadok, a középsőkkel majdnem érintkezők, a középsők egy fel szemátnérőnyire egymástól; a hátsó sor erősen behajló, középszemei szabálytalan (Q) alakúak, nem távolabbra egymástól és a kerek oldalszemektől, mint az alsó sor középszemei egymástól; a két sor oldalszemei igen közel egymáshoz, de nem érintkeznek; az alsó középsők a felső középsőkkel egy oly négyszögbe elhelyezettek, a mely szélességénél majdnem kétszer magasabb.

A zár egy vörössesárga, felkerek tércse, mely a nyelecske felé egy vörösbarna — szerű vonás által van határolva, belsejében pedig két vörösbarna Λ alakú és állású rést mutat.

Méretek: ♀ Törzs 8 $\frac{mm}{100}$ ebből
fejmell 3 »
I lámpár 7.2 »
IV » 9.5 »

♂ Elöttem ismeretlen.

Egyetlen ivarérett példányomat mint nyári alakot, Alsó-Hámorból (Borsod) bírom, hol a hatalmas mészsziklák egy szűk réschen tanyásozt (»Szinva») és csak jobboldalának két első lába s a tapogatók

árán került birtokomba; egy másodvadású ép példányt Orsován egy fa kérge alatt találtam. Eddig csak Svédországból ismeretes egy fejletlen nőstény és egy ivarérett hím után (lásd Westring és Thorell l. c.) Az ivarérett nőstény itt iratik le először. Koch L. jeles műveben «Die Arachn. Fam. der Drassiden» az ismeretlenek között szerepel.

SPEC. 9. FAJ. DRASSUS LORICATUS. L. K. VÉRTES K. GEPANZERTE M.

(loricatus = vértezett; úgy látszik az előtestről.)

Syn. 1866. *Drassus loricatus* L. KOCH «Die Ar. Fam. der Drass.» pag. 131.

♂ Előteste szép világos-vörössárga, vörösebb rágókkal. Végteste finom borsósárga, felületének legelején egy vörössárga folttal, és előre álló vöröses szőrűstökkel; lábai vörössárgák, hasonló színű tüskékkel elegyesen szőrösök.

Jellegei: Az alsó szemsor határozottan behajló, középszemei az oldalszemeknél kisebbek. A harmadik és negyedik lábpár szára felül is tüskés.

A fej mell részre vaskos, laposan domború, hosszukásan szívalakú, a fejrész rövid és kissé hirtelenül keskenyedő, a résszerű hátgödörből jól kivethető, tetemes barázdák futnak csillagszerűen a lábak felé; oldalról tekintve, a hátvonal majdnem egyenes. A mellvért vörössárga, szelein barnuló, körded, legnagyobb szélessége megfelel az első lábpár csipője hosszúságának. A rágók sárgászörösek, az első lábpár elsővég-izénél valamivel rövidebbek, gazdag, serteszerű, vöröses szőrözettel; oldalról tekintve, fővükkel alig kiálló és egészen függőlegesek. Az állkapcsok és az alajk baránthorpasztással; az előbbieket végükön elkerekítettek, egyébként módosan egymásfelé hajlók, vörössárgák, szeleiken hosszú szőrökkel, az alajk barnás vörös, amazoknál keskenyebb, hosszúságuk két harmadát valamivel meghaladja. A labak ezomb és szár részökben kissé vaskosak, végeik karesuk; az első és második pár végzei gyér talpkefevel; a ezombok alul fegyvertelenek; a száruk alul fegyveresek — felül a két első párt fegyvertelen, a két hátsó párt közül a harmadik egy, a negyedik két tüskevel fegyvereztet; valamennyi másodvégiz fegyveres.

A végtest elöl kissé elnemszett, hátul alig szélesedő s így majdnem párhuzamos oldalakkal és kissé lelapított. A felső fonópár igen gyenge; rövidebb a hengerded, vaskos és hosszabb alsó párnál.

Az alsó szemsor behajló, középszemei feketek (nappali), a többi (valamennyi) szem élénken fénylő, opalizáló (éjjeli), az alsó sor szemei igen szorosan együtt, a középsők között egy kis tér, ezek és az oldalszemek majdnem érintkeznek, a középsők fel átmérőnyire a homlok szélétől; a hátsó sor alig behajló, középszemei tojásdadok, csúcsosabb végeikkel egymásfelé dülve hátra néznek, majdnem érintkeznek; az oldalszemek kerekék, sokkal kisebbek s a középsőktől körülbelül saját átmérőnyi távolságra állanak; a két sor oldalszemei egy hátsó oldalszem átmérőnyire egymástól, az alsó és hátsó középsők oly négyszögbe elhelyezettek mely, szélességénél sokkal magasabb.

A tapogató rövid, karesú, sárgás vörös; térd és száríze egyenlő hosszúságú, az utóbbi módosan vastagodott és külső oldala végén egy vaskos, rövid, vörössárga tüskevel fegyvereztet; a pikkely keskeny, hosszú; vége köröskörül szőrös; nemzörése egy, a pikkely üret kitöltő hártáival elzárt gyűjtőt mutat, melynek hátulsó végéből egy lassanként vékonyodó, serteszerű nyujtvány indul, mely a pikkely belső szelehez alkalmazkodva a pikkely csúsa alá ér; e nyujtvány áttetsző, sárgászörös.

Méretek: ♂ Törzs	8.5 $\frac{mm}{m}$ ebből
fej mell	3.8 »
I lábpár	11 »
IV »	13 »

♀ Szinezetre a hímekkel megegyezik; rövidebb lábú. Tapogatóján a végiz kissé füstös, karesú, hegyesedő, felül a töven tüskés s bőven oly hosszú mint a térd és szár együttve.

A zár egy felvetett és barnás szélű, szívalakú kivájtás, mely csücsével a legzörést eri, s a melybe — a nyelecske felől — egy, a szív kivágásának megfelelő, nyelvalakú, keskeny osztó lemez melyen benyomul.

Mertekek: ♀ Törzs	8 $\frac{m}{m}$ ebből
fej mell	3·3 »
I lábpár	9·5 »
IV »	11 »

A hímek kora tavaszkor (márczius) Doroszlón, lakásom falán, estve gyertya világánál fogtam, a nőtényt testvér öcsém Vlkolinszky Jenő küldte Schmeczabányáról. Igen ritka.

SPEC. 10. FAJ. DRASSUS PUBESCENS. THOR. SZŐRÖS K. BEHAARTE M.

(pubescens = szőrösödő; a fej mell szőrös voltáról).

Syn. 1856. *Drassus pubescens* THORELL «Recensio crit.» pag. 11v.

Vide: THORELL «Remarks» pag. 203.

Koch L. «Drassiden» pag. 123.

♂ Előtteste halavány-barnássárga, fekete szegelyvonallal, végteste szürkessárga, gyenge rezes fényvel, lábai sárgabarnák, végeik vörösbarnák.

Jellegei: A két első lábpár szárain, felül, tüskék; az alsó szemsor behajló, szemei egyenlők, közép-szemei nagyobb távolságra egymástól mint az oldalszemektől.

Fejmelle oly hosszú mint a negyedik lábpár szár- és térdíze együttvéve, oldalaiban elkerékített, elől igen szűk, igen fényes, finom, ágas, selyemfényű szőrözettel tömötten borítva. A hosszú háthasítékból benyomások sugárzanak az oldalak felé. A fejrész egy sekély barázdá által a mellrészről elválik. A mellvert előre-felé keskenyedve, hátul csücsös, barnássárga, szélein sötétebb, fényes, a csipők táján sekély behorpasztásokkal, közepén rövid, megfekvő, ágas és egyszerű szőrözettel, szélein elálló hosszú szőrrel borítva. A rágók sárgabarnák, oly hosszú mint az első lábpár másodvégíze s oly vastagok mint a lábpár czombja, tövükkel térdszerűen kidagadók, fényesek, a külső, és belső oldalakon hosszú, gombokból induló sertékekkel borítottak; a becsapó rés külső élén két erős, egy apró, a belsőt két apró fog. Az állkapcsok sárgabarnák, közülről behorpasztottak; az alajk $\frac{1}{3}$ -dal rövidebb, végén elnetszett. Lábaik talpkefe; a IV lábpár hosszabb az elsőnél, a különbség a IV-dik pár szára hosszának felel meg. A végtest keskeny, elől elnetszett, sűrűn selyemfényű ágas szőrözettel borítva, melybe közbe-közbe elálló serték vegyülnek.

A tapogató második íze oldalról lapított, hajlott, vege vastagodott. A negyedik íz hosszabb a harmadiknál, a végén, külső oldalán egy rövid, lefele görbülő, hegyen hasított nyújtvány nyúl; pikkelye alapján a negyedik íznel szélesebb, elől csőrszerűen hegyesedő; nemzőszerve módosan kidagadó, elől egy árforma embolussal, melynek szárát egy a külső oldalról induló, hasított nyújtvány keresztezi.

Mertekek: ♂ Törzs	7·3 $\frac{m}{m}$
fej mell	3 »
I lábpár	7 »
IV »	8 »

♀ előttem ismeretlen. Dr. Koch L. szerint a testrészek arányai s színezet szerint a ♂-mel azonos. A zár egy majdnem teljes körű tér, két pontszerű tojócsőnyílással, ezektől ketoldalt és felett arabeszkyszerűen kanyarodó barázdával.


Egyetlen ♂ példányát a Bihar hegységből (Vlegyásza-fenyőöve) ismerem, hol júniusban a moha között akadt.

GEN. 9. NEM. PROTHESIMA. L. K.¹

(πρόθεσις = elől, σπιός = tompa, pisze orr; a fejalkatról.)

Syn. 1872. L. Koch «Apterol. aus dem frank. Jura» pag. 139.

Vide: THORELL «Remarks» pag. 430. sub.

A hátsó szemsor, felülről tekintve, majdnem egyenes, nem kihajló, kevéssel hosszabb az alsónál; az alsó szemsor középsői a többi szemmel mindig kisebbek s egy harántfekvő emelkedesen állnak (innen «Prothesima»). A rágók becsapó resznek hátsó szele alig kinyúló; apró fogacsokkal fegyverzett. Az állkapcsok haránt horpasztással; az alajk egy harmaddal rövidebb. A lábak hosszaránya 4, 1, 2, 3. Állandó szövetet nem szőnek. A nőstény a petéket egy tányér alakú, kerek, alul lapos, felül homorú () burokba szövi, mely kövek alatt, resekben stb. szabadon fekvő az anya által őriztetik. Közepes nagyságon alóli, gyors. keskeny, legtöbbször fénytelen-fekete alakok.

SPEC. 1. FAJ. PROTHESIMA PETIVERII (Scop.) PETIVER GYÁSZPÓKJA. PETIVERS TRAUERSPINNE.

(Petiver, mult századbeli term. barát.)

Syn. 1763. *Arauca Petiverii* ScopOL «Entom. Carn.» pag. 398.

Vide: THORELL «Remarks» pag. 194.

♀ Fekete, elő állapotban kekes lehellellet. Előteste módosan fénylő; vegteste fénytelen szőrös. Lábai barnafeketék; az első pár czombja igen csekély mertekben vörösesen áttetsző.

Jellegei: A hátsó szemsor középsői oly távolságra egymástól, mint az alsó szemsor középsői. A hátsó sor középsői nem nagyobbak ugyan e sor oldalszemeinél. A fejmell oly hosszú mint a negyedik lábpár szára és terde együttve. A rágók hosszú sertekkel. A negyedik lábpár másodvégizével hosszabb az elsőnél.

A fejmell csúcsosan szívalakú, módosan domború; oldalról tekintve hatvonala majdnem egyenes; a hátresen túl a mellresz hirtelenül es meredeken a nyelecskere lecsapott. A mellvert szélesen korded, kissé domborodó; szélein igen csekély behorpasztásokkal, szőrös, szélein a szőrök csillagszerűen elrendezettek. A rágók feketebarnak, az első lábpár czombjánál vékonyabbak; ugyane lábpár elsővégizenél alig hosszabbak; oldalról tekintve a homlok előtt térszerűen kiálló; tövük fele hosszacska sertekkel. Az állkapcsok feketebarnák, módosan harántbenyomásúak, közepök táján elege kihajló, végeik vörösesek, egymásfele hajló; az alajk nyelvalakú, egy állkapocsfelével nem keskenyebb, a vége majdnem csúcsos; a rágók hosszának két harmadreszt bőven eléri. A tapogató rövid, vörösbarna, végze gazdagon szőrös s oly hosszú, mint a terd és száríz együttve. A lábak erősek, vaskosak, arányos hosszúságúak; a czombok kissé laposra nyomva, szélesedők; a két első pár czombja felületen két-két egymásután álló, hosszú sertetüske, a többi lábpáron több tüske; az első két pár többi ize csak szőrös, a többi lábpáré, az első végiz kivételével, tüskes; a két első lábpár mindket végizen talpkefe.

A vegtest elől elvágott, oldalai majdnem párhuzamosak, vége elkerekített, a kiálló fonók csúcsossá teszik, nem domború, egészben hosszúkás és különösen felületen sűrűn szőrös; a szőr erős rövid, megfekvő.

A hátsó szemsor majdnem egyenes (kihajlásra hajlandó) szemei kerek, egyenlő nagyságúak; a középsők laposak s alig valamivel közelebb egymáshoz mint az oldalszemekhez; az alsó sor a hátsónál rövidebb és egy oldalszem átmérőjénél valamivel távolabbra a homlok szelétől; középszemei sokkal kisebbek,

¹ Azelőtt «Melanophora Autorum», minthogy azonban kitűnt, hogy MEIGEN e nevet már 1803-ban legyekre alkalmazta, Dr. Koch L. a változtatást fogantatosította.

feketék, közös emelkedesen állva, sokkal távolabb állanak egymástól, mint az oldalszemektől; a hátsó sor középsői az alsó középsőktől távolabbra állnak mint a hátsó középsők egymástól; a két sor oldalszeme alig kisebb távolságra egymástól mint az alsó középsők a felső középsőktől. A zár egy vörösesbarna, majdnem hossznegyszögletes térese, közepén egy lyra alakú betéttel, mely szélességénél magasabb, s széles alapjával a legzőres felé áll (Z).

Mértékek: ♀ Törzs	9 $\frac{m}{m}$ ebből
fejmell	4 »
I lábpár	8.8 »
IV »	10 »

♂ Elöttem ismeretlen.

Peteburka 9 $\frac{m}{m}$ átmérőjű és tetemesen domború, rózsásszínű; lapos oldalával rendszeren a kövek aljára van erősítve.

Ez az alak megfelel a *Prothesima subterranea* L. Koch alaknak, lásd: L. Koch «Die Ar. Fam. der Drassiden» p. 170, Taf. VII, fig. 110.

Változat: *P. Petiverii* var. *petrensis* C. Koch (?) Syn. *P. petrensis* L. Koch «Die Ar. Fam. der Drassiden» pag. 167.

(Lásd: Thorell «Rem. on Synon.» pag. 194 sub «*Melanophora petrensis*.»)

Kisebb, valamivel világosabb lábakkal. A zár lyra alakú betetje magasságánál szélesebb (U).

Mértékek: ♀ Törzs	6.5 $\frac{m}{m}$ ebből
fejmell	2.7 »
I lábpár	6.7 »
IV »	7.5 »

Peteburka 8 $\frac{m}{m}$ átmérőjű, kevesebbe domború, rózsaszínes.

Mint nyári alak a *P. Petiverii* eddig a deli részek hegyi alakjaként mutatkozik s ismerem a Melhadia felett uralkodó Damoclet tombról, úgy a bükk tenyészövéből, mint a Damoclet legesücsáról is, mely a bükk tenyészövének legfelsőbb szelet kepezi; mindenütt kövek alatt tartózkodik s a míg nem ürzi tojásait, igen sebesen menekül.

A *P. Petiverii* v. *petrensis* szintén mint hegyi alakot ismerem, S.-A.-Ujhelyről, Alsó-Hámorból és Diósgyőrből (Borsodmegye).

SPEC. 2. FAJ. PROTHESIMA OBLONGA. (C. K.) HOSSZÚKÁS GY. LÁNGLICHE T.

(oblonga = hosszúkás; a karesú alakról.)

Syn. 1844. (!) *Melanophora* (!) *oblonga* C. Koch in «Herr. Schäff. Deutschl. Ins.» 120, 23.

Vide: L. Koch «Die Ar. Fam. der Drass.» p. 164.

♀ Barnásfekete. Lábai sötétvörösbarnák, a czombokban kevesse áttetszők, a csipők kissé világosabbak. A hason a legzőres feletti rész vörösbarna.

Jellegek: A hátsó szemsor középszemei valamivel közelebbre egymáshoz, mint az alsó középsők szinten egymáshoz; a hátsó középsők a hátsó oldaliaknál nem nagyobbak. Az első lábpár első végizével hosszabb a másodiknál. A negyedik lábpár második végizével hosszabb az elsőnél. A fejmell oly hosszú mint a negyedik lábpár szára és terde együttvéve. A rágókon hosszú sertek.

A fejmell szivalakú; fejeresze a mellhez kepest esücsösödő; hátvonala, oldalról tekintve, vízszintes, egyenes, hátul a nyelecskere lehajló; a hátres tetemes, az izombarizdák gyengek. A mellvert szélesen korded, vörösbarna, szemcsés, módosan szőrös. A rágók barnavörösek, oldalról tekintve körtvealakúak, tövükkel

terdszerűen kiálló, keves, hosszú sertekkel. Az allkapesok barnavörösek, vegeik fele világosodók s az egy allkapocsfelével valamivel szelesebb, nyelvalaku aljakot () körülfogók; az aljak a rágók hosszának két harmad részét meghaladja. A lábak elég erősek és elég hosszúk; vegeik karesuk. Az első és második lábpar szárán, alul, semmi tüske, másodvegyzenek feven egy-egy tüske; a harmadik lábpar szárán és másodvegyzen, alul és oldalt tüskék állanak; terde belső oldalán egy tüske; a negyedik páron hasonlóképen.

A végtest hosszukás, elől kisse keskenyedő, hátul elkerekített.

Az alsó szemsor középsői, közös dudorodáson állva, korulbelül két szemátmérőnyire a homlok szelétől és sokkal távolabbra egymástól mint a középszemektől; ezek a középsőknel nagyobbak. A hátsó sor egyenes, szemei egyenlő nagyságúak, középsői valamivel távolabbra egymástól mint az oldalszemektől, de közelebbre egymáshoz mint az alsó középsők szintén egymáshoz.

A zár egy terjedelmes, világos barnászörös tércse, lapos, kettől ∇ szerűen határolt; e szegély elváló ágai között egy igen sekély, keskeny csatornával; összehajló ágai között, melyek a legzöres szelet erik, sekély, széles sötét csatornával.

Mertekek, ♀ : Törzs	7.5 m_m ebből
fejmell	3.8 "
I lábpar	7.4 "
II "	6.8 "
III "	6.8 "
IV "	10 "

♂ Kisebb; aránylag hosszulábú. A tapogató igen karesú nyellel és tetemes bunkóval; a nyelv füstbarna; szára a terdnel rövidebb, elől szelesedő s itt hosszánál valamivel vastagabb; külső oldalán egy toviszerű hegyes nyújtványt bocsát, mely a pikkelyhez alkalmazkodva vegevel kisse felhajlik s magánál a szárnál hosszabb. A pikkely kamatalaku, sokkal hosszabb mint a terd és szár együttevén, nagyocská; a nemzőszerv meglehetősen domborodó, a pikkely uret kitölti; hátul sötét, elől sárgasan nyílt, repedésszerű barna betetekkel.

Mertekek, ♂ : Törzs	5.5 m_m ebből
fejmell	2.6 "
I lábpar	6.9 "
IV "	8.3 "

A nőstény peteburkanak az átmérője 8.5 m_m , színe rózsaszínes (borszeszben sárgás).

Mint kora nyári alakot Orsova és Bazias környékéről, kövek alól ismerem. E faj amnyiban is nevezetes, hogy eddig kizárólagosan csak Tirolból volt ismertetve. (L. Koch in litt.).

SPEC. 3. FAJ. PROSTHESIMA ATRA. (LATR.) FEKETE G. SCHWARZE T.

(atra = fekete; a színről.)

Syn. 1806, *Drassus ater* LATREILLE «Gen. Crust. et Ins.» I, pag. 87. (ad part.)

Vide: KOCH L. «Die Ar. Fam. der Drass.» pag. 182.

THORELL «Remarks» pag. 195, 197, 198 (in § P. Petiverii, moerens.)

♂ Sötét barnásfekete, a végtesten barnás szőrözettel.

Jellegek: A hátsó szemsor középsői oly távolságra egymástól mint az alsó középsők szintén egymástól. A hátsó középszemek a hátsó oldalszemeknel nem nagyobbak. A fejmell oly hosszú, mint a IV-dik lábpar szára és terde együttevén. A második lábpar szárán, alul, egy tüske; a negyedik lábpar másodvegyzevel hosszabb az első párnál. Az allkapesokon hosszú sertek. — A fejmell tiszta fekete.

A tapogató szára kiszélesedett, hosszúságával — különösen elől — szélesebb, külső oldala végén egy tűskeszerű, hegyes, erős, kissé felhajló nyújtványnyal, mely, töve beszámításával, a szárnál nem rövidebb; a pikkely kanálalakú, sárgásbarna szőrözött, oly hosszú, mint a terd és szár együttve; a nemzőszerv egyszerű, kevesse domborodó, a kanál alakjához képest szélességénél hosszabb, hátul feketebarna, elől barnássárga és itt a belső széle felé egy benyomással; legelől egy kissé felvetett barna szegélyvel.

Mertekek. 2 Torzs	6.2 m_m ebből
fej mell	2.5 »
I lábpar	4.8 »
IV »	7.2 »

Az egyetlen, túlságos áztatás következtében oszlofokban levő példány a m. Nemz. Muzemben; Pees környéken, egyebek között, gyűjte Frivaldszky János.

Annál a körülménnyel fogva, hogy jellegeit megalapítani még lehetséges volt s Dr. Koch L. is annak állítja a minék leírtam, végre érdekességénél fogva, bevettem a Faunába.

SPEC. 4. FAL. PROTHESIMA PRAEFICA. (L. K.) GYÁSZOLÓ GY. KLAGE NDE T.

(praeifica = sirató asszony temetéseknél; a szinről.)

Syn. 1866. *Melanophora praefica* L. Koch «Die Ar. Fam. der Drass.» pag. 157.

Vide: THORELL «Remarks» pag. 197. (in § M. moerens.)

♂ Sötét, fenytelen-fekete, finoman-szemcsés előtesttel. Labái barnafeketek, az első második és negyedik lábparon mind a két végiz világos vörössárga, a harmadik lábparon szemnyes barnasárga, kevesse feltűnő.

Jellegei: A hátsó sor középszemei valamennyinél nagyobbak. A fej mell oly hosszú mint a negyedik lábpar szára és terde együttve s a mellett finoman szemcsés.

A fej mell csúcsosan szívalakú, oldalról tekintve egyenes hátvonallal, a hátresen túl a nyeleske fele elkerekítve lecsapott; felülete, erősebb nagyítás mellett chagrinbőrszerűen szemcsézve-ránczolt. A mellvert körded, ritkisan pontozott, gyeren szőrös, szeleín csillagszerűen fekvő szőrsorral. A rágók az első lábpar czombljanal gyengébbek, ugyane lábpar első végizenél rövidebbek, feketek, sertesen szőrösök, oldalról tekintve tövükkel a homlok előtt térszerűen ki- egyebkent függőlegesen állók. Az állkapcsok barnássárgák, vegeikkel egymásfele hajlók, közepök haránt behorpasztott; az alajk nyelv alakú; töve barna; elkerekített vege világosodó. A tapogatók szemnyes-sárgásbarnák, végizök vörössbarna, bőven szőrös, valamivel rövidebb mint a terd és szár együttve. A lábak barnafeketek, czombreszőkben laposan szélesek, erős száakkal s kissé hirtelenül vékonyodó vegekkel; a harmadik és negyedik lábpar szárán, alul, két két tűske s ugyane lábparok másodvégize köröskörül több tűskevel; az első és második lábpar mindket végize gyenge talpkéfevel.

A végtest elől ívesen elvágott, különben hossztojásdad, megfekvően szőrös; a két alsó fonópar hengeres s meglehetősen távol egymástól állva, a végtest vege alatt kiáll.

A hátsó szemsor kissé behajló, szemei igen lelapítottak, tejes színűek, a két középső szabálytalan alakú s valamivel közelebb áll egymáshoz mint az oldalszemekhez s az utóbbiaknál nagyobb; az alsó sor is egyenes, középszemei kisebbek az oldalszemeknél, több mint szemátmerőnyi távolságra egymástól állva, a nagyobb tejes szmü oldalszemeket megközehtik, e sor a homlok szeletől bőven egy alsó oldalszemátmerőnyire esik; a két sor egyenlő hosszúságú, s a középszemei közötti köz kétszer nagyobb annál, a mely az alsó sor középsői között letezik,

A zár egy barnássárga majdnem pajzsalakú terese, melyben egy horgonyforma csatornás benyomás kepezi a választékot (\mathfrak{U}); a horgonyforma rész a legzőrés fele áll.

Mertekek: ♀	Törzs	6.2 $\frac{mm}{m}$	ebből
	fejmed	3	»
	I lábpár	7.8	»
	IV »	9	»

♂ Előttem ismeretlen.

Mint nyári alakot Orsováról ismerem, hol, úgy látszik, ritka. E fajt Dr. Koch L. az idezett műben eredetileg is Orsováról került példányokra alapítá s eddig csak magyar földről ismeretes.

SPEC. 5. FAJ. PROTHESIMA LONGIPES. (L. K.) HOSSZÚLÁBÚ GY. LANGBEINIGE T.

(longus — pes = hosszú, láb.)

Syn. 1866 *Melanophora longipes* L. Koch «Die Ar. Fam. der Drass.» p. 147.

♂ Füstösfekete; az első lábpár ezombján belül, egy terjedelmes, vörösesbarnás, áttetsző folt; a lábak vörösesbarnásan feketek, a negyedik pár feltűnően hosszú.

Jellegei: A hátsó szemsor középszemei ugyane sor oldalszemeinél nem nagyobbak. A fejmed rövidebb mint a negyedik lábpár szár- és terdize együttve.

A fejmed esucosan szivalakú, oldalról tekintve egyenes hátvonallal, a hátresen túl a nyelecske fele ívesen lecsapott; gyér és felálló szőrökkel. A mellvért körded, elszórtan pontozott, gyéren szőrös és fénylő. A rágók az első lábpár ezombjánál gyengébbek, ugyane pár első végizenél rövidebbek, tövükkel a homlok előtt terdszerűen kiálló; gyéren hosszú szőrökkel ellátottak. Az állkapcsok sötétvörösbarnak, kissé világosodó végekkel, melyekkel egymásfele hajolnak; harántbenyomásuk; az aljuk nyelvalakú, a rágóknál valamivel sötétebb. A lábak vörösbarnásan feketek, aránylag hosszúk s a ez mbokban erősek; a ezombok alul fegyvertelenek, felül két két sertetűskevel; a két első lábpár szára egészen fegyvertelen, másodvégize alul és töve egy egy tűskepárral; a harmadik és negyedik pár szára alul három három pár tűskevel, másodvégize több tűskevel; az első és második lábpár mind a két végize módos talpkéfével.

A vegtest keskeny, elől ívesen elvágott, különben hossztojás ad; a vége alatt az alsó, hengerded fonopár kiáll s ennek végén fehéres szőrzet látható.

A hátsó szemsor egyenes, szemei egyenlők s egyenlő, csekély távolságra egymástól; az alsó sor egyenes, középszemei közös dudoron állva, kisebbek a teljes színű oldalszemeknél s közelebb ezekhez, mint egymáshoz; mind a két sor oldalszeme majdnem oly távolságra egymástól, mint a hátsó sor középsői az alsó sor középsőitől; az alsó sor távolsága a homlok szélétől több, mint egyik oldalszemének az átmerője.

A tapogató vörösbarna, rövid és bunkós; ezombresze közepe táján feltűnően szélesedett; terd és szárízze rövid, az utóbbi igen vastagodott, küloldala végén egy hosszú, a pikkelyhez alkalmazkodó, ujszerű nyújtvánnyal; a pikkely tompa-kanalakú, magasan domború, bőven szőrös; nemzőszerve egyszerűen kidagadó a végén és befelé nemi behorpasztással, mely vörösbarnás; a gyűjtő felületen egy terjedelmes, szabálytalan alakú sárgásfehéres folt látható.

Mertekek, ♂:	Törzs	7.5 $\frac{mm}{m}$	ebből
	fejmed	3	»
	I lábpár	8.5	»
	IV »	11.6	»

♀ Előttem ismeretlen.

Mint őszi alakot csak egy példányát találtam a budapesti Gellérthegyen, egy lazár felfekvő kő alatt.

SPEC. 6. FAJ. PROSTHESIMA PEDESTRIS. (C. K.) LÁBAS GY. GESTIEFELTE T.

(pedester = gyalogos; a lábfejek szembeötlő, világos színéről).

Syn. 1839. Melanophora pedestris C. Koch «Die Arachniden» VI. p. 82.

Vide: L. Koch «Die Ar. Fam. der Drassiden» p. 178.

♀ Előteste barnásfekete; végteste fekete. A lábak czombjai zöldesbarnák, a többi íz úgy mint a tapogatók is ken- vagy vörössesárgák. A fonók és a végbel fedele szintén sárgásak.

Jellegek; A hátsó szemsor középszelei közelébb egymáshoz mint az alsó sor középsői szintén egymáshoz; a hátsó sor középsői nem nagyobbak ugyane sor oldalszeleivel. A negyedik lábpár első végizével hosszabb az első párnál. A fejmell oly hosszú, mint a negyedik lábpár szára és térdé együttvéve.

A fejmell szivalakú, kissé szeleledő, a mellrészen jól kivethető, csillagszerűen elosztott gödröcskékkel; oldalról tekintve hátvonala majdnem egyenes, a hátresen túl a nyeleeskére lecsapott. A mellvert majdnem pajzsalakú, zöldesbarna, kurta szőrözettel. A rágók az első lábpár czombjánál vékonyabbak s alig oly hosszúk, mint ugyane láb első végize; zöldessárgák kefeszerű, sűrű, fekete szőrözettel. Az állkapcsok szenygyesen barnássárgák, haránt benyomással, külső széleik közepén tetemesen kiszökők; az aljuk hasonló színű, nyelvvalakú. A tapogató czombja barnássárga, a többi íze sárga, fekete szőrözettel; végize oly hosszú, mint szár- és térdize együttvéve. A lábak, meglehetősen hosszúság mellett kissé vaskosak, a czombok különösen laposan-vastagok, felületökön két-két tövissel; a két első lábpár többi íze fegyvertelen, a két hátsó lábpár szára és másodvégize több kurta tövissel; felületek azonban fegyvertelen. A két első lábpár első végize alig feltűnő talpkefével.

A végtest elől kissé kimetszett, keskenyebb mint közepe táján; vége kissé csücsösödő; felületén a négy nagy ingódór feltűnik. A fonók hengerdedek, szemgyesen-zöldessárgák, mintegy füstösek.

A hátsó szemsor egyenes, szelei tejszínűek, egyenlő nagyságúak, a középsők szabálytalanok, igen laposak s közelebb egymáshoz mint az oldalszemekhez, a melyektől szemátmérőnyire állanak; az alsó sor középsői kicsinyek s közös emelkedesen állva, távolabb állanak egymástól, mint a sokkal nagyobb, tejszínű oldalszemektől; a két sor oldalszelei bőven egy oldalszemátmérőnyire egymástól.

A zár egy vörössesbarna, majdnem tojásdad tércse, egy elkerekített szögletű háromszöghöz (\triangle) hasonlító betéttel, mely az egyik sarkával a légzőrés felé áll.

Mértekek, ♀ : Törzs 7·7 m_m ebből

fejmell 3·3 »

I lábpár 7·5 »

IV » 9 »

♂ Előttem ismeretlen.

E feltűnő fajnak egy ivarérett és egy ifjabb nőtényét Orsovánál (Graczká völgy) találtam egy patak görgetegében, hol mint nyári alak tartózkodott. A faj eredetileg is Orsováról került magyar példányokra alapítottatott (lásd Dr. L. Koch az idézett helyen); ismerem továbbá Erdélyből a tordai hasadékból.

SPEC. 7. FAJ. PROSTHESIMA CALCEOLATA. N. SP. CZIPÓS GY. BESCHUITE T.

(calceolus = czipő; a világos lábvégekről.)

(VII-dik tábla, 163, a szemesoport, b előláb, c ♂ tapogatója, d mérték).

♂ Tisztafekete; előteste alig észrevehetőleg barnás lehelletű; lábai füstös-barnák, a két első pár végize vörössesárga, a két hátsó kevesbbe elütő, barnászörös. A szivalakú fejmell kevessebb rövidébb mint a negyedik lábpár térdé és szára együttvéve. A két hátsó lábpár csipője barnássárga, a többi páré barna.

A lábak czombrészekben, térdben és szárban láthatólag erősödöttek, a végizek karesuk. A két első lábpár szárán semmi tüske, másodvégizen, alul, hossza-közepe táján egy apró tüskepár; a harmadik és negyedik pár szárán, alul több tüske, ugy a végizeken is; az utóbbiak oldalt is tüskések.

A szemek igen laposak és alig opalizálók; az alsó sor középsői egy kis emelkedésen állva kerek, a többi szem szabálytalan alakú; mind a két sor közel egyenes, a szemtávolságok közel egyenlők; az alsó sor középsői alig valamivel távolabbra egymástól mint a hátsó soréi szintén egymástól.

A tapogató alkotása igen jellemző; czombja vastagodott s felső felén egy elkerekített sarkot alkot; a térdiz vastagságánál legalább másfélszer hosszabb; a szár alig rövidebb s hosszú szőrözettel, külső oldalának a végén egy vastag, hegyes, kissé a pikkely fele hajlott köröm áll; a pikkely mélyen, tompán-kanálalakú, szőrös; nemzőszerve — külső oldaláról tekintve — kosszarvszerűen ki és alá kanyargó, erős, széles nyújtványt mutat.

Mertekek.	♂: Törzs	5.7 $\frac{m}{m}$ ebből
	fejmell	2.4 "
	I lábpár	6.7 "
	II "	5.7 "
	III "	5 "
	IV "	7.8 "

♀ Elöttem ismeretlen.

Egyetlen, tökéletes fejlesű példányát cvekkel ezelőtt a Buda melletti Gellérthegy Duna felőli oldalán egy kő alatt találtam. Dr. Thorell és Dr. Koch szerint is igen feltűnő faj, mely eddig ismeretlen volt.

SPEC. S. FAJ. PROSTHESIMA SEROTINA (L. K.) ÉJJELI GY. NACHT T.

(serotinus = késő esteli; a szín komorságáról.)

Syn. 1866. Melanophora serotina L. Koch «Drassiden» p. 185.

Vide: THORELL «Remarks» p. 198.

♀ Sötétfekete. Lábai a czombok és végizek vörösesbarnán áttetszők.

Jellegei: A hátsó sor középszemei nem nagyobbak ugyane sor középsőinél, és nem távolabb egymástól, mint az alsó középsők szintén egymástól. A második lábpár szárán, alul, semmi tüske. A negyedik lábpár első végizével hosszabb az elsőnél. A fejmell oly hosszú, mint a negyedik lábpár szára és térdé együttvéve. A rágók hosszú serteszőrökkel.

A fejmell csúcsosan szívalakú, oldalról tekintve egyenes hátvonallal, a hátresen túl hirtelen és meredeken lecsapott. A mellvert tojásdad, fényes, vörösbarna, gyér szőrös. A rágók az első lábpár czombjánál vékonyabbak s ugyane lábpár első végizenél valamivel rövidebbek; sötétvörösbarnák, hosszú, serteszerű, gyér szőrözettel. Az állkapcsok és az alajk sötét vörösbarnák, az előbbieket egymásfele hajlók, haránt benyomással; az utóbbi széles, elől elkerekített. A tapogató vörösbarna, czombja a többi izhez képest hátározottan szélesedő, végize oly hosszú, mint a tér- és száriz együttvéve. A két első lábpár czomb és szár részében láthatólag vastagodó; valamennyi páron a czombok felülete két-két hosszú sertetüskevel; a harmadik és negyedik páron, a szárazon — alul — három-három pár tüske; a másodvégiz több tüskevel.

A végtest keskeny, elől ivesen elvágott, oldalai majdnem párhuzamosak; hátul tompán csúcsos, módosan kiálló, hengeres alsó-fonópárral.

A hátsó szemsor igen módosan kihajló, középszemei valamivel távolabbra egymástól mint az oldalszemektől; az alsó sor egyenes, középszemei az oldalszemeknél kisebbek, közös emelkedésen állva, távolabbra egymástól mint az oldalszemektől; a hátsó és alsó középszemek oly derek-négyszöget képeznek, mely szélességénél nem magasabb.

A zár egy szélességénél magasabb térese, mely a nyelecske felé öblösen kivágott, betétje fényes, \cup alakú.

Mertekek, ♀ : Törzs	6.2 $\frac{m}{m}$ ebből
fejmell	2.6 »
I lábpár	6.2 »
IV »	8 »

♂ Előttem ismeretlen.

Peteburka, 7 $\frac{m}{m}$ átmérő mellett, sárgás. Ismerem mint nyári alakot Orsováról, az Allion-hegy tővéről, hol kövek alatt tartózkodik.

SPEC. 9. PAJ. PROTHESIMA FEMELLA. (L. K.) CZOMBOS GY. GESCHENKELTE T.

(femen = felső czomb; az első lábpár erős czombjairól.)

Syn. 1866. Melanophora femella L. KOCH «Die Ar. Fam. der Drass.» p. 176.

♀ Fekete. Végteste barnás szőrökkel elegyítve fekete. Lábai sötétvörösbarnák, a két első pár czombrésze, különösen szára láthatólag vastagodott.

Jellegei: A negyedik lábpár másodvégizével hosszabb az elsőnél. A végtest nem fénylik. A rágók hosszú sertékkal ellátottak. A hátsó szemsor szemei egyenlők; a középsők nem távolabbra egymástól mint az alsó középsők szintén egymástól. A fejmell oly hosszú mint a negyedik lábpár szára és terde együttvéve.

A fejmell fekete, csúcsosan szívalakú, durván szőrös; oldalról tekintve egyenes hátvonallal, a hát részen túl lankásan lecsapott. A mellvért sötétvörösbarna, kissé fénylő, gyéren szőrös. A rágók sötétvörösbarnák, az első lábpár czombjánál sokkal vékonyabbak, ugyan e lábpár első végizével rövidebbek, hosszú sertékkal ellátottak; oldalról tekintve inkább kidagadók mint térdszerűen kiállók. Az állkapcsok vörösbarnák, végeiken igen csekély mértékben világosodók, haránt behorpasztással s egymásfele hajlok; az alajk hasonló színű, elől elkerekített. A tapogató vörösbarna; czombja vastagodott, végize sokkal rövidebb mint a szár és térdiz együttvéve. A lábak sötétvörösbarnák, az első pár czombja vörösesen áttetsző; a két első pár czombja igen erősen vastagodott, a szár láthatólag vastagodott; valamennyi pár czombfelületének a tővén egy-egy hosszú sertetüske; a harmadik lábpár szára, alul, a végén, egy pár — ketoldalt három-három tüskével; a negyedik pár — alul, a végén, egy pár — ketoldalt két-két tüskével. A két első pár végizén talpkefe.

A végtest keskeny, elől ívesen elvágott, majdnem párhuzamos oldalakkal; hátul tompán csúcsos, módosan kiálló hengeres alsó fonópárral.

A hátsó szemsor egyenes, szemei egyenlők, a középsők valamivel távolabbra egymástól mint az oldalszemektől; az alsó sor középszemei kicsinyek, távolabbra egymástól mint az oldalszemektől; a két sor negy középszeme oly négyszögbe elhelyezett, mely szélességénél valamivel hosszabb.

A zár egy sötétvörösbarna, szélességénél magasabb térese, egy \cap alakú betéttel.

Mertekek, ♀ : Törzs	6 $\frac{m}{m}$ ebből
fejmell	2.7 »
I lábpár	6.3 »
IV »	7.9 »

♂ Előttem ismeretlen.

Egyetlen példányát, mint nyári alakot, Orsován az Allion-hegy tővén kő alatt találtam.

SPEC. 10. FAL. PROTHESIMA CONSPICUA. (L. K.) FELTÜNŐ G. AUFFALLENDE T.

(conspicua = szemebetűnő, feltűnő; itt az elűtő színezetről.)

Syn. 1866. *Melanophora conspicua* L. Koch «Die Ar. Fam. der Drass.» p. 149.

♀ Barnafekete. A végtest közepe táján, oldalt, egy-egy — a borszeszben — feltűnő világos folttal; lábai tarkak.

Jellegei: A fejmell hosszabb mint a negyedik lábpár terde és szára együttveve. Az első lábpár szára, alul, több tüskevel.

A fejmell sötét-gesztenyebarna, nyújtott-szívalaku, csuesos; oldalról tekintve hatvonala igen laposan ives, a hátresen túl meredeken lecsapott. A mellvert körded, világos vörösbarna, gyeren szőrös. A rágók, barnászörösek, az első lábpár czombjánál sokkal vékonyabbak, sertekkel; oldalról tekintve, tövük kidagadó, kisse előre irányzottak. Az alkapcsok barnászörösek, világos végekkel, haránt benyomásnak; az alajk nyelv-alaku. A tapogató czombúze sötétebb a többinél; a végiz oly hosszú mint a terd és száríz együttveve. A lábak, különösen a két első pár, czombreszőkben igen erősek s a czombok sötétvörösbarnák; a térdiz valamennyi páron sárgászörös, a száríz az I, II és IV-dik páron sötétvörösbarna, világosodó véggel; a többi iz mind sárgászörös. Az első lábpár szárán, alul két pár, a másodvégize töven és szinten alul egy pár tüske, — a második lábpáron hasonlóképen; a harmadik és negyedik lábpár szárán, alul, három-három pár tüske; a másodvégizek tüskések; valamennyi czomb felületen két-két tüske; a két első lábpár végizen tetemes talpkéfe. A végtest hossztojásdad; a végen a felső és alsó fonópár kilátszik, mely majdnem egyenlő hosszúságú; a felső pár valamivel vékonyabb.

A hátsó szemsor igen csekély mertekben kilajló, középszemei igen ellapulók, úgy hogy körületek alakja alig kivehető, de valamivel távolabb állanak egymástól mint az oldalszemektől; az alsó sor középszemei, közös emelkedesen állva, távolabbra esnek egymástól mint az oldalszemektől s ezeknél nem kisebbek; a két sor középsői oly negyszögben állanak, mely hátsó szelességenél nem magasabb.

A zár egy sötétbarna terese, melynek betetije vörössesárga, szívalaku, közepen egy hasonló színű kis dudorodással.

Mertekek, ♀ : Törzs	8·4 $\frac{m}{mm}$ ebből
fejmell	3·5 "
I lábpár	7 "
IV "	8·8 "

♂ Előttem ismeretlen.

E feltűnő és szép fajt csak két példány után ismerem. Mint nyári alakot Kőszegen (Vas megye) találtam egy pinczefal tövében; a fejmell «feher savja» azonban, melyet Dr. Koch L. említ (a ♂-nél) e példányon nem volt meg. A második példány a magy. nemz. Múzeumban van; esonka, lábai a leírotténál sokkal sötétebbek, azonossága a többi jegyek alapján kétségtelen; gyűjte Frivaldszky János Meládia vagy Orsova környéken.

SPEC. 11. FAL. PROTHESIMA BIMACULATA. (C. K.). KÉTPETTYES GY. ZWEIFUNKT T.

(bis = macula = két, petty; a végtest két fehér pontjáról.)

Syn. 1839. *Melanophora bimaculata* C. K. «Die Arachniden» VI, p. 81.

♀ Fekete; fejmelle közepén fehéres szőrök; a végtest felületének elején szinten fehér szőrök állanak, közepe táján két oldalt egy-egy hófehér, nagyobb folt. A két hátsó lábpár csipője kensárga; valamennyi láb czombja és a két első pár csipője fekete; a többi iz kensárga. Kiesiny, nyulánk, igen keskeny alak, melyet már a mondott jellegek is felismerhetővé tesznek.

Fejnelle hosszúkás, hosszabb mint a negyedik lábpár szára és terde együttve, szívalakú: oldalról tekintve, egyenes hatvonallal, a hátrésen túl lecsapott; a szemek között néhány hosszú serte áll. A mellvert kissé viszájára-tojásdad, domborodó, fekete, fényes; gyér szőrözettel. A rágók sötétvörösbarnák, az első láb-pár ezombjánál vékonyabbak, oldalról tekintve kissé kidagadók, gyéren álló hosszú sertékkal ellátottak. Az állkapesok fekete-barnák, sárgás szelekkel. A tapogató ezombresze fekete, a többi iz kensárga; szőrözete fekete. A lábak ezombreszekben feketek, vastagodottak; a ezombok felületén, az első két pár, két hosszabb és egy rövidebb sertetüskevel, a többi két-két tüskevel; az első két pár láb szára, alul, a végén, egy egy tüskevel; a hátsó két pár több tüskevel; az első két lábpár meglehetősen talpkéfevel. A végtest hengerded, kiálló két fonópárral, melyek majdnem egyenlő hosszúságúak; a felső pár vékonyabb. A has fehéres szőrökkel elegyítve fekete.

A hátsó szemsor egyenes, szemei egyenlők, a középsők kétszerre oly távolságra egymástól, mint az oldalszemektől; az alsó sor egyenes, két középső szeme közös emelkedesen állva az oldalszemeknél kisebb, távolabb egymástól mint az oldalszemektől, de közelebb egymáshoz mint a hátsó sor középszemei szintén egymáshoz.

A zár egy közel negyszögletes fekete terese, a mint látszik, két egymás mellett, a légzőrés közelében fekvő ∞ szerű melyedessel.

Mertekek ♀ : Törzs	5·7 $\frac{m}{m}$ ebből
fejmell	2 "
I lábpár	3·8 "
IV "	5·2 "

♂ Ismeretlen.

E nevezetes fajnak egyetlen nőstényét, mint tavaszi alakot Pancsován, a szőlők sövényei mellett tenyésztő családon fogtam. Koch C. az idezett helyen megemlíti, hogy a példány, a melyre ő a fajt alapította Görögországból származott; fia Dr. Koch L. a típusokat nem találta atyja gyűjteményében s a Drassidák családjáról írt, többször idezett monográfiájában e fajt mint előtte ismeretlent sorolja elő. Annyi bizonyos, hogy a *Pr. conspicua* fajsomszedje (fejmell hosszabb mint a negyedik lábpár szára és terde együttve) és hogy hazánk faunájának délkeleti jellegét kitüntetni képes.

SPEC. 12. FAJ. PROSTHESIMA PETRENSIS (C. K.). KÖVI GY. STEIN T.

(petra = szikla; a tartózkodásról.)

Syn. 1839. *Melanophora petrensis* C. Koch «Die Arachniden» VI, p. 89.

Vide: L. Koch «Die Arachn. Faun. der Drass.» p. 167.

♂ Barnafekete. Lábai vörösbarnásan feketek, az első lábpár ezombja foltszerűen és tetemesen áttetsző.

Jellegek: A hátsó szemsor középsői közelebb egymáshoz mint az alsó középsők szintén egymáshoz; ugyancsak a hátsó középsők nem nagyobbak a hátsó szélsőknél. A fejmell oly hosszú mint a IV lábpár szára és terde együttve. A tapogató sötétszínű. A második és harmadik lábpár egyenlő hosszúságú; a negyedik lábpár másodvégizével hosszabb az elsőnél. Az állkapesokon hosszú sertek.

Az alsó szemsor egyenes; középsői közös dudoron és két átmérőnyire a homlok szeletől, távolabb egymástól mint a nagyobb oldalszemektől; a hátsó sor egyenes, középsői közelebb az oldalszemekhez mint egymáshoz s kevésbé közelebb egymáshoz mint az alsó középsők szintén egymáshoz.

A zár egy terjedelmes, szélességénél majdnem kétszer hosszabb terese, mely a nyelecske fele szív-szerűen és bemélyedve határolt; e bemélyített terben egymás felett két megfordítva-szívalakú terese (széles felével a légzőrés fele), mely érintkezik; a felső tereseben egy sekély kivájtás, az alsóban, mely a légzőresig terjed, két homorú bordácska, egy iker kivájtást határol.

Mertekek: ♂ Törzs	7 $\frac{m}{m}$ ebből
fejmell	2.8 "
I lábpár	6.7 "
II "	6 "
III "	6 "
IV "	8 "

♂ Elöttem ismeretlen.

Egyetlen példányát, mint késő nyári alakot. Alsó-Hämorból ismerem.

SPEC. 13. FAJ. PROTHESIMA ALLIONICA. N. SP. ALLIONI GY. ALLION T.

(Allion, hegy Orsova mellett; jeles lelhely.)

(VII-dik tábla, 164, *a* szemecsoport, *b* ♂ tapogató oldalról, *c* ugyanannak nemzőszerve alulról, *d* mérték.)

♂ Elötteste sötét-szemnyesvörösbarna; végteste sötét olajbarna. Lábai világos olajzöldek; az első két pár térde és szára füstös barna. A lábak karesük és rendkívül hosszúk, jelesen a negyedik pár kirívó. A szívalakú fejmell oly hosszú, mint a negyedik lábpár szára *egymagában*. A mellvert szépen tojásdad, olajzöld. Az állkapcsok és az aluk olajzöldek.

A lábak ezombrészekben erősödöttek, különben karesük; az első pár szárán semmi tüske, másodvégizen, alul, két pár tüske; a második pár másodvégizen hasonlóképpen; szárán, alul, két erős serte a harmadik és negyedik lábpár szára, alul, több tüskével, másodvégize alul és oldalt tüskés.

A végtest keskeny, majdnem párhuzamos; a két alsó fonó hengeres, hosszúra fejlett, szembetünő, közel 1 $\frac{m}{m}$ hosszúságú.

A hátsó szemsor középsői nagyok, tojásdadok, hátul egymás felé dülök s itt közelebbre egymáshoz, mint az alsó középsők szintén egymáshoz.

A tapogató hosszú, karesú, eléggé bunkos; térde eléggé nyújtott, szára ennél nem rövidebb; külső oldalának a végén egy dudorral, mely hirtelenül egy finom tüskeben végződik; pikkelye kanálalakú, eléggé szőrös, külső oldalán kissé kiszélelt; a csúcsa alatt egy, hegyével oldalt-kifelé kanyargó, sarló alakú, finom, hegyes nyújtvánnyal; e nyújtvány barnavöröses.

Mertekek: ♂ Törzs	4.9 $\frac{m}{m}$ ebből
fejmell	2.3 "
I lábpár	7.8 "
II "	6 "
III "	2 "
IV "	9.5 "

Az igen feltűnő, az egész nemben uralkodó habitustól eltűtő alak, Orsova mellett az Allion hegyen fordult elő csupán egy példányban, mely május végén ivarérett volt. Dr. Koch L. megjegyzése szerint is felette feltűnő új faj.

SPEC. 14. FAJ. PROTHESIMA TRAGICA. N. SP. SZOMORÚ GY. TRAUERNDE T.

(tragica = gyászos, szomorú; a színről.)

(VII-dik tábla, 165, *a* szemecsoport, *b* ♀ zárja, *c* mérték.)

♀ Elötteste sötét-vörösbarna; végteste olajbarna, durva, megfekvő szőrözettel. A lábak sötétvörösbarnák; az első pár czombja — töve felé — foltszerűen áttetsző; a második pár kevesebb áttetsző, homályos hosszvonással.

A fejmell szívalakú; fejerésze esücsosodó; a fejmell oly hosszú, mint a negyedik lábpár szára és térde együttvége. A mellvert körded, vörösbarnás, szőrös. Az állkapesok benyomottak, nyújtottak, széleiken kissé világosodók; az alajk sötétebb, nyelv alakú, az állkapesok hosszának két harmadrészét bőven éri.

A tapogató vaskos, czombja kissé dagadt, szőrözete sertetűsekkel elegyes; végíze valamivel rövidebb mint a térde és szár együttvége.

A lábak czombrészekben vaskosak, végizeik a szárhoz képest karesúk; a két első pár szárán és másodvégizén semmi tüske; a harmadik lábpár szárán, felül, egy tüske; a negyedik lábpárén, alul, két pár hosszú tüske. A végtest hosszukás, kissé lapított.

A szemek aprók; az alsó sor oldalszemei valamennyi között a legnagyobbak, tojásdadok, kifelé dülők; az alsó- és hátsó középsők egymás között egyenlő távolságra állnak.

A zár egy terjedelmes, szélességénél hosszabb, a nyelecske felé kiszélelt, barna térese, melynek közepén egy fényes, mozsártörő alakú lemez fekszik; e lemez hátsó vége alatt, a légzőrés felé egy esatornás benyomás látható, melytől jobbra-balra egy egy bordaszerű dudorodás kanyarodik felfelé.

Mértékek: ♀ Törzs	5·7 $\frac{m}{m}$ ebből
fejmell	2·5 »
I lábpár	5 »

♂ Elöttem ismeretlen.

E faj egyetlen példányát mint juniusi alakot az Orsova melletti «Graczk» völgyből ismerem. Dr. Koch L. is újnak mondja.

SPEC. 15. FAJ. PROSTHESIMA ACCEPTA N. SP. FOGADOTT GY. ANGONOMMENE T.

(accepta = elfogadott; a megkülönböztetés merésztségére ezélok.)

(VII-dik tábla, a szemesoport, b ♀ zárja, c mérték)

♀ Elötteste olajbarna; lábai olajzöldek; valamennyi szár sötétedő; a végtest fekete, olajbarna lehelettel.

A fejmell szívalakú, oly hosszú, mint a negyedik lábpár térde és szára együttvége. A mellvert szív alakú, sötétolajbarna, szőrös. Az állkapesok világos olajzöldek, benyomottak; az alajk valamivel sötétebb, nyelv alakú, az állkapesok hosszának két harmadrészét éri. A tapogató világos-olajzöld, elálló-sertékekkel elegyes gyér szőrözettel; végíze alig rövidebb mint térde és szára együttvége.

A lábak, jelesen czombrészekben, erősek; az elsődvégizek világos olajsárgák, karesúk; az első pár szárán, alul semmi tüske, másodvégizén, alul, a tö közelében, egy tüskepár; a második lábpáron hasonlóképen; a két hátsó lábpár szárain és másodvégizein, alul és oldalt több tüske. A végtest aránylag kiesiny.

Az alsó szemsor módosan behajló, a két középsője kerek, oldalszemei szabálytalanok; a hátsó sor két középsője lapos, nagy, opalizáló, szabálytalan alakú, igen megközelített.

A zár igen feltűnő alkotású; egy igen széles, a has elejét majdnem teljesen elborító, vörössesárgás térese, mely egy finom, vörösbarna szegély által bekerítettik, s egy barna borda által két körded téresére osztatik; e borda a légzőrés felett ketté válva, egy harántfekvő, kisebb, körded téresét szegélyez.

Mértékek: ♂ Törzs	5·7 $\frac{m}{m}$ ebből
fejmell	2·8 »
I lábpár	6·8 »
II »	6 »
III »	4·2 »
IV »	8·8 »

Az egyetlen, igen csonka, de jellemző részeiben feltűnő példányt, Orsova mellett az Allion hegyen találtam. Juniushan ivarerett. Dr. Koch Lajos a faj újságát elismerte. Megjegyezem, hogy e faj a Pr. Allionica fajhoz, melynek csak himjét ismerem, nagyon közel áll: a különbség az első lábpár másodvégizen álló tüskékben fekszik.

SPEC. 16. FAJ. PROSTHESIMA NIGRITA. (FABR.). FEKETE GY. SCHWARZE T.

(niger = fekete; a színezetről.)

Syn. 1775. *Aranca nigrita* FABRICIUS «Syst. Ent.» p. 432.

Vide: THORELL «Remarks» p. 199.

♀ Előteste fekete; végteste fekete-fémfényű, szürkéssárga, rövid, egyszerű szőrökkel gyéren borítva; a két első lábpár vége sárga, a hátsó lábpároké vörösesbarna, a többi izület fekete.

Jellegei: A hátsó szemsor középsői oly nagyok mint az oldalszemek, valamivel közelebb egymáshoz, mint az alsó szemsor középsői szintén egymáshoz. A rágókon finom, hosszú serték. A negyedik lábpár egy első végizzel hosszabb az első párnál. A fej mell oly hosszú, mint a negyedik lábpár szára és térde együttvéve. A lábakon semmi talpkéfe.

Az alsó szemsor behajló, középszemei kerek, oldalszemei kördedek és nagyobbak; a középszemek egy közös dudoron elhelyezve, alig szemátmérőnyire egymástól, az oldalszemeket a középsőktől csak egy keskeny köz választja el; a hátsó szemsor egyenes, középszemei közelebb egymáshoz mint az oldalszemekhez, kördedek, egymásra dülök, oldalszemei kerek, dudorokon ülve ki- és hátrafelé tekintenek.

A zár egy szivalakú kis térese, a kimetszéssel a nyelecske felé fordítva — a két karajnak megfelelően két barázda nyomul be — a szerűen a légzőrés felől.

Mertekek, ♀ : Torzs	6	$\frac{m}{\mu m}$
fej mell	2	»
I lábpár	5.5	»
IV »	7	»

♂ Előttem ismeretlen. Dr. Koch L. ki Orsováról említi («Drassiden» p. 179—182) a tapogatót így írja le «a második iz görbült, végén vastagodott, felületén a felső fele egy hosszú, felálló tüske, a végén két rövidebb tüske; a harmadik és negyedik iz egyenlő hosszúságú, az utóbbi külső oldalán egy felfelé görbült nyújtvánnyal». A mellekelt rajz szerint e nyújtvány hegyes; a nemzőszerv egy sarlóalakú finom embolust mutat, melylyel szemközt s részben alatta futva, két nyulának, hegyes tartó fut.

Egyszer találta Frivaldszky Janos Pécs vidéken (Muz. gy.).

GEN. 10. NEM. GNAPHOSA. (LATR.).¹

(γνάπτω = marcangolni; a támadás hevességéről.)

Syn. 1804. LATREILLE «Nouv. Dict. d'Hist. Nat.» XXIX. p. 134. (ad part.).

Vide: THORELL «On Europ. Spid.» p. 149.

(1867. THYSA KEMPELEN «Verh. d. zool.-bot. Ges.» 1867. p. 607.)

A hátsó szemsor határozottan kihajló; a két sor oldalszemei mindig távolabb egymástól mint a két sor középsői szintén egymástól. A csipőköröm beesapóresesnek hátsó szele fogacsolt lemezzé kinyújtva (kivéve a *Gnaphosa nocturna* fajt, melynel egy vaskos foggá van alakítva). Az állkapcsok behorpasztottak. A has többnyire pikkelyekkel vagy ágas szőrökkel fedett. Két bordás köröm, semmi sánjaköröm; a talpkéfe mindig megvan.

Sötét helyeken, mint pincékben, körakásokban, moha alatt stb. élő, a világosságot kerülő alakok.

¹ Azelőtt a C. Koch által felállított Pythonissa, melyet THORELL id. L. a Latreille-féle régibb elnevezésre vezetett vissza.

SPEC. I. FAL. GNAPHOSA LUCIFUGA. (WALCK.). ÁLNOK MARÓPÓK. FALSCH REISSSPINNE.

(lucifuga = fénykerülő ; a tartózkodásról.)

Syn. 1802. *Aranca lucifuga* WALCKENAER «Fam. Pal.» 11. p. 222.

Vide : THORELL «Remarks» p. 187.

1867. *Thysa pythonissaeformis* KEMPELEN l. c. p. 607.¹

♀ A fejmell igen sötét-vörösbarna, fénylő. A végtest fekete, nem fénylő. A lábak feketék, ezombjaik, kisebb-nagyobb mértékben vörösbarnák vagy barnászörösek.

Jellegei: Az alsó szemsor szemei nem egyenlő nagyságúak, az oldalszemek nagyobbak. A fejmell széle karimás. A has pikkelyekkel és szőrrel elegyesen fedett. A harmadik lábpár szára felületen semmi tüske.

A fejmell igen vaskos; széles, elől elkerekített fejjel, a homlok szélén egynehány sertével, a hátrés előtt és mögött meglehetősen szőrözettel; a hátréstől a lábak felé több barázda vonul s egy sekély csatorna, oldalt, a fej elválasztását is jelöli; oldalról tekintve, a hátvonal igen laposan íves, a hátgödörön túl hirtelen lecsapott, a fej elején kerekdeden lekonyuló. A mellvért paizsalakú, széles, rótbarna, bozontosan szőrös. A rágók vaskosak, az első lábpár ezombjánál vastagabbak s ugyane lábpár első végizével valamivel hosszabbak, fővükkel a homlok előtt és térdszerűen kiállva, függőlegesek. Az állkapesok sötét vörösbarnák, résütösen-harántbenyomástuak, igen szélesek s közepök táján, kifele, sarokszerűen kiállók; végeikkel az alajk felett tetemesen összehajlók; az alajk nyelv alakú, közepe táján kissé hasas. A tapogató vaskos; ezombize barnászörös, a többi íze feketes; a végiz serteszerű szőrözettel és elegyesen néhány tüskével fegyverzett, oly hosszú, mint a térd és száríz együttvéve. A lábak vaskosak, végig durván-szörösek, erős fegyverzettel; a ezombok felülete 2 vagy több tüskével; a két első lábpár végize erős talpkéfével; az első lábpár szára, alul a vége fele, két tüskével, a másodvégize közepe táján, egy tüskével, vagy egy tüsképárral; a második pár hasonlóképen; a harmadik pár szára, alul, három pár, oldalt három tüskével, a negyedik pár hasonlóképen; a harmadik pár szára, alul, három pár, oldalt három tüskével, másodvégize alul szintén három párral, oldalt és felül meg néhány tüskével; a negyedik lábpár hasonlóképen.

A végtest elől lapos-ívesen elvágott s valamivel keskenyebb mint felehosszán tul; hátul elkerekített, kiálló fonókkal; a hason két egyenközű hosszbarázda. Az alsó fonópár henger alakú, hosszabb és vastagabb, a felső pár kissé csúcsosodó, vékonyabb. Az alsó szemsor igen esékély, mértékben behajló, két középső szeme fekete (nappali), oldalszemei gyantásárgák (esteli), a középsők bőven szemátmérőnyire és távolabb egymástól mint az oldalszemektől, az oldalszemek kissé kördedek s oly távolságra állanak a homlok szélétől, mely nagyobb átmérőjük kétszeresének bőven megfelel; a hátsó sor erősen kihajló, középszemei laposak, tojásdadok, opalizálók, oldalszemei gyantásárgák, kerekék, a sor az alsónál sokkal hosszabb, középszemei kevesebb mint félátmérőnyire egymástól és két átmérőnyire az oldalszemektől; az alsó és hátsó középsők közötti tér megfelel annak, a mely a hátsó középsők és hátsó oldalszemek között letezik.

A zár az állat állapotjához kepest kissé változó, de téreseje mindig tojásdad, neha kissé hasas; e térese közepeben, a nyelecske felől, egy sárgászörös, nyelv alakú nyujtvány látható, mely harántrovátkolt s oldalt két síma, kolbász alakú lemez által határoltatik.

Mertekek, ♀ : Törzs	18	$\frac{m}{m}$ ebből
fejmell	7.2	»
I lábpár	16	»
IV »	17.8	»

A lábak hosszaránya: 4, 1, 2, 3.

Kisebb példányok gyakoriak.

♂ Keveessel (neha sokkal) kisebb, karesűbb végtesttel. Színezete a nőstényével azonos. A tapogató módosan fejlett, nem éppen feltűnően vastagodott ivarszervvel; térd és száríze egyenlő hosszúságú; az utóbbi

¹ Lásd hátrább.

felülete végen és kisse kifele-oldalt egy vaskos, a pikkely tövéhez alkalmazkodó hajlású körömforma tövissel fegyverzett; a pikkely kanálalakú, kefeszerűen tömött és durva szőrökkel borított; nemzőszerve kevésbé kidagadó, vörösbarna, közepen nyílt és hartyás, sárgásfehér; belső oldalán egy kardforma hegyes nyújtvány indul, mely a pikkely ürebe belefekve, a pikkely csúsa alá ér.

Mertekek, ♂: Torzs	15.8 $\frac{m}{m}$ ebből
fej mell.	7 "
I lábpár	18 "
IV "	19 "

Noha igen kicsi; törzse csak 9 $\frac{m}{m}$.

Mint nyári alak nem ritka s leginkább a kórákosokat kedveli, hol a legalsóbb kövek alá barlangot ás és beleszövi nagy csövet, mely hófehér. Merész támadó, mely az erős bogarakat is könnyen legyőzi, a melyeknek maradványai azután igen bőven hevernek a tartózkodási hely közelében. Marása könnyen áthatol az emberi bőrön; hatása tompa, sajgó fájdalom s pl. a megmart ujjnak megmerevedéséből áll; az utóbbi tünet 24—36 órán át is eltart.

Ismerem, erdélyi részekből: Kolozsvárról, Mező-Zaláról, Parajdrol, Balánbányáról, Tölgyesről és Szebenből (Sill Victor gyűjteményében); magyar részekből: Moháciáról, Orsováról, S.-A.-Ujhelyről, Gyöngyösről, Pécs vidékéről (Muz. gy. különösen nagy példányok; gyűjtötték Frivaldszky és Pável).

SPEC. 2. FAJ. GNAPHIOSA LUGUBRIS. (C. K.). GYÁSZOS M. TRAUERND E R.

(lugubris = gyászos; a színről.)

Syn. 1839. *Pythonissa lugubris* C. Koch «Die Arachn.» VI. p. 60.

Vide: L. Koch «Die Ar. Fam. der Drass.» p. 8.

THORELL «Remarks» p. 190. (in § G. muscorum).

♀ Az előtest vörösbarnás. A végtest füstbarna. Lábai vörösesbe húzó füstbarnák.

Jellegek: Az alsó szemsor oldalszemei a középsőknel kévéssel nagyobbak (inkább csak tojásdad alakjuk következtében nagyobbak). A fej mell szélén finom párkány. A has pikkelyekkel borított.

A fej mell fejerése szelesedett; az egész fej mell vaskos, laposan domború, legszéle egy finom, éles, kisse karimásan felhajló párkánnyal, a hátrész közepén inkább behorpasztás mint hátrész látható. A mellvert majdnem kerek, barna, eléggé szőrös. A rágók, elülről tekintve, tövüknel szelesebbek mint végöknel, oldalról tekintve körtealakúak, tövükkel csak módosan kidomborodók, különben sötétvörösbarnák, és erős, serteszerű szőrözötűek. Az állkapcsok sötét-vörösbarnák, végökön világosodók, szelesek és az alajk körül összehajlók, külső görbületek magasíves úgy, hogy szélességök (együttvéve) kétszer akkora mint magaságuk; az alajk nyelv alakú, sötétvörösbarna, az állkapcsok hosszának közel $\frac{3}{4}$ részét éri el.

A tapogató vaskos, czombja terde és szára barnászöröses; végíze füstösödő, sertesen szőrös, közben, alul, 2—3 tüskével, alig rövidebb mint a terd és szár együttvéve. A lábak erősek, elég hosszúak, az első és második pár végízeim erős talpkefe; a hátsó párokon a talpkefe gyenge. Az első lábpár szárán, alul, a végen, egy kis tüske, másodvégizen, alul, egy pár tüske; a második pár másodvégíze töven egy pár tüske; czombja felületén két hosszú sertetüske. A harmadik lábpár szárán, felül, egy tüske, külső oldalán négy tüske, — belső oldalán négy tüske, alul három pár tüske, — terdize belső oldalán egy tüske; másodvégizen, alul és felül három-három pár tüske. A végtest kisse lapított, hosszúkás, elől kisse keskenyedő; hátul elkerekített.

Az alsó szemsor kisse behajló, a hátsó módosan kihajló; az alsó sor középsői valamivel távolabbra a homlok szélétől mint a hátsó középsőktől, szemátmérőnyire egymástól s valamivel közelebbre az oldalszemekhez; a hátsó sor középsői igen laposak, csúcsosan tojásdadok, csúcsos (hátsó) végökkel nagyon egy-

másfelé dülök, s alig saját, kisebb átmérőjük távolságára egymástól, — e sor oldalszeméi annyira a sor középsőitől, mint az alsó középsők a hátsó középsőktől.

A zár egy terjedelmes vörösbarna térese, a légzőrés fele álló ékalakú, domborodó betéttel, mely a nyeleleske irányában két vaskos ágra oszlik, — e két ág pedig egy kerek, tetemes dudort kerít be.

Mértekek, ♀ : Törzs	11	$\frac{m}{m}$ ebből
fejmell	5	»
I lábpár	11	»
II »	10·8	»
III »	10	»
IV »	13·7	»

♂ előttem ismeretlen.

E fajt egy példány után mint nyári alakot, a S.-A.-Ujhely melletti «Kopasz» hegyről ismerem, hol kő alatt tartózkodott.

SPEC. 3. FAJ. GNAPHOSA SOROR. N. SP. TESTVÉR M. VERWANDTE R.

(soror = nővér; a G. lugubrishez való rokonságról.)

(VII. tábla 169, a szemesoport, b ♀ zárja, c mérték.)

♀ Előteste sötét vörösbarna; lábai az előtestnél valamivel világosabbak; végteste barnás-szürkés, poros, nagyítás alatt apró, kasásan elhintett, barnás pontok tűnnek szembe. Nagy, erős alak.

A fejmell vaskos, szívalakú, fejlett fejrésszel, hosszabb mint a negyedik lábpár térde és szára együttvéve. A mellvért szélesen körded, sötétvörösbarna, szőrös. A rágók sötétvörösbarnák, vaskosak, az első lábpár másodvégizénél hosszabbak. Az állkapesok és az alajk sötétvörösbarnák, együttvéve majdnem körídmot alkotnak; az alajk az állkapesok hosszának három negyed részét eléri. A tapogató vörösbarna, csúcsa sötétbarna és tömötten szőrös; a szár és végiz felületén, a szőrözet között, 2–3 tüske rejlik; a végiz olyan hosszú, mint a térd és szár együttvéve. A lábak erősek, aránylag kurták; az első pár másodvégizén, alul, a közepetáján egy tüskepár; a szár fegyvertelen; a második lábpár szárán, alul, a végén egy tüske (vagy pár?), másodvégizén egy tüskepár; a két hátsó lábpár szárán és másodvégizén, alul, több tüske. A végtest hossz-körded, elég domború, síma; pikkelyei fűrészesek.

Az alsó szemsor könnyeden behajló, a hátsó kihajló, az alsó sor középsői a szélsőknél kisebbek s valamivel távolabbra állanak egymástól mint a szélsőktől; a hátsó sor középsői szabálytalan alakúak, egymásfelé dülök, s közelebb állanak egymáshoz, mint az alsó középsők szintén egymáshoz; a hátsó oldalszemek távolabbra esnek az alsó oldalszemektől, mint a hátsó középsőktől.

A zár sötét vörösbarna, fenyülő.

Mértekek: ♀ Törzs	14	$\frac{m}{m}$ ebből
fejmell	5·3	»
I lábpár	11	»
II »	10	»
III »	9·8	»
IV »	12·5	»

♂ Ismeretlen.

Az egyetlen példányt Pável János gyűjté Budapest vidékén; e példány a M. Nemzeti Múzeum gyűjteményében van letelve. — Dr. Koch L. e fajt elismere s rokonságot is megerősítő.

SPEC. 4. FAJ. GNAPHOSA FUMOSA ? (C. K.). FÜSTÖS M. RATCHIGE R.

(fumosa = füstös; a színről.)

Syn. 1843. *Pythonissa fumosa* C. Koch «Die Arachniden» X, p. 118.

Vide: THORELL «Remarks» p. 192.

♀ Előteste vörösesbarna, olajbarnás szőrözettel; a végtest olajbarna. Lábai világosabb olajbarnák, oldalukon végig kormosodók.

Jellegek: A középszemek hátrafelé kissé szelesedő négyszögben; az alsó sor oldalszemei a középsőknel nagyobbak. A fejmell párkányszerű, keskeny szegelylyel (margine tenui Thorell, Randkante L. K.). Az első lábpárok szárain, alul, egy-egy tüske.

A fejmell szivalakú, fejerésze keskenyedő; oldalról tekintve hátvonalú egyenes, vízszintes, hátul a nyelecskére lehajló. A mellvért körded, vörösbarnás, kevés szőrözettel. A rágók barnásvörösek, vaskosak, az első lábpár elsődvégizénél alig hosszabbak, kevés serteszőrökkel; oldalról tekintve körtvealakúak, tövükkel erősen kidomborodók. Az állkapcsok világos barnásvörösek, végeik felé kissé világosodók, haránt behorpasztottak; az alajk majdnem körded egy állkapocs felénél nem keskenyebb s az állkapocs hosszának két harmadát bőven eléri, az állkapcsok által () szerűen körülfogott.

A tapogató olajbarnás, végíze alig valamit füstösödő, módosan szőrös, kevésel rövidebb mint a térd és szár együttvéve. A lábak elég hosszúk és erősek, végeik karesűk; az első és második pár szárán, alul, a vége belső oldalán egy-egy vékony tüske; a másodvégiz hossza közepének belső oldalán szintén egy tüske; a harmadik lábpár térdé belső oldalán egy tüske, szárán, felül, egy tüske, mindenik oldalán két-két tüske, alul három pár tüske. A végtest kissé lapított, elől kissé keskenyedő, hátul elkerekített; ingödrei jól kivehetők. Az alsó szemsor könnyedén behajló, középsői körülbelül három átmérőnyire a homlok szélétől, és egy átmérőnyire egymástól, az oldalszemektől pedig alig felátmérőnyire; az oldalszemek tojásdadok, a középsőknel nagyobbak; a hátsó sor erősen kihajló; a hátsó szemek meglehetősen egyenlő nagyságúak, a középsők laposak, közelebb egymáshoz mint az oldalszemekhez. A hátsó és alsó középsők által alkotott négyszeg hátul tágult ugyan, de a hátsó középsők közötti köz kisebb az alsók közötti köznél, ellenben a hátsó középsők nagyobbak az alsó középsőknel.

A zár egy () szerű keret által kettfelöl kerített vörösbarna térese, melyben a nyelecske felől egy barnássárga, nyelv alakú, kicsiny betét (nem hosszlemez) látható; a keretnek a legzörés felé álló végei dudorokká alakultak, fénylők.

Méretek:	♀	Törzs	7	$\frac{m}{m}$	ebből
		fejmell	3	"	
		I lábpár	6	"	
	II	"	5.5	"	
	III	"	5.2	"	
	IV	"	6	"	

♂ Elöttem ismeretlen.

Ez érdekes fajt, melynek azonossága a C. Koch-féle «fumosa» alakkal még kétséges, melyet azonban példányom szerint úgy Dr. Thorell mint L. Koch is fenntartással «fumosa»-nak mondtak, mint kora nyári alak a S.-A.-Ujhely melletti «Kopasz» hegy kövei alatt fordul elő. Lábfegyverzete azonos a G. lapponum L. Koch fájával, melytől azonban már a szemállás által is különbözik.

SPEC. 5. FAJ. GNAPHOSA DOLOSA. N. SP. CSALÉKONY M. TRÜGERISCHE R.

(dolos = csalfa, csalékony; ugy az életmódra mint az alakrokonságra is czéloz.)

(VII-dik tábla, 167, a szemesoport, b ♀ zárja, c ♂ tapogatója oldalról, d ugyanannak nemzőszerve alólól, e mérték.)

♀ Előteste sötétebb-, lábai világosabb szemnyes-barnássárgák; végteste olajbarna; a fougók világosabb barnás-sárgák. A fejmell a szemek táján sötétedő.

A fej mell laposan domború, szélesen szívalakú, oly hosszú mint a negyedik lábpár térde és szára együttvéve; felületén gyéren elszórt fekete szőrökkel. A mellvért körded, vörösbarna, szőrös. A rágók erősek, vörösbarnák, hosszú, erős, előre álló, sötét sertékkal gazdagon rakottak. Az állkapcsok vörösbarnák, benyomottak, harapófogó formán összehajlók, világos vörösbarnák, legvégükön kissé világosodók; az alajk sötétebb, tojásdad, széles, az állkapcsok hosszának háromnegyed részét bőven eléri. A tapogató vaskos, durva; czombrésze felületén néhány felálló, görbült, fekete tüskével, egyébként sertés-szőrös. A lábak elég hosszúk és erősek, gyéren és elálló szőrökkel ellátottak; az első pár szárán semmi tüske, másodvégizen, alul, a belső oldalon egy tüske; a második lábpár szárán, alul néha semmi tüske, néha két tüske egymás mögött; másodvégizen néha egy tüske, néha egy tükepar; a két hátsó lábpár szárán és másodvégizen, alul és oldalt is több hosszú tüske. A két első pár elsődvégizen egy erős talpkefe, mely a másodvégizre is átmegy. A végtest kissé lapított, szélesedő, alul-felül gyéren szőrös.

Az alsó szemsor módosan behajló, a hátsó tetemesen kihajló; az alsó sor középsői kisebbek és távolabbra állanak egymástól mint az oldalszemektől; a hátsó sor középsői mandulaalakúak, esüesos végökkel egymásra dülök, sokkal közelebbre esnek egymáshoz mint az alsó középsők szintén egymáshoz; a hátsó sor oldalszemei két átmérőnyire esnek e sor középsőitől.

A zár aránylag kicsiny, bajosan leírható. (Lásd rajz.)

Mértékek, ♀ : Törzs	10	$\frac{m}{m}$ ebből
fej mell	4.8	»
I lábpár	12	»
II »	11.3	»
III »	9.6	»
IV »	15.5	»

♂ Alig kisebb, egészben véve sötétebb; fej melle vörösbarna. A tapogató módosan bunkós; térde alig hosszabb a szárnál, a szár külső oldalának végén egy erős, kurta, kissé görbült, sötét köröm; a czomb felületén két felálló sertés tüske; a pikkely kanálalakú, szőrözete durva; nemzőszerve, alulról tekintve, egy sárgás gyűjtőt mutat, a mely, a pikkely esüesa alatt, egy kis dudort visel, a belső oldalon egy vörösbarna lemez fekszik, mely a pikkely esüesa alatt egy könnyedén hajlott, hegyes nyújtványban végződik.

Mértékek, ♂ : Törzs	10	$\frac{m}{m}$ ebből
fej mell	5.2	»

E faj, nagyságra nézve, igen változékony, törzshossza 6—10 $\frac{m}{m}$ között ingadozik; de a jellemző jegyek, jelesen az ivarszervek, mindig azonosok maradnak.

E fajt mint juniusi alakot Orsova körül leginkább lehullott levelek alatt és kövek között gyűjtöttem. Dr. Koch Lajos elismerte s kiemeli a *G. lucifugával* való közeli rokonságát is.

SPEC. G. FAJ. GNAPHOSA LEPORINA. (L. K.). CSINOS MARÓPÓK. HUBSCHE R.

(leporina = nyulszerű; a színről.)

Syn. *Phytonissa leporina* L. Koch «Die Drassiden» p. 27.

Vide : THORELL «Remarks» p. 193.

♀ Előteste sárgabarna, hálószerű fekete rajzzal, a fej beigtatása helyén két előre felé szétágazó fekete folttal és fekete szegélyvonallal; végteste szürkésbarna pikkelyszőrökkel borítva, ezek között elálló fekete sertékkal; lábai sárgabarnák, a fej mellnél világosabbak, gyéren szőrösök, az első két pár végizen talpkefével.

Jellegei: A végtest pikkelyszőrökkel borítva; az alsó szemsor oldalszemei nagyobbak; a negyedik lábpár másodvégizével hosszabb az elsőnél, a második és harmadik lábpár egyenlő hosszúságú; a két első lábpár szárán, alul, egy tüske.

A fejmell hosszabb mint a negyedik lábpár térd és száríze együttvéve. A mellvért tojásdad, hátul csücsös, szőrökkel és hosszabb sertékekkel borítva, sötét sárgabarna. A rágók feketebarnak, oly hosszuk mint az első lábpár végize, oly vastagok mint a láb czombja, tövükkel térdszerűen kiállók, sok erős sertével borítottak. Az állkapcsok sötét-vörösbarnak, elől sárgásfeheren szegélyezve, az alajkra hajlók, kívül elkerekítve, középen melyen behorpasztva; az alajk 1/3-dal rövidebb, elől igen keskeny, elkerekített. A végtest elől elmetszett, hátul elkerekített, felehosszában legszelesebb.

Az alsó szemsor behajló, a középszemek kerek, s szemátmerőnyire egymástól, az oldalszemek tojásdadok s a középsőktől csak egy keskeny köz által elválasztva. A hátsó szemsor kihajló, középszemei tojásdadok, közelebb egymáshoz mint az alsók szinten egymáshoz, ezektől oly távolságra mint az oldalszemektől.

A zár egy szabályos, tojásdad terese, hegyesebb végével a légzőrésnek állva, középen egy mély bevágású, szívalakú melyedes, e bevágásnak megfelelő, cserépszindely módra egymásra borított, két nyelv-alakú lemezzel.

Mertekek.	4	: Fejmell	4	$\frac{m}{mm}$
		I lábpár	7.5	"
		IV "	10	"

♂ Ismeretlen.

E pókot Dr. Seidlitz fedezte föl Erdélyben (alkalmasint N.-Szeben vidéken), Dr. Koch i. h. leirta. Peldányokat nem láttam.

SPEC. 7. FAM. GNAPHOSA BICOLOR. (HAHN). KÉTSZINŰ M. ZWEIFARBIGE R.

(bicolor = kétszínű; a lábak elütő színéről.)

Syn. 1831. *Drassus bicolor* HAHN «Die Arachn.» I, p. 123.

Vide: THORELL «Remarks» p. 191.

♀ Előteste barnasvörös. Végteste olajbarna. Lábai elenken sárgászöröses czombokkal és vörösbarna vegekkel.

Jellegei: Az alsó szemsor oldalszemei a középsőknél nagyobbak; a fejmell széle karimás. A has pikkelyekkel fedett. Az első és második lábpár mind két végizén a talpkefe megvan, ugyane párok szárán, alul, csak egy egy tüske (?). A második lábpár másodizével hosszabb az elsőnél.

A fejmell barnászörös, a hátrés táján kissé sötétedő; fejeresze tompán elkerekített; az egész gyéren szőrös, fénylő; a hátrés előtt egy sekély behorpasztás látható s a réstől a lábak felé minden oldalon két két sekély barázda látható; a szélek karimája keskeny, durva. A mellvért majdnem kerek, barnás vörös, bőven szőrös, fénylő. A rágók vörösbarnak, rövidek és vaskosak, az első lábpár czombjánál nem vékonyabbak s valamivel rövidebbek, mint ugyane lábpár első végize, tövükkel kis mértékben kiállók és bőven szőrösek. Az állkapcsok sárgászörösek, haránt benyomásúak és felholdszerűen egymás felé hajlók; az alajk vörösbarna, szeles, hasas, elől elvágott. A tapogató sárgászörös, végize kissé barnuló, bőven szőrös és valamivel hosszabb mint a térd és szár együttvéve. A lábak kétszínűek; a czombok és részben a térdek is elenken sárgászörösek, a többi iz — különösen a két első páre — vörösbarna; a két első lábpár szárán, alul 1 vagy 2 tüske, * ugyane párok másodvégizein egy-egy túskepar s a talpkefe az elsőkről ezekre is átmegyen; a két hátsó lábpár szárán, alul 3-3 pár tüske, a másodvégizen több tüske; az I, II és IV pár czombján, felül három három — a III-dik paren több tüske.

A végtest olajbarna, hosszkörded; a fonók alola kevesse kiallok, rovidek, világosabb-olajbarnások.

* Peldányomon a két első pár ballábam a száruk alján 2-2, a jobb lábakon egy-egy tüske; Dr. Koch L. «Die Ar. Fam. der Drassiden» és Thorell tanár csak egy-egyet mondanak.

Az alsó szemsor alig behajló, középsői kisebbek, feketék (nappaliak) az oldalszemek nagyobbak tojásdadok, opalizálók (éjjeliek), a szemek egyenlő távolságra egymástól, mely kisebb egy középszem átmérőjénél; a sor bőven egy oldalszem átmérőnyire a homlok széletől; a hátsó sor módosan kihajló, szemei opalizálók (éjjeliek), középsői szabálytalan körídomuak s nem állanak távolabbra egymástól mint az alsó középsők szintén egymástól; az oldalszemek a középsőktől bőven kétszer oly távolra esnek mint az utóbbiak egymástól.

A zár szövевényes; terjedelmes sárgás téreseje köröskörül csatornás, fénylő s keretet kepezi egy nyelvalakú középső csatornának, melynek szélei barnások; belseje harántrovátkos; vége a legzörést megközelíti.

Mertekek: ♀	Törzs	7.9 $\frac{m}{m}$ ebből
	fejmell	3.5 "
	I lábpár	7.5 "
	IV "	9.5 "

A lábak hosszaránya: 4, 1, 2, 4.

♂ Elöttem ismeretlen.

Egyetlen példányát nyár derekán Alsó-Hámorban (Borsod) találtam egy kö alatt, hol lencse alakú, 7 $\frac{m}{m}$ átmérőjű peteburkát őrzé; a peteburok fehér s oly finom szövetű, hogy a petek láthatók.

SPEC. 8. FAL. GNAPHOSA SUSPECTA. N. SP. GYANUS M. VERDÄCHTIGE R.

(suspecta = gyanuba fogott; alakrokonságra czéloz.)

(VII-dik tábla, 168, a szemállás, b ♀ zárja, c mérték.)

♀ A fejmell vörösesbarna, szürkés szőrözettel; a lábak sárgásbarnák, vöröses lehelettel; a végtest olajbarna, poros kinezésű. A fejmell szivalakú, kissé szélesedett fejrésszel s valamivel hosszabb mint a negyedik lábpár szára és terde együttveve. A mellvert körded, szőrös, sárgásbarna. A rágók arányosak, tövükkel térszerűen kiállók, vörösbarnák, keves serteszerű, elálló szőrözettel. Az állkapcsok sárgásbarnák, A tapogató vaskos, csücsa sötétedő, szára és végize kissé vastagodott; végize valamivel rövidebb mint térde és szára együttveve. A lábak erősek; az első pár másodvégizen, alul, a közepe felett, egy hosszú tüskepár, e pár szára fegyvertelen; a második pár szárán, alul a legvégén egy — másodvégizen, alul, szintén egy tüskepár; a harmadik és negyedik páron a száron és végizen, alul és oldalt több hosszú tüske. A végtest szélesen körded, kissé lenyomott.

Az alsó szemsor majdnem egyenes, középsői a szelsőknel kisebbek, valamennyi szem kerek; a hátsó sor kihajló, két középsője tojásdad, csücsával egymásfelé dülő s közelebb egymáshoz, mint az alsó középsők szintén egymáshoz.

A zár egy szélességénél hosszabb térese, mely a nyelecske felé módosan kivágott, e téresében egy melyen szivalakra kivágott nyílás fekszik, a kivágást képező beteten egy kis dudor látható.

Mertekek, ♀:	Törzs	7.5 $\frac{m}{m}$ ebből
	fejmell	3.4 "
	I lábpár	7 "
	II "	6.7 "
	III "	6 "
	IV "	9.8 "

♂ Elöttem ismeretlen.

E fajt Orsova mellett és S.-A.-Ujhelyen kövek alatt gyűjtöttem, hol június havában már selymes, fehér peteburkát őrzé. Eredetileg a Cl. Koch-féle Gnaph. fumosa fajjal azonosnak tartottam. Dr. Koch Lajos azonban az imént említett faj iránt meg nem jött tisztába s a mienket, a melyet itt leírtam, ujnak veli.

SPEC. 9. FAJ. GNAPHOSA MOLESTA. N. SP. BAJOS M. SCHWIERIGE R.

(molesta = terhes, kellemetlen; a megkülönböztetés nehézsége öli.)

(VII. tábla, 170, *a* szemállás, *b* ♀ zárja, *c* mérték.)

♂ Előteste szennyes-vörösesbarna; lábai ezombreszőkben vöröses barnasárgák-világosak, a többi iz sötét vörösbarna; végteste olajzöld.

A fejmell vastos, szívalakú, keves szőrrel fedett; széle meglehetősen széles, feketés, karimás párkánnyal. A mellvért szélesen körded, világos-vörösbarna, gyéren szőrös. A rágók sötétvörösbarnák, erősek, nem hosszuk, tövükkel térdszerűen kiállók, sok erős, felálló sertével rakottak. Az állkapesok világos-vörösbarnák, végeik kissé világosodók, az alajkkal együtt körformát alakítanak; az alajk nyelvalaku, tövén keskenyebb mint a közepén, az állkapesoknál sötétebb s ezek hosszának két harmadrészét bőven túleri. A lábak arányosak, elég erősek; az első és második pár szárán, alul, a legvégének belső oldalán egy tüske; másodvégizen, alul, a középtájon egy tüskepár. A harmadik és negyedik lábpár szárán és másodvégizen, alul és oldalt több hosszú tüske. A végtest módosan szőrös, hosszukás, kissé lenyomott.

Az alsó szemsor behajló, a hátsó kihajló; az alsó sor oldalszemei a középsőknél sokkal nagyobbak s a középsőkhöz sokkal közelebbre, mint a középsők egymáshoz; a hátsó sor középsői tojásdadok, egymásfele dülők, hosszabbik átmérőjük nem nagyobb ugyan a sor oldalszemeinek az átmérőjénél; a hátsó sor oldalszemei bőven másfel átmérőnyire a középsőktől, a középsők közelebb egymáshoz mint az alsó középsők szintén egymáshoz.

A zár egy szívalaku, melyen kivágott vajás, a kivágásnak megfelelő rész nyelvalakú, lemezszerű, világos, --- csücsán kissé barnult, alatta, a kivágásban két buzaszemalaku, hosszbenyomású dudor látható.

Mértékek. ♀ : Törzs	9	$\frac{m}{m}$ ebből
fejmell	4	»
I lábpár	8.5	»
II »	7.5	»
III »	7	»
IV »	11	»

♂ Ismeretlen. (Neha kisebb, törzs: 7.5 $\frac{m}{m}$.)

E faj a *G. suspecta* H. O. fajhoz igen közel áll s ettől leginkább nemzőszerve által különbözik. Mint májusi alakot csupán csak két példányát gyűjtöttem Orsova körül, kövek alatt. Dr. Koch Lajos a faj újjoltát megerősíté.

SPEC. 10. FAJ. GNAPHOSA OPACA. N. SP. KOMOR M. MATTE R.

(opaca = árnyékolt, fénytelen; a színezetről.)

(VII. tábla, 171, *a* szemállás, *b* ♂ tapogatója oldalról, *c* ugyanannak nemzőszerve alulról, *d* mérték.)

♂ Előteste sötét, szennyes-sárgásbarna; lábai olajzöldek; végteste olajbarna. Kis alak.

Fejmelle szívalaku, módosan szőrös, finom, keskeny, szélein kissé ripacsos, karimaszerű, varránynyal. A mellvért barnás-olajzöld, kevés szőrrel. A rágók eléggé vastosak, olajbarnások, körmük kissé vöröslő, tövük térdszerűen kiálló, igen kevés sertével ellátott. Az állkapesok az alajkhoz képest igen szélesek, evvel együtt majdnem köridomuak, tetemesen haránt benyomottak, olajzöldek, világosak. Az alajk nyelvalaku, aránylag keskeny, az állkapesok hosszának kétharmadrészét bőven eléri. A lábak elég erősek, hosszuk, végzeik karesuk, szőrzetük feltűnően durva; az első pár szárán, alul a végén egy pár, a közepén ismét egy pár tüske, — másodvégizen, alul, egy tüskepár; a második lábpáron hasonlóképen; a két

hátsó lábpár szárán és másodvégizén, alul és oldalt több tüske, melyek különösen a negyedik pár másodvégize végén pereszlen formára rendezettek. A végtest kicsiny, csúcsosan tojásdad.

A szemek közül a hátsó sor középsői nem tojásdadok, de laposak és megközelítettek s az alsó sor középsőivel majdnem derék négyszögben állanak, mely szélességénél csak kevéssel magasabb. A hátsó sor erősen kihajló, az alsó egyenes, oldalszemei nagyobbak.

A tapogató elég erős és bunkós: térde vastagságánál valamivel hosszabb, szára a térdnél rövidebb, külső oldalának a végén egy vaskos, farkasfülforma nyujtványban végződő; pikkelye kanálalakú, eléggé szőrös; nemzőszerve, alülről tekintve egy egyszerű, terjedelmes, világos gyűjtőt mutat, mely belső szélén, a pikkely szélén kissé túlterjed s a pikkely csücsa alatt, külfelől egy világosszínű, ujforma nyujtványt visel, belfelől egy karesu, vörösesbarna serteszerű tüskét bocsát, mely a pikkely belső szelehez alkalmazkodva, annak csücsát eléri.

Mértekek, ♂: Törzs	5	$\frac{m}{m}$ ebből
fejmell	2	"
I lábpár	5.5	"
II "	5	"
III "	4.2	"
IV "	6.2	"

♂ Elöttem ismeretlen.

Egyetlen példányát e fajnak mint juniusi alakot S.-A.-Ujhelyen, a «Kopaszhegy» kövei alól szedtem ki. A faj ujvoltát Dr. Thorell és Dr. Koch Lajos elismerték.

SPEC. II. FAJ, GNAPHOSA FALLAX, N. SP. FURA M. VERSCHLAGENE R.

(fallax = csaló, furfangos; az életmódra ezélez.)

(VIII. tábla, 173, *a* szemállás, *b* ♀ zúnya, *c* mérték.)

♀ Elötteste szennyes-vörösesbe húzó olajbarnás, lábai világosabbak; végteste olajbarna, poros kinézésű szőrözettel.

Fejmelle szívalakú, elég vaskos fejfel, kevés, porszürkés szőrözettel. A mellvért szélesen körded, barna, gyéren, kurtán szőrös. A rágók vaskosak, barnavörösesek, csipőkörmük vöröslő, tövük térdszerűen kiálló, szőrözetük gyér, serteszerű, nem feltűnő. Az állkapcsok sárgásbarnák, egymásfele hajlók, szélesek; az alajk sötétebb, nyelvvalaku, széles, az állkapcsok hosszának ket harmadrészet eléri. A tapogató czombja olajsárgás, vége kissé vöröslő; végize eléggé szőrös, oly hosszú, mint a térd és szár együttvéve. A lábak meglehetősen vaskosak, durvan szőrösek; az első pár szárán, alul, a legvégén egy gyenge tüske; másodvégizén, alul a közepén egy tüskepár. A második lábpár szárán, alul, a legvégén egy tüskepár; másodvégizén alul, a közepe táján szintén egy tüskepár. A harmadik és negyedik pár szárán és másodvégizén, alul és oldalt több tüske. A végtest hosszúkas, kissé lapított.

Az alsó szemsor behajló, oldalszemei a középsőknél sokkal nagyobbak; a hátsó szemsor erősen kihajló, középsői tojásdadok, kicsinyek, egymásfelé dülők, igen közel egymáshoz; az alsó és hátsó középsők közötti távolság sokkal kisebb annál, a mely a két sor oldalszemei között létezik.

A zár felső fele egy szívalakú kivágás, melynek kivágását voltaképen egy vöröslő kis dudor képezi; alsó felét két, a vége felé sötétlő, elkerekített lapos lemez fogja körül; e lemezek nem érnek össze.

Mértekek, ♀: Törzs	5.6	$\frac{m}{m}$ ebből
fejmell	2.5	"
I lábpár	5	"
II "	4.5	"

III lábpar	4.2 $\frac{mm}{m}$
IV "	6.5 "

♂ Elöttem ismeretlen.

E fajnak csupán két példányát ismerem; az egyik Orsován került május végén, a másik S.-A.-Ujhelyen (a «Kopaszon») júniusban. Mind a két helyiségen kövek alatt találtam. Dr. Koch L. e fajt újnak ismerte el.

SPEC. 12. FAJ. GNAPHOSA EXORNATA. (C. K.). DÍSZES M. SCHÖNE R.

(exornare = feldíszíteni; a bronzszínű és a fonók melletti fekete diszre vonatkozik.)

Syn. 1839. *Pythonissa exornata* C. Koch «Die Arachnid.» VI. p. 63.

Vide: THORELL «Remarks» p. 502.

♀ Porszürke; vörösbarnásan áttetsző előtesttel és lábakkal. A fonók felett — a végtest végének két oldalán — két-két fekete pont.

Jellegei: Az első két lábpar másodvégizein két-két tüske. A két szemsor majdnem egyenes, valamennyi oldalszem nagyobb valamennyi középsőnél; a hátsó szemsor oldalszemei nem távolabb a középsők-től mint ezek egymástól.

Karcsú, kissé hosszúlábú alak. A fejmell szívalakú, kissé csücsösödő, porszürke pikkelyek- és szőrökkel borított, ezek alatt vörösbarna. A mellvért szívalaku vörösbarnás, bőven, szürkésen szőrös. A rágók vaskosak, vörösbarnások, bőven sertések, az első lábpar első végizénél rövidebbek, czombjánál nem vastagabbak. Az állkapcsok sárgászörösek, világosodó szélekkel, alig behorpasztottak s módosan egymásra hajlók; az alajk sötétebb, széles, hasas, elől elkerekített. A tapogató sárgászörös, elálló feketés sertékekkel elegyesen szőrös, végize oly hosszú mint a térd és szár együttvéve. A lábak vörösbarnások, karcsúk, eléggé szőrösök, a czombok felületén két-két sertetüske, a harmadik páren több; az első két szár másodvégizén, alul két két tüske; az első lábpar szárán, alul egy tüske, a másodikon három-három hosszú sertetüske; a két hátsó lábpar szárai és másodvégizei köröskörül több tüskével. A végtest, elől, ívesen elvágott, különben hossztojásdad, módosan kiálló fonókkal; porszürke, pikkelyekkel és szőrökkel elegyesen borított. A fonók közvetlen közelében két oldalt négy bársonyfekete, apró, hosszukás foltocskák áll.

Valamennyi szem sötetes színű. Az alsó sor igen könnyedén behajló, középsői valamivel kisebbek, szemátmérőnyire egymástól, az oldalszemekhez még közelebb állva; a hátsó szemsor könnyedén kihajló, oldalszemei valamivel nagyobbak, valamennyi szem egyenlő távolságra egymástól, mely alig egy közep-szemátmérőnyi; a hátsó és alsó középsők közötti távolság háromszorosánál is több mint az, a mely a hátsó középsőket, a hátsó oldalszemektől elválasztja.

A zár egy barnás-vörös, kerek térese, egy ásó alakú betettel, melynek kerülete csatornás.

Mertekek. ♀ : Törzs	6.5 $\frac{mm}{m}$ ebből
fejmell	2.8 "
I lábpar	8.5 "
IV "	9.2 "

A lábak hosszaránya: 4, 1, 2, 3.

♂ Kicsiny, karcsú, hosszúlábú, kisse lelapított előtesttel. Színezete talál a nőstényével. A tapogató tetemesen bunkósodott; száríze a terdiznél rövidebb, vastagodott, felső széléből egy vörösbarna, fénylő, széles és lapos nyújtványt boesát, mely a pikkelytő domborúságához falkalmazkodva, oldalt — kifele irányul, a végén elkerekített, alsó oldalán egy felhajló kis csücsbe kifutó; a nemzőszerv jól kidagadó, sárgás gyűjtőből áll, melynek külső oldalán egy kígyózó, barnás csik látható, felső végén pedig egy sötét-vörösbarna, rövid, kisse csavart és görbe, hegyes köröm látható.

Mértékek, ♂: Törzs	5	$\frac{m}{m}$ ebből
fejmell	2.2	»
I lábpár	9	»
IV »	9	»

Faunánk jellegére nézve a legkiválóbb alakok közé tartozik, a mennyiben t. i. eddig csak a Saháról, Görögországból és a legújabb időben Del-Tirolból (Merán) lett ismeretes.

Ismerem Orsováról és Bázisáról; mindkét helyen mint nyári alak leginkább verőfényes helyeken, lehullott levelek és növénysszárak között tartózkodik. Rendkívül gyors alak, mely bájosan fogható, mert színe és gyorsasága egyaránt előnyére szolgálnak a gyors eltűnésnek.

SPEC. 13. FAL. GNAPHOSA MONTANA. (L. K.). HEGYI MARÓPÓK. BERG R.

(montana = hegyi; a tartózkodásról.)

Syn. 1866. *Pythonissa montana* L. KOCH «Die Arachn. Fam. d. Drassiden»

Vide: THORELL «Remarks» p. 188, 190.

♀ Előteste sötét vörösbarna, fekete szegélyvonallal; a szemek táján feketebarna, a fejrész közepén egy, a heigtatás táján két fekete folt, végteste fekete alapon sárgabarna pikkelyszőrökkel fedett; a lábak sötét vörösbarnák, a czombokon világosabb folttal.

Jellegei: Az alsó szemsor szemei egyenlők; a fejmell párkányos szélekkel; az előláb párok szárain, alul, egy tüske pár; a harmadik lábpár szára tüskés. Hat fonó; az alsó pár a leghosszabb. A két előláb párvégzein talpkefe.

Mértékek: ♀ Fejmell	6	$\frac{m}{m}$
I lábpár	12.5	»
IV »	14.5	»

♂ Ismeretlen.

E pókot Dr. Koch L. i. h. a bajor havasokból s a frank Jürából ismertette. Dr. Zimmermann (Limburg) a magyar Tátrából kapta s Dr. Koch által meghatározhatta. Peldányt nem láttam.

SPEC. 14. FAL. GNAPHOSA NOCTURNA. (LIN.). ÉJJELI M. NACHT R.

(nocturna = éjjeli, éjjeljáró; az életmódról.)

Syn. 1758. *Aranca nocturna* LINNÉ «Syst. Nat.» Ed. X, p. 621.

Vide: THORELL «Remarks» p. 199 et 567.

♀ Fekete. Előteste aranysárgás, selymesen fénylő, ágas pikkelyekkel borított. Végteste felületének elején egy aranysárgás félhold, közepe táján és a test vége felé egy egy pár aranysárgás folt¹; a has aranysárgás, feketével elegyes. Lábai vörösbarnák, néha világosabb csipőkkel és vegekkel. Kis alak, melyet az adott jellegek is már eléggé ismertetnek.

A fejmell csucsos-an-szívalakú, pikkelyfedezete között gyeren álló fekete szőrökkel. A mellvért szív-alakú, vörös-barna, néha világosodó, szőrös. A rágók rövidek, világos vörösbarnák, az első lábpár czombjára

¹ LINNÉ az *Aranca nocturna*-ról azt mondja: «abdomine nigro punctis duobus albis basi lunula alba» a mi ellentétben van a fennemlített „négy” ponttal. MENGE (Preussische Spinnen p. 314 és 317, Pl. 56, táb. 181 és 182) kimutatja, hogy a *Gnaphosa nocturna* LINNÉ nem csak a két pont hanem egyebek által is különbözik a négy pontos alaktól, mely szerinte azonos a *Pythonissa maculata* C. KOCH (Die Arachniden VI, p. 61 fig. 474, 475) alakjával. Megjegyezem tehát hogy az általam tárgyalt négy pontos alakot THORELL auctoritására támaszkodva nevezem *Gnaph. nocturna* LINNÉ, annyiival is inkább, mert példányom THORELL tanár revisiójában részesült s a MENGE munkálata akkor már ki volt adva; a vitás kérdés eldöntése nem tartozik reám.

nál sokkal vékonyabbak és ugyan a lábpár első végizenel rövidebbek. Az állkapcsok barnasvörösek elmosódva-világosabb végekkel, a nyelv alakú, hasasan-széles alajk felett egészen összehajlók. A tapogatók vörösbarnák, czombjuk kissé világosodó, minden ízén gyéren álló, hosszú szőrözettel; a végiz vékonyodó, csúcsos, valamivel rövidebb mint a terd és a szár együttveve. A lábak czomb és szárreszőkben erősek, végig hosszú szőrökkel ellátottak, erős fegyverzetűek; az első lábpár szára, alul, három pár tüskével, másodvégize negy tüskével; a második pár hasonlóképen. A vegtest rendszeren kissé lelapított, majdnem párhuzamos oldalakkal (terhes állapotban hengerded), a fennt jelzett rajzzal; a fonók hengerdedek, feketések, a felső pár nem hosszabb az alsónál; de, domborodáson állva, az alsó felett kiáll.

Mind a két szemsor majdnem egyenes s a homlok szeletől oly távolságra, mely a két szemsor magasságánál alig csekélyebb; az alsó sor alig észrevehetőleg behajló, középszemei kisebbek, valamennyi szeme egyenlő távolságra, mely egy kisebb szem átmerőnél csekélyebb; a hátsó sor majdnem egyenes, középszemei valamivel távolabbra egymástól mint az oldalszemektől; a két sor középsői közötti távolság alig csekélyebb annál a mely a két sor oldalszemei között letezik.

A zár egy vörösbarna, majdnem kerek térese, közepén egy kerek kivájással, mely oldalról két sötétebb () szerű lemez közze foglaltatik.

Mértékek: ♀	Törzs	7	$\frac{m}{m}$ ebből
	Fejmell	2.5	»
	I lábpár	5	»
	IV	6.8	»

♂ Kisebb karcsúbb. Színezete a nőstényével megegyezik. Tapogatója vaskos, elege bunkós; czombrésze semmi nyujtványnyal vagy foggal, terd és szárize igen rövidek, az utóbbi hosszú, elálló sertekkel; pikkelye kanálalakú, sötétbarna, sárgás szőrözettel; nemzőszerve egy módosan kidagadó, előre nyitott gyűjtő, oldalról tekintve a pikkely csúcsa alatt egy le és kissé hátrafelé irányozott rövid és gyenge, ujjalakú nyujtvány látható.

Mertekek: ♂	Törzs	5	$\frac{m}{m}$ ebből
	fej mell	1.8	»
	(Peldányom lábai csontkak.)		

Rendkívül gyors és nehezen fogható nyári alak, mely különösen a verőfényen heverő fatonkok kerge alatt szeret tartózkodni. Pikkelyzete igen könnyen leválik és sertetlen állapotban ritkán kapható. Lenese alakú peteburka $6 \frac{m}{m}$ átmerő mellett hófehér.

Ismerem, erdélyi részekből: Kolozsvárról és Nagy-Szebenből (Sill V. gyűjteményében); magyar részekből: Pancsovárról és Orsovárról. Az utóbbi helyről Dr. Koch L. is ismertette.

SPEC. 15. FAJ. GNAPHOSA SCHUSZTERI. N. SP. SCHUSZTER M. SCHUSZTER R.

(SCHUSZTER KÁROLY jeles gyűjtő tiszteletére.)

(VIII. tábla, 172, *a* szemállás, *b* rágó, *c* ♀ zárja, *d* ♂ tapogató oldalról, *e* ugyanannak nemzőszerve alólól, *f* mérték.)

♀ Előteste tiszta fekete, sárgásfehér, atlaszfényű boritekkal, mely agaspikkelyekből áll: a vegtest fekete, sárgással elegyes, elején egy felholdalakú folttal, a második ingódörpár táján két petytyel, a fonók felett ismét két petytyel, — a felhold és a pettyek sárgásfehérek, atlaszfényűek. A lábak czombjai barnas-feketék, a többi iz élénksárga. A rágók becsapó resének belső felén a fogacsolt lemez helyett egy vaskos, tompa, dudorszerű fog.

A fejmell szivalakú, fejeresze tetemesen keskenyedve-csúcsosodott. A mellvert csúcsosan tojásdad, szurokbarna, kevéssé szőrös. A rágók barnák, simán-fényesek, oldalról tekintve körtealakúak, tövükkel térszerűen kiállók, gyéren álló, gyenge szőrözettel. Az állkapcsok szennyes barnássárgák, szélesek, egymásfele hajlók, benyomottak, külső szeleiken egy könyökszerű sarokkal ellátottak; az alajk nyelv alakú, elege

szeles, az allkapcsok hosszának két harmadreszet alig eri el. A lábak karesuk, hosszuk, czombreszökben erősödöttek; az első pár szára kissé füstös, alul három pár ho szű, gyenge tüskével, végize sárga, a másodvegizen, alul, a legvégén egy finom tüsképár; a második lábpáron hasonlókepen; a két hátsó lábpár szárán és másodvegizen alul és oldalt néhány karesű tüske. A végtest hosszúkás, kissé lapított. Az alsó szemsor igen módosan behajló, oldalszemei nagyobbak, a hátsó sor egyenes, középszemei hosszúkások, hosszabb tengelyökkel harántfekvők; a két sor oldalszemei közötti távolság kevéssel nagyobb annál, a mely az alsó és hátsó középsők között letezik.

A zár egy igen élesszélű, közel felkör alakú kivájas, melybe a nyelecske felől egy osztó lemez mélyen benyomul; az osztó lemez a csúcsa fele kitágult, elkerekített.

Mértékek, ♀ : Törzs	5·8 $\frac{m}{\mu m}$ ebből
fejmell	2 "
I lábpár	5·7 "
II "	4·8 "
III "	4·9 "
IV "	7·4 "

♂ Kisebb, sokkal karesubb, a végtest feltjai igen terjedelmesek. Tapogatoja sötét színű, eléggé vaskos; térdize vastagságánál kevéssel hosszabb, szárize a térdnél rövidebb; hosszú, elálló szőrökkel; pikkelye kanálalakú, szőrös, külső oldaláról tekintve a pikkely csúcsa alól egy kis dudor áll ki, mely, alulról tekintve, a sima, világos gyűjtő csavaros nyujtványa végének bizonyul.

Mértékek, ♂ : Törzs	4·3 $\frac{m}{\mu m}$ ebből
fejmell	2 "
I lábpár	5·5 "
II "	4·8 "
III "	4·6 "
IV "	6·5 "

Néhány példányát e szép póknak Orsován gyűjtöttem. Juniushan ivarretett. Szárazon fekvő köhalmazokban tartózkodik; e pókok roppant sebes futással menekülnek, úgy, hogy sértetlen példányok szerzése igen bajos. Legközelebbi rokona a *G. maculata* (Lin.). Az itt leírt fajt Dr. Koch L. is ujnak ismerte fel.

GEN. 2. NEM. THYSA. KEMPELEN.

Thysa = bacchansnők; a pinczére mint lelhelyre ezeloz.)

Syn. 1867. KEMPELEN «Verh. d. zool.-bot. Ges. in Wien» p. 607.

Vide : THORELL «On Europ. Sp.» p. 151.

=*Gnaphosa* (LATREILLE).

Az 1867-dik év óta e hat szemű nem, es illetőleg *Thysa pythonissaeformis* KEMP. nevű faj, sorra járja a rendszerező araneologiai irodalmat, úgy azonban, hogy minden ovatosabb író, a hatszeműség daczára is, kisebb nagyobb mertekben kétséget taplált jogosultsága iránt. Így tett THORELL i. h., így BERTKAU s mások is.

KEMPELEN-nek i. h. megjelent, nem. open szabatos leírást olvasva s a hozzá melletkelt ábrákat tanulmányozva, mindenkinek felötlík a «*Gnaphosa*» jelleg; de a végleges eldöntes megis lehetetlenne van teve, mert KEMPELEN leírása nem emlékezik meg arról: vajjon a ragó beesapóresén fog, vagy fogacsolt lemez áll-e? a fejmell széle karimás-e? stb. Már pedig e jellegek ismerete igen lényeges volt volna a hatszeműség értékenek megállapítására is.

Ezelőtt három évvel fölkerestem KEMPELEN urat a vegett, hogy a kétségeket eloszlassam; annyival is inkább, mert az egyetlen példány, melyre a nem es faj alapítatott, Egerből származott s így reám

nézve fokozott érdekel birt. Eredmény nem volt, mert a tulajdonos nagy beesben tartotta az „unicumot”-feltette a szorosabb megvizsgálás véletlenségeitől.

Nagy utazásom közben, melyet a pókfauna érdekében tettem, csupán e pók miatt kerestem föl Eger városát. Kipuhatoltam, hogy a pók a jelenleg u. n. Skopetz hazból került; e házának pinczéjét s minden képzelhető helyiségét a legbehatóbb kutatásnak vetettem alá; eredmény nem volt. Átkutattam néhány más pinczet, körakásokat, kerteket; mind hiába. S minthogy tíz év óta senkisémet talált egy második példányt, másfelől tapasztalásból tudtam, hogy a szemesoportok eltorzulása a pókoknál előfordul; mindinkább azt a meggyőződést kezdtem táplálni, hogy az egész *Thysa* valamelyik *Gnaphosa* fajnak az eltorzulása.

KEMPELEN ur ez évben elhalálozván, a pókokat a beesi udvari Múzeumnak hagyományozta, e Múzeum öre, t. barátom KOELBEL Károly ur pedig oly szeretetreméltó volt, hogy a legbehatóbb megvizsgálás végett rendelkezésemre bocsátotta.

A vizsgálat a következő diagnosist szolgáltatta:

A rágók beesapórésének belső szélén egy széles, finoman fogacsolt lemez, mely teljesen egyezik a Gnaphosa lucifuga (Walek.) illető lemezével. E jegy szerint a nem: Gnaphosa.

A fej mell széle szélesen karimás, hosszabb mint a negyedik lábpár szára és térdé együttvére, fejrésze láthatólag elválasztott. Rágói oly hosszúk mint az első lábpár térdé, oly vastagok, mint e lábpár czombja, tövükkel a homlok előtt kidagadók. A negyedik lábpár másodvégíze hosszabb e láb száránál. A legalsóbb fonópár a leghosszabb és legvastagabb. A hátsó szemsor erősen kihajló, e sor oldalszemci a középsőktől körülbelül oly távolságra mint az alsó középsőktől. A zár teljesen egyezik a Dr. Koch L. által a „Fam. der Drass.“ I. tábláján 5 alatt lerajzolt változattal. E jegyek alapján az állat nem más mint Gnaphosa lucifuga (Walek.).

A szemek egészen vére kerésszé kifejlettek, laposak, mely körülmény maga is a szemesoport monstruosus voltára vall rá.

A példány rossz conserválás következtében rossz állapotban van s szőrözete, a lábak fegyverzete teljesen elenyészett.

FAM. 4. CSALÁD. DYSDEROIDAE. FOJTÓK. MORDSPINNEN.

δύσδηρος = nehezen legyőzhető; a túladás hevesességéről.

GEN. 1. NEM. SEGESTRIA. LATR.

(segestre = durva takaró; a szövetre vonatkozik.)

Syn. 1804. LATREILLE «Nouv. Dict. d' Hist. Nat.» XXIV, p. 134.

Vide: THORELL «On europ. Spid.» p. 154.

Hat szem; az alsó sor négy, a hátsó két szemből áll; csak az alsó sor szemci sorakozottak. Az állkapcsok hosszuk, egyenesek, majdnem párhuzamosak. Két bordas és egy sánja köröm; a bordaskörömök fésűalakuak, szélesek, kampójuk kinyuló, erős, mögötte a hosszú bordak sűrűn sorakoznak. A sánjaköröm hirtelen lehajló, mögötte egy rövidke borda (II. köt. V. tábla 119 b.). Karesu alak, hengerded végtessel.

SPEC. 1 FAJ. SEGESTRIA SENOCULATA. (LIN.), HATSZEMŰ, DARÓCZPOK. SECHSÄUGIGE LODENSP.

(senoculata=hatszemmű; a szemek számáról.)

Syn. 1758. *Aranca senoculata* LINNÉ «Syst. Nat. Ed.» X. 1. p. 622.

Vide: THORELL «Remarks» p. 152.

♀ Elötteste vörösbarna, végteste szürkessárga; felületen, egész hosszában egy barna, széles és mind a két szélén csipkézett hosszávval; oldalai és hasfele barnán pontozottak.

Fejmelle, felülről tekintve, majdnem párhuzamos, mellrészében csak módosan tágult, — oldalról

tekintve, a fejresz a legmagasabb s ettől a nyelecskeig a hátvonal lankásan, kissé ívesen igyekszik hátrafele; a fejresz valamivel sötétebb a mellrésznél; az egész megfekvő finom szőrökkel oly módon borított, hogy az alapszín kilátszik. A mellvért körded, szélein a csipők fekvésének megfelelő tetemes behorpasztásokkal, — sárgásbarna. A rágók fenyvesek, sötét fekete-barnák, hengerdedek, az első lábpár czombjánál vastagabbak, kétszer oly hosszúk mint ugyane lábpár elsővége, oldalról tekintve terdszerűen kiállók és kissé előre irányzottak; végig gyéren álló hosszú sertekkel. Az állkapesok hosszúk, keskenyek, közepök táján kissé karcuk, végök kifelé elkerékített, befelé résüntösen elvágott; az alajk hosszú, keskeny, párhuzamos, elől ívesen elmetsett s az állkapesok hossza két harmadreszenek felel meg; az állkapesok és az alajk vörösbarnák. A tapogató vörössesárga; szárize alig hosszabb a térdíznél, s mind a kettő együttve oly hosszú mint a végiz. A lábak vörössesárgák, végeik valamivel sötétebbek s a szárazon és másodvégizeken rendetlen, sötétebb foltok is láthatók; az első pár a többinél erősebb, szárán, alul, négy öt pár erős tüske s oldalán is tüskék állanak; a második lábpár hasonlóképen; a harmadik és negyedik lábpár gyengébb és gyéresebb fegyverzett. A végtest hosszúkás, hengerded, elől hátul elkerékített, felületén a fémérintett rajzzal; hasfelén a barna foltok tömörülnek és a légzőrés és fonók között egy párhuzamos foltzalagot alkotnak. A légzőrés két oldalán álló mellkres párok (I. köt., I. tábl., 15, *l, m*), hosszúkás forradásokhoz hasonlítva s a hasbőr alapszínével birva, kevésbé feltűnők. A fonók rövidek, vörössesárgák.

Valamennyi szem módosan opalizáló (éjjeli); az alsó sor négy szemből áll, középsői közelebb állanak egymáshoz mint az oldalszemekhez, a sor behajló; a hátsó sor két szemből áll s e két szem az alsó sornak megfelelő oldalszemével egy közös emelkedésen elhelyezett, úgy, hogy az alsó sor oldalszeme oldalt-előre a hátsó oldalt-hátra tekint; az alsó sor szemei a homlok szelétől szemátmérőnyire.

A zár nem chitines, hanem egyszerű bőrös tércse; alakja szerint négyszögletes, színe szerint barna.

Mértékek: ♀	Törzs	10 $\frac{m}{m}$ ebből
	fej mell	3.2 »
	I lábpár	9.5 »
	IV »	8.4 »
	II »	9.2 »

A lábak hosszaránya tehát: 1, 2, 4, 3.

♂ Előttem ismeretlen; az ivaréretlenek színre nézve megegyeznek a nősténynyel.

Csak a hegységből ismerem, hol a bükk tenyészvonalát is meghaladja, de a fenyőövnek csak az alját tartja; a törpefenyő övéből nem ismerem. Leginkább az elálló kergét és neha a köveket választja tanyájául hol sokszor igen szűk helyiségben fehér, selymes burkot sző, a melyben tartózkodik, s a melyben petéit is őrzi. A mondottakhoz hasonló helyiségekben nem ritka. Ismerem, erdélyi részekből: a Mezőhavas (Hargita), Nagy Hagymás (Csiki havasok) fenyőövéből; továbbá Nagy Szebenből (Sill és Bergleiter gyűjtemények); magyar részekből: Mehádiáról (Damoclet csucsa), Alsó-Hámor (Borsod «Hollós» fenyves) és Selmeczbányáról (Klingertarna köhalmai).

GEN. 2. NEM. DYSDERA. LATR.

(vide : Dysderoidae).

Syn. 1804. LATREILLE «Nouv. Dict. d' Hist. Nat.» XXIV. p. 134 (ad part).

Vide : THORELL «On europ. Spid.» p. 157.

Hat szem, inkább felkörbe mint sorokba állítva; az alsó két szem a többinél nagyobb és kisebb nagyobb távolságra egymástól; a hátsó négy szem erősen behajló sorban. A rágók előre irányzottak, erős, hosszú csipőköörömmel fegyverzetek. Csak két bordás köröm a lábvegeken; a sarlóalakú, keskeny, hosszú, karsu kampó mögött rövid bordák sorakoznak. (II. köt. V. t. 120, c). Karsu, hengerded végtestű, élenszínű alakok, melyek kövek es kergék alatt tanyáznak. A nőstények petéiket hólyagszerű burkokban elrejtve őrzik.

SPEC. I. FAJ. *DYSDERA CAMBRIDGEI*. THOR. CAMBRIDGE FOJTÓPÓKJA. CAMBRIDGES WURGSP.

(O. P. Cambridge híres angol Araneologus tiszteletére.)

Syn. 1873. *Dysdera Cambridgei* THORELL «Remarks» p. 465.

♀ Előteste szép sötétvörösbarna. Végteste sárgás testszínű. Labái elenken téglavörösek. Rágói szép vörösbarnák, karesűk, előre irányzottak.

A fejmei fejérsze felemelt, elől ívesen elvágott, elég széles; mellrésze szelesedő; oldalról tekintve, a hátvonal ívesen és egyszersmind lankásan bocsátkozik le a nyelecskere. Felülete a fejmeinek pontozva ránczott; a hátsó szemek mögött egy sekely barázda kezdődik, mely a mellrész közepe táján kissé bemélyed s azon túl is tart. A mellvert világosabb vörösbarna, szélesen tojásdad, szelein a csipők beigtatásának megfelelő behorpasztásokkal. A rágók resüntösen előreálló, a fejmeinnel rövidebbek, oly hosszúk, mint az első lábpár másodvégize, akár felülről, akár oldalról tekintve karesu-kupalakuak, végeikkel kissé szétállók, igen gyér szőrözettel és meglehetősen durva harántránczokkal; csipőkörmük áttetszően vörös, könnyedén hajlott, tühegyes s a rágótőnél alig rövidebb. Az állkapcsok elenken barnászvörösek, tövük kivastagodott s a tapogató beigtatása szabadon látható, az állkapocs hosszának majdnem közepére esik; végők keskeny és befelé resüntösen elvágott; az aljuk hasonló színű, hosszú, keskeny, a végén elmetsett; töve szélesebb a végénél. A tapogató elenk világos-téglavörös, izei jól elválasztottak; szára nem hosszabb a terdnel, végize felületen tömött, rövid szőrözettel s egészben valamivel rövidebb mint a terd és szár együttlve. A lábak kissé hosszúk, elég erősek, végők fele alig vékonyodók, igen élénken téglavörösek, izeik jól elkülönítettek; az elsővégizek igen rövidek s alig egy harmadát teszik a másodvégizeknek; az első két lábpár módosan szőrös, fegyvertelen, a két hátsó pár szárán, alul a végén, egy-egy tüske-pár, a másodvégizeken néhány apró tüske. A végtest keskeny, hengerded, elől hátul elkerekített, felül és alul egyszínű, meglehetősen megfekvően szőrös. A stigmapárok (I. köt. I. tábla 15, *l, m*) vöröskeretűek, szembetűnők.

A szemcsoport egészben patkóalaku, magasságánál szélesebb, előre felé nyitott; a két hátsó közep-szem a legkisebb s majdnem érintkezik, a közép és oldalszemek között egy kis köz s ez oldalszemek az alsó szemekkel ismét majdnem érintkeznek; az alsó szemek a legnagyobbak, távolságuk egymástól átmérő-jüknek megfelel s ily távolságra vannak a homlok szeletől is.

A zár bőrs,  szerű vörösbarna behomályosítással.

Mertekek, ♀ : Törzs	7.6 $\frac{m}{m}$ ebből
fejmei	3.8 "
I lábpár	9 "
II "	8.8 "

A lábak hosszaránya: 1, 2, 4, 3.

A rágók hossza (a törzsbe nincsen beleértve) a töe	2 $\frac{m}{m}$
a köröme	1.9 "

♂ Kisebb, karesubb, alakra és színezetre nevez a nősténynyel azonos. Tapogatója elenk téglavörös; szárize hosszabb a terdnel; a végét nem pikkely, hanem végiz képezi, a melyhez a nemzőszerv függelék-viszonyban áll; a függelék igen rövid, vékony nyelecske által függ össze e végizzel s annak alsó fele közepére van alkalmazva; e függelék töve vastagabb s az egész kétszer hosszabb a végiznél; a függelék vörössárga, töve hengerded és egy sötétebb harantesikkal díszített, e vastagabb rész felehosszát teszi az egész függeléknek s végződése táján kissé púpos, a pup mellett egy sötétvörös-fekete rövid körmöcskével fegyverzett; alsó fele kissé előre irányul, csörszerűen nyújtott, a tőnél vékonyabb lemez, melynek vége kissé felgyűrt, s egy hosszabrdája vörösfekete.

Mertekek, ♂ : Törzs	7.4 $\frac{m}{m}$ ebből
fejmei	3.4 "
I lábpár	8.8 "
Rago	1.5 "

E csinos faj nem epen gyakori; neha kéreg, neha kövek alatt találtam. mindig egy selymes burokba rejtve es nyugodva.

Ismerem: Báziasról (kövek alatt), Orsováról, az Also-Hámból (Hollós fenyvese, kéreg alatt); a magyar nemz. muzeumban egy-egy csonka példány Nagyváradról (Mocsary) es Ungvár vidékeről (Vidra Ferdinand).

SPEC. 2. FAJ. DYSDERA NINII CAN. ET PAV. NINI F. NINIS W.

(Nini olasz vizsgáló tiszteletére.)

Syn. 1871. *Dysdera Nini* CANESTRINI et PAVESI «Catal. Syst.»

♀ Elöteste vörösesen fekete. Végteste szep sárgásszürke, elejen neha lándzsafoltszerű világosodással. Lábai rendszerint sötét téglavörösek (majdnem vörvörösek), ritkán világos téglavörösek.

A fej mell vaskos; fejerésze szélesedő, mellrésze hátul felkörben elkerekített; a fejresz oldalain igen sekely behorpasztások; az egész felület ritkasan és igen szabályosan pontozott; oldalról tekintve a hátvonal szep lapos ívben emelkedik. A mellvert szélesen korded, ritkasan pontozott, alig domboru. A rágók reszúntósen előre irányozottak, aránylag nem epen hosszúk, oly hosszúk mint az első lábpár másodvégize, nem igen fénylök, végök fele vékonyodók, belső élükön sok serteszörökkel, különben barnászörösek; csipőkörük karcsú, hegyes, oly hosszú, mint a rágó töve. Az állkapcsok keskenyek, tövük szabadon kiálló, vastagodott, úgy hogy a tapogató beiktatása szabadon látható. — barnászörösek, végükön világosodók, csücsokkal a rágó hosszának két harmadreszét eléri. Az aluk, nyelvalakú, tövén nem szélesedett, a végén világosodó, nem szélesebb az állkapocsfél végénél.

A tapogató sötét téglavörös, végize szörös, terde láthatólag vastagodott, végize alig valamivel rövidebb mint a térd és szár együttvéve.

Lábai elég hosszúk és karcsúk, fegyvertelenek. A végtest hossztojásdad, kisse hengeres.

A szemek egy magasságánál szélesebb patkó alakba sorakozottak; az alsó két szem másfel átmerőnyire a homlok szélétől s közel szemátmérőnyire egymástól, a többi szem e kettőtől kezdve sűrűn sorakozott. A szemek összesége egy dombocskán áll, mely a homlok felől láthatólag határolt.

A zár egy bőrös, vörössessárga sima ter. mely a légzörés felett két < < szerű benyomást mutat.

Mértékek, ♀ : Törzs	10	$\frac{m}{m}$ ebből
fej mell	4.2	»
I lábpár	11.5	»
II " 	10	»
III " 	9	»
IV " 	11.2	»

♂ Kisebb; a harmadik es negyedik labpar szaran, alula végén egy tuske (vajjon állando?). A tapogató terdize kisse dagadt; különben a térd- szár- és végiz meglehetősen egyenlő hosszúságúak; a végiz nincsen pikkelylye átalakítva; a nemzőszerv függelékszerűen alkalmazott, oly hosszú mint a térd es szár együttvéve s egy hossztojásdad, sárga, vöröses-harántesikos, fényes gyűjtöböl áll, mely lefelé fűrészerűen csavart s egy lapos karajt bocsát hatrafele, a karajon alul egy tompa nyujtvány látható, mely egy-szer kiszögellik s a melylyel szemközt egy árszerűen hajlott, finom, hegyes tövis látható, mely a tompa nyujtványnyal egyetemben egy rak-ollóra emlékeztet.

Mértékek: ♂ Törzs	8	$\frac{m}{m}$ ebből
fej mell	3.9	»
I lábpár	10.8	»
II " 	10	»
III " 	7.8	»
IV " 	10.3	»

E fajt. mely eredetileg Olaszországból iratott le. nőstényei után mint tavaszi alakot Mehádiáról (Hercules-fürdő melletti sziklaresek) ismerem. Dr. Koch L. ur. ki alakjainkat felülvizsgálta, azt írja (in litt.), hogy ugyanez az alak Dél-tirolban igen gyakori. A déltiroli példányok fejmellén a pontozás valamivel sűrűbb. A him leírását egy déltiroli példányra alapítottam, melyet Dr. Koch L. szivességének köszönök.

SPEC. 3. FAJ. *DYSDERA WESTRINGII*. CAMBR. WESTRING F. WESTRINGS W.

(Westring jeles svéd Araneologus tiszteletére.)

Syn. 1872. *Dysdera Westringii* CAMBRIDGE «General list. of the, Spid. of Palest. and Syria. etc.» *Procéd. of the Zool-Soc. of London.*

♂ Az előtest igen tüzes-barnászvörös. A végtest világos szürkés-sárga. Labái rikítóan teglavörösek. A fejmell hátul tökéletes felkorben elkerekített, fejerésze szélesebb, oldalfelől tetemes behorpasztás által határolt; oldalról tekintve a nyelecsketől lapos ivben emelkedik; egész felülete durván ránczos-szememes. A mellvert szélesen tojásdad, laposan domboru, kevesbbé durván ránczos-szememes, világosabb barnászvörös. A rágók előre irányozottak, elég hosszúk s az első lábpár második végizenél valamivel rövidebbek, simak, fenyések, finoman és gyéren pontozottak, végök felé karesuk, belső elükön szemközt álló, bő serteszőrőzettel; csipő-körmük karesu, sarlószerűen hajlott, finom hegyű, a rágók tövével rövidebb. Az állkapcsok karesuk, keskenyek, tövük szélesedett, szabadon fekvő, úgy, hogy a tapogatók beígtatása egészen szabadon látható; végökkel a rágók hosszának felét bőven elerik s mint az alajk is elenken barnás vörösek. Az alajk nyelvaku, tövével az állkapcsok végénél szélesebb, legnagyobb szélességénél sokkal hosszabb s az állkapcsok hosszának $\frac{2}{3}$ -át bőven eléri. A lábak hosszúk és karesuk, a bordás körmök alatti szőrecesetek feketék; a két első pár fegyvertelen; a harmadik pár szárán felül egy — külső oldalán két — alul hat tüske, az utóbbiak közül csak a végen álló párosan elhelyezett; e szám úgy látszik a maximum, s az elhelyezés egyazon példány ugyanazon lábpár felein nem egyforma, csak az alsó végén álló pár állandó; második végizen szintén néhány tüske; a negyedik lábpár fegyverzete hasonlít a harmadik páréhoz.

A has karesú, kisse hengeres, a fejmellnél keskenyebb és emel alig hosszabb.

A szemek egy, magasságánál valamivel szélesebb patkóalakba sorakozottak, nagyságra nevezé nem igen különbözök; a két alsó körülbelül átmerőnyire a homlok széletől s valamivel kevesebbre, mint átmerőnyire egymástól, kerek alakúak; a többi szem kissé tojásdad; a hátsó középsők érintkeznek s szomszédjaiktól oly távolságra esnek, a mekkora a távolság ezek s az alsó két szem között.

A tapogató berendezése legjobb jellege a fajnak. A tapogató egészben véve hosszú, karesu; szára a terdnél valamivel hosszabb és vékonyabb; végíze nincs pikkelylye átalakítva s a szár hosszúságának körülbelül $\frac{2}{3}$ -ad részét teszi; a végizre függlekszerűen akasztott nemzőszerv hosszú, nem rövidebb mint a terd és szár együttve; külső oldaláról tekintve egy halvány-sárgászvörös, fényes gömbbel indul, e gömb egy közel hengeres, sárgásfehér darabbal folytatódik, mely a végén ketfele, szárnyszerűen, laposan mintegy kinyílik, a belső oldalról tekintve pedig az előrenéző lapítás tövéből egy finom, árszerű sertet bocsát.

Mertekek: ♂ Torzs	10 $\frac{m}{mm}$ ebből
fejmell	5 "
rágo (külön, a két kozlott	
mertekből kifogva)	2 "
I lábpár	12 "
II "	11 "
III "	9 "
IV "	12 "

♀ Elöttem ismeretlen.

E jeles fajnak egyetlen példányát Dr. Horvath Geza t. barátomnak köszönöm, ki azt a Rákoson gyűjtötte (julius). Eddig csak Syriából volt ismertetve.

THORFILL tr (in litt.) a fajt felismeré s azonosnak sejte a Dysdera Kollari Dobl. fajjal; e feltevesnek azonban Dr. L. Koch (in litt.) ellentmond s különösen kiemeli, hogy a D. Kollari Dobl. rágóinak felületen egy éles párkány vonul végig.

SPEC. 4. FAJ. DYSDERA LONGITARSIS. DOBLIKA. LÁBAS F. FÜSSIGE W.

(longitarsis = hosszú lábfej; a szervezetről.)

Syn. 1853. *Dysdera longitarsis* DOBLIKA «Beitr. zur Monogr. des Sp. Geschl. Dysdera.» Verhandl. der k. zool. Ges. Wien

♀ Előteste sötét-vörösfekete. Végteste világosszürke, felületének elejen rendesen egy feheres, elmosódó, rövid közepvonással; a fonók közvetlen környeke szinten világosodó. Lábai sötétes téglavörösek. Rágói az előtestéhez hasonló színezet mellett hosszuk és előre irányzottak.

A fejmell fejerésze szélesedő, elől ívesen elvágott; mellrésze módosan szélesedő és eléggé domboru, úgy, hogy a hátvonal, oldalról tekintve, a nyelecske fele kissé lecsapott; a középbarázda csak közvetlenül a hátsó szemek mögött feltűnő, azontul inkább pontozott, mint melyített; a felület gyéren és durván pont-pontozva-ránczott. A mellvert barnászvörös, körded, szélein a csipők állásának megfelelő horpadásokkal. A rágók vörösbarnak, előre irányzottak, tövüknél hengerdedek, végükön kúposak; haránt ránczosok; széjjel állók; csipőkörmük erős, könnyedhajlásu, tövüknél valamivel hosszabb, sötétvörös. Az állkapcsok elenken barnavörösek, tövük igen szélesedő, végök elég széles ki- és befelé rézsutosan elmetstett; a tapogató beigtatása szabadon látható s az állkapocs hossza felére esik; az alajk az állkapocsfel végénél szélesebb, párhuzamos, elől elmetstett. A tapogató sötétes téglavörös, szára nem hosszabb a térdnél, végíze felül tömötten szőrös és sokkal rövidebb, mint a térd és szár együttveve. A lábuk sötétes téglavörösek, végökefelé csak kevésbé vékonyodók, finoman szőrösök; a két első pár fegyvertelen; a két hátsó pár szárán alúl a végén két-két tüske; a negyedik pár másodvégizen szinten néhány tüske.

A végtest tojásdad-hengerded (terhes példányoknál hengerded, vastag), hasfele rendesen sárgászürke; a stigmák vöröses kerettel, és szőrökkel körítve (I. köt. I. t. 15. l. m.); szembetűnők.

A patkóalakba állított hat szem közzül, a négy hátsó egyenlő nagyságú; a két alsó valamivel nagyobb; a szemek egymástól egyenlő távolságra, mely igen csekély; a két alsó szem közötti tér egy alsó szem átmerőnyi.

A zár egy hártvás, sárgászvörös, sima terese, közepén egy kis, foltszerű behomályosítással.

Mértékek: ♀ Törzs	9	m_m ebből
fejmell	4	"
I lábpár	10	"
II "	9	"
rágo	2.4	"
körme	2.7	"

(Terhes állapotban a törzs neha 12 m_m .)

♂ Karesübb (neha alig, neha sokkal kisebb), végteste sötétebb szürke; labai vörösek; fejmelle hosszabb, úgy rágói is, melyek láthatólag () szerűen egymásfele hajlok, a fejmell, mellvert és a rágók igen durván pontozva-ripacosok. A tapogató vöröses; szár, térd és a nemzőrészt viselő végíze, mely ninesen pikkelylyé alakítva, majdnem egyenlő hosszúságúak; a függelék nemzőszerv egy és egy felszer oly hosszú, mint a végíz, töve nyújtott tojásdad, sárgás, rajznelküli; végén semmi körömmel, nyújtványa lemezszerű, csavart, (mint az eke fordítója) s a legvégén egy kis villácskát visel, mely előre irányul.

Mértékek : ♂ Törzs (nagyobb)	9	$\frac{m}{m}$
" (kisebb)	7	"
fejmel (nagyobb)	4	"
rágó "	3	"
1 lábpár "	11	"
11 " "	10.5	"

Határozottan déli alak, melyet mint nyári alakot Orsováról és Meladiáról ismerek, hol burkaiba rejtözve ritkán fordul elő; leginkább a kövek alján tartózkodik.

GEN. 3. NEM HARPACTES. TEMPL.

(ἀροπαζήσ = rabló; a ragadozó életmódról.)

Syn. 1834. TEMPLETON «On the Spid. of the Gen. Dysdera» p. 401.

Vide : THORELL «On europ. Spid.» p. 157.

Hat, inkább körbe, mint sorokba állított szem.

A rágók függőlegesek; csipőkörmük rövid. Két bordás és egy sánjaköröm; a bordáskörmök inkább sarló, mint fesűalakúak; a hosszú, erős kampó mögött közepes hosszúságú, egyenes bordák sűrűn sorakoznak (II. köt. V. t. 121. c.), a sánjakörmon semmi borda. Karsu, hengerded végtestű alakok, melyek életmód szerint a Dysdera-nem alakjaival sokban megegyeznek.

SPEC. 1. FAJ. HARPACTES RUBICUNDUS. (C. K.). VÖRÖS RABLÓPÓK. RÖTHE RAUBSPINNE.

(rubicundus = vöröslő; az előtest színéről.)

Syn. 1839. *Dysdera rubicunda* C. Koch «Die Arachniden» V. p. 79.

Vide : THORELL «Remarks» pag. 468. (sub *Dysd. rubicunda*).

(IX. tábla, 199 ♂ nagyítva, 200 mellvért és szájszervek alólól *r* rágók, *l*, *m* állkapcsok, *c* csipők, 201 karomrendszer, 202 fej előlről.)

♀ Előteste vörösbarna, néha szemyes-sárgászöld. Végteste szürkés-testszín. Lábai vörösesek, néha vörössárgák; valamennyi czomb felületének végén tüskés. A rágók majdnem tökéletesen függőlegesek.

Fejmellet domboru; fejresze szűkülő, oldalról tekintve a hátvonal íves; a hátres kivehető; a fej elválasztását is két csekély csatorna jelöli. A mellvért rendes-körded, szelein a csipők fekvésének megfelelő horpadásokkal, barnászöld. A rágók élénk-vörösbarnák, fénylők, harántirányúak, az első lábpár második végének kétharmadával egyenlő hosszúságúak; körmük vaskos, rövid, tövük egy harmadával alig felérő. Az állkapcsok karsuk és egyenesek; tövük módosan vastagodott; a tapogató beigtatása szabadon látható s az állkapcsok hosszának alsó felén történik; az alajk keskeny, párhuzamos, egy állkapocsfel végénél nem szélesebb, elől ívesen elvágott, az állkapcsok hosszának két harmadát alig éri el. A tapogató karsu, vöröses vagy sárgászöld; terd és szárize egyenlően hosszú, végze rövidebb, mint e kettő együttveve. A lábak hosszúak, végük felé kissé vékonyodók; az első pár czombja felületén, a vége előtt, kissé vastagodott, kihajló s e pupon néhány (5) tövis áll együtt; a második lábpár hasonló helyen 3—4 tövis; a harmadik lábpár czombja felületén, a negyedik páron a felület töve felé néhány tövis; az első és második páron a száraz és végek fegyvertelenek; a többi pároknál gyéren tüskések; az elsődvégzek igen rövidek; az első páré alig egy ötöde a második végzek.

A végtest karsu, hengeres; hasfelen a négy stigma vörös keretben, szőrökkel körülvéve; szembe-tünő. A hat szem patkóalakba sorakozott; a patkó magasságánál alig valamivel szélesebb; a hátsó négy

szem egyenlő, az alsó kettő valamivel nagyobb s oly távolságra egymástól, mely egy (alsó) szem átmérője felének megfelel; az alsó szemek a homlok széletől alig szemátmerőnyi távolságra.

A zár hártyás, minden kitüntetés nélküli.

Mertekek: ♀ Törzs	11	$\frac{m}{mm}$ ebből
fejmell	4	"
I lábpár	11.8	"
II "	10.8	"
IV "	11.8	"

A lábak hosszaránya tehát: 1 = 4, 2, 3.

♂ Karesubb, hosszabb lábú; lábfegyverzete erősebb. Fejmelle szélesebbre fejlett s a fej jobban elválasztott. Tapogatója hosszú, sárgászörös; végíze nincsen pikkelyléc átalakítva s oly hosszú, mint a térdiz; a száríz valamivel hosszabb. A nemzőrész függelékes; igen rövid nyelecsken, körtvealakú, fényes, sáma egyszínűen sárgás, csücske egy kis, karimás nyílással, melyből egy hajlott vörösbarna körmöske áll ki s egy másik világosabb körmöskevel, mely a nyílás széléből indul fogóformán () összehajlik (lásd I. köt. I. t. 7. x).

Mertekek: ♂ Törzs	9	$\frac{m}{mm}$ ebből
fejmell	4.5	"
I lábpár	15.5	"

(Neha nagyobb is.)

Nálunk a Dysderoidák legközönségesebb alakja, mely mint nyári és őszi alak nem ritkán lakott helyeken is található, mint kűszöbök, kövek, téglák alatt, elálló vakolatrésekben stb.; de az erdőkben is lehullott lomb alatt és kérgek mögött el, hol a nőstények egy selymes burokba beszöve őrzik petéiket. Merész támadó, mely a legerősebb hangyafelekkel (*Campanotus ligniperdus*) is könnyedén elbánik.

Mint két bordás és egy sánja körömmel ellátott alak *Harpactesnek* általam ismertetett fel; eddig sok tévedésre szolgáltatott okot.

Ismerem erdélyi részekből: Tordáról, Szász-Vesszősről, Kolozsvárról, Oláh-Fenesről, Mező-Záhról, Gyekéből, Görgény-Szt.-Imréről, Szebenből (Sill és Bergleiter gyűjtemények); magyar részekből: Doroszlóról, Tokajból, S.-A.-Ujhelyről, Alsó-Hámorból, Egerből, Selmeczbányáról, B.-Füredről, Budáról (Muz. gy. Pável), Mehádiáról (Muz. gy. Frivaldszky János).

SPEC. 2. FAJ. *HARPACTES SAEVUS*. N. SP. DÜHÖS R. WILDE R.

(*saevus* = dühös; az életmódról.)

(VIII. tábla, 174, *a* szemállás, *b* karomrendszer, *c* ♂ tapogatója oldalról, *d* mérték.)

♀ Előteste füstbarna vöröses lehelettel; lábai vörössárgák; végteste szürke (kocsonyás kinezésű). Karesű alak. Rágói függőlegesek.

Fejmelle szívalakú, kissé szélesedett, elkeresített fejjel; felülete véghetetlen finoman szemcsés. A mellvert vörössárga, hosszkörded, a csipők kapesolata körül kivágott. A rágók kevéssel rövidebbek mint az első lábpár térdize, különben nyújtottak, hengerdedek, sötét sárgászörösek, kevéssé szőrösek. Az állkapesok keskenyek, egyenesek; a stipes, melyhez a tapogató kapesolódik, egészen szabadon fekszik; sárgászörösek; az aluk hasonló színű, keskeny, nyelv alakú, az állkapesok hosszának két harmadrészet eléri. A tapogató sárgászörös, karesű, egyenletesen, nem sűrűn szőrös; végíze rövidebb mint térdé és szára együttvéve. A lábak eléggé hosszúk, karesűk, egyenletesen szőrösek; a két első pár czombján, felül a végen, három-három tüske, az első páren egymás mellett, a második páren egymásután; a két hátsó lábpár czombján, felül 4 tüske; a harmadikon a vége felé, a negyediken a töve közelében; a harmadik lábpár térdén, felül-elöl egy tüske; a két hátsó lábpár szárán és másodvégizén, alul és oldalt több tüske. A végtest hosszú, hengerded.

A hat szem patkóalakba sorakozott; a két alsó, felátmerőnyire egymástól, valamennyi szem opalizáló. A zár egy bőrös terese, mely sima és semmi megkülönböztető jegyet nem visel.

Mertekek: ♀	Törzs	8	$\frac{m}{m}$ ebből
	fej mell	3	»
	I lábpár	8	»
	II »	7.2	»
	III »	6	»
	IV »	8.7	»

♂ Keresőbb; fej melle szép barnavörös. Tapogatója igen jellemző szerkezetű: czombja vastagodott, hurka-kinezesű, sima, fényes; terde a szárnál rövidebb; végíze a szár hossza két harmadrészenek megfelel; a végiz tövéhez igen közel kapcsolódik a gömbalaku, sima, fényes, vörössárga gyűjtő, melynek kapcsolata igen vékony, nyújtványa ellenben, melyet alul és kisse előirányozottan visel, vaskos, szélein kisse fogacsos.

Mertekek: ♂	Törzs	8	$\frac{m}{m}$ ebből
	fej mell	3	»
	I lábpár	9	»
	II »	7.8	»
	III »	6	»
	IV »	9.4	»

E szép faj amál nevezetesebb, a minél bizonyosabb, hogy a Harpactes-nemnek csak igen kevés (2) képviselője ismeretes. Mint nyári alakot találtam Orsován az Allion hegyen és a Mragonya-völgyben (Ogradena mellett) kéreg alatt finom burkokba beszöve; igen virgocz és gyors mozgású állat. A faj új volta, különösen a him tapogatójánál fogva, szembeszökő. Dr. THORELL és Dr. KOCH a faj új voltát elismerték.

SUBORDO IV. ALREND.

T E R R I T E L A R I A E

(terra = föld; tela = szövet.)

FÖLDBESZÖVŐK.

A Földbeszövők legállandóbb és legbiztosabb jellege az, hogy a rágók csipőkörme le- és hátrafele, tehát a rágótő alsó hossz tengelyébe esukodik, a rágópár karmai tehát egyenközü fekvésben vannak, holott a többi alrendeknél, fogómódra működve, szemközt allanak. Ezenkívül általánosjelleg az, hogy a légzőres mellett még mellek stigmaik is vannak (innen: Quadripulmonaires, Duges).

Az alrendnek eddig ismert magyar alakjainál a fonók száma csak négy: a felső pár hosszabb az alsónál.

Ezen alrendnél a megtelepedés a tetőpontra hág, a mint ezt a szelepszerű ajtóval ellátott lakok bizonyítják, melyek egyszersmind azt is tudatják velünk, hogy az így lakó alakok tevékenysége egész életökön át állandóan egy bizonyos ponthoz van kötve.

Mínthogy ezen alrend a forró égöv alatt éri el alakgazdagságának tetőpontját, a pókműködés rendszerében való helye, működésének jellege csak akkor lesz megállapítható, a mikor sikerülni fog, a forró égövben tenyésző alakokon kívül, az életmódra vonatkozó adatokkal is birni. Ettől még távol allunk.

De azt láthatjuk, hogy a lakhely állandósítása, már a csőszövőknél kezdődve, itt, a Földbeszövőknél éri el tetőpontját: s ha az átmenetekre — bár sejtelemszerűen is — következtetni akarunk, úgy a következő alrendhez (Keszegjárók — Laterigradae) kell közelednünk. Bizonyos Keszegjárók, jelesen a mi Húnyópókunk (Micrommata), főleg pedig az Európában élő Heteropoda nemnek képviselői, alakilag közelednek a Földbeszövők némely alakjaihoz és viszont úgy látszik, hogy a Földbeszövők alrendjében a megtelepedettség lassan átmenyen az egyszerűbb lakásra, végre éppen csak leshelyre, mi azután szintén átmenetet képezne a még némileg megtelepedett Keszegjárókhoz.

FAM. I. CSALÁD. THERAPHOSIDAE. CSŐZÖK. MINIRSPINNEN.

SUBFAM. I. ALCSALÁD. ATYPINAE. TORZOK. KOPFSPINNEN.

(ἄτυπος = alaktalan, elütő, mintegy torzképe a rendes alkatnak; a fejrésről.)

GEN. 1. NEM. ATYPUS. LATR.

(vide: Atypinae.)

Syn. 1804. LATREILLE «Nouv. Dict. d'Hist. Nat.» XXIV. p. 133.

Vide: THORELL «On europ. Spid.» pag. 165.

AUSSERER «Beitr. z. K. der Ar. Fam. der Territ. p. 15. (131.)

THORELL «Remarks» p. 604.

A fejmell fejerésze magasra kiemelkedik. Nyolcz szem. A rágók töve kiszélesedett, a tapogatók e kiszélesedésbe — tehát oldalt csuklódnak. Az állkapcsok oly hosszúk mint a fejmell; terdszerűen kidagadó tövel. A bordáskörmök egy sorban álló bordákkal. A végtest felületén egy nyelvalakú, bőrszerű térese. A szerzők szerint ásó alakok, melyek lakaöveiket végig kikárpítozzák (magam csak barangoló példányt ismerek).

SPEC. 1. FAJ. ATYPUS PICEUS. (SULZER.) SZÜRKÖS TORZPÓK. PECH KOPFSPINNE.

(piceus = szurokszínű.)

Syn. 1776. *Aranca picea* SULZER «Gesch. der Ins.» p. 254.

Vide: THORELL «Remarks» p. 415.

(IX-dik tábla, 203 [^] felülről, nagyítva; 204 ugyanannak törzse oldalról tekintve.)

[^] Szurokfekete. Lábai, jelesen a csipők, valamivel világosabbak.

A fejmell elől szélesebb mint hátul; fejerésze magasra kiemelkedik s e kiemelkedésen áll a kisebb, kissé előrehajló dudorodás, a melyen a két nagy középszem helyezkedik el; mellrésze lelapított, közepén — szerű mély hátgödörrel, melytől a lábak felé tartó barázdák indulnak. Az egész felület szurokfenyű és finoman szemcses. A mellvért pajzsalakú, gyéren szőrös, szélein hat sekély, de élesszelű gödörrel. A rágók tövükön szerfelett kivastagodva, felülről tekintve hengereknek, oldalról tekintve körtvealakúak; csipőkörműk oly hosszú mint tövük; becsapórésük öt fogat mutat, melyek közül a két hátsó a többinél nagyobb. Az állkapcsok keskenyek, tövük kivastagodott; az aljuk széles alapon háromszögletes, aránylag kicsiny, a mell-

¹ A Territeliák genericus beosztására nézve AUSSERER műve irányadó, a mint ezt THORELL tanár is elismeri. (Lásd: THORELL «Rem. on Synonyms» p. 601.)

vertől csak egy sekely horpadás (nem csukló) választja el. A tapogatók hosszuk és erősek, a száríz nem hosszabb a terdiznél s vékony alappal indulva, bunkósan kivastagodik; szőrös; a pikkely a szárnál sokkal rövidebb, kanálalakú, szőrös; nemzőszerve egy barnássárga, sima, fényes felgömb, sötétebb köresikkel és bubján egy rövid, csőszzerű nyujtványnyal. A lábak vastak, módosan szőrösek, keves, gyenge tüskeekkel. A végtest egészben karcos, a fejmellet keskenyebb, hátul palaczkyszerűen kiszélesedik; hátfele elejétől kezdve s a közepén túlig nyúlva egy nyelvalakú, harántirányú, bőros terese terjed el. A hat fonó közül a felső pár a leghosszabb, negyzű és furkszerűen kiálló.

A szem kettős-csoportban áll; a dudorán fekvő két szem, mely középsőnek bevalik, kerek és a többivel nagyobb, oly távolságra egymástól, mely egy szemátmérő kétszeresének megfelel; a két alsó oldalszem, hosszukörded s nagyobb átmérője nem esekelyebb egy középszem átmérőjénél; a mögötte álló két hátsó szem hosszukörded, hátsó végevel egymásra dőlő; a külső szem szorosan, a belső kevésbé illeszkedik az oldalszemhez, mely résüntősen áll. (II. köt. V. t. 122. a).

Mertekek: ♂ Torzs a ragokkal	16 $\frac{m}{mm}$ ebből
fejmellet	10 „
IV lábpar	15 „

A lábak hosszaránya. 4, 1, 2, 3.

♀ Elöttem ismeretlen.

A szerzők szerint régi falakba vajnyílúkait (AUSSENER és többen), Moggridge «Harvesting Ants and Trap-Door Spiders Suppl. p. 180, plate XIII, Simon észleletei nyomán adja a lakás leírását és rajzát. E szerint az *Atypus* különböző talajon 15-20 $\frac{cm}{mm}$ mely csövet váj, ezt finoman és sűrűn kikárpítozza; a föld felett töleser alakban folytatja, e tölesert füvekkel stb. megtámasztja. E lukásokat magam is gyakrabban találtam Kolozsvár, Mező-Záh, Torda és Budapest vidéken.

Példányomat 1868-dik évi júniusban Erdélyben, Mező-Záhon találtam, a mint az Ugron udvar egyik útján áthaladt. A példány az erdélyi múzeum gyűjteményet díszíti.

THORELL tanár, az idézett helyen, kritikai vizsgálódása alapján az AUSSENER által megkülönböztetett *A. anachoreta* L. KOCH ¹ fajt, az általam leírt *A. piceus* fajjal azonosítja s ide vonja többek között a BLACKWALL leírta *A. Sulzeri* ² is.

Itt azt kívánom kimutatni, hogy a szemek állása, a mennyiben a relatív távolságra vonatkozik, a leírások és rajzok szerint valóban nagy különbségeket mutat, meg pedig:

Atypus Sulzeri BLACKWALL: . . . A két nagy középszem egy szem átmérőnyire egymástól; a két nagyobb oldalszem, több mint egy középszem — fél átmérőnyire a középszemtől és hosszukörded; a két két hátsó szem kerek, kicsiny, szemátmérőjüknek megfelelő távolságra egymástól.

Atypus piceus AUSSENER: . . . a két nagy középszem legalább három felátmérőnyire (radius) egymástól és meg emel is távolabbra az alsó nagyobb oldalszemtől.

Atypus anachoreta AUSSENER: (L. KOCH) a két nagy középszem alig szemátmérőnyire egymástól és majdnem éppen akkora távolságra a két nagyobb oldalszemtől.

Atypus piceus THORELL (l. c.): a két nagy középszem nem egészen 1½ átmérőnyire egymástól és hasonló távolságra a két nagyobb oldalszemtől.

Atypus piceus mihli: a két nagy középszem két átmérőnyire egymástól s alig egy átmérőnyire az oldalszemektől.

Ezekből kitűnik, hogy a közep- és oldalszemek közötti távolságra nevezve *Atypus piceus* AUSSENER közel egyenlő az *Atypus piceus* THORELL-lel, t. i. AUSSENER három rádiust, THORELL másfél átmérőt mond; az *Atypus Sulzeri* BLACKWALL pedig egyenlő az *Atypus anachoreta* Aussererrel, t. i. BLACKWALL a két közep-

Lásd: AUSSENER «Beiträge zur Kenntn. etc. der Territelariae» pag. 17 (133).

BLACKWALL «A hist. of. the Spiders of Cr. Britain etc.» Pl. I, fig. 1 e.

szemet egy szemátmerőnyi távolságra rajzolja, AUSSERER «alig» ennyire mondja; a mi fajunk, melynek középszemei, igen esekely híjával, két átmerőnyire állanak egymástól, magára maradna.

THORELL tanár ez eltérések között átmeneteket gyanít. Én részemről csak azt kívánom megjegyezni, hogy a szemek relativ távolságai, a nemző részek mellett, a leghívebb és legállhatatosabb jellegeket szolgáltatják s egy, a kimutatotthoz hasonló ingadozással egy faj keretében nehezen tudok megbarátkozni s csak nehezen határozottan el magamat arra, hogy a vizsgált magyar példányt *Atypus piceus*nak mondom. Azonban beismerem azt is, hogy az eldöntésre nem érzek hivatottságot, mert az a meggyőződéseim hogy ez csak a típusok összehasonlító felülvizsgálata nem pedig az irodalom segítségével válik lehetőséggé.

SUBF. II. ALCALAD. TAPINOCEPHALL. AKNÁSZOK. MINIRSPINNEN.

(*ταπεινός* = lapos, *κεφαλή* = fej; a fejről; mint ellentétje az *Atypinae* alcsaládnak.)

GEN. 2. NEM. NEMESIA. SAV. ET AUD.

(*Νέμεσις* = Mythol. név.)

Syn. 1825. SAVIGNY ET AUDUIN «Descr. de l'Égypt.» II. XXII, p. 302.

Vide: THORELL «Remarks» p. 604. et «On europ. Spid.» p. 166.

A rágók végén egy öt fogú gereblye. A hátgödör — forma. A fej mell fejezete nem magaslik ki. A bordás körmökön a bordák két sorban állanak. A tapogatók az állkapcsok csücsébe csuklódnak. A szemek egy közös dutorodáson, sűrű csoportosításban állanak. Vájó alakok, a melyek finoman kikárpitozott 8—10 $\frac{m}{m}$ átmerőjű csöveket vájva, ezeket egy földtörmelekekből összeszőtt és nemezpánton járó ajtócskával zárják be, mely a csöbe szelepszzerű pontossággal beleillik.

SPEC. 1. FAJ. NEMESIA PANNONICA. N. SP. MAGYAR AKNÁSZPÓK. UNGARISCH MINIRSP.

VIII-dik tábla, 175, *a* szemesoport, *b* előláb, *c* bordáskarom, *d* ♂ tapogatója oldalról, *e* mérték.

♂ Rófavöröses, de egészben inkább a sárgásba húzó színezettel.

Fejmelle meglehetősen csücsös szívalakú, kis fejrészszel, — szerű hátgödörrel; fejezete oldalbarazdak által jól elválasztva; a hátgödörből a lábak fekvéséhez alkalmazott, jól követhető barázdák vonulnak; oldalról tekintve a hátvonal vízszintes, a gödör táján behorpasztott, a gödörön túl ívesen lehanyatló. A mellvert körded, módosan domború, sárgavörös, sűrű, de nem bozontos, barnás szőrözettel. A rágók az első lábpár czombjánál sokkal gyengébbek, oly hosszúk, mint az első lábpár másodvégze, párhuzamosak, végök fele kefeszerűen, sárga-vörösen szőrösök, legvégökön öt hosszúcska, vékony, gereblyeszerűen előre álló foggal; oldalról tekintve kissé előreirányzottak és igen gyengén ívesek; csipőkörmük szép barnásvörös, erős, és tövükkel nem rövidebb; hátrafelé beesapódó. Az állkapcsok egészen csipőjellegűek, belső elükön rojtosan-szőrösök, vörössárgák; az alajk kicsiny, felkerek. A lábak hosszúk, erősek, végök vékonyodók, fegyverzetek igen hatalmas. A czombok felületén 5—6 tüske; az első lábpár szára tetemesen vastagodott, alfele végén egy hatalmas előre irányozott s felfelé görbülő tövissel, mögötte meg két pár és oldalt meg két-két tövissel; a második lábpár száranak alfo felén elől 3, ezután meg két pár tövis; a harmadik lábpáren három pár, a negyedik páren szintén három pár tövis; a harmadik lábpár száran azonkívül meg a felületén és oldalt is, a negyedikén csak oldalt állnak tüskék. A másodvégzek köröskörül sűrűn tüskések, az elsődvégzek valamennyi lábön fegyvertelenek; az első két lábpár talpkefével, mely a másodvégzre is atmegyen.

A végtest vörössárga; megfekvő, rovid, aranyos-fenyves szőrozete közül bőven allanak ki a barnás, erős sertek. A negy fonó közül a felső pár erős, hengeres, ket izű, a csücsiz rövidke; az alsó pár igen kicsiny és vekony, alig feltünő.

A szemek egy közös, barnás dudoron allanak. A ket középső olyan nagy, mint a ket alsó oldalszem, a többi szem kisebb, a ket középső szemátmerőnyire egymástól s kevesebbre mint ennyire az oldal-szemektől is; e négy szem hajlása olyan, hogy egy a középszemek alatt huzott egyenes vonal valamivel az oldalszemek felett menne el; a hátsó oldalszem hosszkörded, körülbelül kisebb átmerője-nek megfelelő távolságra az alsó oldalszemtől, a hátsó középső szem kerek, az alsó középszemtől körülbelül félátmerőnyire, a hátsó oldalszemmel pedig majdnem érintkezik; az alsó oldalszemek annyira a homlok szélétől, a mennyi a szemesoport magassága.

A tapogató lábszerű, erős; czombize felületének a végen öt tüske; szárize felületének a leg-csücsán három tüske, mely a rágó gereblyéhez hasonló alkotású s valószínűleg rendeltetésű is; a végiz inkább iz mint pikkely, igen rövid, a száriznek alig harmadreszet tevő, felületen, elől 8—10 rövid tüskevel fegyverzett; nemzőszerve függelékes, hagymaalakú, a vastag véggel egy rövid nyelecske által a végizzel összekötve; hosszú, igen finoman kifutó csücsesal.

Mertekek: ♀ Törzs	10 $\frac{m}{m}$ ebből
fejmell	5 "
rágó	2·4 "
I lábpár	12·5 "
II "	11·5 "
III "	10·6 "
IV "	16 "

A bordáskormók kettős bordazata már eles nagyítóval is észrevehető; a bordák szamat az első lábpáron, a kámpó nélkül, nyolczig birtan megszámlálni.

Életmódját nem ismerem, mert az előttem fekvő példányt Zimony mellett egy gyaloguton talaltam s minden igyekezetem, a melyet több példány felfedezesere fordítottam, az idő rövidsege miatt kárba ment.

A Theraphosinák legészakibb pontja eddig Wippach volt Görz mellett (lásd AUSSERER sub *Nemesia caementaria*), magyar földön meg továbbra is haladnak eszak fele (lásd a következő fajt).



SPEC. 2. FAJ. *NEMESIA SAUVAGESII* (DORTH.) SAUVAGES A. SAUVAGES M.

(Abbé Sauvages tiszteletére, ki első irt e formákról.)

Syn. 1794. *Aranca Sauvagesii* DORTHEZ «Observ. on the stucture and ocon. of some curious spec. of Aran. Transact.»
SIN. Soc. II. p. 19.

Vide: THORELL «Remarks» pag. 495.

AUSSERER l. c. p. 50 (166).

♀ juvenis. Agyagsárgas. Előtesten a mellresz elmosódva sötetebb, a fejrsz ekalakban világosabb. A vegtest felületének elején egy nyársalakú barnás csik, a fonók felett ket  szerű barnás foltpár egymás-után állva. A fejmell nyújtott, fejreszében csak módosan szűkülő, hátrése — alakú, mely: a fejreszt elválasztó barázdák és azok, a melyek a hátgödörből a lábak fele tartanak, igen tetemesek; az egész hátfel kissé gerinczesen kiemelkedő; oldalról tekintve, a fejrsz a hátgödörből kissé ívesen kiemelkedő. A mellvert sárgás, szőrös, pajzsalakú, elől kevésbé keskenyebb, mint a harmadik csipőpár táján, a végen  szerűen végződik. A rágók szemnyes barnássárgák, az első lábpár czombjánál sokkal vastagabbak, ugyanennek másodvégizénél sokkal hosszabbak, végökön mindenik fel négy erősebb es hat valamivel gyengebb, sűrűn

álló gereblyefoggal; azonkívül kefeszerűen szőrosek; oldalról tekintve ivesen előre szokók; csipőkormuk vörösbarna, tövén erős, a rágó tövénél alig rövidebb. Az állkapcsok egészen csipőjellegűek s szőrözetre nézve sem különböznek a csipőktől, csak belső élük rojtosan-szőrös; az alajk kicsiny, félkörű. A tapogató, az állkapcsok végebe csuklódva, lábszerű; végíze tömötten szőrös, a szarnál valamivel rövidebb és csak felig oly hosszú, mint a szár és terd együttve; az utóbbi két iz együttve oly hosszú, mint a czombiz, a száríz alsó felén néhány hosszú tüske. A lábak vaskosak, végök felé alig vékonyodók, sárgások fekete szőrözettel; az első pár szárán, alul, három tüske, a másodvegyzen három pár tüske; az első és második (az utóbbi AUSSERER szerint, mert az en példányomon a második pár csónka) pár végizei kivehető talpkéfével.

A végtest hosszukás-hengeres, a fent jelzett rajzzal. A fonók közül a felső pár vastag, hengeres, hosszú, ketizű; a végiz az alapíznek fele hosszát felülmúlja.

A szemsort egy közös, barnás emelkedesen áll; az alsó sor negy szeme sötét, a hátsó sor elenken opalizáló; az alsó sor középszemei kerek, nagyok, oldalszemei hossztojásdadok, valamivel kisebbek, a sor oly erősen behajló, hogy a középszemek elé képzelt egyenes vonal az alsó oldalszemeket nem érintene, — e sor szemei majdnem egyenlő távolságra egymástól, mely távolság egy középszem felátmérőljének körülbelől megfelel; — a hátsó sor szemei közül kettő-kettő a megfelelő oldalon párosan együtt áll, a két pár akkora távolságra egymástól, a mekkora az alsó sor két középsőjének a terfogata (haránt értve), e hátsó sor oldalszemei hossztojásdadok, a középsők kerek, valamennyi sokkal kisebb, mint az alsó soréi; a hátsó oldalszem az alsó oldalszemtől kisebb átmerőjének megfelelő távolságra, a hátsó középső az alsó középsőtől felátmérőljének alig megfelelő távolságra áll. Felig fejlett példányomon a nemzőrész még nem fejlődött ki.

Mertekek ? Torzs	8	$\frac{m}{m}$ ebből
fej mell	3	„
állkapcsok	2	„
I lámpár	7.3	„
IV „	9.3	„

AUSSERER es saját, kulföldön tett tapasztalásaim szerint a kifejlődött állat törzhossza neha $20 \frac{m}{m}$.
♂ Elöttem ismeretlen.

E felette érdekes fajt Pável János a magyar n. muzeum gyűjtője gyűjte Buda környéken (a lel hely pontja nincs megjelölve) s a példány a muzeum birtokában van. Buda lenne tehát ez idő szerint legészakibb pontja a Theraphosoidák elterjedésének. A Nemesia Sauvagesii Európában mint delnyugoti alak szerepelt; magam Franciaországból (Montpellier) es Corfu szigetéről ismerem s lakásának a leírását Montpellierből származó minta szerint adom. A földbe mélyen behatoló es csaváros csőszája $12 \frac{m}{m}$ átmerőjű; az egész cső rendkívül tömött, selyemfényű, sárgásfehér nemezzel van kikárpitozva, ugy, hogy beomlása lehetetlen; a cső szájának egyik oldalán e nemez $8 \frac{m}{m}$ szélességben kifele folytatódik s a pántot képezi, a mely által a befele domborn, $3-4 \frac{m}{m}$ vastagságú kerek ajtócska a cső szelevel összefügg. E pantszövet ugy van készítve, hogy az ajtócska a függőleges irányon csak valamivel tul-kifele nyitható, tehát nyitva állhat a nélkül, hogy kidűlné, ellenben tökéletesen bezárható (lásd, I. köt. III. t. 59.). Az ajtócska homorúságával es illetőleg szélével szelep- (ventil) szerű pontossággal illik a cső szájába, lapos felülete legpontosabb utanzata a környezetnek s így bezárt állapotban csak a leggyakorlottabb szem veheti észre. Az ajtócska csupa apró földmormosákból van összeszőve es tapasztva; belső oldala finom nemezzel kárpitozott. Veszély idejében a pók hirtelenül bezárja lakása ajtaját, az ajtó kárpitozásába vágja bordás körmeit s oly erővel tartja az ajtót, hogy csak rombolás árán lehet kinyitni. Montpellier mellett, a hol kopár talajba is ássa csőveit, az ajtó felülete is kopár, Corfuban, mohos helyeken is található s ott az ajtó felületébe is mohlevelek vannak beszőve. A csövet az állkapcsaim álló gereblyével ássa.

Reménylem, hogy a gondos kutatás a pókkal együtt annak lakását is felfedezi hazánk területén.

SECTIO II. OSZTÁLY.

DIOTRICAЕ. ÜLDÖZÖK.

($\delta\acute{\iota}\omega$ - $\delta\acute{\iota}\omega\tilde{\xi}\iota\varsigma$ = üldözés.)

SUBORDO V. ALREND.

L A T E R I G R A D A E

(latus = oldal, gradus = lépés.)

KESZEGJÁRÓK.

A keszegjárókat jellemző jegy az, hogy lábaik láthatólag oldalt irányulnak, úgyszólván vízszintesen elterülnek, terdek tehát nem felállók, hanem lelapulók. A Hunyópókna (Micrommata) a terdek meg némileg emelkednek ugyan, de a lábak mégis félreismerhetetlenül «oldalas» irányban terjednek szét.

A lábalkotás sajátosságával kapcsolatos, vagy épen belőle folyik azon tulajdonság, hogy e pókok előre, hátra, s bármely oldal felé haladni képesek.

A szöves-fonás tulajdonsága tehát itt már érezhetőleg a háttérbe kezd lépni, noha itt még kifejlett kettős karomrendszerrel találkozunk, az életnek már nem főfeltetele, hanem csak kisegítő eszköze. A súly a *mozgás sajátlagosságára* esik.

A *nyugró* predához lopva közeledni, azt a fekvő, sarló módra elterülő első láppárral átkarolni: ez a keszegjárók módja, evvel járuhnak hozzá a pókműködés rendszeréhez.

Itt is találunk meg lakhelyeket (lásd. Diaea, ált. rész III. t. 61), de az alakok legtöbbször már beéri oly helylyel is, a minőt a véletlen szolgáltat, tehát már bizonyos mértékben szabadon barangolva intézi támadásait, gyakorolja a hatást.

Működésében igen szabad, mert helyről helyre közlekedve (vándorlás, fonalröpítés) legott hozzáláthat a táplálkozáshoz.

Az elterjedésre nézve legfőképen az aljukban tartózkodnak s csak kevés alak emelkedik a fa tenyészvonalára fölé.¹

A nemzedékek sorát, úgy látszik, áttelelő alakok tartják fenn, minthogy bizonyos, hogy az anyák peteik kikelését bevárják.

¹ PAVESI «Ragni del Cantone Ticino etc.» p. 146, a Thanatus arenarius Thor. fajt 2200 méter magasságból ismeri. E faj nálunk nem találtatott.

FAMIL. I. CSALÁD. HETEROPODOIDAE. LÁBASOK. FUSSSPINNEN.

(ἑτεροδος -- különböző, ποὺς = láb; a második család ellentétjére vonatkozik.)

GEN. 1. NEM. MICROMMATA. LATR.

(μικρός = apró, ὄμμα = szem; a szemek apróságáról.)

Syn. 1804. LATREILLE «Nouv. Dict. d'Histoire Naturelle» XXIV, p. 135 (ad part.).

Vide: THORELL «Remarks on Syd.» p. 606 et «On Europ. Spid.» p. 175.

Minden szemsor négy-négy szemből áll; az alsó sor könnyedén kihajló, a hátsó könnyedén behajló; a két sor négy középszeme egy, előre fele szűkülő trapezet alkot. Az alsó sor középszemei valamivel kisebb távolságra a homlok szélétől, mint a hátsó sor középszemeitől. Az állkapesok egyenesek, párhuzamosak. A lábak nem terülnek el egészen oldalt-laposan. Csak két bordásköröm; alatta egy, végeiken vastagított hosszú szőrökből álló ecset. Gyors élénk színű alak, mely leginkább a buja növényzetben tartózkodik. A bordás körmök a Micr. virescens első lábán nyújtott alakúak, hirtelenül lehajló kampóval, alakjuk és berendezésük szerint igen hasonlítanak egy ritka, u. n.: frizirfesűhöz; a talpecsét karcsú, kevésbé vastagított szőrökből áll (lásd II. köt. V. tábl. 124. b).

SPEC. 1. FAJ. MICROMMATA VIRESCENS. (CL.). ZÖLDELŐ HÜNYÓPÓK. GRÜNENDE ZWINKERSP.

(virescens = zöldelő; ♀ alapszínéről.)

Syn. 1757. Aranea virescens CLERCK «Aran. Suec.» p. 138. ♀ Idem ibidem: Araneus roseus p. 137 ♂.

Vide: THORELL «Remarks» p. 227.

♀ Szép halavány-smaragdzöld; a végtest felületének elején egy sötétebb, nyársalakú közepesikkal, mely a végtest hosszának a felét eléri (borszeszben az egész állat halaványsárgává lesz.).

A fej mell elég domború, fejerésze elég széles, a mellrészről jól elválasztott, rövid szőrökkel borított; a hátrés szűk; a lábak felé vezető barázdák jól láthatók; a homlok majdnem egyenesen elvágott; oldalról tekintve, a hátvonallal laposan íves, a hátrésen túl lehajló. A mellvért szivalakú, széleim igen sekély horpadásokkal; zöld. A rágók zöldek, vöröses csipőkörömmel, az első lábpár czombjánál nem vékonyabbak, oly hosszúk, mint a lábpár elsődvégize, gyéren szőrösek; függőlegesek. Az állkapesok szélesek, párhuzamosak, elkerekített véggel; az alajk felkerek, az állkapesok felehosszát nem éri el. A tapogató zöld, végze oly hosszú, mint a szár a térdel együttvéve; a czombnál nem rövidebb; valamennyi ízén néhány tüske. A lábak hosszúk, hosszúságra és vastagságra nem igen elütők, valamennyi végizeken a talpkéfe megvan; valamennyi szár és másodvégiz, alul, kevés megfekvő tüskevel fegyverzett; a bordáskörmök tökéletesen fésűalakúak, számos (12?) bordával; az ecset, melynek szőrei tövükön vékonyak, végükön egyszerűen vastagodók, a bordás körmök végét eléri.

A végtest csücsösen hossztojásdad, módosan szőrös; a fonók igen rövidek.

Az alsó szemsor könnyedén kihajló, oldalszemei nagyobbak a középsőknél s közelebb állanak ezekhez, mint azok egymáshoz; a hátsó sor behajló, az alsónál hosszabb, szemei egyenlőek; a középsők kevésbé távolabbra egymástól, mint az oldalszemektől; a két sor oldalszemei közötti távolság nem nagyobb annál, a mely a hátsó sor oldalszemei és középsői között létezik. Valamennyi szem fekete, apró.

A zár egy vörösbarnás a nyelecske felé szívyszerűen kinnetszett (∞) tércse, melyben a kimetszés és

illetőleg az általa alakított két öbölhöz kepest többletű ránczok mutatkoznak, melyek a légzőrés felett egy rövidke, nyelvalaku dudort is környeznek.

Mertekek : ♀ Törzs	13—15	$\frac{m}{m}$ ebből
fej mell	5	»
I lábpár	17.4	»
II » 	18	»
III » 	15	»
IV » 	18	»

♂ Kisebb, karesubb; aránylag hosszabb lábakkal, másszínű végtesttel; a végtest felülete élénk citromsárga, felülete közepén s egész hosszúságán végig egy élénk-haragos vörös csík, oldalai szintén vörösek. Fejmelle a nőstényenél domborubb, a fej kevésbé elválasztott. A lábak legesücsa fekete. A tapogató erős; szára a térdnél hosszabb és felülete végén, kissé kifelé-oldalt, egy erős, hosszú, tövén göcsösen vastagodó, könnyedén hajlott tövissel fegyverzett, e tövis a szárnál csak kevéssel rövidebb; a pikkely kalánalakú, bőven szőrös; a nemzőszerv, alulról tekintve, egy felgömbölyű vörösbarna gyűjtőt mutat, a melyből egy erős, egyenetlenül csatornás, hegyes, kosszarvszerűen csavarodott embolus meredezik, melynek hegyes vége a pikkely csücsa alól lefele irányul.

Mertekek : ♀ Törzs	9.4	$\frac{m}{m}$ ebből
fej mell	4.4	»
I lábpár	17	»
II » 	17	»
III » 	14.6	»
IV » 	18	»

Tavaszi és nyári alak, mely a hegységbe is felhatol s buja növényzettel, bokrokkal borított helyeken nem ritka; gyors futó, mely prédáját meglopja és szökéssel ejti hatalmába, magas növényekről gyorsan leugrik, a nélkül, hogy ugrását fonállal biztosítaná. Kora tavasszal kertekben a gyümölcsfák tövén heverő lomb alatt gyakori.

Ismerem, erdélyi részekből: Kolozsvárról, Szász-Vesszősről, Mező-Záhról, Bakánbányáról, Nagy-Szebenből, (Sill és Bergleiter-gyűjtemény, Seidlitz jegyzéke); magyar részekből: Doroszlóról, Pancsováról, Orsováról, Ogradena (Veteráni barlang tája), Bázinsról, Tokajból, Rakamazról, Alsó-Hámorból (Borsod), Csorba (Liptó, a «csorbai tó környékén»), Nagy-Váradról (Muz. gy. Moesáry), Pécsről (Muz. gy. Frivaldszky és Pável), Budáról (Muz. gy. Pável), «Felvidek» jelzővel (Muz. gy. Kovács Gyula).

Jegyzés. Az a faj, mely Koch C.-nel «Die Arachniden» XII. p. 90. Taf. CCCCXVII. fig. 1021. «Sparassus ornatus» név alatt szerepel, s a melyet mint fajt és «Sparassust» THORELL tanár (Remarks on Syn. pag. 228.) kétségbe von, Erdélyben, Kolozsvár környékén nem ritka. Ennek sárgavörös pettyekkel behintett végteste egy széles, párhuzamos, almazöldes csíkot visel finom vörös szegélylyel és vörös pettyegetéssel. Ez az alak folytonosan csak mint éretlen him fordult elő, szemállításánál s egyéb jegyeinél fogva egy tökéletes Micrommata s én azt tapasztalom, hogy a M. virescensnek éretlen himje.

GEN. 2. NEM. PHILODROMUS. WALCKENAER.

(φιλέω = szeretni, δρόμος = futás; a mozgás sebességéről.)

Syn. 1825. WALCKENAER «Faun. Franc.» pag. 86 (ad part).

Vide: THORELL «On europ. Spid.» pag. 180.

Mind a két szemsor egyformán, könnyedén kihajló; a két sor oldalszeméi közötti távolság nem kisebb annál, a mely az alsó és hátsó középsők között letezik. A végtest lapított, visszájára tojásdad, néha közel ötszögű.

Az alsó szemsor középszeméi távolabbra esnek a homlok széletől, mint a hátsó középszemekről.

Az állkapcsok összehajlók. A lábvégek esetei elkerekített, szélesen-lapiczkás végű szőrökből valók. A lábak hosszaránya: 2, 1, 4, 3, vagy 2, 1, 3, 4, a lábak nem egészen laposan-oldalt elterülők.

Gyors, ügyes futásu alakok, amelyek mindenek előtt a növényzet leveleit kedvelik s azokra lapulva lesik prédájukat.

A bordáskörmök rövidek, kampósak, elég hosszú, kissé ritkásan álló bordákkal. (lásd. II. köt. V. tabl. 125. b.).

SPEC. 1. FAJ. PHILODROMUS AUREOLUS. (CL.). ARANYOS KENGYELFUTÓPÓK. GOLDIGE LÄUFERSP.


(aureolus = aranyos; a pikkelyek aranyos ragyogásáról.)

Syn. 1757. *Araneus aureolus* CLERCK «Aran. Suec.» p. 133.

Vide: THORELL «Remarks» p. 264.

♀ Húsvörösös, ezüstösen és aranyosan fénylő pikkelyekből alkotott rajzokkal, melyek az előtesten egy széles középszalagból, a végtesten egy nyársalakú közepesikből és az oldalokba nyomuló ágrajzokból állnak.

A fejmell vaskos, elég domború, hosszúságánál nem szélesebb, csücsával előrefele tojásdad s oldalról tekintve hirtvonala vízszintesen egyenes, hátul hirtelenül és meredeken lecsapott, ezüstösen és aranyosan fénylő ágas pikkelyekkel egészen borítva, melyek a mellrész oldalaiiban ritkábbak s a barnás-húsvörös színt nem fedik el. A mellvért háromszögletesen pajzsalakú, húsvörösös, közepén pikkelyekkel, szélein elálló szőrökkel. A rágók, előlről tekintve, párhuzamosak, sárgáshúsvörösek, az első lábpair első-végizénél rövidebbek, oldalról tekintve ekalakuak, feheres szőrökkel és sertekkel eléggé borítottak. Az állkapcsok haránt benyomással elől elkerekítve egymásra dőlnek, sertekkel és szőrökkel elegyesen és gyéren fedve; az aljuk nyelvalakú, az állkapcsok hosszának felét bőven eléri. A tapogató sárga, aranyos pikkelyekkel elegyesen szőrös, s minden íz végén köröskörül néhány tüskével fegyverzett; végize oly hosszú mint a térd és szár együttvéve. A lábak hosszúk, oldalra elterülve nem lapulnak le egészen, halvány húsvörösek aranyos-pikkelyesek; a száruk végei úgy a lábvégizek is halaványan gyűrűsek; az elsődvégizek kivételével, valamennyi lábuk valamennyi íze gyéren tüskés; az első lábpair szárán, alul, három tüskepár.

E végtest megfordítva tojásdad, elől keskenyebb, mint hossza második feleiben, a vége azonban csücsbe végződik; sok aranyos és ezüstös fényű pikkelyből alakult rajzokkal, melyek a felület elején egy nyárs- vagy ekalakú, hegyes, hússzínű csíkot szegélyeznek, az oldalukba rendszeren két-két feltünőbb csíkot bocsátanak, az ekalakú csík alatt pedig több egymásra dülő, a fonók felé esökkenő, résüntös vonalpárokat () létesítenek. A has közepén egy hússzínű középszalag.

Mind a két szemsor könnyedén és egyenletesen kihajló, a hátsó az alsónál sokkal hosszabb; a szemek majdnem egyenlők; a hátsó sor oldalszemei egy-egy kis dudorra állítottak. Az alsó sor középsői valamivel távolabbra egymástól mint az oldalszemektől, a köztük és a homlok széle közötti tér sokkal nagyobb, mint az, a mely őket a hátsó középsőktől elválasztja, a hátsó sor szemei körülbelül egyforma távolságra, a középsők mégis valamivel távolabbra egymástól, a középsők az alsó középsőkkel egy előrefele szűkülő trapezben állanak, mely legnagyobb szélességénél nem magasabb; a két sor oldalszemei közötti távolság nem kisebb annál, a mely a hátsó és alsó középszemek között elterül.

A zár egy magasságánál szélesebb, vörösbarna, kissé domborodó, vesealakú terese, egyszerű egyszerű nyílással.

Mertekek: ♀ Törzs	9	$\frac{mm}{m}$ ebből
fejmell	3	»
I lábpair	12	»
II »	13.2	»
III »	10.6	»
IV »	10	»

Legtöbbször kisebb, törzhossza 5·5—6 $\frac{m}{m}$; I. lábpár: 9·5, II: 12, III: 9·5, IV: 8·7.

A lábak hosszaránya e szerint változó.

♂ Kisebb, karesübb, rajzai kevésbé élesek, fejmele majdnem kerek. A hátsó sor középszemei közötti ter észrevehetőleg nagyobb annál, a mely köztök s az oldalszemek között letezik. A tapogató elég hosszú és vaskosodó nyelvű, módosan bunkós; terden, száran és czombján egynehány tűske; szára nem, vagy alig hosszabb a terdnel, külső oldalának végén egy újszerű, karesű, tompa, sötétszínű nyujtványnyal, mely a szár felehosszanál rövidebb; a pikkely tojásdad-kanálalakú, elég domború és szőrös, barnás; nemzőszerve igen csekélyen kidomborodó, s alulról tekintve egy halpikkelyhez hasonló, vörösbarna lemezt mutat, mely a pikkely üret kitölti, elől egy keveset tátong.

Mertekek: nagyobb hím törzse	6·2	$\frac{m}{m}$
fejmele	3	"
I lábpár	14·8	"
kisebb ♂, törzs	4	"
I lábpár	11	"

Nyári alak, mely a verőfenyt kedveli; néha karokon, gyakrabban a fák derekán és leggyakrabban a fák és bokrok levelein lelapulva, lesve és lopakodva észlelhető; roppant gyors futású, veszély idején rendszeren a levelek aljára menekülve, ott egészen lelapul. Juniában a nőstény rendszeren az ernyők könyökeiben néha bogáncs bojtokban is zacsót sző, a melybe peteit lerakja s gondosan őrzi. A verőfenyven játszó apró legyeket lassan meglopja s hirtelenül megragadja; esését fonállal biztosítja; vakmerő támadó, mely olykor nálánál sokkal nagyobb rovarokat is legyőz.

Ismerem, erdélyi részekből: Kolozsvárról; magyar részekből: Doroszlóról, Pancsováról, Orsováról, Tokajból (legelők Rakamaz felé, az ott álló tölgyeken különösen nagy pedányok), S.-A.-Ujhelyről, az Alsó-Hámorból (Borsod), Selmecbányáról; a nemz. Múzeumban: Nagyváradról (Mocsáry), Pecsvidéke (Frivaldszky, Pável), Pest, (Frivaldszky), Ungvár (Vidra Ferd.), Dabas (Metelka).

SPEC. 2. FAJ. PHILODROMUS PELLAX. N. SP. CSALFA K. FRUGERISCHE L.

(pellax = csalfa; az ügyes rejtőzködésről.)

(VIII-dik tábla, 176, a szemesoport, b ♀ zárja.)

♀ Előteste halavany vörössárga; lábai halavany zöldessárgások, végteste halavany sárgásfehér. Az egész felület a lábakkal együtt, a nagyító alatt gyeren, mintegy szenporral behintett. A fejmele szív-alakú, szélesedő fejreszszel; közepe csikformára szélesen világosodó. A mellvert szivalaku, szemmyes fehér, mintegy szenporral behintett. A rágók s a szájszervek általában sárgásfehérek. A tapogató zöldessárgás, igen világos, végizen néhány sötét sertevel; végize nem hosszabb mint terde és szára együttveve. A lábak karesűk; czombjaik felületen kevés tűske, száraikon és a másodvégizeken, alul és oldalt is néhány karesű tűske. A végtest lapított, hosszukás, hosszának közepén a legszélesebb, hátul csúcsos.

Az alsó szemsor inkább, a hátsó kevésbé kihajló, a hátsó sokkal hosszabb; a két sor középsői egy előrefele szűkülő trapezbe elhelyezettek; az alsó oldalszemek a hátsó sor középsőivel egy hátrafele szűkülő trapezet alkotnak; a hátsó sor oldalszemei valamivel közelebb a középsőkhöz, mint a középsők egymáshoz.

A zár kicsiny, sötétes, hosszában egy osztólemezt által kette választva, az osztólemezt felső végén két elkerekített, picziny nyílás, alsó végén két hosszukás sötét dudor látható.

Mértekek: ♂ Torzs	5·2 $\frac{m}{m}$ ebből
fejmell	1·9 »
I lábpár	7·8 »
II »	10 »
III »	6·9 »
IV »	6·4 »

♂ Ismeretlen.

E faj Orsova mellett a Graczká-völgy feletti retek füvében fordult elő mint júniusi alak. Dr. THORELL tudósítása szerint az ő gyűjteményében is egy példánya van meg e fajnak, mely Svécziában gyűjtetett.


SPEC. 3. FAJ. PHILODROMUS POECILUS. (TH.). CZIFRA K. BUNTE L.

(*ποικίλος* = tarka, de furfangos is; a színre és a kéreggel való mimicrismusra czéloz.)

Syn. 1870—73. *Artanes*¹ *pocilus* THORELL «Remarks» p. 261.

♀ Sárgásszürke; tisztaszürke és fekete rajzokkal és foltokkal diszítve.

Fejmelle hosszúságánál szélesebb, a fejrész bubjával felálló, oldalról tekintve a hátvonala fejbübtől a nyelecskére meglehetősen meredeken lehanyatlik, a homlok kissé hátradülő, a fejrész sárgásszürke, barnásan mintegy freccsentve; a mellrész barnásszürke. A mellvért sárgás, kevés barnával, fényes, majdnem kerek. A rágók kicsinyek és véznák; barnással elegyítve sárgásak, oly hosszúk, mint az első lábpár első végize. Az állkapcsok sárgák, párhuzamosak; elől elkerekítve, végeikkel az alajk felett érintkeznek; az alajk hagymaalakú, töven egy állkapocsfelnél nem keskenyebb. A tapogató csontsárgás, barnafekete diszszel; czombja, alul és egész hosszában barnafekete, a többi íz ily színű gyűrűvel és foltocskákkal, végize oly hosszú, mint a térd és szár együttvéve. A lábak hosszúk, karcuk, oldalt elterülők, csontsárga, fehér és barnafekete színvegyülettel; az első és második pár czombjának alsó fele széles barnafekete hosszcsikkal; a többi rész és íz ily színű foltokkal és gyűrűkkel tarkázva; minden czomb felületén három-három, alapján barnás, egyébként fehér, felálló tüskével; az első lábpár szára alsófelen öt pár tüskével fegyverzett; a többi szár és második szintén tüskékkel fegyverzett.

A végtest lapos, majdnem ötszögletű, szürke, fehér, sárgás és barna-feketevel egyes színű s a színek úgy vegyítve, hogy  szerű sötét rajzok is képződnek; a mellett két tetemes ingödör is feltűnik; a has szürkés, oldalaiiban kevés barnás petytyel.

Az alsó szemsor kihajló, oldalszemei nagyobbak, nem egészen átmerőjük távolságára a középsőktől; a középsők távolabb egymástól, mint az oldalszemektől; a hátsó sor kevesebb kihajló, az alsónál hosszabb; oldalszemei nagyobbak, középsői nagyobbak az alsó középsőknél; szemei körülbelül egyenlő távolságra egymástól; a hátsó középsők az alsó középsőkkel egy előrefele szűkülő trapezben allanak, mely legnagyobb szélességénél magasabb; az alsó oldalszemek a hátsó középsőkkel egy hátrafele szűkülő trapezet alkotnak.

A zár egy M alakú kettős csatorna, mely szélességénél magasabb.

Mértekek: ♀ Törzs.	5·5—6 $\frac{m}{m}$ ebből
fejmell	2·3 »
I lábpár	8·8 »
II »	11 »
III »	10 »
IV »	7·3 »

♂ Sokkal kisebb, karcsubb; fejmelle a végtestnél szélesebb; a végtest felületének eleje csontfehér. A tapogató rövid, bunkós; szárizza a térdiznél rövidebb, külső oldala vegen egy oldalt álló, ripacsszerű, kettős

¹ Ez a nem bevonatott, mert átmeneteket mutat ahhoz, a melybe alakjai beállítottak. THORELL (in litt.).

dudorral; pikkelye kanállakú, domboru, elejen rövidke szőrökkel borított, nemzőszerve sötét-barnafekete, fenyés, kidagadó, a pikkely üreét kitöltő; felülete alulról tekintve egyszerűen lencsealakú.

Mértékek: ♀ Törzs	1	$\frac{m}{m}$ ebből
fej mell	2	»
1 lábpar	8-7	»

Mint tavaszi és nyári alak nem ritka s leginkább a gyümölcsfák törzsét, a régi kerítéseket, cölöpöket választja tanyájául, hol egészen lelapulva a leggyakorlottabb szemet is kijátszsa; veszély idején laposságánál fogva a legszűkebb repedésekbe bemenekül; roppant gyors futó; futásában hirtelenül meg-megáll; előre, hátra és oldalt egyenlő ügyességgel mozog, lábait folytonosan elterítve tartja. A nőstény $4 \frac{m}{m}$ átmerőjű lazaszövetű peteburkát valamely tárgyhoz odaerősíti s reaborúlva gondosan őrzi.

Ismerem: Doroszlóról, Ujvidékről, Rakamazról, Budapestről (Margitsziget).

GEN. 3. NEM. THANATUS. C. K.

(Θάνατος = halál, gyilkosság; a támadó természetéről.)

Syn. 1837. C. KOCH «Übers. des Arachn. Syst.» I. pag. 28.

Vide: THORELL «On Europ. Spid.» p. 181.

Mind a két szemsor erősen kihajló; az alsó sor középső szemei távolabbra a homlok szeptől, mint a hátsó középsőtől. A törzs hosszúkás. A lábak aránya 2. 4. 1. 3. vagy 2. 4. 3. 1. Egyes kúszók, melyek részint a földön, részint a magas növényzeten tartozkodnak s predájukat meglöpve hirtelenül átkarolják.

A bordáskörmök a Thanatus oblongus első lábpárján karesuk, kampósak, keves, ritkás bordákkal; a talpcsetek erősen lapiczkás szőrökből valók, lásd II. köt. V. tabla. 126. c.

SPEC. 1. FAJ. THANATUS OBLONGUS. (WALCK.). HOSSZÚKÁS LATORPÓK. LÄNGLICHE LOTTERSP.

(oblongus = hosszúkás; a karesű alakról.)

Syn. 1802. Aranea oblonga WALCKENAER «Faune Par.» II. p. 228.

Vide: THORELL «Remarks» p. 269.

♀ Világos agyagsárga, hosszecikkos elő- és vegtesttel; hasonló egyszínű, hosszú, erős lábakkal. A vegtest az előtestnél nem szelesebb, hosszú.

A fej mell hosszúkás, eleg domboru, feje része módosan keskenyedett, a mellresztől oldalbarázdák által meglehetősen elválasztott, vörössárga, egy középső, kisse elmosódó s a szemek fele rendesen áttört, barnás csikkal. A mellvért világossárga, barnás pontocskákkal, fehér és sötét szőrözettel, pajzsalakú, lapos. A rágók sárgák, előlről tekintve párhuzamosak, az első lábpár végizénél sokkal rövidebbek, oldalról tekintve függőlegesek; szőrözetök szerfelett gyér. Az állkapsok majdnem párhuzamosak, haránt behorpasztottak, sárgák, elől elkerekítettek keves szőrrel; az alajk tojásdad, az állkapsok felehosszának megfelelő.

A tapogató sárga, legesücsa feketedő; valamennyi ize néhány tüskével fegyverezett, végize valamivel rövidebb, mint a terd és szár együttvéve. A lábak vöröses agyagsárgák s vegeik a sötét, erős talpkefe folytán sötétedők, az első végizék fegyvertelenek, a többi iz gyérén tüskés; mind a négy páron mind a két végiz sötét, erős talpkefevel, melynek szőrei lapátos végűek, a lábvegek egy ritkább és egy sűrűbb bordás körömmel. A vegtest halvány agyagsárga egy középső, barnás, szelesebb hosszecikkal, ettől kétoldalt finomabb vonalakkal s kisse sötétedő oldalakkal, úgy hogy felülről tekintve háromcsikkosnak látszik lenni. A has fehéres, tömötten szőrös.

A szemek kicsinyek; az alsó sor a hátsó sor középsőivel egy harantfekvő, hosszukás hatszoget alkot (\diamond); a hátsó sor oldalszemei e csoporttól messze oldalt és hátra esnek. Az alsó sor oldalszemei egy kis fekete foltocskába esnek s nagyobbaknak látszanak, valamivel közelebb állanak a középsőkhöz, mint ezek egymáshoz; a hátsó sor az alsónál sokkal hosszabb, oldalszemei, fekete dudoron fekvé, nagyobbaknak látszanak és sokkal távolabbra állanak a középszemektől, mint ezek egymástól. A hátsó sor középsői valamivel távolabbra esnek egymás között, mint az alsó középsők, szintén egymás között. A két sor oldalszemei közötti távolság nagyobb annál, a mely a két sor középszeméi között elterül; az alsó középsők közelebb állanak az alsó oldalszemekhez, mint állanak a hátsó középsők ugyanezekhez. A zár két $\sphericalangle O$ szerű sötétbarna behorpadást mutat.

Mertekek: ♀ Törzs	11	$\frac{m}{mm}$ ebből
fejmell	3.5	»
I lábpár	13.5	»
II »	15	»
III »	10	»
IV »	13.6	»

♂ Rövidebb törzsű; fejmele erősen fejlett, végtete ennél sokkal keskenyebb; rendesen valamivel sötetebb agyagsárga. Lábai aránytalanul hosszúk. Tapogatója husos nyelű, kis bunkóval, valamennyi ize gyeren tüskés; a pikkely csücsösen kanálalakú, elég domború, szőrös, domborodása tövén rendesen egy tüskével; szár és térdize mintegy egy darabból való, egymásnál nem hosszabb; a nemzőszerv vörössárga, sima, tojásdad, elől egy, mintegy feltett, jelentéktelen dudorral.

Mertekek: ♂ Törzs	8.5	$\frac{m}{mm}$ ebből
fejmell	3.2	»
I lábpár	15	»
II »	17	»
III »	11	»
IV »	15.7	»

Felig fejlett példányai már kora tavaszkor észlelhetők s a legszorgalmasabb leghajósok köze tartoznak (legalább a Bácskában azoknak tapasztaltam); a karók csücsaim, a növények szirmain és sásos helyeken is leskelődik; az ernyős növényeken az ernyő alatt vonúl meg s előlábaival az ernyő felébe nyújtva lesi prédáját, melyet hirtelen átkarolással ejt birtokába; szétvetett lábakkal egészen le tud lapulni s ha kuszva vadászik, gondosan felhasználja a rügyeket, göröngyöket, hogy fedve lophassa meg prédáját, neha a méhet is legyőzi, s csipőkörméit rendesen a fej és torj közé vágja be.

Ismerem, erdélyi részekből: Szász-Vesszősről, Kolozsvárról, Mező-Záhról és Szebenből (Sill-gyűjtemény); magyar részekből: Doroszlóról (mint leghajóst), Pancsováról, Orsováról, Székes-Fehérvárról, Budáról (Pável), Komjátiról (Dr. Horváth Geza).

SPEC. 2. FAL. THANATUS FORMICINUS. (CL.). HANGYA L. AMEISEN L.

(formica = hangya; a hangyabolyok körül való tartózkodásról.)

Syn. 1757. *Araneus formicinus* CLERCK «Aran. Suec.» p. 134.

Vide: THORELL «Remarks» p. 269.

♀ Élénk, világos cserbarna; a fejmele közepe hosszában szélesen, szalagszerűen világosabb; a szélesedő vegtest felületének elején egy rikitóan szembeszökő, hasitekszerű, bársonyfekete lándzsafolt. Zömök alak.

Fejmelle vastkos, domború, felül párhuzamosan lelapított, oldalról tekintve a nyelecsketől iveresen emelkedő, szélességénél alig hosszabb, vastag fejreszszel; a mellresz oldalai lecsapottak, a felső lelapításnál

valamivel sötétebbek, a lelapítás két feheres, a szemek közül induló csikkal szegélyezett; az egész bronzfenyű oly pikkelyekkel borított, a melyek végökön lapiczkások, tövükön ágasok, a pikkelyekkel elegyesen, de gyéren serteszerű szőrök is jelen vannak s a fej elején leginkább feltűnnek. A mellvért szívalakú, laposan domboru, durván és különösen a szeleken gazdagon szőrös. A rágók az első lábpár ezombjánál sokkal vékonyabbak, összeillők s előlről tekintve tövüknel valamivel szelesebbek, az első lábpár első végizénél alig rövidebbek, a fejresz sapkászerűen borul tövükre, oldalról tekintve tetemesen az állkapcsokra esapottak, pikkelyekkel és különösen sok, erős, görbült sertékkal inkább fegyverezettek mint szőrösök. Az állkapcsok nyújtottak, végeik elkerékitettek, egymázhoz közel állanak, tövük bőven sertés-szőrös, az alajk az állkapcsok közé beékelve, azoknak felehosszát alig éri el. A tapogató vaskos, minden ize bőven tüskeszerű sertékkal fegyverzett, közben pikkelyes, végíze a többinél karcsúbb s alig rövidebb, mint a térd és szár együttvéve. A lábak hosszúk, vaskosak, terdek felemelkednek; borítékuk pikkelyekből áll, melyek közül a tüskeszerű rövid szőrözet és az erős fegyverzet kiáll; az első lábpár ezombján elől két erős tüske, felületén két tüske, szárán és másodvégizén, alul, az előbbin három, az utóbbin két pár tüske; az első két lápáron mind a két végizen végig kétsoros erős talpkefe, a hátsó párokn a talpkefe a másodvégiz tövét nem éri el.

A végtest hosszkörded, pikkelyekkel egészen fedett s a mellett különösen a vége felé sok tüskeszerű, fekete és itt-ott fehér szőrökkel borított; a bársonyfekete lándzsafolt igen finom fehéres szegélyezettel.

Az alsó szemsor négy szeme a hátsó sor két középsőjével egy oly hatszöget kepez, mely szélességénél nem magasabb s a melynek rendetlensége onnan ered, hogy az alsó oldalszemek sokkal közelebb állanak az alsó, mint a hátsó középsőkhöz. Az alsó sor középsői sokkal távolabbra esnek egymástól, mint az alsó oldalszemektől, s a homlok szeletől sokkal távolabbra, mint a hátsó középsőktől; e sor oldal-
szemei, fekete foltban állva, látszólag nagyobbak. A hátsó sor szemei egyenlő távolságra egymástól.

A zár egy cserbarna, lyra-alakú bemélyedés, mely szélességénél sokkal magasabb s hosszában egy ekalakú, szőrös lemez által két részre oszlik.

Mértékek: ♀	Törzs	8 $\frac{m}{m}$ ebből
	fej mell	3.5 "
	I lábpár	10.7 "
	II "	11.8 "
	III "	10 "
	IV "	10.7 "

♂ Az ivarérett hímét nem ismerem; a harmadvedlésű, a melynek nemzőszerve egy sima bunkó, színre nevezve a nősténynyel azonos.

Mint nyári alakot hangyabolyok közelében találtam Kolozsivárt (Muzeumkert), ifjabb példányait ősszel Doroszlón; Dr. Horváth Géza barátom szívességének köszönök egy ifju példányt, mely Kassa mellett tel derekán (január 5-ken) gyűjtöttet; ifjabb példányait ismerem még Veszpremből, Budáról (Muz. gy. Pével János).

FAM. II. CSALÁD. THOMISOIDAE. KAROLÓK. ARMSPINNEN.

($\theta\omega\mu\iota\zeta\omega$ = fonállal kötni; arról a szokásról, hogy a prédát megkötik.)

GEN. 1. NEM. MONAESES. THOR.

($M\omega\alpha\iota\sigma\epsilon\varsigma$ = görög név.)

Syn. 1869—70. THORELL «On Europ. Spid.» p. 182.

A homlok és a rágók részüntösen előrenyújtottak; az első középszemek távolabbra a homlok szeletől mint a hátsó középsőktől. Az alsó szemsor igen könnyedén, a hátsó tetemesen kihajló; az alsó

oldalszemek az alsó középsőknél sokkal nagyobbak. A végtest hátul emelkedett, csücskös (II. k. V. t. 127. b). Talpkéfe, illetőleg lapiezkás szőrökből alkotott ecset nincsen. A bordáskörmök erősek, kampójuk könnyed hajlása, bordáik elég szűrűn állanak, elég hosszúk, lásd. II. köt. V. tábla, 127. c.

SPEC. I. FAJ. MONAESES CUNEOLUS (C. K.) ÉKELT MONAESESPÓK. KEILFÖRMIGER M.

(cuneolus = kis ék; a végtest alakjáról.)

Syn. 1838. *Xysticus cuneolus* C. KOCH «Die Arachniden» IV. p. 79. (ad part).

Vide: PAVESI «Cat. sist. dei Rag. del Cant. Ticino» p. 147. (Synonymica).


♀ Előteste barna, ekalaku világosabb közepesikkal. Végteste, felül szürkés fehér, oldalaiban vörös-barna, úgy hogy a szürkésfehér szín egy, csücsával előre fordított ekhez hasonlít; hasa fehéres egy végig vonuló feketés közepesikkal. Lábai sárgások, fekete pontozatokkal.

A fejmell kicsiny, kerekded, magas; felületen kissé lelapított; fejerésze széles, homloka menedekesen előrenyúló; a mellrész oldalai barnák, világosabb színnel elegyesek, mintegy áttörték; a szemesoporttól és egész szélességét átfogva egy világosabb, széles csik indul, mely a nyelecske felé ekalakra keskenyedik; az egész fejmell felületén, igen gyéren elszórva, gombocskákból indulva serteszerű szőrök állanak. A mellvert hosszkörded, fekete, kevés fehéres szőrökkel. A rágók menedekesen előre nyújtottak, rövidek és laposak; színök sárgás, tövüknél barnásba átmenő, kevés szőreik feketés gombokból indulnak. Az állkapcsok sárgák, fekete szőrözettel, tövük kivastagodott, a végök keskeny, elől elkerekített; az alajk nyelv alakú, az állkapcsok felehosszának megfelelő. A tapogató sárga, rövid, húsos, bőven szőrös, a szőrök részben feketés gombokból indulnak, végíze oly hosszú, mint a térd és szár együttvéve.

A lábak közül a két első pár a két hátsót hosszúságra szembetűnően felülmúlja; valamennyi halvány sárga, fekete szőrözettel, mely fekete gömbökből indul s emelfogva a lábak feketetarkák; a tüskék foltoszerű nagyobb gömbökből erednek. A czombok elől és felül, a száruk alul gyéren tüskések.

A végtest sajátságos alakú, elől sokkal keskenyebb mint hátul, és hátul sokkal magasabb mint elől, a hát végén csücsökbe végződik s a csücsök és fonók között függőleges; színezete kissé változékony; felülete mindig szürkésfehér elmosódó tiszta fehér néha rajzszerű vegyülettel; oldalai néha szélesen vörös-barnák, néha s felületnél sötétebb szürkek; a felület fehér helyei mindig az mgödröket vagy a szőrök tövét kerítik. A has fehéres, állandóan egy feketés, széles, nem épen éles szélű közepesikkal.

Mind a két sor oldalszemei egyenként igen tetemes, félgömb vagy hosszukás emelkedéseken állanak. Az alsó sor majdnem egyenes (kihajlásra hajlandó.), igen kicsiny középsői nem állanak távolabbra egymástól mint a háromszor nagyobb oldalszemektől. A hátsó sor kihajló, középsői kisebbek az oldalszemeknél s kevéssel nagyobbak az alsó középsőknél, közelebb állanak egymáshoz mint soruk oldalszemeihez. A hátsó sor hosszabb az alsónál; a két sor oldalszeme oly távolságra egymástól, mint az alsó a hátsó középsőkhöz.

A zár egy majdnem négyszögletes, barna, bőrös térese, igen sekely  szerű sculpturával.

Mertekek: ♀ Törzs	7.5 $\frac{mm}{m}$ ebből
fejmell	2 "
I lábpár	8 "
II "	7.2 "
III "	4 "
IV "	4.3 "

♂ Sokkal kisebb, karesűbb; végteste, oldalról tekintve, majdnem párhuzamos, hátul csücskös ugyan, de nem magasabb mint elől. Színe a nőstényével azonos. Homloka meredekebb, rágói függőlegesek. A tapogató sárga, rövid, száríze a térdnél rövidebb, külső oldalának a végén egy fekete, ki- és hátra-

felé görbulő tetemes, körömszerű nyújtványnyal; pikkelye kanalakú, módosan szőrös; nemzőszerve egy alig kidomborodó barna, síma és fényes, vesealakú gyűjtőből áll.

Mertekek:	♂ Torzs	4	m_m ebből
	fej mell	1.5	»
	I lábpár	7	»
	IV »	4	»

Mint tavaszi és nyári alak nem éppen gyakori s leginkább az erdőszélek bujabb növényzetet kedveli; ifjabb nemzedéke, úgy látszik, egyes pontokon nagy számban fordul elő (Buda vidéken Pável János igen sok példányt gyűjtött, egytől egyig fel fejlődésűeket).

Ismerem, erdélyi részekből: Kolozsvárról; magyar részekből: Doroszlóról, Pancsovaról, Tokajból és Budáról (Muz. gy.).

GEN. 2. NEM. THOMISUS. (WALCK.).

(Vide: «Thomisoidae»)

Syn. 1805. WALCKENAER «Tabl. d'Aran.» p. 28. (ad partem).

Vide: THORELL «On Europ. Spid.» p. 183.

A homlok és a rágók kevesse kinyúlók.

Az alsó szemsor középsői távolabbra a homlok széletől mint a hátsó középsőktől.

Az alsó szemsor erősen, a hátsó kevéssé kihajló; az alsó sor oldalszemei nem nagyobbak a középsőknél. (A fejresz két, szarvszerű, magas, szétágazó csücsökkel).

A bordás kórmók a Thomisus onustus első lábpárján erősek, kampójuk hosszú és vaskos, közte és az első borda között tetemes az ür, a bordák elég hosszúak, sűrűn sorakozottak.

SPEC. 1. FAJ. THOMISUS ONUSTUS WALCK. HASAS RÁKPÓK. BAUCHIGE KREBSSPINNE.

(onustus = megrakott, megtömött; a végtest nagyságáról.)

Syn. 1805. *Thomisus onustus* WALCKENAER «Tabl. d'Aran.» p. 32.

Vide: THORELL «Remarks» p. 427.

♀ Világos, változó színezet; az alapszín rendszeren fehér vagy sárgás. Fejmelle fehér, két sötét oldalcsikkal, fejerésze két felálló, szétágazó, kupalakú csücsökbe kihuzva, a csücsökön, hátul, közel a csücskhöz, a hátsó szemsor két oldalszeme, — elől, a csücsök közepe táján az alsó két oldalszeme. A végtest színe világos, változó. A végtest terjedelmes, hátul a fonók felett igen magas, felülről tekintve majdnem háromszögletes, a háromszög talpával hátrafele (tehát visszajára) s itt csücskös. A lábak világosak, rendszeren halaványan gyűrűsek.

A fejmell szélességénél csak kevesse hosszabb, magas, felulete párhuzamosan lelapított, e laposság csontsárga, az oldalak sötétesek (zöldesek, néha barnák). A fejresz elől elmetezett, szarv vagy fűlszerű csücsökkel, a homlok meredek, a rágók töve közé egy kis nyújtványt bocsát (∩). A mellvert tojásdad, világos színű, szőrös. A rágók laposak, a homlok magasságánál nem rovidebbek, részben csontszínűek, részben barnások, alig szőrösök. Az alkapesok világosak, összehajlók, tövük kivastagodott úgy, hogy a tapogató csuklója szabadon látható; az aljuk nyelv alakú, az állkapesok fele hosszát valamivel meghaladja. A tapogató sárga-fekete rövid szőrözettel, végze rövidebb mint a térd és szár együttve. A lábak oldalt elterülők, az első két pár erős és hosszú; valamennyi világos, az izek végei gyűrűs behomályosítással; az első pár szárán, alul, egy pár tüske, második végizen nyolcz pár tüske, a második lábpár szárán, alul, szintén egy pár a második végizen öt pár és meg két paratlanul álló tüske; a két hátsó lábpár fegyvertelen.

A végtest háromszögletes, keskeny vegevel előrefele áll, színe néha csontsárgás, csontfehér, néha oldalaiban rózsaszínes, lapos felületen hasonló színű haránt csíkokkal, melyek közül egy szelesebb a két hátsücsköt összeköti, a végtest elején egy kupalaku rózsaszín folt; az utóbbi változatnál a láb gyűrűzete is rózsaszínes.

Az alsó szemsor igen apró szemei kihajló sorban, a középsők sokkal közelebb egymáshoz mint az oldalszemekhez, melyek már a csücskök derekán állanak. Az alsó sor igen módosan kihajló, középszemei a két csücsök közötti völgybe esnek s távolabb állanak egymástól, mint a csücskök csücsa alatt fekvő oldalszemektől, szemei aprók. Az alsó középszemek távolabbra esnek a homlok szeletől mint a hátsó középsőktől, a hátsó középsők valamivel távolabbra egymástól mint az alsó középsőktől.

A zár egy sárga, fenyves, gyantaszerű, kiemelkedő köldök, két oldalt pontszerű fekete nyilással (Ö)

Mertekek: ♀	Törzs	11	m_m ebből
	fejmell	3.5	»
	I lábpár	13	»
	II »	12.3	»
	III »	5.5	»
	IV »	6.6	»

♂ Aránytalanul kicsiny. Első két lábpárja töven sárga, lábszárától kezdve végig feketebarna (csizmás), valamennyi lába fegyvertelen. A végtest lapos, gyanta sárga tetemesen csücskös. A fejmell barnas, hátán világosodó, a fejesücskök ele csontfehér vagy sárga. A tapogató rövidke, bunkós, sárga; térd és száríze egyenlő, rövid; pikkelye tetemes, kanálalaku, módosan szőrös. Alulról tekintve a szár hosszában barna fogacsok láthatók. A nemzőrész, alulról tekintve lapos, lenese alaku, barna, a kanál üret egészen kitöltő gyűjtő.

Mertekek: ♂	Törzs	3.3	m_m ebből
	fejmell	1.5	»
	I lábpár	7.6	»
	IV »	2.4	»

E sajátságos külsejű faj, mint nyári jelenség nem éppen gyakori, de nem is ritka. Rózsaszínes változatai (= diadema C. Koch Görögországból) leginkább a virágzó loheren, a fehérek ernyős növényeken (*Sambucus ebulus*, *Chacrophyllum*) találhatók, hol a virágokba illetőleg virágok alá rejtőzve hosszú előlábait a virág felé tartja s a virágon megtelepedő rovarokat átkarolja. Neha egy-egy fűszál csücskére mászva kitarja karjait, s várja, míg valamely rovar virágnak nézi s karjai köze telepedik. Egyebekre nézve lásd «életmód» szakasza «alak és színezet» alatt.

Ismerem, erdélyi részekből: Kolozsvárról, Mező-Záhról és Szebenből (Sill gyűjtemény; magyar részekből: Doroszlóról, Orsováról, Pecs vidékeről (Muz. gy. Friwaldsky), Budáról (Muz. gy. Pavel), Pestről (Muz. gy. Friwaldsky).

GEN. 3. NEM. MISUMENA. LATR.

(*μισομένης* = a gyűlött; talán az álnok életmódról.)

Syn. 1804. LATREILLE «Nouv. Dict. d'Hist. Nat.» XXIV, p. 315 (ad part).

Vide: THORELL «On europ. Spid.» p. 183.

A homlok és a ragók majdnem függőlegesek; az alsó szemsor középsői nem állanak távolabbra a homlok szeletől mint a hátsó középsőktől. A hátsó szemsor oldalszemei nem vagy alig nagyobbak a középsőknél. A középszemek trapezben állanak. Az alsó szemsor erősen, a hátsó könnyedén kihajló, az alsó oldalszemek a középsőknél nem vagy kevéssel nagyobbak.

A bordáskörmök a *Misumena vatia* első lábpárján íves hajlasuak, hosszú-kamposak, keves bordájuk közül az elsők erősebbek.

SPEC. I. FAL. MISUMENA VATIA. (CL.). ALAKOSKODÓ¹ KESZEGPÓK. FALSCHЕ BRACHSENSPINNE.

(vatia ab vates = jós, költő; az alakra vonatkozik.)

Syn. 1757. *Araneus vatius* CLERCK «Aran. Suec.» p. 128.

Vide: THORELL «Remarks» p. 258.

♂ Csontfehértől sárga fokozatokkal egészen a haragos citrom és narancessárgába átmenő változékony színezet; gyakran az oldalakban, ritkán a hát közepén (a végtesten) vérvörös, vagy rózsás foltokkal. Leggyakrabban citromsárga («citreus vel citrea» De Geer, WALCKENAER, BLACKWALL). A fejmell felülete az oldalaknál mindig világosabb; a lábak a test alapszínének megfelelően egyszínűek. A fejmell szélességénél nem hosszabb, magas, felületen kissé lelapított, szivalakú, elől elkerékített; fejerésze kétoldalán egy módos emelkedésű hosszudorodás, melyen a két szemsor oldalszemei állanak. A mellvert pajzsalakú, igen gyéren szőrös. A rágók az első lábpár elsővégizénél rövidebbek, inkább laposak, gyér, kurta de erős szőrökkel. Az állkapcsok összehajlók keskenyek, alig vastagodó tövel úgy, hogy a tapogató csuklódása szabadon látható; az alajk párhuzamos oldalakkal, elől elkerékített az állkapcsok hosszának két harmadrészet bőven eléri. A tapogató kurta, feketés szőrözetű, végíze rövidebb mint szára és terde együttvéve. Az első két lábpár hosszú, erős, oldalt elterülő, karolásra alkotott sarló állású, czombjai fegyvertelenek, szárai alul rendetlenül, leginkább a külső szélre alkalmazott 4—6 gyenge tüskevel, ugyan e párok másodvégizein, alul, hét pár tüske, a hátsó két lábpár másodvégizén, alul, egy-két tüske.

A végtest, hátul, hosszánál szélesebb, előrefele keskenyebb, alig lelapított, vastag  alakú, nem csücskös.

Az alsó szemsor apró szemű, erősen kihajló, szemei egyforma távolságra egymástól, egymásnál nem nagyobbak; a hátsó szemsor könnyeden kihajló, szemei egyenlő nagyság mellett az alsóknál inkább kisebbek s a középsők valamivel közelebbre egymáshoz mint az oldalszemekhez; a két sor oldalszeme egy tetemes, hosszúkás dudor két végére elhelyezve, közelebb áll egymáshoz, mint a hátsó oldalszem a hátsó középszemhez; a két sor középszemei közel derek négyszögbe (előre mégis szűkebb) elhelyezve; az alsó szemsor középsői körülbelül annyira állanak a homlok szélétől a mennyire állanak a hátsó középsőktől.

A zár egy igen jelentéktelen haránt dudorodás, alsó szelen pontszerű ket nyílással ().

Mertekek: ♀ Törzs	8—11 $\frac{mm}{100}$ ebből
fejmell (a nagyobbak) . .	3.8 »
I lábpár	15.5 »
II »	14.6 »
III »	7.5 »
IV »	8.5 »

♂ Aránytalan kicsiny, egészen elűtő színezettel.

A fejmell vörösbarna, felületen egy széles vörössárga csíkkal s e szín a fej emelkedéseire és az alsó szemsor alatti homlokrészre is átmegy. A hosszukórded végtest felülete zöld vagy zöldessárga, két párhuzamos, barna csíkkal, mely a fonóknál kezdődve nem éri el a végtest elejét s hosszának mintegy három negyedében végződik; a has és az oldalak barnák. A két első lábpár barna, a szárok közepe és a végizek töve gyűrűsen világosodó, a két hátsó lábpár világos, sárga vagy zöldes.

A tapogató nyele sárga, bunkója barna; száríze a térdiznél sokkal rövidebb, külső oldala végen egy erős, a pikkely széle görbületehez illő nyújtványba nyulik, mely nyújtvány végén egy igen apró, hajlott körmöcske áll, a szár alfelen semmi fogacsok; a pikkely kanálalakú, nemzőszerve vörösbarna, lenesealakú, síma és lapos.

¹ CLERCK, «Aran. Suec.» p. 128. «Caneri similitudinem quamquam hujus Aranei forma aliquam aut nullam refert; solus tamen hoc nomen promeruisse videtur; quonobrem digum habetur, qui primum locum inter hujus Generis Araneorum obtineat.»

Mertekek: ♀ Törzs	3.2 $\frac{mm}{m}$ ebből
fej mell	1.4 "
I lábpár	7.5 "
IV "	3 "

Az aljakban, különösen réteken és kertekben a buja növényzeten messze elterjedett faj, mely mindenek előtt az ernyős virágokat kedveli (a veteményesekben pl. leginkább a murek virágát s innen «Thomisus dauci» pl. WALCKENAEER-nél,) hol a Thomisus onustus módjára vadászgat; de a virágok kelyhébe is bemélyed s ott várja a mézelő rovarokat, melyekkel igen ügyesen el tud banni; prédáját rendszeren nyakszírtan éri s a fej közé vágja be lapos állkapcsainak rövid körmét; a nehéz és erős rovarokat rendszeren egy-két szállal leköti (lepányvázza) s csak azután szívja ki.

Ismerem, erdélyi részekből: Szász-Vesszősről, Kolozsvárról, Mező-Záhról, Oláh-Fenes, Retyiczél, Parajd, Gy. Sz. Miklós, Balánbánya és Tölgyesről, továbbra N.-Szebenből (Sill és Bergleiter gyűjtemény), Hosszulelkéről (Miksa György elhunyt barátom útján); magyar részekből: Doroszlóról, Panesova és Orsováról, Mehádiáról, Báziásról, Ó-Huttáról (Borsod), Lykaukáról (Liptó), Nagy-Váradról (Muz. gy. Moesáry), Pécsről (Muz. gy. Friwaldszky és Pável), Bártfáról (Muz. gy. Dr. Chyzer Cornél), Mehádia (Muz. gyűjt. Friwaldszky).

SPEC. 2. FAJ. MISUMENA TRUNCATA. (PALL.). VASKOS K. VIERSCHRÖTTIGE B.

(truncata = esonkitott, tompító értelemben; a végtest alakjáról.)

Syn. 1772. *Arauc truncata* PALLAS «Spicileg. zool.» 9, pag 47.

Vide: THORELL «Remarks» p. 259.

♀ Fejmelle világosabb vagy sötétebb fahéjszínű.

Végteste fahéjszín, néha sötétebb vörösbarna színnel elegyített. A két első lábpár fahéjbarna, világosabb, elmosódó gyűrűzettel; a két hátsó lábpár vörössárga, sötetdő csücsesal, a negyedik pár térde mindig barna. Széles alak, lapuló fejmellet és otromba, hátul két oldalt tompa csücsökbe kifutó végtesttel.

A fej mell szélességénél nem hosszabb, laposan domboru, elől elnestszett, a mellrészben kerekített, egyszínűen fahéjbarna, világosabb finom szegélylyel; a szemter, különösen az oldalszemek táján, göcsös. A mellvért fahéjbarna, néha világosabb pontokkal, szívalaku, lapos, szőrös. A rágók laposak, oly hosszúak mint az első lábpár elsővége, fahéjbarnák, haránttranczoltak s alig szőrösök. Az állkapcsok majdnem párhuzamosak, egymásra hajlók, tövük nem vastagodott, a tapogató csuklója azonban szabadon látható — fahéjbarnák; az alajk hasonló színű, nyelv alakú, az állkapcsok hosszának két harmadát eléri. A tapogató fahéjbarna, vége a többihez képest kissé vékonyodó csücsán feketes és bőven szőrös, rövidebb mint a szár és térd együttvéve. A lábak közül a két első pár vaskos és hosszú; sarló alakú, oldalt elterülő állásban karolásra igen alkalmas, fahéjbarna, az ízek tövein világosodó; mind a két pár szára és másodvége, alul, páros, rövid tüskekkal sűrűn fegyverzett; az első lábpár szárán alul 7 párig, — másodvégén, alul, 9 párig szaporodó tüske, a második lábpáron hasonlóképen: — a harmadik és negyedik pár világos vörössárga, az utóbbi barna tédde; a harmadik pár szárán alul egy apró tüske, a negyedik pár egészen fegyvertelen.

A végtest otromba, háromszögletes, elkerekített csücsával előre felé fordított, ivarérett állapotban lapos, terhes állapotban nagy vastagságra növekedő, fahéjbarna sötét vörösbarna besötétítésekkel, néha egyszerűen drapszínű, hosszúságánál, hátul, szélesebb s itt oldalt álló csücsökbe végződik.

Az alsó szemsor oldalszemei a többinél láthatólag nagyobbak, e sor erősen kihajló, szemei egyenlő távolságra egymástól, mely nem nagyobb annál, a mely a középszemek és homlok széle között elterül. A hátsó sor könnyeden kihajló, szemei kiesinyek, egymástól egyenlő távolságra állók, mely alig kisebb annál, a mely a hátsó középsőket az alsó középsőktől elválasztja; a hátsó oldalszemek egy göcs esücsa alatt

állanak, mely göcs résüntösen az alsó oldal és hátsó középszem köze is kiterjed; az alsó középsők és a homlok széle közötti távolság sokkal kisebb mint a távolság az alsó és felső középszemek között.

A zár, egy gyantasárga kiemelkedő, vesealakú, haránt és homoru oldalával a légzőrésre nező koldók, melynek homorúsága egyszersmind keretet is képezi a tojócső nyílásnak.

Mertekek : ♀ Törzs (terhes)	9.5 $\frac{m}{m}$ ebből
(ivarerett)	6.5 "
fejmel	3.4 "
I lábpár	14.4 "
II "	14 "
III "	7 "
IV "	8 "

Ivarerett himjét nem ismerem; a felfejlődésű törzs hossza $4 \frac{m}{m}$ és a harmadik és negyedik lábpár szintén barnás; az alak és szín egyebekben a nőstényével azonos.

Tapasztalásom szerint ritka; mint nyári alakot leginkább kertekből s ott az egres-bokrokról ismerem, mint nyári alakot.

Találtam erdélyi részekben: Kolozsvártt, Nyarad- Szeredán és N.-Szebenben (Sill-gyűjtemény), magyar részekben: Palánkan és Orsován, Buda vidéken (Muz. gy. Pavel Janos).

SPEC. 3. FAJ. MISUMENA VILLOSA. (WALCK.). BORZOS K. ZOTTIGE E.

(villosa = bozontosan szőrös; a test szőrösségéről.)

Syn. 1837. *Thomisus villosus* WALCKENAER «Hist. Nat. des Ins. Apt.» I. p. 535.

Vide: THORELL «Remarks» pag. 539.

♀ Halvány zöld, fehérrel; a végtest hossztojásdad, csúcsával előre irányozott; az egész állat serteszerű erős, világos szőrökkel borzosan boritva.

A fejmel széleslegénél valamivel hosszabb, szívalakú, tompa fejrészszel, oldalai zöldesek, közepe keskenyen fehér; a szemtercsen sok, előre meredező, erős, feheres szőrökkel, a többi része szintén erős szőrözettel; a szőrök gombokból indulnak. A mellyvert szívalakú, lapos, zöldes, bőven erős szőrözettel boritva. A rágók zöldesek, rövidek és laposak, vaskosak, kevés, rövid, erős szőrökkel. Az állkapesok nyulánkok, kisse egymásfelé dülők, zöldesek, tömött szőrözettel; az alajk nyelvalakú, szőrös, az állkapesok hosszának három negyedrészet bőven eléri. A tapogató zöldes, gombból induló szőrözete túszerű, meredező, végíze rövidebb, mint szár és terdize együttveve. A lábak zöldesek, a két első pár, jelesen a legelső pár hosszú, erős, karolásra alkalmas; valamennyi lábón a szőrözet kurta, sűrűn és túszerűen felálló; az első lábpár szárán, alul, nyolcz — másodvégizen 8—9 pár tüske; — a második lábpár szárán, alul és renlesen csak az egyik oldalán három vagy több (?), másodvégizen 5 párig tüske; a hátsó lábpárok fegyvertelenek.

A végtest nyújtott, hossztojásdad, szélességénél sokkal hosszabb, hátul szépen elkerékített, zöldes, elmosódva-feheres hátvonallal s mindenütt serteszerűen, ritkasan szőrös; a zöldes hasszőrözet ritkan áll és finom.

Az alsó szemsor erősen kihajló, oldalszemai észrevehetőleg nagyobbak, középsői távolabbra egymástól, mint az oldalszemektől, az oldalszemek dudoron állanak; a hátsó sor kevésbbe, de határozottan kihajló, szemei egyenlő távolságra egymástól, oldalszemai a középsőknél alig észrevehetőleg nagyobbak és dudoron állók; a középszemek nem trapezbe, hanem szélességénél magasabb deréknégyszögbe elhelyezettek; az alsó középsők valamivel közelebbre a homlok széléhez, mint a hátsó középsőkhöz.

A zár egy kördel, alig emelkedett s alig kiváló terese, alsó szelen két, kisse tavolított, pontszerű benyomással.

Mértékek: ♀	Törzs	8.5 $\frac{mm}{m}$ ebből
	fej mell	2.5 »
	I lábpár	12.8 »
	II »	9.5 »
	III »	5.8 »
	IV »	5.8 »

♂ Sokkal kisebb, rövidke végtesttel, szőrözete cpen tüskeszerű el- és illetőleg felálló, feketes, fehéréssel elegyesen, az előbbi az erősebb; lábain ágasan eláll. Színezete a nőstényével azonos. Tapogatója kurta; száríze a térdnél sokkal rövidebb, külső oldala végén egy rövid, zöldes, a pikkely széléhez alkalmazkodó, tompa nyujtványnyal; pikkelye zöldes, kanálalakú, bőven szőrös: nemzőszerve lencsealakú, kerek, vörössesárga, szélein órarugóra emlékeztető finom fekete szegélyvel.

Mértékek: ♀	Törzs	4.5 $\frac{mm}{m}$ ebből
	fej mell	2.3 »
	I lábpár	11.5 »
	IV »	5 »

Tapasztalásom szerint az aljak bujább növényzetét lakó ritka nyári alak, melyet magam csak egyszer találtam Kőszegen (Vas megye); a magyar nemz. muzeumban megvan: Pestről (Frivaldszky János, Pável a «Csillagvölgyből»), Budáról (Pável «Farkasvölgy»); egy ifjú példányát Dr. Horváth Géza barátom hozott Komjátiból.

GEN. 4. NEM. DIAEA. THOR.

(*Diaea* = görög név.)

Syn. 1869—70. THORELL «On europ. Spiders» pag. 184.

A homlok függőleges. Az alsó szemsor középsői nem távolabbra a homlok szélétől, mint a hátsó középsőktől; a hátsó oldalszemek a középsőknél kevésbé nagyobbak; az alsó szemsor igen könnyedén, a hátsó tetemesen kihajló; az alsó sor oldalszemek a középsőknél sokkal nagyobbak. A *Diaea globosa* bordáskörmei alakra és berendezésre nézve a *Micrommata virescens* fajára emlékeztetnek.

SPEC. 1. FAJ. DIAEA GLOBOSA. (FABR.), BÜTYKÖS NYESŐPÓK. KUGELIGE STUTZSPINNE.

(*globosa* = golyóalakú; a végtestről.)

Syn. 1775. *Aranca globosa* FABRICIUS «Syst. Ent.» p. 432.

Vide: THORELL «Remarks» pag. 542.

♀ Fekete vagy barnásfekete; végtestének felülete fehér és részben vörössesfehér ríktó oldalrajzzal, mely az egészet koszorú módra körülfogja s a hát közepe felé irányozott csipkeket és ágakat boesát, az utóbbiak közül minden oldalon egy-egy mindig hosszabb a tobbinál s a hát közepén majdnem összeér. A fehérség elől összeér, a fonók felett megszakad. Zömök alak, majdnem körídomu végtesttel.

A fej mell sötét barnavörös, homlok részén rendszeren világosabb boltozatos; mellrésze a fej résznél csak kevésbé szélesebb. A mellvert szívalakú feketesbarna, domborodó és kevés, finom szőrözettel. A rágók vörösbarnák, laposan szélesek, kissé előre irányozottak, az első lábpár első végizénél alig hosszabbak. Az állkapcsok barnászörösek, összehajlók, az aljak hasonló színű, az állkapcsok hosszának két harmadát eléri. A tapogató barnászörös, a csuklóban kissé világosodó, gyéren szőrös, végíze rövidebb mint a térd és szár együtt-

véve. A lábak közül az első két pár hosszabb a többinél, egészben azonban módosan fejlett; valamennyi sötét vörösbarna, világosabb csuklokkal és lábvegekkel, karolásra alkalmas, az első két pár szárán, alul legfeljebb 4, a második lábvégizéken szintén 4 pár tüske; a harmadik és negyedik pár ugyanazon ízein néhány tüske. A has közepe szélesen barnafekete, oldalt szélesen () szerűen világosodó, a légzőrés mögött néha egy világosodó folt.

Az alsó szemsor középsői az oldalszemeknél sokkal kisebbek s oly nagyok, mint a hátsó sor oldalszemei, a homlok szélehez sokkal közelebb állanak, mint a hátsó középsőkhöz; az alsó sor igen könnyeden kihajló, szemei egyenlő távolságra egymástól, az oldalszemek a középsőknél sokkal nagyobbak; a hátsó sor kihajló, középszemei kisebbek és távolabbra esnek egymástól mint az oldalszemektől s valamivel távolabbra egymástól, mint az alsó középsők szintén egymástól, az utobbiakkal pedig oly negyszöget alkotnak, mely magasságánál szélesebb.

A zár egy egyszerű, barna, sima, alig kiemelkedő kerek köldök, also szelen — szerű hasitekkal.

Mértekek: ♀	Törzs	7	$\frac{m}{m}$ ebből
	fej mell	2·2	»
	I lábpár	6·8	»
	II „	7	»
	III „	4	»
	IV „	3·6	»

♂ Kisebb törzsű; vegtete tojásdad, lapos; fej melle szélesedő és lapuló, a lábvegek és a két hátsó lábpár sárga, széles, fekete-barna gyűrűzettel; egyébképen színezete a nőstényével azonos, rajzai a test nagyságához képest finomabbak. A tapogató vörösbarna, rövid, kis bunkóval; száríze kissé szélesedő, a terdnel nem hosszabb, külső oldala csúcsán egy felfelé görbült finom tövissel; a pikkely kicsiny, kalánalaku, módosan szőrös; nemzőszerve alólról tekintve vörösbarna, lencsealaku, lapos, finom sötét szegélyvel.

Mértekek: ♂	Törzs	4	$\frac{m}{m}$ ebből
	fej mell	1·7	»
	II lábpár	7·5	»
	IV „	4·5	»

Tavaszi és koranyári, az aljakban gyakori alak, mely leginkább az ernyősvirágú növények lakója, hol vadászatát sok leleményességgel űzi és zacskószerű lakását, melynek nyílása fölfele néz, nagy ügyességgel az ernyő könyökei köze alkalmazva. E faj is azok közül való, a melyek a kis virágok alá rejtőzve, előlábaikat a virág felébe nyújtják s az oda telepedő rovarát átkarolják.

Ismerem, erdelyi részekből: Szász-Vesszősről, Kolozsvár és Mező-Záhról; magyar részekből: Palánkáról, Pancsováról, Orsováról, a Veterani barlang környékéről, Bázsiáról, az Alsó-Hámorból (Borsod), Nagy-Váradról (Muz. gy. Moesary), Ungvárról (Muz. gy. Vidra Ferdinánd), Melhádia (Muz. gy. Frivaldszky Janos), Pest (Muz. gy. «Csillagvölgy» Pavel J).

SPEC. 2. FAJ. DIAEA TRICUSPIDATA. (FABR.). VILLÁS NY. GABELIGE S.

(cuspidis = kópja, lándzsa, Neptun szigonya; a ♀ barna rajzáról.)

Syn. 1775. *Aranca tricuspidata* FABRICIUS «Ent. Syst.» p. 433.

Vide: THORELL «Remarks» p. 539.

♀ Előteste halavány barnássárga, vegtete elenk világos zöld (borszeszben sárgává változik), a végén egy előre nyitott, patkószerű barna rajzzal. A végtest majdnem ötszögletes, elkerekített sarkokkal.

A fej mell laposan szélesedő, szélességénél nem hosszabb, mellrésze szélesedő; az egész halavány barnássárga. A mellvért szívalaku, világos barnássárga, módosan szőrös. A rágók rövidek, laposan szélesedők, világos barnássárgák, a homlok magasságánál csak alig hosszabbak. Az állkapcsok nyulánkok, egymás-

fele hajlók, világos barnássárgák; az alajk hasonló színezet mellett az állkapcsok hosszának két harmadat bőven eléri. A tapogatók világos barnássárgák, gyér szőrözettel, a végiz alig rövidebb, mint a térd és szár együttvéve. A lábak egyszínűen halvány barnássárgák, a két előpár hosszú és erős; az első pár szárán, alul, a külső soron hat, a belsőn három tüske, másodvégizen hat pár tüske; a második lábpár szárán kívül 4, belől 3 tüske, másodvégizen rendszeren öt pár és hátul egy páratlan tüske; a két hátsó pár szárán és másodvégizékén 1—2 apró tüske elszórva. A végtest \cup szerű barna rajzzal, hasa világos barnássárga.

Az alsó szemsor középsői oly távolságra a homlok szélétől, mint a hátsó középsőktől. A hátsó sor oldalszemei a középsőknél nem nagyobbak, mind a két sor oldalszemei fehér dudorokon, az alsó soréi valamennyi szemmel nagyobbak. A hátsó sor középsői sokkal távolabbra egymástól, mint az alsó sor középsői szinten egymástól; mind a két sor szemei különben egymás között egyenlő távolságra állanak.

A zár egy \cup szerű, alig feltűnő rés, mely nyitott oldalával a nyelecskére néz.

Mertekek: ♀ Törzs	5.5 $\frac{m}{m}$ ebből
fejmell	2 "
I lábpár	9.8 "
II "	9.4 "
III "	4 "
IV "	4.8 "

♂ Kisebb, korded, lapos végtesttel és részben elütő színezettel. Fejmellén két barna hosszcsík; végtesten a barna rajz csak szegélyszerű. Két előlábparja barnássárga szépen elmosódó biborosbarna karikákkal, két hátsó párja elenk zöld (borszeszben sárga); a tüskék fekete gombokból indulnak ki. A tapogató barnássárga, szára a térdnél valamivel rövidebb, küloldala végen egy hosszú lemezbe kinyúlik, mely lemez a pikkely széléhez simul; a pikkely kanálalakú, kicsiny, módosan szőrös; nemzőszerve lapos, kerek, vöröses-sárga, körfogata órarugószerű, fekete, finom szegélyvel.

Mertekek: ♀ Törzs	4 $\frac{m}{m}$ ebből
fejmell	1.8 "
I lábpár	8 "
IV "	3.5 "

Az aljakban, nevezetesen buja retek füvében, kertek növényzetén közönséges faj, mely leginkább a különféle virágok kelyheiben lesi predáját.

Ismerem, erdélyi részekből: Kolozsvárról, Mező-Záhról és Nagy-Szebenből (Sill és Bergleiter-fele gyűjtemények); magyar részekből: Doroszlóról, Apatinból, Palánkáról, Pancsováról, Orsováról, Tokajból, Rakamazról, Nagyváradról (Muz. gy. Moesáry), Pestről (Muz. gy. Frivaldszky), Ungvárról (Muz. gy. Vidra Ferd.), Mehádiáról (Muz. gy. Frivaldszky).

SPEC. 3. FAJ. DIAEA CAPPARINA. (C. K.) KAPPARISZ NY. CAPPARIS S.

(Capparis, egy növény; a tartózkodásról.)

Syn. 1845. *Thomisus capparinus* C. Koch «Die Arachniden» XII, p. 58, Tab. 410 fig. 993-995.

♀ Előteste és labái zöldek; a szemdudorok fehérek; a tapogatók sárgák; a végtest zöld, oldalai feheresek. Törzs 5 $\frac{m}{m}$.

♂ Előteste és tapogatói sárgák, az előbbin két barna hosszcsíkkal és fekete szegélyvel; végteste zöld, felül fehéren szegve, oldalaiiban barnafekete; labái élénksárgák, az ízületek végen egy-egy barna gyűrűvel. Törzs 3.8 $\frac{m}{m}$.

Közel áll a *Diaea tricuspidata*hoz, melytől a következő jegyek által különbözik: előteste rövidebb és szelesebb s keveslebb boltozatos; a két szemsor középsői nem négyszögben, hanem egy előrefele szűkült trapez-

ben állanak, t. i. az alsó sor középsői alig felakkora távolságra, mint a hátsó sor középsői; valamennyi szem igen kicsiny, csak az alsó sor oldalszeméi kissé nagyobbak.

A ♂ nemzőszerve gesztenyebarna.»

E fajt Koch C. i. h. oly példányok után írta le, melyeket Dr. ROSENHAUER 1844-ben Magyarországon a «Bánságban» gyűjtött. A leírás csak színezet szerint lévén adva, e fajhoz bővebben hozzászólni nem lehet.

GEN. 5. NEM. XYSTICUS. (C. K.).

(ξυστικός = karczó, kaparó; a földön való tartózkodás ól.)

Syn. 1835, C. Koch «Die Arachniden» in «Herr. Schäff. Deutschl. Ins.» 129. 16, 17.

Vide: THORELL «On europ. Spiders» p. 185.

A homlok függőleges. Az alsó szemsor középsői nem távolabbra a homlok szelétől mint a hátsó sor középsőitől. A hátsó szemsor oldalszeméi rendesen és határozottan nagyobbak a középsőknél; az alsó oldal szemek sokkal nagyobbak e sor középsőinél. A két sor oldalszeméi közötti távolság alig vagy nem nagyobb annál, mely az alsó középsőket a felső középsőktől elválasztja. A két sor középsői rendesen derek négyszögbe elhelyezettek. A lábszárak és másodvégizek, alul, vastos tüskékkel fegyverezettek. Zömök, kurta, széles-lapos végtestű alakok, szürke-barna, vagy barnás-feketés színvegyülettel, a végtest felületén rendszerint egy ketfele füreszfogas vagy visszahorgos csikkal. Az előtest hosszánál alig vagy nem keskenyebb, magasló az oldalak és a nyelecske felé reszútösen vagy ivesen lecsapott, elől elvágott, vagy ivesen elvágott, a fejszéle soha sem éles.

A bordáskörmök rendesen lehajló kampóval, 4—6 erős bordával, alattuk gyeren osztott serték állanak. A megkülönböztetésnél az ivarszervek a határozók, a második sorban a szemek, a harmadikban a lábak fegyverzete is könnyit a megkülönböztetés nehezsegein.

SPEC. 1. FAJ. XYSTICUS IMPAVIDUS¹ TH. BÁTOR KAPARÓPÓK. KUINE SCHARRSPINNE.

(impavidus = bátor; az erős testalkatról.)

Syn. 1871. *Xysticus impavidus* THORELL «Remarks» p. 230.

♀ Nagy. Előteste elenk barasárga; széles, világosab közepsávval, mely elől sötetedik. Az egész igen magas, szélességénél nem hosszabb, a nyelecskefele meredek-ivesen lecsapott; e lejtőn a közepsávtól két-oldalt egy-egy sötétebb folt. A fejrsz ivesen elvágott. A végtest szélességénél alig hosszabb, szürkessárga, egészen elmosódó hátlapal s ilyen középrajzzal. A lábak barnássárgák, sötétebb pont és foltszerű tarkasággal elegyítettek.

A zár köldökszerűen kiemelkedik, barnássárga és egy közös keretben két vesecské, a homorúsággal egymásfelé fordított nyílást mutat, melyet egy széles lemez elválaszt (00).

Az alsó szemsor könnyeden kihajló, oldalszeméi a középsőknél sokkal nagyobbak s közelebb állanak a középsőkhöz, mint ezek egymáshoz; a középsők körülbelül annyira egymástól, a mennyire a homlok szelétől. A hátsó sor kihajló, oldalszeméi a középsőknél csak kevésbé nagyobbak, ezektől akkora távolságra, a mekkora a középsők közötti távolság. A két sor középsői oly dereknégyszöget alkotnak, mely magasságánál valamivel szélesebb. A homlok sok rendetlen állású sertével. Az első lábpár szárán, alul, rendesen 13 tüske két sorban: az előszelen 7, a belsőn 6, a két sor hossza közepén egy szabad tér, mely nagyobb annál.

¹ Ugylátszik azonos a X. luctator K. L. fajjal, s ha igen, úgy e névé az elsőbség, minthogy Koch L. 1870-ben írta le «Beitr. zur Kenntn. der Arachn. Fauna Galiziens» p. 29.

a mely a tüskék között rendesen elterül: a másodvégizen, alul, hat pár tüske: a második lábpár szárán és végizen, alul úgy mint az első paron.

A rágók barnássárgák, tövüknel nem egészen kétszer oly szélesek mint véőükön. Az állkapcsok keskenyek, összehajlók, barnássárgások: az alajk valamivel sötétebb, az állkapcsok hossza két harmadának megfelel. A tapogató barnássárga, felületén sok, tüskeszerű sertével inkább fegyverzett mint fedett, végize rövidebb mint a térd és szár együttvéve.

Mértékek: ♂ Törzs	12	$\frac{m}{m}$ ebből
fejmell	4	"
I lábpár	12	"
II "	11.5	"
III "	8	"
IV "	9	"

♂ Kisebb, karecsűbb; a törzs eserbarna alapszínnel. A fejmell szélesre fejlett, közepén egy széles, világos sárgászöröses szalaggal, mely a nyelecske felől világosabb, közepén villaszerűen behasított: a hátsó sor középszemei között s tehát a középszalagban két barnás hosszvonás látható. A végtest, felülről tekintve, egy finom, sárgásfehér, de egyenetlen szegélyt mutat, fűreszfogas rajza csak vázlatosan tűnik elő. Valamennyi lábezomb és térd barnás, az utóbbi izek azonban világosabbak; a két első lábpár többi íze barnássárga, egyszínű, a harmadik és negyedik lábpár többi íze barnássárga, minden iz végén egy barna gyűrű. A tapogató kurta; térdize elkerekített, vastagságánál nem hosszabb; száríze vastagságánál rövidebb, külső oldalának a végén egy hüvelykujjszerű nyujtvánnyal, mely a pikkelyhez illeszkedik, — alul egy karajszerű, elől en egyenesen elmetsett nyujtvánnyal; a pikkely szélesen kanálalakú, nemzőszerve egy lencsealakú, finoman barnán szegélyezett gyűjtőből áll, melyből (oldalról tekintve) két, majdnem egyenlő vastagságú nyujtvány emelkedik, e nyujtványpár, egymásfele hajolva végeivel, érintkezik, a hátulfelől álló nyujtvány kevésbé hajlott.

Mértékek: ♀ Törzs	6	$\frac{m}{m}$ ebből
fejmell	3	"
I lábpár	12	"
II " "	11.5	"
III " "	8	"
IV " "	8.5	"

Mint nyári alakot, leginkább bokros helyekről ismerem, erdélyi részekből Kolozsvárról és Mező-Zahról; magyar részekből Alsó-Dabasról (Muz. gy. Metelka F.).

SPEC. 2. FAJ. XYSTICUS CRISTATUS. (CL.). TARAJOS K. KAMM S.

(cristatus = tarajjal ellátott; a fejrészen álló sertékről.)

Syn. 1757. *Araneus cristatus* CLERCK «Ar. Suec.» p. 136.

Vide: THORELL «Remarks» pag. 236.

♀ Elötteste barnás, magas, a hatgödörtől kezdve a nyelecskere lecsapott; felülete lemezszerűen lapos, barnás ekkal, mely élével hátrafelé néz s a nyelecskétől jövő fehéres, villásan oszló szár által szegélyezett; szélességénél nem hosszabb. A végtest szélességénél alig hosszabb oldalai barnássárgák vagy sárgás szemnyesfehérek, lapja élesen határolt, barnás vagy szürkésbarna, középsávja világos, széles, éles körírajzú s rendesen minden oldalon három-három visszhorog vagy fűreszfogszerű ágat bocsát a hátlap szelei felé. A lábak barnássárgák, a két hátulsó rendesen némi barna pettyezettséggel.

A zár kisse köldökszerűen emelkedett, vörössárga, neha barnás, két körded nyílással, melyek egy széles, a köldök síkjába felemelt, lapos)(szerű lemez által elválasztatnak. Az elválasztó lemez hátul horgony vagy megfordított L formára elágazik. Az alsó szemsor igen kevese kihajló, oldalszemei a középsőknél bőven kétszer nagyobbak; a középsőktől kevesebb mint két átmérőnyi távolságra esnek, a középsők ennél sokkal távolabbra egymástól s egyszersmind távolabbra egymástól mint a homlok szélétől. A hátsó sor kihajló, oldalszemei a középsőknél határozottan nagyobbak, szemei egymás között egyenlő távolságra, mely nem kisebb annál, a mely az alsó középsők között elterjed. A két sor oldalszemei tetemes dudorokon állanak; a két sor középsői oly deréknégyszöget alkotnak, mely magasságánál valamivel szélesebb. A homlok szélén hat serte, az alsó középszemek alatt egy serte a kellő közepén; az oldalszemek alatt minden oldalon két-két serte.

A lábak fegyverzete, jelesen az első páre, igen változó; neha ugyanannál a példánynál a ballábszáron, alul négy, a jobblábon 5 pár és még egy páratlan tüske, a másodvégizén öt-öt pár tüske; a második lábpár szárain, alul, negy-négy pár, a másodvégizén szintén négy pár tüske; a harmadik lábpár szárain, alul, két pár és egy tüske, a negyediken ugyanott 2-3 tüske. A rágók laposkásak; előlről tekintve, tövükön kétszer oly szélesek mint végükön, barnássárgák, gyeren álló fekete sertekkel. Az állkapcsok keskenyek, összehajlók sárgásak, az alajk többnyire sötétebb, az állkapcsok hosszának két harmadrészet eléri. A tapogatók barnássárgák, végizük felül tuskes-szőrös s kevéssel rövidebb mint a tord és szár együttveve.

Mertekek: ♂ Törzs	7.5 $\frac{m}{m}$ ebből
fejmell	2.9 "
I lábpár	9 "
II "	8 "
III "	5.5 "
IV "	6.2 "

♀ Kisebb, karesubb, Sötetbarna alapszinnel, melyen a nőstény rajzai sárgásfehér korvonalozás által jelölve. A két első lábpár czombja es térde vörösbarna, a többi része barnássárga, a két hátsó lábpár barnássárga, vörösbarna, elmosódó foltokkal. A tapogató barnássárga nyelvű, pikkelye valamivel sötétebb, szára a ferdnél sokkal rövidebb, küloldala végén egy rövid, erős tövisbe végződik, alul egy kurta, széles, lapiczkás nyújtványt boesát; a nemzőszerv, a pikkely belső oldaláról tekintve, egy széles alapú, előre kanyargó eles fogatmutat, melylyel szemközt egy T szerű, karesű nyújtvány látható.

Mertekek: ♂ Törzs	4.5 $\frac{m}{m}$ ebből
fejmell	2.1 "
I lábpár	9 "
IV "	5.4 "

Mint tavaszi es nyári alak a X. Kochiival úgy tartózkodásra mint életmódra nevezve megegyezik; mint leghajóst ritkábban észleltem. Ismerem: erdélyi reszekből: Kolozsvarról, Mező-Záhrol, Megygyesről es Szász-Vesszősről; magyar reszekből: Doroszlóról, Palánkáról, Orsováról, Tokajból, Rakamazról, Selmecz-bányáról, Nagy-Váradról (Muz. gy. Moesáry), Pécs vidékeről (Muz. gy. Friwaldszky es Pável), Unghvárról (Vidra Ferd.).


SPEC. 3. FAJ. XYSTICUS KOCHII. THOR. KOCH K. KOCHS S.

(Dr. KOCH LAJOS kitünő német Araneologus tiszteletére.)

Syn. 1871. *Xysticus Kochii* THORELL «Remarks» p. 241.

♀ Sárgásszürke: a fejmell oldalai sötétebbek. A fejmell a hátgödörtől kezdve a nyelecskefelé meredeken lecsapott. A végtest lapos, hátsó feleben oly széles a milyen hosszú, előre felé módosan keskenyedő, oldaliban sárgásszürke, hátlapja szürkésbarna, e lapban egy széles, jól látható sárgásszürke, széles közepsáv.


mely az első ingödör-páron túl kezdve legalább három visszhorog-(füreszfog) szerű ágat bocsát, lábai sárgászürkék. A végtest egy es felszer (vagy kevesebb) hosszabb a fejmellnél.

A zár egy vörösessárga vagy barnás, módos domborodású köldök, hosszukás kettős nyílással, melyen elől egy háromszögletes nyujtvány áll () , belül egy határozatlan hosszlemez által választatik el egymástól; a lemez gyenge, keskeny. Az alsó szemsor alig kihajló, oldalszemei a középsőknél kétszer nagyobbak s ezektől kettős (oldal) szemátmérőnyire állanak, a középsők ennél sokkal távolabbra egymástól s egyszersmind sokkal távolabbra egymástól, mint a homlok szélétől; a hátsó sor kihajló, oldalszemei a középsőknél valamivel nagyobbak. — szemei majdnem egyenlő távolságra egymástól s e távolság nem kisebb annál a mely az alsó középsők között elterül. Az oldalszemek tetemes dudorokon állanak. A két sor középsői oly deréknégy-szöget alkotnak, mely magasságánál valamivel szélesebb. A homlok szélén hat fekete serte, az alsó közép-szemek alatt egy serte; minden oldalon az oldalszemek alatt két-két serte.

Az első lábpár szárán, alul, a külső soron öt, a belső soron három tüske, másodvégizén, alul, öt pár tüske. A második lábpár szárán, alul, három, másodvégizén öt pár tüske. A harmadik lábpár szárán, alul, két pár, a negyedikén egy nagyobb tüske.

A rágók laposkások; előlről tekintve tövük közel kétszer oly széles mint végök, serteszerű szőrözöttek gyer; különben sárgásszürkék s a homlok magasságánál valamivel hosszabbak. Az állkapcsok keskenyek, hosszuk, egymásfelé hajlók, sárgások, az alajk nyelvalakú az állkapcsok felehosszánál több, ketharmad-hosszánál kevesebb. A tapogatók sárgások, a szár és végiz, felül, sertes, a végiz oly hosszú mint a térd és szár együttvéve.

Mértekek: ♀ Törzs	6.4— 8.7 $\frac{m}{m}$ ebből
fejmell	2.8— 3 "
I lábpár	10.5 "
II "	10.5 "
III "	6.4 "
IV "	7.3 "

♂ Kisebb, karsu. Alapszíne sötétbarna, a nőstényéhez hasonló rajzok úgy az elő mint a végtesten sárgásfehér körrajzok által vázoltatnak. A két első lábpár czombja és térdje sötétbarna, sárgásfehér pettyekkel gyéren tarkázva, a többi íz világos barnássárga; az első lábpár czombján, felül, 8-10 hosszú tüske rendetlen állásban. A két hátsó lábpár barnássárga, sűrű barna pettyezetéssel. A tapogató barnássárga, barnával elegyes, száríze a térdnél rövidebb, külső oldala, kissé aláfele, egy hosszú, erős, kissé a pikkely üre fele hajló nyujtványt visel, mely magánál az iznél nem rövidebb; a pikkely kanálalakú, módosan szőrös; a nemzőrész — a tapogatót belső oldaláról tekintve — jellemezve van egy fogószerű, kettős nyujtvány által, melynek ágai egyenlő vastagságúak es oldalt-befele irányzottak () , a gyűjtő felett egészen szabadon kiállók.

Mertekek: ♂ Törzs	4.8 $\frac{m}{m}$ ebből
fejmell	2.7 "
I lábpár	10 "
IV "	6 "

Leginkább elterjedett faj, mely nagyságra, a hímeknél színezetre nézve is, változó, úgy hogy felismerése csak a nemzőrészek segítségével biztos. A régibb íróknál e faj nőstényei irattak le legtöbbször «X. viaticus» nev alatt, de úgyannyira összetévesztettek más fajokkal, hogy az «X. viaticus» eredeti típusa megalapíthatatlan s a nev az u. n. obscurus nevek közé soroltatott.

Poros utakon, bokrokon, fűben, karókon stb. mint tavaszi és nyári alak az aljakban közönséges, lassan jár s nagymester a preda alattomos megtámadásában. Karókon rendszeren a csúcsához közel megkapul s a csúcsra megtelepedő rovarokat, de fajbelieit is, lassu kúszással megközelelti — et előlabpárját fogószerűen kinyujtva tartva, csak a két hátsó párral mászik — kellő távolságra érve prédáját hirtelenül átkarolja, ha erős, pár fonállal lepanyvázza. Tavaszkor — jelesen ifjabb nemzedéke, a legszorgalmasabb fonalrópító-leghajósok közé tartozik.

Ismerem: erdélyi részekből: Kolozsvárról, Mező-Záhról, Olahfenesről, Balánbányáról; magyar részekből: Doroszlóról, Palánkáról, Illokról, Pancsováról, Orsováról, Jeselnitráról, a veteráni barlang tájáról, S.-A.-Újhelyről, az Alsó-Hámorból, Nagy-Váradról (Muz. gy. Moesáry), Budáról (Muz. gy. Pável), Mehádiáról (Muz. gy. Friwaldszky), Dabasról (Muz. gy. Metelka Ferencz), Pest (Muz. gy. «Csillagvölgy» Pável János).

SPEC. 4. FAJ. XYSTICUS LATERALIS. (HAHN). OLDALAS K. SEITEN 8.

(lateralis = oldalas; a végtest diszitására vonatkozik.)

Syn. 1831. *Thomisus lateralis* HAHN «Die Arachnid.» I. p. 40.

Vide: THORELL «Remarks» pag. 231, 232, 538.

♀ Előteste elenken sötét-cserbarna, sárgásfehér, széles közepcsikkal, melyben semmi ekfolt nincsen, vagy csak elmosódva — néha éppen csak néhány szennyes-barnas folt által jelöltetik; a mellresz sárgásfehér, finom szegélyvel; az egész előtest magas, felül, a csik szélességében, lemezszerűen lapos, hátul, túl a nyelecske felé, szepen meredek-ívesen lecsapott, e meredek részen a csiktől két oldalt egy-egy sötétebb folt. A végtest szélességénél alig hosszabb, elől keskenyebb, hátul körszerűen elkerekített, szélesebb, kissé lelapi-tott; oldalai, különösen elől, elenken pirulók, néha sárgásfehérek. A hátlap cserbarnas, középrajza ren-de-sen csak két visszhorog vagy fűrészfogszerű oldalágat bocsát. A lábak elenken barnássárgák s az előpárok czombjai néha vörössel elegyítettek vagy sötétes foltokkal tarkáltak.

A zár igen jellemző; köldökszerű, vörössárga emelkedesen gombostüfejszerű két vorosbarna fenyés dudor áll, melyet egy meglehetősen széles, vörössárga lemez választ el (✕).

Az alsó szemsor igen könnyeden kihajló, oldalszemei a középsőknel közel kétszer nagyobbak s valamennyi szeme majdnem egyenlő távolságra egymástól (a középsők alig megkülönböztethetőleg távolabbra egymástól), a középsők kevéssel közelebb a homlok szélehez mint egymáshoz. A hatsó szemsor kihajló, oldal-szemei a középsőknel nagyobbak s láthatólag távolabbra állanak a középsőktől mint ezek egymástól. A két sor középsői dereknégyszöget kepeznek, mely szélességénél nem magasabb.

A homlok szelen rendszeren nyolcz serte, az alsó középszemek alatt, közepen, egy serte, az oldalsze-mek alatt, oldalt, ket-ket serte, ezek között egy hosszabb és egy rövidebb serte.

Az első lábpár szárán es másodvégizen, alul, rendszeren hat-hat pár tuske; a második lábpár szá-rán hat, másodvégizen öt pár tuske; a harmadik lábpár szárán két pár es egy — a negyedikén két tuske. A ragók laposkások, tövük kevesebb mint kétszer oly széles mint végök, serteik gyéren állanak. Az állkapcsok keskenyek, összehajlók, sárgások; az alajk sötétebb, az állkapcsok hosszának két harmadát bőven eléri. A tapogató barnássárga, felül sertesen szőrös, barnapettyes, végize rövidebb mint a szár és terd együttvéve.

Mertekek: ♀ Torzs	8	$\frac{m}{m}$ ebből
fej mell	3.5	»
I lábpár	10.7	»
II » 	10.5	»
III » 	7	»
IV » 	8	»

♂ Kisebb, karcsúbb, elenk színezetű. Fejmelle elenk cserbarna, alig világosodó közepcsikkal, ebben, a hát közepe táján, egy fehérsárga előre nyúló \vee szerű sarokfolt. A végtest alapszíne sötétbarna, szegélye finom, sárgásfehér, visszborgos középrajza elenken sárgásfehér cserbarna foltokkal. A lábak elenken bar-nássárgák, a két első pár czombja es terde cserbarnával foltozott és pettyezetett.

A tapogató barnássárga, szára a terdnel sokkal rövidebb, külső oldala vegen egy, a pikkely szélehez szorosán illeszkedő rövid nyújtvánnyal, alján egy karejszerű lapos nyújtvánnyal, mely szélességénél nem hosszabb. A pikkely kanálalakú, módosan szőrös, nemzőszerve sötétvörös-barna, rajta egy befelé görbülő egyszerű, hasonlószerű nyújtvány áll (>).

Mertekek: ♂ Torzs	5.2 $\frac{m}{mm}$ ebből
fejmell	2.8 "
I lábpár	10 "
IV "	6.8 "

Eddig mint nyári alakot csak Doroszlóról ismerem; Pecs vidékeről egy példány a magyar nemzeti muz. gyűjteményében, gyűjte Friwaldszky János úr.

SPEC. 5. FAJ. XYSTICUS SABULOSUS. (HAHN). FOVÉNYES K. SAND S.

(sabulosus = homokos; lehet a tartózkodásról és színezetről is.)

Syn. 1831. *Thomisus sabulosus* HAHN «Die Arachniden» I. p. 28.

Vide: THORELL «Remarks» p. 249.

♂ Előteste barna, sárgával mintegy márványozott; a mellrész közepén ágasan oszló esiknyalábbal, mely a szemek között is elterjed, a homlok felső ele, az oldalszemek dudorait is befoglalva, csontsárga; végteste barna, széle — különösen elől — sárgásan szegelyezve, a füreszesrajznak csak vázlata még pedig csontsárga, az oldalakból benyomuló, keskeny harántcsíkokkal van megjelölve, e csíkok csak a végtest végén összeérők, a felsőbbek a közepén megszakítottak; lábai barnák, némi sárgás márványzattal, mely a két hátsó páron leginkább feltűnik.

E faj leginkább a hím tapogatójának sajátzerű berendezése által különbözik fajrokonaitól. A tapogató rövid, terde a vastagságánál alig hosszabb; szára hosszúságánál szelesebb és külső oldalának a vége egy a pikkelyhez alkalmazkodó hosszú vékony nyujtványba megy át, e nyujtvány — körömszerűen végződve — a pikkely megfelelő (külső) oldalán kiáll s alulról tekintve, a pikkely oldalfogacsának látszik lenni, ugyancsak a szár még alülfelül is egy görbült, vaskos nyujtványt bocsát, mely egészben előre irányzott, míg görbülete befelé es oldalt igyekszik; a gyűjtő lencsealakú, lapos, elől félholdszerűen kimetszett, *capta semmi fogacs vagy tövis nem létezik*

Mertekek: ♂ Torzs	4.4 $\frac{m}{mm}$ ebből
fejmell	2.3 "
I lábpár	9.2 "
II "	9 "
III "	6 "
IV "	6.5 "

♀ Előttem ismeretlen.

E pókot, egész biztossággal, csak Kolozsvár környekeről ismerem, hol kerti utakon es a bokrok tövével heverő lehullott lomb alatt fordult elő.

SPEC. 6. FAJ. XYSTICUS BIFASCIATUS C. K. KÉTCSÍKOS K. DOPPELBINDIGE S.

(bis, fascia = kétszer, csík; a fejmell világos rajzáról.)

Syn. 1835. *Xysticus bifasciatus* C. KOCH «Übers. des Ar. Syst.» I, p. 26.

1837. Idem «Die Arachniden» IV, p. 59. (saltem ad partem)

Vide: THORELL «Remarks» p. 234.

♀ Előteste sötét-sárgabarna, felül lemezszerűen lelapított, barnas; a nyelecsketől egy világos- barnássárga sáv indul, mely a mellrész közepe táján két keskeny ágra oszlik, ezek az ágak az oldalszemekig tartva, két csikra emlékeztetnek. A fejmell vaskos, magas, a nyelecsketől igen boltozatosan emelkedett.

A végtest hosszánál nem szelesebb, elől keskenyebb, hátul elkerekített, oldalaiiban fehéres vagy szürkés, hátlapja sárgásszürke, középrajza neha elenyésző, rendszeren három visszhorog vagy fűrészfogszerű oldalrajzzal. Lábai sötét-barnássárgák, felül világos, sárgás hosszsesíkokkal.

A zár köldökszerűen emelkedett, sötét-vörösbarna s egy majdnem körforma nyílást mutat, mely mögött (a légzőrés felett) a keret szeles, fényesen vörösbarna, a köldökszerű emelkedés két oldalán két-két sekély horpadás látható.

Az alsó szemsor könnyedén kihajló, oldalszemei a középsőknél sokkal nagyobbak; a középsők annyira egymástól mint a homlok széletől s távolabbra egymástól mint az oldalszemektől. A hátsó sor kihajló, oldalszemei a középsőknél valamivel nagyobbak, valamennyi szem egymás között egyenlő távolságra. A két sor középsői oly dereknegyszöget alkotnak, mely oly magas a milyen széles.

Az első lábpár szárán, alul, kilencz tüske ket sorban, a külső soron öt; másodvégizen, alul, rendszeren hat pár tüske; a második lábpár szárán rendszeren öt, másodvégizen — hét pár tüske; a harmadik pár szárán, alul, egy pár és egy tüske, a negyediken egy nagyobb tüske.

A rágók sárgabarnák, laposok, tövüknel kétszer oly szélesek mint végöknel. Az állkapcsok keskenyek, alig egymásra hajlók, barnássárgák; az alajk az állkapcsok hosszának két harmadát eléri.

A tapogató barnássárga, bőven szőrös, végize alig rövidebb mint a ferd és szár együttve.

Mertekek: ♀ Törzs	11 $\frac{m}{m}$ ebből
fejmell	4 „
I lábpár	12.7 „
II „	11.8 „
III „	8 „
IV „	8.5 „

Neha kisebb, törzs: 8 $\frac{m}{m}$ I lábpár 10.2 $\frac{m}{m}$

♂ Elöttünk ismeretlen.¹

Magam csak egy példányát ismerem Doroszról: a magyar nem. muzeum gyűjteményében két példány «Mehadia és Orsova» jelzővel, gyűjte Friwaldszky Janos nr.

SPEC. 7. FAJ. XYSTICUS ULMI. (HAHN) SZIL. K. ULMEN SCH.

(ulmus = szilfa; kedvencz tartózkodásáról.)

Syn. ♂ 1831. *Thomisus Ulmi* HAHN «Die Arachniden» I, p. 38.

♂ 1861. *Thomisus erraticus* BLACKWALL «Spid. of Gr. Brit. and Ir.» I, p. 71.

Vide: THORELL «Remarks» p. 246.

♀ Elötteste a nyelecsketől ivesen emelkedő, felül lemesszerűen lapos, sárgásbarna, egy világos közép-csíkkal, mely a szemesoport szélességének közel megfelel; e közep csikban egy ekalaku sötetebb betét, mely eleve a nyelecske felé fordított, s melynek csucsát a hátrés kepezi. Lábai barnássárgák. Végteste igen világos sárgásfehér oldalakkal és hassal, felületén a végtest körtealakjának megfelelő korrajzu halvány bebarmitással, mely az oldalak világos színetől egy finom, barnás szegély által választatik el; e barnás hátmező közepén egy elmosódó, fehéressárga, széles hosszsesík, mely a végtest hosszának közepe táján, ket oldalt, viszszhorogszerű ágat bocsát s ez ágbocsátást neha még egyszer ismétli; a hátmező vége felé egy vagy ket szinten világos \wedge szerű harántesík, neha igen finom barna vonalak által szegélyezve. A végtest nem egészen kétszer oly hosszú mint a fejmell, legszelesebb helyen saját hosszánál keskenyebb, lelapiított felületű, körtealaku, elkerekített csucsával előrefele irányzott.

¹ THORELL l. c. «The bulbous genitalis hat in *X. bifasciatus* on its under side, near the base, two *strong, long, spine-like processes*, which the greater part of their length run *parallel with each other*, only with their inward curved extremities diverging at an acute angle.» etc.

A zár egy apró, köldökszerű, barnássárga emelkedés. ∇ szerű nyílással, melyben két megközelített apró, fénylő és sötétebb dudorodás látható.

Az alsó szemsor könnyeden kihajló, oldalszemei kétszer akkorák mint középsői s ezekhez oly távolságra állanak, mely kétszeres átnerőjüknek megfelel; középszemei emel valamivel távolabbra egymástól s annyira a homlok szélétől, a mennyire egymástól. A hátsó sor kihajló, oldalszemei a középsőknél alig nagyobbak, az alsó oldalszemeknél sokkal kisebbek, szemei egyenlő távolságra egymástól, mely nem nagyobb az alsó sor középsői közöttinél. Mind a két sor középsői dereknégyszöget kepeznek, mely magasságánál alig szélesebb; a két sor oldalszemei tetemes dudorokon s nem távolabbra egymástól, mint az alsó középsők a felső középsőktől. A homlok legszélén 7 vagy 8 fekete serte, az alsó középsők alatt és távolságuk közepének megfelelően, a hét vagy nyolczhoz függőleges viszonyban még két serte.

Az első lábpár szárán, alul, öt pár, — a másodvégizen, alul, öt pár erős tüske, a tüskék néha páratlanok s a külső soré a nagyobb szám; — a második lábpáron hasonlóképpen. A harmadik lábpár szárán, alul, két pár és egy tüske, a negyediken három tüske egymásmögött.

A rágók vöröses-barnasárgák, a homlok magasságánál alig hosszabbak, laposkások; tövükön — elülről tekintve — kétszer oly szélesek mint végükön. Az állkapcsok keskenyek, összehajlók, az alajkkal együtt vörössárgák; az alajk az állkapcsok hosszának kétharmad részét eléri. A tapogató szára es végize felül tüskés, végize alig rövidebb mint a szár és térd együttvéve.

Mértékek: ♀ Törzs	7 $\frac{m}{m}$ ebből
fejmell	2.8 "
I lábpár	9 "
II "	8.7 "
III "	5.9 "
IV "	6.8 "

♂ Kicsiny, sötétvörösbarna, fejmelle közepén egy, eleve hátrafelé fordított vörösbarnás ék, a nyelecske felől villaszerű, kétágú, sárgásfehér határral; a sötét-vörösbarna végtesten egy egészen körülfutó, keskeny, sárgásfehér oldalesik, a hátmezőn a nőstény rajzai sárgásfehér szegélyek által körvonalazva. A két első lábpár czombja és térdé sötét-feketebarna, szára és vége vörössárga, a két hátsó lábpár sötétebb vöröses-barnasárga. A tapogató vöröses-barnasárga, pikkelye kanálalakú, módosan szőrös, szára alig felét éri a térd hosszának, külső oldala végén egy erős nyujtványt bocsát, mely a pikkely széléhez alkalmazkodva, egy eles, kis, könnyeden hajlott körmöcskébe végződik, a szár e nyujtványán kívül, alul, még egy széles karéjszerű, elkerekített, a pikkely üre felé hajló, sötétbarna, lapos nyujtvány látható, mely a szárnál hosszabb; a nemzőszerv egy sötét-vörösbarna dudor, külső oldaláról tekintve két vékony nyujtványt mutat, melyek közül a hátsó rövidebb, az első emel kétszer hosszabb kissé csavarosan befelé-oldalt hajló.

Mértékek: ♂ Törzs	4.2 $\frac{m}{m}$ ebből
fejmell	2.5 "
I lábpár	8 "

Mint tavaszi alakot füzekről és a tómelleki sáros helyekről Doroszlóról ismerem.

SPEC. 8. FAJ. XYSTICUS PEROGASTER. TH. HASAS K. BAUCHIGE SCH.

($\pi\acute{\epsilon}\rho\tilde{\alpha}$ = tulság jelzője, $\gamma\alpha\sigma\tau\acute{\iota}\rho$ = has; a végtest magyságáról, jelesen nyujtott alakjáról.)

Syn. 1871 *Xysticus perogaster* THORELL. «Remarks» p. 249.

♂ A végtest hossztojásdad, szélességénél egy felszer hosszabb. Fejmelle szélességénél hosszabb, szép barnasárgás foltokkal, világosabb, széles közepesikkal, mely a hátrés előtt a szemekig elmosódó sötétebb hosszfoltokkal elhomályosított. A fejmell szélességénél hosszabb, domború, a hátrés táján kissé behorpasztott s a nyelecskefele lankasan lecsapódó.

A laposodó végtest szélei, különösen elől és az oldalakban finom elenken-fehér szegélylyel, mely szegély hosszráczos s a végtest vége felé elenyészik.

A végtest alapszíne barna, középrajza vörösesbarnás, ékalakú s hegyével közel a fonóig terjed, szélei módos de sűrű csipkézettel, a végső csipkék csúsa pontszerűen fehér, s itt a középrajzban barnás harántesíkok láthatók. A has vörösbarna, néha pettyezett, kétoldalt elmosódó, világos szegélylyel. A lábak sárgásbarnák, felületük egész hosszában egy világosabb csík, mely a czombokon kevésbé kifejlődött.

Az alsó szemsor könnyedén kihajló, oldalszemei a középsőknél kétszer nagyobbak, a középsőkhöz közelebbre állanak mint a középsők egymás között; a középsők amennyire egymástól, a mennyire a homlok szélétől. A hátsó sor kihajló, oldalszemei a középsőknél nagyobbak, a középsők alig észrevehetőleg közelebb egymáshoz mint az oldalszemekhez. A két sor oldalszeme tetemes dudorokon áll, a két sor középsői oly derék négyszögben elhelyezettek, mely oly magas a milyen széles.

A lábczombok felül tüskések, az első páron három és négy tüske két sorban, a többin 3 tüske egy sorban. Az első pár szárán, alul négy, másodvégizén alul, öt pár tüske.

A tapogató barnás, száríze a térdnél sokkal rövidebb, külső oldala végén egy nyujtvánnyal, mely egy kis fekete, sarló alakú, a pikkely széle felé hajló hegyes körmöcskébe végződik; alsó felén egy másik nyujtvány, mely szélességénél hosszabb végen elkerékített és előrefelé lekonyult; a nemzőrész lencsealakú, sötétvörösbarna, külső széle felé kissé behorpasztott, s itt — éppen a széleből — egy karéjszerű, apró, a pikkely szélét alig meghaladó nyujtvánnyal ellátva, a szár körmös, felső nyujtványa a nemzőszervét megközelíti (az egész szerkezet alólól vizsgálandó).

Mértekek: ♂ Törzs	5	$\frac{m}{m}$ ebből
fejmell	2.4	»
I lábpár	10.5	»
IV »	6	»

♀ Nagyobb; végteste tojásdad, szélességénél 1.3-sz. hosszabb, sárgásszürke, elmosódó, széles, vislhorgos középrajzzal. Fejmelle szélességénél valamivel hosszabb, sárgásszürke széles középesíkkal; homlokán gyeren álló, erős fekete sertékkal, melyekhez hasonlóak a tapogatókon is láthatók. Lábai sárgásszürkek, felületükön barnásan vonalozva — pontozottak; az első pár czombja felületen, rézsüntös sorban álló három fekete tüske, szárán alul, három — másodvégizén négy pár tüske, az utóbbin oldalt is még egy két tüske.

A zár egy sötétvörösbarna, fényes és terjedelmes kerek köldök, tojásdad nyílással, melynek felső (a nyelecske felőli) feleben egy szabálytalan formájú sárgás dudor látható. ¹

Mértekek, ♀ : Törzs	5.7	$\frac{m}{m}$ ebből (terhes 7.4 $\frac{m}{m}$)
fejmell	2.5	»
I lábpár	7.3	»
II »	7.3	»
III »	4.8	»
IV »	5.3	»

Mint őszi alakot (október) eddig csak Veszprémből ismerem, hol kökenybokrokron találtam.

¹THORELL l. c. azt mondja: Vulva ex sulcis vel foveolis oblongis duabus subparallelis, costa media longitudinali testacea satulata, convexa, duplo circiter longiore quam latiore disjunctis, constare videtur. Ugy látszik, hogy THORELL példányai ifjabbak voltak, a melyeknél a zár kerete még nem fejlődött ki köldökké.

SPEC. 9. FAJ. XYSTICUS MARMORATUS. THOR. MÁRVÁNYZOTT K. MARMORIRTE SCH.

(A színek élénkségéről.)

Syn. 1875. *Xysticus marmoratus* THORELL «Verz. südruss. Spinnen» p. 54.

1875. » » idem «Descr. of several Europ. au N. Afr. Sp. p. 135.

♀ Barnán s szürkessárga vegyületű alapszínezet, az utóbbi az uralkodó; rajzai élesek. A fej mell oldalai szépen barnák, leghátul két apró esontfehér folttal; a fej mell teteje széles csikkal, mely a fej részen barnával elegyített, a nyelecskefelé tiszta esontfehér; a felület ripacsos, rövid sertékkal eléggé ellátott; az oldalszemek dudorai fehéredők. A fej mell szélességénél nem hosszabb ($2\cdot3 \frac{m}{m}$), oldalról tekintve, a nyelecskétől ívesen emelkedik. A végtest szélességénél hosszabb, felülről tekintve a fonók kissé kilátszanak, elől különben keskenyebb mint hátul. A hátlap barna, középrajza világosabb, belsejében barnán zavaros, oldalt három-három fűrészfogsezrű, élesen kifejezett ággal; a hátlap a világosodó oldalak felé szintén csipkés. A lábak esontfehér és barna vegyületűek s ez utóbbi szín a két hátsó lábpáron gyűrűzetes jeleget ölt.

A zár igen jellemző: egy patkóalakú félkeret közepén egy gombostűfejhez hasonló sima-fenyés, vörössárga dudorból áll.

Az alsó szemsor módosan kihajló, középszemei távolabbra egymástól mint a nagy oldalszemektől ezek a középsőkhöz oly távolságra, mely átmérőjüket (az oldalszemét t. i.) csak kevéssel haladja meg, a középszemek sokkal közelebb a homlok széléhez mint a hátsó középsőkhöz.

A hátsó sor kihajló, oldalszemei a középsőknel valamivel közelebb egymáshoz mint az oldalszemekhez.

A két sor oldalszemei fehérlő dudorokon allanak; a két sor középsői oly negyszöget alkotnak, mely szélességénél nem magasabb.

Az első lábpár szárán, alul, hét gyengébb tüske két sorban, — másodvégizén, alul, öt pár tüske.

A többi lábpár hasonló ízei szintén tüskések.

A rágók laposkások, esont-fehérlők, kevés barnás ripacsos és sertével, a homlok magasságánál kevéssel hosszabbak. A tapogatók esontsárgásokba ma foltokkal és kevés tüskével, végizök oly hosszú, mint a térd és szár együttvéve.

Mertekek ♀ : Törzs	$7\cdot5 \frac{m}{m}$ ebből
fej mell	$2\cdot8$ »
I lábpár	8 »
II »	8 »
III »	$5\cdot8$ »
IV »	$7\cdot6$ »

♂ Az ivarérett him előttem ismeretlen; a harmadvedlésű csak bunkósodó tapogatói által különbözik a nőténytől.

E fajt csak két példány után ismerem: egy eretlen him Rákos Palotáról (Muz. gy. Pavel János), egy ivarérett nőtény Doroszlóról.

SPEC. 10. FAJ XYSTICUS ROBUSTUS. (HAHN). VASKOS K. VIERSCHRÖTTIGE SCH.

(robustus = trop. értelemben; vaskos; az alajk erőteljességéről.)

Syn. 1831. *Thomisus robustus* HAHN «Die Arachniden» I. p. 50.? 1802. *Aranca fucata* WALCKENAER «Faun. Par. II. p. 232.

Vide: THORELL «Remarks» p. 251 et 535.

♀ Rendkívül zömök, vaskos alak, végteste alig hosszabb és alig szélesebb a fej mellnél; a fej mell oly hosszú, a milyen széles ($4 \frac{m}{m}$), magasan domború, hátul ívesen lecsapott, felülete ripacsos, a ripacsokon

kurta, erős fekete tüskék; a végtest elejének az ele szinten tüskés. A lábak rendkívül vaskosak, aránylag rövidek, sok kurta, fekete tüskével fegyverezettek.

Az előtest sötét, világosabb barna és fehéres színvegyületet, mintegy finom márványozást mutat.

Az oldalszemek dudorai előfelőkön csontfehérek (éles szem nagyítás nélkül is kiveheti); a közép-szemektől a hát közepéig egy elmosódó finom barna vonás (leginkább borszeszben) látható, melynek hátsó végétől ismét egy horgonyszerűen az oldalszemek felé kanyarodó vonás követhető.

A végtest hasonlóan márványozott, de visszahorgos középrajza, mely némileg világos, kivehető, széles, minden oldalon megkülönböztethető három visszahoroggal. A háton öt ingödör látható; négy páros és egy a végtest elején.

A végtest oldalai és hasfele sűrű, az utóbbi haránt ránczokkal borítottak.

A lábak szintén márványozottak, a végizék világosodók.

A zár egy kis sárgás, lapos, köldökszerű térese közepén egy jelentéktelen benyomással.

Az alsó szemsor kihajló, középszemei sokkal közelebb a homlok széléhez mint a hátsó középszemekhez, oldalszemei a középsőknél kétszer nagyobbak, a középsők távolabb egymástól, mint az oldalszemektől. A hátsó sor kihajló, oldalszemei nagyobbak a középsőknél, az alsó sor oldalszemeinél ellenben sokkal kisebbek, e (hátsó) sor négy szeme egymás között egyenlő távolságra. A két sor középszemei oly deréknégyszöget alkotnak, mely szélességénél nem magasabb.

Az első lábpár szára, alul, négy pár erős, kurta tüskével, másodikig, alul négy pár hasonló tüskével. A többi lábpár ugyanazokon az izeken szinten tüskés.

A rágók vaskosak, a homlok magasságánál nem hosszabbak, márványozottak, ripaciosok, sok erős sertetüskével borítottak. A tapogató márványozott, ripacios, sok sertével fedett; végige oly hosszú mint a térd és szár együttveve.

Mértékek: ♀ Törzs	7 $\frac{m}{m}$ ebből
fej mell	4 "
I lábpár	11 "
IV "	8 "

♂ Elöttem ismeretlen.

Mint késő őszi alakot csak egy ♀ példány után ismerem, e nőtényt Erdélyben, Szász-Vesző-sön találtam.

A *X. robustus* HAHN és *X. fucatus* WALCK azonossága még kétes (lásd THORELL: «Rem. on Syn.» p. 535.), azért tettem kérdésbe az utóbbi nevet: az eldöntéshez egy példány alapján hozzájárulnom nem lehet.

SPEC. 11. FAJ. NYSTICUS ACERBUS. THOR. KOMOR K. DÜSTERE SCH.

(acerbus = trop. durva, komor; valószínűleg a színezetről.)

Syn. 1871. *X. acerbus* THORELL «Remarks» p. 237.

♀ A *X. robustus* (HAHN) alaktársa, de sokkal kevesbé zömök, más idomú zárral és másnemű szemállással. (Fejmell hossza, szélessége legfeljebb 2·8 $\frac{m}{m}$).

Komor színezetű. Fejmelle sötétbarna, csontsárgás színvegyülettel, amelyecske felöl egy fehéressáv-folt nyomul a mellrész közepe tájáig, hol ∇ szerűen kivágott; a mellrész oldalai sötétbarnak; a fejrész éle az alsó szemsor hosszában csontfehéres. Az egész fej mell felülete sok, nem éppen erős, karesú sertékkal fedett. A végtest kerekded, terjedelmes, elől kevéssé keskenyebb, barnaszürke vegyülettel, néha a sürke szín az uralkodó; hátlapjának színezete elfolyó, középrajza elmosódott, s oldalágai gyakran csak feketés harántvonások által némileg jelölve. A has sűrűs, vagy barnás. A lábak sötétbarnak; a két hátsó pár szára és térd, felül, csontfehéres hosszesikkal. A zár egy sárgászöld, vagy vörösbarna, módosan emelkedő gyűrű, mely a

légzőrés felé nyitott s kissé esatornás folytatású, körreszében sekélyen kivájt, határozatlan, ráncszerű választekkal, mely utóbbi néha hiányzik.

Az alsó szemsor igen kevésbé kihajló, középszemei sokkal távolabb egymástól mint az oldalszemektől; az oldalszemek nagyobbak s körülbelül két átmérőjűeknek megfelelő távolságra állanak a középsőktől. A hátsó sor könnyedén kihajló, oldalszemei a középsőknel nem nagyobbak, valamennyi szem egymás között egyenlő távolságra. A két sor oldalszeme módos dudorokon áll; a két sor középsői oly derek négyszögbe elhelyezettek, mely magasságánál láthatólag szélesebb.

Az első lábpár száran, alul, négy pár rövid — másodvégizén alul 5—6 hosszú tüske. A többi lábpáron, ugyan azon ízek alján, szintén tüskék állanak.

A rágók lapulók, a homlok magasságánál alig hosszabbak, barna-sárgán márványozottak, ripacsosok, több erős sertével. A tapogató barnás, felületén sok erős tüskeszerű sertével inkább fegyverzett mint edett, végíze oly hosszú mint a térd és szár együttvéve.

Mertekek: ♀ Törzs	7.7 $\frac{m}{\mu m}$ ebből
fejmell	2.8 "
I lábpár	8.5 "
II "	8.4 "
III "	6.2 "
IV "	7 "

♂ Elöttem ismeretlen. ¹

Mint tavaszi alakot leginkább bokros helyek sivarabb tisztásairól ismerem; néha bogáneskórókon is tartózkodik,

Találtam, erdélyi részekben: Szász-Vesszősön; magyar részekben: Illokön, Panesován, Orsován, Ó-Ogradenán (Mragonya völgy), Báziáson, — megvan a magy. nemz. muzeum gyűjteményében Nagy-Váradról (Moesáry), Pécs vidékéről (Frivaldszky és Pável), Budaról (Pavel). Úgy látszik, hogy csak délibb részeit lakja az országnak.

SPEC. 12. FAJ. XYSTICUS FRATER. N. SP. ROKON K. VERWANDTE SCH.

(frater = fivér; az acerbus fajhoz való rokonságra ezélez.)

(VIII. tábla, 177, *a* szemesoport, *b* ♀ zárja; és IX. tábla, 205 ♀ felülről.)

♀ Elötteste szép barnásfekete; végteste szép sárgásan világosszürke, barna pettyezetéssel, mely néha a fűrészfogas rajzot vázlatosan előtűnteti. Az első két lábpár czomlja és szára szép barnafekete, végízei sárgásvörösek, végökön fekete gyűrűvel, a két hátsó lábpár szára szép sárgásvörös, a végén fekete gyűrűvel, a térd és czomb szepen barna, világos sárgásfehér hosszcsíkkal (a harmadik páron legelősebben kifejezett és kettős), a végizek mint az első párokon. A fejrész arczrészre világosodó, az alsó szemsoron végig egy sárgásfehér haránt csík; a nyelceske felett egy széles közepesik kezdődik, mely gyorsan két finom ágra szakad, a mely két ág — villamódra tágulva — a hátsó szemsorig ér — e rajz sárgásfehér. A hátsó szemsor két középsője mögött három enyésző, vörössessárga hosszvonal, mely néha a villa közét egészen kitölti.

¹ THORELL i. h. a tapogatót illetőleg a nemzőszerv szerkezetét így írja le

«Palpi ferrugineo-fusci, bulbo piceo; pars patellaris paulo longior quam tibia; pars tibiae is ea brevior, versus apicem dilatata, desuper visa fere triangula, brevior fere quam latior ad apicem, apice lateris exterioris in procursum anteriora versus et paulo foras directum, longitudine fere ipsius partis, producto; hoc procursum versus apicem abruptius compresso, apice acuminato paululo deorsum curvato, vix ad $\frac{1}{2}$ longitudinis laminae pertinenti. Latius exterius partis tibialis intra in alterum procursum excurrit latum, extus convexum, intus ad longitudinem concavum, versus apicem paululo angustatum, apice emarginato, anteriora versus, foras et deorsum directus, basi cum procursum apicali partis tibialis ita conerctum, ut emarginatione parva tantum ab eo separatur. Laminae margo exterior aequaliter rotundatus, tuberculo vel procursum nullo. Bulbus rotundatus, humilis, subtus parum inaequalis, sub cochleiformis, in margine exteriori tuberculo vel dente parvo, nitido, pone apicem procursum apicalis partis tibialis sito, munitus; antice in setam vel spinam tenuem excurrens extus directam, circa apicem ejus subcurvatum et laminae arete appressam, praeterea inermis.»

A rágók töve sötétbarna, vége sárgásfehér. A mellvert sárga és barnával finoman tarkított. A csipők különösen diszesek: világosbarnák, végök szép fehéres szegélylyel, tövük több fehéres hosszszessikkal díszlik. A tapogató kurt, barnássárga végige a többihez kepest kissé vekonyult, az egészen kevés serte áll. A lábak közül a két első pár vastos, hosszú, a két hátsó gyengébb és rövidebb. Az első lábpár czombja felületén három ágaskodó serte, kissé baránt sorba állítva, — szárán, alul négy, végizen, alul három tüskepár. Végteste szélesen tojásdad, szélességénél csak igen kevéssel hosszabb, hátul elkerekített.

Az alsó szemsor kevéssé, a hátsó könnyedén kihajló; a két sor középsői egy magasságánál valamivel szélesebb deréknégyszögbe elhelyezettek; az alsó és hátsó sor oldalszemei nagyobbak a középsőknél, az alsó oldalszemek nagyobbak a hátsó oldalszemeknél, a hátsó sor oldalszemei távolabbra állnak a hátsó középsőktől mint az alsó oldalszemektől. A zár egy kiemelkedő, karikászerű keret, mely a légzőrés felé meg van szakítva, belseje dobhártyaszerű, a közepén egy hosszruncszal.

Mertekek: ? Törzs	6	$\frac{m}{mm}$ ebből
fejmell	2·3	"
I lábpár	7·5	"
II "	7·6	"
III "	5	"
IV "	5·1	"

♂ Ismeretlen.

E diszes fajt, mint kora tavaszi alakot az Aldoma vidékén, Palankán, a Trnováczí erdő tisztásainak fűvében gyűjtöttem. Dr. THORELL e fajt újnak ismerte el.


SPEC. 13. FAL. XYSTICUS PRATICOLA. C. K. RÉTI K. WIESEN SCH.

(praticola = rétlakó; a tartózkodásról.)

Syn. 1837—8. X. *praticola* C. Koch «Die Arachniden» IV. p. 77.

Vide: THORELL «Remarks» p. 426, 569, 572.

♀ Kicsiny, rövidlábú; végteste majdnem kerek, hosszánál valamivel szélesebb. Előteste barnászvörös közepesikkal, barna oldalakkal, szélességénél nem hosszabb, oldalról tekintve, egyenes háttal, mely a hát közepén túl meredeken a nyeleckőre lecsapott; a fej eleje ívesen elkerekített, az oldalszemek dudorai jelentéktelenek. A végtest csontsárgás, barnával kevert, a barna szín a nemet jellemző fűrészfogas rajzot meg némileg de határozatlanul jelöli. A lábak barnássárgák, — barna, gyűrűjellegű, sűrűálló foltokkal.

A zár egy vörössárga, kissé keretszerűen emelkedett köldök, mely két felől  szerűen van szegélyezve, a szegély kissé sötétes, az egész keret hosszánál kissé szélesebb, alul összeérő felül szűken nyitott, belül sekélyen kivájt, két apró horpadással (a horpadás csak a mikroszkóp alatt látható).

Az alsó szemsor kihajló, középsői annyira egymástól, mint a homlok szélétől, oldalszemei nagyobbak a szemátmérőjökre állanak a középsőktől. A hátsó sor tetemesen kihajló, oldalszemei a középsőknél nagyobbak s láthatólag távolabbra állanak a középsőktől mint ezek egymástól. A hátsó középső szemek valamivel közelebb egymáshoz mint az alsó középsők szinten egymáshoz s mind a két sor középsői oly négyszöget alkotnak, mely alsó szélességénél láthatólag magasabb.

Az első lábpár szárán, alul, még pedig hossza közepe táján, két pár tüske, — másodvégizen, alul, három pár hosszú tüske. A második páron hasonlóképpen.

A rágók laposkásak; tövük csontsárga, végök sötétedő. A tapogató vörössárga-barna, gyűrűszerű foltokkal, gyöven szőrös; végige rövidebb mint terde és szára együttveve.

Mertekek: ♀	Törzs	4·3 $\frac{m}{mm}$ ebből
	fej mell	1·8 "
	I lábpár	4·3 "
	IV "	3·2 "

♂ Elöttem ismeretlen.

Mint nyári alakot füves helyekről csak Doroszlóról ismerem.

SPEC. 14. FAJ. XYSTICUS GRAECUS. C. K. GÖRÖG K. GRIECHISCHE SCH.

(graecus = görög; a lelheléről.)

Syn. 1838. *Xysticus graecus* C. Koch «Die Arachn.» IV, p. 65.

Vide: THORELL «Remarks» p. 240.

♀ Elötteste sárgásfehér; az oldalszemek mögött egy görbitett hosszcsík s egy szegélycsík feketék; a végtest hátfele olajszürke, három fehéres, keresztbefutó, hullámos szalaggal.

Az elöttest sárgásfehér, a hátsó oldalszemektől a mellrész hátsó lehajlásaig egy feketén márványozott szalag vonul, e szalag a mellrész széle szerint fut s egy sötétfekete pontba végződik. A rágók sárgásfehérek, serteszőrösök, tövükön és végük felé füstösen barnulók. A tapogató sárgás-fehér, a szár- és végiz végén barna. A mellvért fehér, barnán porozott, szélein füstbarnába átmenő. A végtest oldalal és hasfele fehéresek, az előbbieket szürkésbarna, rézsutosan futó vonalakkal. A lábakon a czomb, térd és szár sárgásfehér, a többi iz inkább sárgás, de mégis inkább fehérbe játszik; a czombok belső oldalán három fekete folt, máskülönben a czombok és szárak feketén pontozottak, e pontok a felület fehér vonala hosszában csikyszerűen tömörülve; a czombok tövén, felül, egy nagyobb fekete folt; a többi lábíz töve és vége szintén keskenyen fekete. Törzs 8 $\frac{m}{mm}$.

E fajt Koch C. i. h. eredetileg Görögországból Nauplia környékéről írta le, DOLESCHALL a «Syst. Verz. etc.» sorozatában Magyarországból is említi.

SPEC. 15. FAJ. XYSTICUS HORTICOLA. C. K. KERTI K. GARTEN SCH.

(horticola = kertbenlakó; a tartózkodásról.)

Syn. 1837. *Xysticus horticola* (C. Koch «Uibers. d. Ar. Syst.» I, p. 26.

Vide: THORELL «Remarks» p. 252, 426.

♂ Elötteste vörössárga-barna, sötétebb barnával keverve, oldalszegelye sötétbarna, a nyeleeske táján kivágásszerűen világosabb. Végteste vöröses-sárgabarna néha róka-vörös, barnán porzott, hat ingödörpárral; oldalain bordaszerű sötétebb csíkok. A két első lábpár róka-vörös, a két hátsó lábpár sárga.

A tapogató rövid; szára szerfelett complicált szervezettel; külső oldalán két nyujtvány, egyik a végén, mely lemezszerűen illeszkedik a fedő pikkelyhez, a másik oldalt kifelé mered, vastag, hegyesedő végevel előre felé görbül; alszimen egy mélyen kettéhasított, széles, erős nyujtvány, melynek felei lapítottak, a külső fel vékonyabb, inkább hegyesedő, a másik fel vastkosabb, a végén vastagodott kis se föl- és befelé hajlott. A gyűjtő síma, kidagadó egy finom, hosszú embolus által rugószerűen kerítve; a tövén egy kis horog.

Mertekek: Törzs 5 $\frac{m}{mm}$

♀ Világosabb. A zárat két terjedelmes, fekete, hosszukás, majdnem háromszögletes folt jellemzi, melyek hegyekkel kifelé állnak.

E fajt említi Sill V. „*Thomisus*“ *horticola* C. Koch nev alatt Szeben környékéről. Peldányt nem láttam.

SPEC. 16. FAJ. XYSTICUS? DEVIUS. (C. K.). FÉLREJÁRÓ K. UNSTATE SCH.

(devius = kóbor, állhatatlan, félreeső, messzeeső stb; az első lelhelyre vonatkozik.)

Syn. 1845. *Thomisus devius* C. Koch «Die Arachn.» XII. p. 61. Taf. 411. fig. 997.

«♀ Előteste kimagasló fejresszel, homlokreszen számos sertevel, sárga; sötét, barnán-foltos szegelylyel; végteste rozsdaszínű; lábai sárgások, a csombok felületen két barna hosszcsík.»

Mérték: Törzs 11 $\frac{m}{\mu}$

Dr. Koch C. e pókot, melyet Dr. ROSENHAUER (Erlangen) a «Bánátban», valószínűleg Oravicza táján találta, türe szűrt, szárított példány után írta le, úgy azonban, hogy annak megbizonyítása lehetetlen, mert a színezet nem elégséges jelleg, az ivarszervekről a leíró nem emlékezett meg. A fajt a „*Thomisus calycinus*”-sal hozza kapcsolatba s így meglehet, hogy a faj a *Misumena vatia* (CL) egy feltűnőbb színváltozata.

SPEC. 17. FAJ. XYSTICUS? CERINUS. (C. K.). VIASZOS K. WACHS SCH.

(cerinus = viaszos; a színezetről.)

Syn. 1845. *Thomisus cerinus* C. Koch «Die Arachn.» XII. p. 60. Taf. 411. fig. 996.

«♀ Előteste barnafekete, fejeresse felül, mellresze a szelein sárgák; végteste agyagossárga; lábai és tapogatói élénksárgák.»

Mérték: Törzs 8.5 $\frac{m}{\mu}$

Dr. Koch C. ezt a fajt is ROSENHAUER (Erlangen) féle, Oraviczáról származó példány után írta le és a «*Thomisus lateralis* Halm» fajjal hozza kapcsolatba, e szerint tehát *Xysticus impavidus* Thor fajjal állana viszonyban. A fenn idézett rajzhoz tartozó szemesoport után ítelve azonban inkább *Misumena*-ra emlékeztet s nem lehetetlen, hogy ez is csak a *Misumena vatia* (CL) fajnak egy feltűnőbb színváltozata.

SUBORDO VI. ALREND.

C I T I G R A D A E

(cito = gyors; gradus = lépés.)

FUTÓK.

A futók jól jellemzett alrendjenek jegyei: az emelkedett, majdnem primaticus előtest, 3 vagy 4 harantfutó sorba elrendezett szemesoport; gyors mozgásra alkalmas szervezet, mely a testtörzsnek a lábakhoz való, megfelelő arányában gyökerezik.

Noha a lábak kivétel nélkül hármas szövőkarom rendszert mutatnak, a szövés itt is háttérbe lép, minek jellemző jele az, hogy az alrend legtypikusabb alakjainál (*Lycosoidae*-Farkaspókok) a szövőkarmok elköresesülése itt ott észlelhető. A lábaknak a testtörzshöz képest aránylagos fejlettsége, a futás, egyáltalában gyors mozgás képességet eredményezi, s az alrend alakjait *prédát kereső* vadászokká teszi.

A rend legtypicusabb alakjai ugyanmilyra mozgók, hogy meg a nemzedékek sorára tartozó mozzanatok sem kötik őket egy helyhez: a nőstény zacskóba szövő petéit s vadászatait magával hordozza, épen úgy, mint későbben hátán a kibújt fiakat, mindaddig, a míg ezek önálló életmódra képesek.

Itt is találunk lakhelyeket (Cselőpók-Trochosa), de ezek nem az alrend életmódjának sajátlagos irányából, hanem azon körülményekből folynak, a melyek között az illető alakok élnek, a melyek között létök biztosságát csak egy lakás hozzájárulásából merithetik (Trochosa infernalis-Pokoli Cselőpók a pusztán, Trochosa cinerea-Szürke Cselőpók könnyen áradó folyók görgetegein). E lakhelyek kapcsolják e rendet némileg a földbeszövőkhöz (biologialilag). A szervezetre nézve találunk kapcsolatokat a Csöszövőkkel (lásd Zora-Párduezpók), és a Keszegjárókkal (lásd a Futók közül: Oxyopoidae-Hinzipókok, s a Keszegjárók közül: Hunnyópók-Micrommata).

A nyugró vagy mozgó prédát felkeresni, szembe megtámadni, ha menekülni akar, vagy bajosan megközelíthető, ugrással is reátámadni, ez a futók módja, evvel járulnak a pókműködés rendszeréhez.

A szövés, mint táplálékszerző közeg egészen háttérbe lép, és a mozgás sajátlagosságára esik a főszű.

A kivételbe tett alakok kivételével, a többi azon hajlékkal éri be, a melyet a véletlen szolgáltat; az alakok tehát szabadon barangolva intézik támadásaikat, gyakorolnak hatást.

Működésökre nézve, bár a röghöz kötve, de vízszintes irányban teljesen szabadok.

Az aljak rögtől fel a hegyesücsök örök haváig, mindenütt vannak ez alrendnek képviselői; de alakgazdagságának tetőpontját mégis az aljakban éri el.

A száraz talajon, a vízmelléken, a víz színén mindenütt futókkal találkozunk, melyeknek fajsoraiban (talán általános is) a fonárröptés, tehát nagyszabású helyváltoztatás szerepel s képesekké teszi őket, a hatásnak széles alapon való gyakorlására.

A nemzedékek sorát úgy látszik kizárólagosan áttelelő alakok tartják fenn.

FAM. I. CSALÁD. LYCOSOIDAE. FARKASOK. WOLFESSPINNEN.

(*λύκος* = farkas; a barangoló életmódról.)

GEN. I. NEM. AULONIA. C. K.

(*αὐλή* = csatorna, völgy; valószínűleg az előtest némi nyergességéről.)

Syn. 1848. C. Koch «Die Arachniden» XIV, p. 97.

Vide: THORELL «On europ. Spiders» p. 190.

Az alsó szemsor középsői és a homlok széle közötti távolság nem nagyobb egy alsó középszem atmerőjénél. A felső fonópar az alsónál sokkal hosszabb. Az arcz magas, közel negyszögletes, a rágók töve felett kiálló. Az alsó szemsor behajló.

SPEC. I. FAM. AULONIA ALBIMANA. (WALCK.). FEHÉRKEZŰ KOSPÓK. WEISSHÄNDIGE WIDERSP.

(albimana = fehérkezű; a tapogatón lévő fehér szímről.)

Syn. 1805. *Lycosa albimana* WALCKENAER «Tabl. d'Arachn.» p. 40.

(Vide: 1848. (*Aulonia*) *albimana* C. Koch «Die Arachn.» XIV, p. 202.

♀ Előteste fekete, megfekvő, igen finom es gyér szőrözettel.

A végtest fekete, megfekvő sárgás szőrözettel. A tapogató fekete-barna, *terde csontfehér*. Az első lábpar czombja fekete, a többi ize, valamint a többi láb is barnássárga.

A fej mell fejrésze keskeny, a szélesedő mellreszből prismszerűen mintegy kitolt, erősen kidülő homlokkal, sima: felülről tekintve, a mellrész mindkét oldalán két-két tetemes behorpasztás látható s a mellrész legszélén egy igen finom, szőrökből való, hófehér szegély szembeötünő; oldalról tekintve a hátvonal kissé nyerges, hátul reszűntösen a nyelecskere lecsapott. A mellvert szívalakú, fekete, zsírfenyű.

A rágók vörösbarnák, oldalról tekintve, erősen az állkapcsokra csapottak, úgy hogy a kiálló homlokkal meglehetősen egy síkba esve, evvel s a hátvonallal éles szöveget képeznek. A tapogató karesú, végíze kevés, rövidebb mint a térd és szár együttvéve.

A lábak karesú, elég hosszúk, hosszú nyulánk tüskével fegyverezve; jelesen a két első pár szárán, alul 5—6 hosszú tüske, a másodvégizen, alul, szintén hosszú tüskék; a negyedik lábpár szárán kevés karesú tüske, köröskörül pereszlecszerűen elhelyezve.

A végtest tojásdad. A fonók közül a felső pár hosszabb az alsónál, két ize igen jól megkülönböztethető.

Az alsó szemsor négy szeme igen apró, igen közel a homlok széléhez, alig szemátmérőnyire egymástól, a sor a homlok széléhez illeszkedve behajló. A középső sor két szeme nagy, domború, a fej elére elhelyezett, körülbelül szemátmérőnyire egymástól, a hátsó sor két szeme kisebb a középsőnél s távolabb egymástól, mint a középsők szintén egymástól, úgy hogy e négy szem egy előre felé könnyedén szűkülő trapezet képez.

A zár alig kiemelkedő, semmi jellemzőt sem mutat.

Mértékek: ♀ Törzs	4 m_m ebből
fej mell	1.9 "
I lábpár	4.3 "
IV "	5.7 "

♂ Karesúbb, színezete a nőstényével azonos, csak a tapogató térdé kevésbé kirívó, barnássárga. A tapogató szára szélesedő, a térdnél nem hosszabb; pikkelye fekete, terjedelmes, csúcsosan kanál alakú lekonyuló véggel, módosan szőrös (példányomon a nemzőszerv még nem tökéletesen fejlett).

Mértékek: ♂ Törzs	3.8 m_m ebből
fej mell	2 "
I lábpár	4.2 "
IV "	5.5 "

E csinos kis fajt eddig csak Doroszról, közel ivarérett állapotjában, mint igen kora tavaszi alakot, s a legszorgalmasabb léghajósok egyikét ismerem. Fonálröpitéseit már márczius melegebb napjain kezdi s a Mosztonga melletti kertek karóin remlesen többet magával sürgölődik. Igen gyors futó s ha a szél erősödik, úgy, hogy a fonálröpitést lehetetlenné teszi, a pok esillagszerűen szétterpeszti lábait, lelapul s bevárja a szél csillapodását.

Néha egy fél perc alatt 1 méternyi fonalat fejt és elhajózik rajta.

GEN. 2. NEM. LYCOSA. LATR.

(Vide: Lycosoidae.)

Syn. 1804. LATREILLE «Nouv. Dict. d'Hist. Nat.» XXIV, p. 135. (ad partem).

Vide: THORELL «On europ. Spiders» p. 190.

Az alsó szemsor középsői oly távolságra esnek a homlok szélétől, mely a szem átmérőjét kevésbé meghaladja. A felső fonó pár az alsónál nem, vagy alig hosszabb. Az alsó szemsor a középsőnél valamivel rövidebb. A szemcsoport tere legalább oly hosszú, a milyen széles. Az arcz (fej, előlről tekintve) magas, majdnem négyszögletes, a rágók töve felett nem vagy alig táguló, egyenes oldalakkal. A lábvegek karesú, nyulánkok.

Kósza, futó, komor színű alakok, a melyek lakást nem készítenek és csak alkalmas helyiségekben, mint kövek alá, resekbe, körakasokba stb. vonulnak meg. Látó képességek éles, a közeledő veszélyt már messziről veszik észre. A nőstények lenescalaku peteburkaikat, a fonókhöz erősítve, mindenütt magukkal czipelik s fiaikat, egy darabig hátukon hordozzák.

SPEC. 1. EAJ. LYCOSA AMENTATA. (CL.) PARITTYÁS FARKASPÖK. SCHLEUDER W.

(amentum = hajító szij, - amenta torquere : szij segítségével lövegeket röpiteni; alkalmasint a testhez erősített peteburokról.)

Syn. 1757. *Araneus amentatus* CLERCK «Aran. Succ.» p. 96.

Vide: THORELL «Remarks» p. 298.

♀ Olajbarna, barnássárgán kevert-szőrfű; a fejmenen a mellrészen, a hátsó szemekig terjedve, egy terjedelmes világosodó folt, mely közepén hasított (legjobban borszeszben tűnik elő), a mellrész szélein határozatlan szegély. A lábak komor barnássárgák, sűrűn álló barna gyűrűkkel és foltokkal; a csipők egyszínűen, élénken barnássárgák.

A fej mell, felülről tekintve, hosszukas szívalaku, előre felé módosan felemelkedő; oldalról tekintve hátvonala majdnem vízszintes, alig észrevehetőleg nyerges hajlású, s a hátrés végével kezdve a nyelecskere lecsapott; megfekvő szőrözete bőven sárgásbarnával kevert, felálló szőrözete gyér, fekete, hosszú, a szemek területén leginkább feltűnő. A mellvert sötétbarna, barnássárga szőrözettel bőven fedett. A rágók elég hosszúk, az első lábpár végizénél rövidebbek, czombjánál nem vastagabbak, barnássárgák sötettedő végekkel, lefelé álló sötét szőrözettel, mely szimoket nem fedi el.

Az állkapcsok barnássárgák, szélesek, elől elkeresítették; az alajk sötetebb, az állkapcsok felehoszszának körülbelül megfelelő. A tapogató barnássárga, barna foltokkal és gyűrűkkel, szőrös: valamennyi íze felületén karesű tüskék állanak, végíze alig hosszabb a száriznál és sokkal rövidebb mint a térd és szár együttvéve.

A lábak hosszúk, — különösen az utolsó pár — karesűk, finoman kifutó végekkel és bő fegyverzettel. Az első pár szárán, alul, a végén egy pár rövidebb, hátrafelé két pár hosszú, kissé megfekvő tüske, e másodvégizen hasonlóképen; czombja felülete végén több kurta tüske, ezek mögött, egymásután állva, két hosszú tüske; a szára és másodvégíze felületén a rövid, megfekvő szőrözet közül 2—3 tapintó szőr áll ki.

A harmadik és negyedik lábpár szára és másodvégíze felül is tüskés: valamennyi pár czombja felületén egymás után álló két hosszabb tüske.

A végtest terhes állapotban hossztojásdad, nem terhesben hátul ellapított, elől kissé keskenyebb; hasa a felületnél valamivel világosabb.

Az alsó szemsor egyenes, szemei aprók, egyenlőek, a homlok szélétől átmérőjüknél távolabbra állanak, a középsők valamivel távolabbra egymástól, mint az oldalszemektől; az alsó sor a középsőnél láthatólag rövidebb. A középső sor két szeme nagy, bőven egy szem átmérőnyire egymástól és fél átmérőnyire az alsó, oldalszemektől. A hátsó két szem az alsó szemeknél sokkal nagyobb, a középszemek fél átmérőjét is meghaladja, sokkal távolabbra áll egymástól mint a középszemektől, s ezekkel egy előre felé szűkülő trapézot alkot.

A zár barnássárga, egy lóherelevélhez hasonló beosztású; a légzőrés felé, nyelv helyett, egy szív alakú lemezzel () neha az osztás hiányzik, de a szívalakú lemez határozottan kivehető.

Mértékek: ♀ Törzs (terhes)	8.5 $\frac{m}{mm}$	ebből
(nem terhes)	7	»
fej mell	3.5	»
I lábpár	10.5	»
II »	9.8	»
III »	10.5	»
IV »	14.8	»

A peteburok barnássárgás, lenesealakú, finom szövetű, úgy hogy a peték kissé áttetszenek; átmérője $5.5 \frac{m}{m}$.

♂ Valamivel karesubb; tojásdad, kis végtesttel; lábai halaványabb foltokkal és gyűrűkkel, a testhez kepest világosodók. A tapogató vaskos, vörösesbarnás, foltos, a vége felé bozontosan-feketeszőrös; száríze hosszabb a térdnél, előre felé vastagodott, a pikkely tövéénél nem keskenyebb, gazdagon szőrös; a pikkely csücsös, csücsa alatt eesetesen szőrös; nemzőszerve, oldalról tekintve, egy, mintegy tokból kiálló, vaskos, előre irányozott vörösbarna tüskét visel, a tüske valamivel rövidebb, mint a mennyire a pikkely csücsától hátra áll.

Mertekek: ♂ Törzs	7 $\frac{m}{m}$ ebből
fejmell	3.7 »
I lábpár	11 »
IV »	13 »

Legközönségesebb fajaink egyike, melyet tavaszkor és őszkor is bőven találhatni erdőkben, ligetekben, árnyasabb helyeken s a nádasok szélén is. Őszkor inkább ivarérett hímek, tavaszkor a burkaikat czipelő nőstényeket kaphatni és úgy látszik, hogy nőstényei (legalább nálunk) áttelelnék.

Igen gyors futó és kizárólagosan a föld színén tartózkodik. A peteburok a nőstény fonóíhoz van megerősítve s az állatot futásában legkevesébbé sem gátolja; peteburkát igen szereti s ha elvételik tőle, hosszasan keresi, megfélekedzik minden veszedelemtől, ha megtalálja rágóival és tapogatóival megragadja s biztos helyre czipeli, hol ismét fonóíhoz erősíti. Különösen ifjú nemzedéke a legszorgalmasabb leghajózók köze tartozik. Ez a faj azonosnak vették a LINNÉ leírta «*Aranea saccata*» fajjal, mely jogosan eltoroltetett, már azért is, mert a «saccata: zacskós», úgy a mint LINNÉ értette, az egész alrend valamennyi alakjára talál és számos tevedésnek lett kuforrása.

Ismerem, erdélyi részekből: Szász-Vesszősről, Kolozsvárról, Szamosfalyváról, Mező-Zalról és számos más helyről, de kizárólagosan csak az aljakból és az előhegységéből; magyar részekből: Doroszlóról, Apatinból, Bázsíásról, az Alsó Hámorból; a magy. nemz. muzeumban megvan: Nagyváradról, Tátrafüredről (Friwaldszky), Budapestről, Ungvárról.

SPEC. 2. FAL. LYCOSIA LIGNARIA. (CL.). TÖNK F. HOLZ WOLFS.

(lignum = fa; az erdőben való tartózkodásról.)

Syn. 1757 *Araneus lignarius* CLERCK «*Arad. Suec.*» p. 90.

Vide: THORELL «*Remarks*» p. 294.

♀ Fekete; végteste és lábai sok fehérrel tarkázva.

A fejmell durván szemcsézett, közepén egy szakadozott fehér hosszcsikkal; a mellrész oldalai hasonló színű szegélylyel. Lábai feketék, barnás gyűrűzettel, a gyűrűzet osztása fehér szőröcskéekkel. A végtest fekete, csak néhol eesetszerűen tömörülő fehér szőröcskéekkel mintegy pettyezve.

A fejmell szivalakú, mellrészke keskenyedő, feje részke észrevehetőleg felvetett, magas; oldalról tekintve a hátvonal kissé nyerges, hátul a nyelecskére lecsapott. A mellvért fekete, szőrös, a csipők egyszínűen barnássárgák. A rágók vörösbarnások, vegeik sötétebbek, szőrzetük fekete, fehérrel elegyes, gyér. Az állkapcsok szélesek, végök elkerekített, barnássárgák; az alajk sötétebb. A tapogató vörösbarna, barna gyűrűzettel, sok fehér szőrökkel, a czomb, térd és száríz felülete hosszú tüskékkel, a végíz hosszab a szárnál, de rövidebb mint a térd és szár együttveve. A lábak hosszúk, karesuk, a fekete szín az uralkodó, a barna szín gyűrűket alkot. A fegyverzet bő, de nem erős. Az első lábpár szárán, alul, egy pár rövid és négy pár hosszú, karesu tüske; másodvégizen egy pár rövid, két pár hosszú tüske. Valamennyi czomb felületen három hosszú tüske. A harmadik és negyedik lábpár szára és másodvégize felül is tüskes, terde csücsán tüske áll.

A végtest tojásdad, hasfele szürkés, felülete fekete feheren habos.

Az alsó szemsor négy szeme apró; egyenlő, egyenes sorban; középsői kevésbé távolabbra egymástól mint az oldalszemektől a közel két szemátmérőnyire a homlok szélétől. A középső sor két szeme nagy, bőven szemátmérőnyire egymástól s bőven fél átmérőnyire az alsó sor szélsőitől. A hátsó sor két szeme kevésbé kisebb a középsőre, s kétszerénél is nagyobb távolságra áll egymástól, mint a középsőtől. A középső sor két szeme között egy serteüstök.

A zár egy terjedelmes, szívalakú, vörössárgás terese, a körídomot ismétlő alakú kivájjal, e kivájas alján, tehát a legzöres felől, egy szívalakú, sima betéttel.

Mertekek, ♂: Törzs	8	$\frac{m}{m}$ ebből
fejmell	3.5	»
I lábpár	13	»
II » 	12.5	»
III » 	12	»
IV » 	15	»

A peteburok laposan lencsealakú, zöldeskék (borszeszben szennyessárgásbarna), 6 $\frac{m}{m}$ átmérőjű. ♂ Elöttem ismeretlen.

Igen gyors futású állat, melyet eddig csak az Alsó Hámor (Borsod) fenyő ertések vágásos helyeiről (Jávorkút, Feketesár) néhány példány után ismerem. E faj megkülönböztető jellegei között az első lábpár szárának négy pár hosszú tüskéje az első helyen áll, s e jegy alapján, melyhez még a végtest fehér fekete színe, sőt a peteburoké is hozzá járul: ide sorozom azt a Lycosát is, a melyet a Kárpátokon még a Kriván legcsücsán is feltaláltam; de csak harmadvedlésű példányok után említhetem meg, melyek bozontosabb szőrőzet mellett majdnem egyszínűen barnás-fekete lábak által tűnnek ki; burokezipelő nőstényeket számolatlan láttam; de elfogásuk nem sikerült, mert villángyorsan menekültek a roppant sziklatömbök közé, melyeket emberi erő megmozdítani képtelen.

SPEC. 3. FAJ. LYCOSA LUGUBRIS. (WALCK.). GYÁSZOS F. T. RAUER W.

(lugubris = gyászos; itt a színről.)

Syn. 1802. *Aranea lugubris* WALKENAE «Faun. Paris» II. p. 239.

Vide: THORELL «Remarks» pag. 276.

♀ Sárgásszürke. A fejmell közepén egy határozatlan, világosodó hosszú. Lábai sárgásszürkék (borszeszben vöröslők), leginkább csak a csomókban előtűnedező, elmosódó barnás foltokkal.

A fejmell hossz-szívalakú, fejeresze elől egyenesen elmetsett, prismaszerű, a szemtér fekete, a középső szemsor szemei között egy gyér szőrecset; a szőrőzet megfekvő, sárgás, a mellrész közepén és szélein világosodó. Elölre tekintve, az arc magas, majdnem négyszögletes; oldalról tekintve, a hátvonal vízszintes, hátul lankásan a nyelecskére lecsapott. A mellvert barna, sárgás szőrőzettel. A rágók vöröses-sárgák, egyszínűek gyéren álló, hosszú, sárgás szőrőzettel, az első lábpár elsővégénél valamivel rövidebbek, csomójánál alig vékonyabbak. Az állkapcsok szélesek, vörössárgások, elől elkerekítettek; az alajk sötétebb, csücsös, az állkapcsok felhosszát felülmúlja. A tapogató karesú, sárgás; csomója és szára némi homályos gyűrűzettel; ízei, felül, hosszú tüskevel; végze oly hosszú vagy alig rövidebb mint a terd és szár együttvéve.

A lábak karesú, finom hosszú fegyverzettel.

Az első lábpár szárán, alul, a végén, egy pár rövid, e mögött három pár hosszú finom tüske, a másodvégizen egy pár rövid, két pár hosszú tüske. A harmadik és negyedik lábpár szára és másodvégze felül is tüskés. Az első és második lábpár terde csücsán egy tapintószőr, a harmadik és negyedik páren egy nyúlók tüske.

A végtest (terhesen) hossztojásdad,

Az alsó szemsor egyenes, szemei aprók, egyenlők, egyforma távolságra egymás között, a homlok széletől egy szemátmérőnél távolabbra állnak, a sor a közép sornál rövidebb. A középsor két szeme nagyobb, bőven szemátmérőnyire egymástól, felátmérőnyire az alsó sor szélsőitől: a hátsó sor két szeme alig vagy nem kisebb a középsőnél s körülbelül másfelszer távolabbra áll egymástól mint a középsor szemeitől, a melyekkel egy előrefele szűkülő trapezet alkot.

A zár egy hosszúkás térese, hosszúkás kivájasában egy középlemezzel, mely a legzőrés felé egy haránt lemezbe ütközik, a melylyel egy igen jól kivehető J szerű alakot képez.

Mertekek: ♀ Törzs (terhesen)	7 $\frac{m}{m}$ ebből
fejmell	3 „
I lábpár	8 „
II „	8 „
III „	8 „
IV „	12.5 „

Peteburka lenesealakú, szürkés, 4 $\frac{m}{m}$ átmérőjű.

♂ Kicsiny, karsú; színezete a nőstényétől elütő. Fekete; a fejmell közepén egy, a hátsó szemsor szélességének megfelelő, az egész előtesten végig vonuló fehér csík, mely a végtestre átmenve, azon is végig tart; a végtest oldalai szürkésbe átmenők. A lábak czombjai barna vagy barnás-fekete főkkel s csak végök felé világosodnak; a többi íz vöröses- vagy szalmasárga, a végek rendkívül finomak. A tapogató barnafekete, a pikkely domborodása vöröses vagy csontsárga. A szár a térdnél sokkal hosszabb, vaskos, bozontosan szőrös; a pikkely csúcsos, felületen módosan, csúcsa alatt bozontosan szőrös, nemzőszerve, oldalról tekintve, egy előre irányzott, kissé lelhajló, karsú tüskét visel.

Mertekek: ♂ Törzs	4.7 $\frac{m}{m}$ ebből
fejmell	2.2 „
I lábpár	9.5 „
IV lábpár	11.5 „

Tavaszi alak, mely különösen a vigályos erdők, bokros helyek talaját, a gyalogutakat, de a mezőt is kedveli, rendszeren roppant mennyiségben fordul elő s tetemesen hozzájárul annak a selymes fenynek a letesítéséhez, a mely a tisztások fűvét borítja. A him roppant gyors futo, néha ugrálva menekül.

Ismerem, erdélyi részekből: Kolozsvárról és Mező-Záhról; magyar részekből: Doroszlóról, Apatinból és Orsováról. Hegyi alaknak eddig nem tapasztaltam.

SPEC. 4. FAJ. LYCOSA MONTICOLA. (CL.). HEGYI F. BERG W.

(monticola = hegyen lakó; a tartózkodásról.)

Syn. 1757. *Araneus monticolus* CLERCK «*Arad. Suec.*» p. 91.

Vide: THORELL «*Remarks*» pag. 285.

♀ A *Lycosa lugubris* rokon alakja, ettől leginkább nemzőszerve által megkülömböztetve.

A fejmell barnás, közepén egy keskeny világos csikkal, szélein hasonló szegelylyel; a közepesík a végtest elején is folytatódik, melynek általános színezete barnás, szürkés sok fehérrel elegyes, megfekvő szőrozetű; a has szennyesfehér. A lábak agyagsárgások, sok barna folttal.

A fejmell hosszúkás-szivalakú, magas; a fej, előlről tekintve, majdnem négyszögletes, alig pofásodó, alsó feleben sárgás arcot mutat, a középszemsor két szeme között tetemes üstök látható.

A mellvért barna, világos szőrozetettel. A rágók töve agyagsárga, végök elmosódva barnuló: szőrozetűk, gyéren állva, sárgás, barnással elegyes; hosszúságuk megfelel az első lábpár végizének, e láb czombjánál alig vékonyabbak. Az állkapcsok vörössárgák, szélesek, elkerékítettek, az alajk csúcsos, és sötétebb.

A tapogató vörössárga, keves barna folttal, felülete keves tüskevel; végze valamivel rövidebb mint a térd és szár együttvéve.

A lábak karesuk, finom végűek; az első pár szárán, alul a végén egy pár rövidebb, e mögött két pár hosszú tűske; másodvégizén hasonlóképen. A fegyverzet egyebekben a *L. lugubrise*-vel talál.

A végtest hossztojásdad.

Az alsó szemsor egyenes, szemei aprók, a középsők alig észrevehetőleg nagyobbak s oly távolságra a homlok szélétől, mely másfel átmérőjüknek megfelel. A középső sor két szeme meglehetősen nagy s másfel átmérőnyire egymástól. A hátsó sor két szeme kisebb a közép sorénál, az alsó sorénál ellenben nagyobb s körülbelül másfélszer annyira egymástól mint a közép sor szemeitől.

A zár egy vörössárga, szélességénél hosszabb, a légzőrés fele kissé táguló, ott elmetezett lemez, alig észrevehető behorpadással; elmetezett végén a sarkok mintegy becsipettek.

Mértékek: ♀ Törzs	7	$\frac{m}{m}$ ebből
fejmell	3	»
I lábpár	7.5	»
II »	7.5	»
III »	7.8	»
IV »	12	»

♂ Kisebb, karesubb, színezete a nőstényetől elütő. Elő- és végteste fekete; az előtest közepén egy végig vonuló, keskeny, fehéres hosszcsík, mely a végtest elején is követhető. A lábak czombjai füstbarnak, a két első pár többi ize szennyes sárga, a két hátsó páre barnássárga.

A has szürkülő. A tapogató barnássárgás, szára és pikkelye feketés. A szár nem hosszabb a térdnél, tetemesen vastagodó, szőrös; a pikkely csúcsos, csúcsa alatt módosan szőrös; nemzőszerve, belső oldalról tekintve, egy igen megfekvő, feketebarna, oldalt és kifelé irányozott, lapos és tompa lemezt visel.

Mertekek: ♂ Törzs	5	$\frac{m}{m}$ ebből
fejmell	2.5	»
I lábpár	8	»
IV »	10	»

Ámbár a sikon is előfordul, mégis inkább hegyi alak, mely a havasokon a törpefenyő tenyeszőven túl is előfordul s a *L. lugubris*-nél gyerebben található.

Ismerem Doroszlóról, Mehádiáról (Damoclet csúcs), Tokajból (Kopasz), az Alsó-Hámorból (Hollós), a Krivánról (a csúcs alatt), Lykaukáról (Liptó).

SPEC. 5. FAJ. LYCOSA PROFUGA. N. SP. BOLYGÓ F. IRRENDE W.

(profuga = számkivetett; futó; az életmódról.)

(VIII. tábla 181, *a* szemesoport, *b* a ♂ tapogatója, *c* mérték.)

♂ Előteste fekete, fehéres szőröcskékkel; végteste porszmű szőrözettel fedett; a két első lábpár czombja, tövétől számítva, felig fekete, a többi iz élenken, világosan barnássárga, a két hátsó lábpár egészen barnássárga. A lábak karesuk, hosszuk.

A fejrész prismaticus, a mellrészt tágult. A mellvert barnásfekete, szőrös; a két hátsó lábpár csipője barnássárga, a két első páre fekete, barnássárgával (jelesen a második páre) elegyes. A rágók feketek, legcsúcsoson kis mértékben barnássárgák; az állkapcsok barnássárgák. Az első lábpár szárán negy, másodvégizén három pár hosszú, karesú tűske, — a második lábpáren hasonlóképen. A végtest keskenyedő, kicsiny.

A homlok vörhenyes, alsó szemsora a másodiknál rövidebb, szemei igen aprók, egyenlők; a második sor két szeme nagy, valamivel többre mint szemátmérőnyire egymástól; a harmadik sor két szeme valamivel távolabbra egymástól mint a második sortól.

A tapogató fekete, száríze a térdnél valamivel hosszabb és tetemesen vastagodott; szőrözete hosszú, felálló; pikkelye lehajló, csúcsosan kanálalakú; nemzőszerve, oldalról tekintve, feketebarna s egy nyereg-szerű, melyen benyomott gyűjtőt mutat, melynek hátulso fele majdnem csücsszerűen kiálló.

Mertekek : ♂ Törzs	5	$\frac{m}{m}$ ebből
fejmell	2.5	"
I lábpár	7	"
II "	6.5	"
III "	5.5	"
IV "	8.8	"

♀ Ismeretlen.

E rendkívül sebesen futó és futás közben ügyesen ugráló, csinos kis fajnak egyetlen himjét Tokaj és Rakamaz között egy legelő silány talaján fogtam, Juniusban ivarérett. Dr. THORELL e fajt nem ismeri.

SPEC. 6. FAJ. LYCOSA PROXIMA. C. K. ROKON F. VERWANDTE W.

(proxima = legközelebbi, mint fajrokona a L. monticolának.)

Syn. 1848. *Lycosa proxima* C. Koch «Die Arachniden» XV, p. 53.

Vide : THORELL «Remarks» p. 287, 288. (in §. Lyc. monticola.)

♀ A fejmell barnás, közepén egy keskeny, világosodó vöröses hosszcsikkal, mely a hátrés táján alig tágul s a szemtérese hátsó határáig ér, a mellrész szelein egy hasonló szegély, mely hátul leginkább látható. A középsík elmosódva bár, de megis a végtest elején is észlelhető. A végtest szürkés és különösen sok vörössárga szőrökkel elegyes színű. Lábai vöröses barnasárgák sűrű füstbarna gyűrűzettel. A fejmell hosszúság szívalakú, a fej kis mértékben felvetett. A mellvert barna; finom, megfekvő szürke- és felálló barna szőrözettel. A rágók csak füstössárgák, tövük fele világosodók, gyeren szőrösek. A tapogatók barnássárgák, vörösesbarna gyűrűzettel, a czomb, térd és száríz felülete módosan tüskés, végze rövidebb mint a térd és szár együttvéve. Az első lábpár szárán, alul, az elején egy pár rövidebb, e mögött egy pár hosszabb, már az oldalak felé elhelyezett, e mögött két pár hosszú tüske.

Az alsó szemsor egyenes, távolabbra a homlok szélétől mint a középsortól, szemei egyenlőek. A középsor két szeme nagy, másfél átnérőnyire egymástól. A hátsó sor két szeme a középsőknél kevésse kisebb s valamivel távolabbra egymástól mint a középsortól.

A zár a L. monticolaétól egészen elüt; elől résszerűen hasított, a hasitekből kilátszik a lemez, a légzőrés felé e hasitek kissé tágitott s itt a lemez két ágra oszolva két bemélyedést kerít be (Λ).

Mertekek : ♂ Törzs	7	$\frac{m}{m}$ ebből
fejmell	3	"
I lábpár	7.4	"
IV "	10.5	"

♂ Kisebb, karesu, színezete a nőstényetől elütő. Fejmelle fekete, közepén egy vörösesen áttetsző keskeny hosszcsikkal. Végteste fekete, kevés vöröses szőrökkel. Az első lábpár czombja és térdje végig fekete, a többi lábpár czombja a vége fele sárgás, barnán gyűrűzött és foltozott.

A tapogató *karesu*, egészen barnafekete, száríze alig hosszabb a térdnél, kevésé vastagodott; különösen alul szőrös; a pikkely csúcsos, a csücs alatt módosan szőrös; *nemzőrészén semmi tüske*, gyűjtője csak behorpasztott, a horpadásban — a külső oldalról kissé hátulról tekintve, két igen apró, tompa fogacs látható.

Mertekek : ♀ Törzs	5	$\frac{m}{m}$ ebből
fejmell	2.5	"
I lábpár	6.5	"
IV "	8.5	"

Mint igen koratavaszi alakot eddig egyedül csak Doroszlóról ismerem, hol a nádasok melletti füves helyen futkároz.

THORELL tr. kritikai jegyzete (lásd a «Remarks on Syn. i. h.» oly ♀-re van alapítva, a melyet Dr. KOCH LAJOS-tól ez pedig Róma környékéről kapott. Az itt leírt himet biztosnak tartom. Ugy látszik, hogy e faj deli elterjedéssel bír.

SPEC. 7. FAJ. LYCOSA PRATIVAGA. L. K. RÉTEJÁRÓ F. WIESEN W.

(pratum = rét, vage = koberolva, a tartózkodásról.)

Syn. 1870. *Lycosa prativaga* L. KOCH «Beitr. z. K. d. Spinn. Faun. Galiz.» pag. 43.

Vide: THORELL «Remarks» p. 304, 306 (in § L. amentata et pullata.)

♀ A fejmele barnás, közepén egy rövidke, jelentéktelen, világosodó közepesikkal; a mellresz, szélein, alig feltűnő világosodó szegélylyel. A végtest elején egy rövidke, világosodó, nem feltűnő csík; a szőrözet szürke-barnás, elegyes, a végtest vége és oldalai felé fehéressel kevert. A lábak szennyes barnássárgák, nem kirivóan, de igen sűrűn barnán gyűrűzöttek.

A fejmele hosszúság-szivalakú, magas; a fejrész kissé felvetett, keskeny, sok serteszerű szőrrel. A mellvert barna; megfekvő, rövid, fehéres és felálló, hosszabb barna szőrökkel. A rágók barnás vörösek, gyér szőrözettel; oldalról tekintve, tetemesen az állkapesokra csapottak, oly hosszúság, mint az első lábpár elsővégíze s e pár czombjánál alig vékonyabbak. Az állkapesok szélesek, elkerekítettek, barnássárgák; az alajk közel háromszögletes, csücsös, az állkapesok felehosszát meghaladja. A tapogató vöröses barnasárga, czombja sötétebb, térdize csücsös s a szár felületén egy-egy tüske, végíze kevéssel rövidebb mint a térd és szár együttvéve. A lábak karsuk; az első pár szárán, alul és elején egy pár rövid — e mögött két pár hosszú tüske, másodvégizén hasonlóképen; valamennyi lábczomb felületén két-két hosszú tüske.

A végtest tojásdad, hasfele sok szennyesfehér szőrrel.

Az alsó szemsor egyenes, négy szeme apró, a középső kettő láthatólag távolabbra egymástól mint a szélsőtől, a homlok szélétől oly távolságra, mely egy szemátmérőnél valamivel nagyobb. A középsor két szeme nagy, bőven szemátmérőnyire egymástól, annyira az alsó sortól, mint ez a homlok szélétől. A hátsó sor két szeme a középsőknél valamivel kisebb s kevéssel távolabbra egymástól mint a középsortól.

A zár magasságánál szélesebb; a nyelecske felé \sim szerű kettős ívet képez, mely alatt, az ívek összetalálkozási pontján, egy, a légzőrés felé irányozott, kisse hasított borda látható, e bordától két oldalt, tehát az ívek alatt, két terjedelmes kivájtás szemlélhető.

Mértékek: ♀	Törzs.....	6	m_m ebből
	fejmele.....	2.7	"
	I lábpár.....	8	"
	IV ".....	11.5	"

A peteburok vastag-lencsealakú 3.8 m_m , átmérőjű.

♂ Alig kisebb; a nőténynyel azonos színezetű. Tapogatója barnás, pikkelye feketés; szárize a térdiznél valamivel hosszabb, vaskos, bőven szőrös; a pikkely csücsös, a csücs egy kis, a szőrözetbe rejtett horogba végződik; nemzőszerve egy sárgászöröses, hosszú, előre és kifelé irányozott igen megfekvő s egyenletes vastagságú lemezt visel, mely a tapogató külső oldaláról tekintve legjobban látható.

Mértékek, ♂	Törzs.....	5.7	m_m ebből
	fejmele.....	2.4	"
	I lábpár.....	8	"
	IV ".....	10.5	"

Mint igen koratavaszi alakot Apatinból, mint nyári alakot Tokajból ismerem.

SPEC. 8. FAJ. LYCOSA ANULATA. THOR. GYŰRŰSLÁBÚ F. EINGELBEINIGE W.

(anulus = gyűrűske; a lábak diszéről.)

Syn. 1871. *Lycosa annulata* THORELL «Remarks» p. 299.

♀ Előteste sötét olajbarna, három világosodó, elmosott hosszúsíkkal, melyek közül a középső meg legjobban kifejezett, a nyelecske felé csúcsosodik, a szemek felé keresztyszerűen tágul, de e tágulás a szemtér hátsó szelen elenyeszik; a szemtér sötét; végteste sötétbarnás, olajzöldes szőrözettel, elején egy világosodó orsófolttal, e mögött igen határozatlan, világosodó foltokkal; lábai olajsárgák sötétebb gyűrűzettel és foltokkal elég sűrűn megrakva. Valamennyi rajz a borszeszben elesedik; száraz állapotban a fakó szőrőzet által elborítottatik.

A fejmel jól fejlett; mellresze kissé tágult, a fejrés prismaticus. A mellvért barna, fehéres szőrözettel. A rágók, állkapsok és az alajk szemmyes agyagsárgák, a rágók tövük felé kissé barnultak. A tapogató a lábakehez hasonló színű, gyűrűzött; térdén, szárán és czombján néhány fekete, karsú tüskével, végíze rövidebb mint a térd és szár együtt véve. A lábak karsúak, finom végekkel, erős, hosszú fegyverzettel; gyűrűzet szerint: a czombon 4, a térdén 1, a száron 3 gyűrű jól megkülönböztethető.

Az első lábpár szárán, alul, három hosszú és ugyanitt, de legelől, egy rövid tüsképpárral; másodvégizen alul, három hosszú tüsképpárral; a harmadik és negyedik lábpár térdén, felül, a legesúcsán egy hosszú tüske; valamennyi pár czombján, felül, szárán és másodvégizén, alul, sok, hosszú és megfekvő tüske. A végtest tojásdad, elég domboru.

Az alsó szemsor negy szeme apró, egyenlő távolságra egymástól s távolabbra a homlok szelétől mint a második sortól; a második sor két szeme nagy, egy szemtérőnél nagyobb távolságra egymástól; a harmadik sor két szeme, a második sorénál kevesse kisebb és sokkal távolabbra egymástól mint a második sortól.

A zár egy elenken sárgászörös, világos, fenyves terese, mely szélessegenel hosszabb, a nyelecske felé kikerekített, a legzőres felé nyelvszerűen kinyúló s ismét kitágulva, elkerekített.

Mertekek: ♀ Törzs	6.8 $\frac{m}{m}$ ebből
fejmel	2.6 »
I lábpár	8.5 »
II »	7.0 »
III »	7.2 »
IV »	10.0 »

♂ Kisebb, karcsubb, egészben sötétebb; a lábak gyűrűzete csak a czombokon kifejezett, különösen a fehéleten sötét. A tapogató czombja és térdé világos, bunkója a szárral együtt sötétfekete; a szár vastagodott, tömötten álló, durva, fekete szőrözettel; pikkelye csúcsosan kanálalakú, kurtán szőrös, csúcsa alatt egy gyer ecsettel; nemzőszerve egy sötét színű, egyszerű, csak kevesse domborodó gyűjtőből áll, melyen csak egy apró, jelentektelen dudorocska látható.

Mertekek: ♂ Törzs	5 $\frac{m}{m}$ ebből
fejmel	3 »
I lábpár	7.8 »
II »	7.4 »
III »	7.4 »
IV »	10.2 »

E jeles fajt, melyet THORELL tanár francia és olasz példányokra alapított, mely tehát deli jellegnek látszik lenni, eddig csupán csak Doroszlón, a moesarak szelein, meg pedig mint kora tavaszi alakot észleltem.

SPEC. 9. FAJ. LYCOSA POECILA. N. SP. TARKA F. BUNTE W.

(ποικίλος = tarka; a színezetről.)

(VIII. tábla 178, *a* szemcsoport, *b* törzs, *c* a ♀ zárja, *d* mérték.)

♀ Elötteste barna; szemtereseje fekete; szélei széles, sárga szegelylyel, mely a homlokon egyesül, a nyelecske felett ellenben megszakad; a nyelecskétől egy sárga középcsík indul, mely a szemterese közelében elenyészik. Lábai karsúk, vörössárgák, a negyedik pár igen hosszú; valamennyi íze sűrűn rakott, egyenetlen szélű, barna gyűrűfoltokkal ékesítve. Végteste olajbarna, elején sárgás lándzsafolttal, hasa szenyyes sárgás.

A fejmell hosszúkás, közel prismaticus. A rágók vöröses sárgák, oldalról tekintve, végökkel az állkapcsokra csapottak. A mellvért kerekded, sárga, sűrűn szőrös. A tapogató sárgás, keves igen enyésző folttal, módosan szőrös, minden ízén néhány sertetüske, végze oly hosszú, mint térd és szára együttvéve. A lábak karsúk, igen finom vegekbe kifutók; az első pár szárán, alul, a legvégén egy párrövid — a közepén és töve felé egy-egy pár igen hosszú tüske, — másodvégizen hasonlóképen; a második lábpáron hasonlóképen, s azonkívül a szár belső oldalán is egy tüske; a két hátsó lábpár szárán és másodvégizen alul és oldalt több tüske.

A végtest hosszúkörded, aránylag kicsiny.

Az alsó szemsor egyenes, a másodiknál valamivel rövidebb, középsői valamivel nagyobbak, távol-sága a homlok szélétől annyi, a mennyi a második sortól; a második sor két szeme nagy, másfél átnyírónyíre egymástól; a harmadik sor két szeme a második sorénál kisebb, sokkal távolabbra egymástól, mint a második sortól.

A zár egy igen terjedelmes, aránytalan nagy, barnászörös, szélesen nyelvvalaku lemez, melynek legzörés felőli sarkain egy-egy barna, gombostüfejszerű dudor látható.

Mértékek: ♀	Törzs	6	$\frac{m}{m}$ ebből
	fejmell	3.1	»
	I lábpár	9	»
	II »	8.3	»
	III »	8	»
	IV »	13	»

♂. Ismeretlen.

E csinos kis pók leginkább reteken fordul meg és sebes, ügyes futása által tunik ki; a kisse nyirkos talajt különösen kedveli. Több helyről ismerem, u. m.: erdélyi részekből Szász-Vesszősről és a Körös-szorosból (Feketető körül); magyar részekből: Apatinból, Lucsivnárról (Kárpátalja); Moesáry Sándor S.-A.-Ujhely körül gyűjté. (Múz. gy.)

SPEC. 10. FAJ. LYCOSA FARINOSA. N. SP. LISZTES F. BESTÁUBTE W.

(farinosa = lisztes; a színezetről.)

(VIII. tábla 179, *a* szemcsoport, *b* a ♀ zárja, *c* a ♂ tapogatója, *d* ugyanannak nemzőszerve nagyítva, *e* mértékek.)

♀ Elötteste barna, fehéres szőrözettel, mely a szemterest is elborítja; végteste barna, szennyyes-fehér szőrözettel, mely a végtest vége felé néhány elmosódó \wedge szerű ágrajzot alkot; hasa barna, szennyyes-fehér szőrözettel. Lábai vörösbarnák, szennyyesfehéres szőrözettel borítottak, vaskosak, elmosódva foltosak.

A fejmell kevésbé prismaticus, elől elkerekített; pofái kissé kidagadók. A mellvért szélesen szív alakú, vörösbarna, fényes, kevés szőrözettel. A rágók töve szennyyes-sárgás-fehéres, a vége barnuló. A tapogató sok sárgás szőrrel és elfolyó barna foltozattal; végze valamivel rövidebb mint a térd és szára együttvéve.

Az első lábpár száran, alul, három tüsképar, másodvegizen, alul, három tüsképar; a második lábpáron hasonlóképen.

A végtest hosszkörded, elege magas.

Az alsó szemsor oly hosszú, mint a második, kevéssel távolabbra a homlok szelétől mint a második sortól, szemei egyenlők; a második sor két szeme nagy, bőven egy szemátmérőnyire egymástól; a harmadik sor két szeme valamivel kisebb, távolabbra egymástól, mint a második sortól.

A zár egy széles \perp szerű osztólemezzel, melynek könyökeiben egy-egy barnás dudor látható; a lemeznek a nyelecske felé álló vége dudorszerű. Az egész zár vörösesbarnás.

Mértékek: ♀ Törzs	10 $\frac{m}{m}$ ebből
fej mell	4·3 „
I lábpár	9 „
II „	8·6 „
III „	8 „
IV „	11 „

♂ Alig kisebb; hosszabb, erős lábakkal. Az előtest szőrözete egy szemterese szélességű szemnyes-fehéres közepesikká alakul, mely finom, barnás hátárokkal szegélyezett; a végtest felületén végig egy hasonló csík, inkább szalag, mintegy folytatása az előbbinek; a szőrözetben sok a fakó színű is, mi földszürkét tesz az alapszínezetet. A tapogató sötét; terde a szárnál valamivel hosszabb; pikkelye kanálalakú; nemzőszerve, oldalról tekintve egy egyszerű gyűjtőt mutat, alulról tekintve e gyűjtő egy résüntős, széles csavardást mutat, a gyűjtő oldalán, a pikkely külső szelének közvetlen közelében egy kissé horgos, éles, kis körmöcske látható.

Mértékek: ♀ Törzs	8 $\frac{m}{m}$ ebből
fej mell	4·4 „
I lábpár	10·3 „
II „	9·9 „
III „	9·5 „
IV „	12 „

E fajnak egyetlen párja, mint kora tavaszi alak (márczius) Doroszló mellett a Mosztonga moesáros szelén találtatott. Dr. THORELL nem ismerte. Megjegyzésem az, hogy a pófák alkotásánál fogva e faj nem szerint legalább is közeli rokonságot mutat a Tarentula-nemhez.

SPEC. 11. FAJ. LYCOSA FESTINANS N. SP. GYORS F. RASCHER W.

(festinans = siető; a mozgásról.)

(VIII. tábla, 180, a szemesoport, b a ♀ zárja, c mérték.)

♀ Előteste barna, a hátres körül világosodó; lábai karesúk, hosszuk, vörösbarnások, számos sötét gyűrűsfolttal; végteste barna, elején egy rövidke kúndzsafolttal.

Fejmellének fejeresze prismaticus, a mellrész szelesedő; a szemterese sötét, pófai kissé világosodók. A mellvért szélesen szívalaku, sötét vörösbarna, kevés fehéres szőrözettel. A rágók töve elmosódva barnás-sárga, vége sötétedő. A tapogató barnássárga, sok barnás, gyűrűsfolttal, eléggé szőrös, a szőrözet között kevés serte, végíze oly hosszú, mint a terd és szár együttvéve. Az első lábpár száran, alul, három pár — oldalt két tüske, másodvegizen, alul, szintén három pár tüske; a második lábpáron hasonlóképen, — az ízek végén álló tüskék rövidek, a többiek karesúk, hosszuk. A végtest szélesen körded, aránylag kiesiny.

Az alsó szemsor egyenes, szemei aprók, a sor rövidebb a második sornál s annyira áll a homlok szélétől, a mennyire a második sortól; a második sor két szeme nagy, földre mint szemátmérőnyire egymástól; a harmadik sor két szeme a második sorénál valamivel kisebb és sokkal távolabbra áll egymástól, mint a második sortól.

A zár egy barnászörös, fénylő, meglehetősen széles osztólemezből áll, mely felső végén elkerekített s oldalt egy-egy tágulást mutat, alsó végén kissé 1 szerű alkatu, a könyökökben egy-egy kis dudorral.

Mértekek: ♀ Törzs	5.8 $\frac{m}{m}$ ebből
fejmell	2.6 "
I lábpár	7.8 "
II "	7.3 "
III "	7 "
IV "	11.4 "

A peteburok barnás, lencsealaku, 4 $\frac{m}{m}$ átmérőjű.

♂ Ismeretlen.

E fajnak egyetlen példányát, mint igen kora tavaszi alakot Doroszlón, moesáros helyen találtam. Dr. THORELL e fajt nem ismeré.

SPEC. 12. FAJ. LYCOSA EXORNATA. N. SP. DISZES FARKASPÓK. ZIERLICHE W.

(exornáta = feldiszitett; a végtest világos diszéről.)

(VIII. tábla, 182, a szemesoport, b törzs, c előláb, d mérték.)

♀ (junior). A fejmell sárgásfehéres szőrözettel, mely egy széles középsíkot és meglehetősen széles szegélyt alkot; végteste feketésbarna, felületén végig egy szembetünő, elől ágas, hátul fűrészfogas rajzzal, melynek szőre sárgás és a mely a borszeszben is élénk marad; hasa szennyesárga; a lábak ezomb, térd és száríze sötét, a ezomb kevésbé foltos, az első páré egy világosodó hosszcsíkkal, — a végizék fakók.

A fejmell fejerésze prismaticus, mellrésze módosan tágult. A mellvert barnásfekete, fényes, kevés szőrözettel. A rágók barnásfeketék, tövük körül fakó szőrözettel. A tapogató vörhenyes, ezombja sötétén foltos, végize valamivel rövidebb mint térdé és szára együttléve. Az első lábpár szárán és másodvégizén, alul, három-három pár tüske. A végtest hossztojásdad, a végén kissé csúcsosodó.

Az alsó szemsor láthatólag behajló, középsői valamivel nagyobbak; a második sor két szeme nagy, körülbelül szemátmérőnyire (inkább földre) egymástól; a harmadik sor két szeme valamivel kisebb s távolabbra egymástól, mint a második sortól.

A zár szerkezete harmadvedlésű példányaimon nincsen kifejlődve.

Mértekek: ♀ Törzs	6.5 $\frac{m}{m}$ ebből
fejmell	3 "
I Lábpár	6 "
II "	5.8 "
III "	5.5 "
IV "	9.5 "

♂ junior. Élénkebb rajzokkal. Tapogatója elenken sárgavörös, nemi barna folttal; nemzőszerve (harmadvedlésű) vaskos; szerkezete ismeretlen.

E szép fajt, mely élénk rajzait bizonyosan a negyedik vedlés után is megtartja, s ennek következtében könnyen fölismerhetővé válik, a kifejlődés mondott fokán leírni jónak láttam. A rajzokon kívül az alsó szemsor behajlása is jellemzi. Dr. THORELL e fajt nem ismeri. Gyűjtötte Pável János juliushan a Rákoson. (Múz. gy.)

GEN. 3. NEM. TARENTULA. SUND.

(Tarentum olasz város, melynek környékéről a mesés tulajdonságokkal felruházott pókok ismeretesei lettek; lásd általános rész, 16. l. Aldrovandi.)

Syn. 1833. SUNDEWALL «Conspectus Arachn.» p. 24. (ad partem.)

Vide: THORELL «On europ. Spiders» p. 191.

A felső fonópár az alsónál nem vagy alig hosszabb.

Az alsó szemsor a középsőnél kevéssel vagy alig rövidebb; a szemek tere oly hosszú, a milyen széles; az arcz elég magas, a rágók töve felett pofás, domborodó oldalakkal; a lábvégek csak kevéssé vékonyodók.

Bujkáló alakok. A nőstények majdnem gömbölyű, nagy peteburkokat készítenek, s ezeket legtöbbszörre kivájt üregekben őrzik; némely alakok barangolók s nőstényeik csak a peték lerakása idején gondoskodnak üregekről.

A *Tarentula radiata* bordáskörmei erősek, íves hajlásúak, kevés, erős, nem épen hosszú bordával felszereltek, lásd: II. köt. VI. t. 134. c.

SPEC. I. FAJ. TARENTULA RADIATA. (LATR.) SUGARAS TARENTULA. STRAHLIGE T.

(radius, radiata — csillagosan oszló sugár; rajz az előtsten.)

Syn. 1817. *Lycosa radiata* LATRAILLE «Nouv. Dict. d'Hist. Nat.» II, éd. XXVIII. p. 292.

Vide: THORELL «Remarks» p. 313, 314.


1875. Idem. «Deser. of several Europ. and North African Sp.» p. 158.

♀ Előteste sárgásbarna; világosabb, széles közép- és hasonló oldalesikkal, az előbbi a nyelecskétől a szemtéréséig tart, az utóbbiak a homlokon egyesülnek. A középsikban fekvő hátres táján, minden oldalon négy-négy, küllőszerűen elrendezett csik indul az oldalesikok felé, s minden küllő — a két első leginkább — hátul feketésen szegélyezett. A végtest fakó, a nyelecske felett két feketés folttal; hasán, a légzőréstől a fonókig terjedve, egy terjedelmes, háromszögletes, elmosódó szélű fekete folt, mely esücsával a fonók fele áll, s azokat megközelíti.

A lábak barnássárgák, alfelőkön, az ízek végén, homályos foltokkal, — a negyedik pár szára tövén és végén széles fekete gyűrűs folttal, mely az iz felületén nem ér össze; a csipők alfele bársonyfekete szőrözettel, különben sötét vörösbarna.

A fejmeleg hosszukás szivalakú, jól domborodott, hátvonala, oldalról tekintve, vízszintes, a szemek táján alig, a hátresen túl tetemesen lekonyuló; a megfekvő, rövid, meglehetősen tömött szőrözettel között es leginkább a szemtérésen, néhány felálló, hosszú, barna szőr. A mellvért szivalakú, fénytelen; bársonyfekete, felálló, serteszerű, fekete szőrökkel. A rágók az első lábpár czombjánál nem vékonyabbak, ugyan e lábpár elsődvégizénél sokkal hosszabbak, másodvégizénél alig rövidebbek; tövük élénk sárga szőrözettel borított, végök feketés, szőrös, az erős csipőkörmök hegye felé biborosan áttetsző. Az állkapcsok vörösbarnák szélesek, befelé résüntősen elvágottak, kifelé elkerekítettek, az alajk hasonló színű, széles, elől egyenesen elnicsztott, az állkapcsok fele hosszánál alig rövidebb. A tapogató sok sárga szőrrel, végíze barnuló; czombja felületének elején három rövid tüske haránt sorban, közepe táján egy nagy tüske.

A lábak barnasárgák, alól sötétben foltosak (lásd felül); valamennyi végizen erős, tömött talpkefe (pálczaszerű szőrökből), mely a két első páron a szárra is átnyulik. Az első lábpár száran, alól, három pár igen megfekvő erős tüske, a második páron hasonlóképen: a harmadik és negyedik lábpár szára köröskörül megfekvő tüskeikkel fegyverezett. Valamennyi czomb felületén 5—7 kurta, megfekvő, rendetlen állású tüske.

A végtest hossztojásdad, fakó, a nyelecske felett két elmosódó folttal, e két folt irányában, hátrább két  szerű feketés foltocska (peldányonnal); szőrözete kurta, finom, világos fakószínű, gyéren feketéssel elegyes.

Az alsó szemsor negy szeme egyenlő nagyságu, egyenlő távolságra egymástól, két középsője bőven szemátmérőnyire a homlok szelétől; a sor igen könnyeden behajló. A középső sor két szeme igen nagy, oly távolságra az alsó sortól, mint ez a homlok szelétől, egymástól pedig egy szemátmérőnél valamivel kevessebbre. A hátsó sor két szeme a középsőnél kisebb s közel másfélszer oly távolságra egymástól mint a középsőtől.

A zár barnászörös, nem épen bemélyedő, szelességénél valamivel hosszabb, a nyelecske felé boltozatosan kikerékitett térese, mely közbül, hosszában egy széles lemez által elválasztott; e választó lemez a légzőrés táján a zár alapját kepező vastag, egyenetlen harántlemezbe \perp szerűen beleforrad.

Mértékek: ♀	Törzs	23 $\frac{m}{m}$ ebből
	fej mell	8.7 "
	I lábpár	23.5 "
	II "	22.4 "
	III "	20.7 "
	IV "	29 "

(A IV lábpár szára és térdé együtt: 9.5 $\frac{m}{m}$.)

♂ Előttem ismeretlen.

E faj színezet szerint változó és példányom legközelebb áll a γ -jegyű változathoz, a melyet THORELL tr. id. helyen bőven leírt.

Déli jellegű faj, mely leginkább Olaszországból (Toscana), a Svajcz déli részeiből és Nizza környékéről ismeretes. Leírásom egy példányra alapított, a melyet Dr. Horváth Géza t. barátom 1873-ban Komjáti környékén az «Alsóhegy» déli lejtőjén egy kő alatt felfedezett; Schusztér Károly ur gyűjteményében egy példány a Budai várhegyről. Életmódját nem ismerem. A faj és lelhely egészen biztos.

SPEC. 2. FAL. TARENTULA INQUILINA. (CL.) BUVÓ T. AFTER T.

(inquinus -- bérbenakó, olyan is, ki nem született Rómában, tehát jöttment; a felfedezés körülményeire ezélez¹⁾)

Syn. 1857. *Araneus inquinus* CLERCK «Aran. Suec.» p. 88.

Vide: THORELL «Remarks» p. 311, 312. (in § T. fabrilis).

♀ Elötteste kissé vöröslő barna; széles, világosabb közepesíkkal, mely a szemtérsze felé mindinkább szélesedik s ezt végre körülfogja; a mellresz oldalain széles, de igen elmosódó szegély. A végtest barna, kissé vöröslő, a nyelecske felett két terjedelmes, tiszta fekete folt, e mögött, mintegy az első ingödörpárt jelezve, két apró, fekete pont; hasfele egész terjedelmében tiszta fekete. Lábai barnások, homályos sötét tarkítással, mely a czombok belső felén leginkább előtűnik, a csipők vörösesbarnák.

A fej mell vaskos, eléggé nyújtott és domboru, oly hosszú, mint a negyedik lábpár térdé és szára együttvéve; kurta, megfekvő szőrökkel, a szemek terén kevés felálló hosszabb szőrrel. A mellvert szivalaku, fényes feketebarna gyér és felálló szőrökkel. A rágók vaskosak, az első lábpár első végizénél kevésse hosszabbak, a másodvégizzel egyenlők, ugyane lábpár czombjánál vastagabbak, tövük körül kevés sárga szőrökkel, egyébként barnafeketek. Az állkapesok sötét vörösbarnák, elől elkerékitettek; az alajk hasonló színű, majdnem négyszögletes, az állkapesok felehosszát eléri. A tapogató vörösbarna, czombján homályosan foltos, ennek felülete végén harántsorban álló három kis, e mögött egy nagyobb tüskevel, végíze alig rövidebb mint térdé és szára együttvéve. A lábak első végizei tömött talpkéfével, a két első páron a kefe a második végizre is átmegy, de soha a szárra. Az első pár szárán, alul, három pár karesu, kissé elálló tüske, másodvégizén szintén három pár a kefeben látható. A harmadik és negyedik lábpár köröskörül hosszú, megfekvő tüskevel fegyverzett. Valamennyi czomb felületén több tüske, a legalsóbb hosszú, karesu, majdnem serteszerű.

¹⁾ Clerck «Ar. Suec.» pag. 88. « . . . reperiebatur sub margine reticul. ab araneo Labyrinthico » etc.

A végtest tojásdad, finom, vöröslő és fénylő szőrrel barnásan elegyítve.

Az alsó szemsor negy apró szeme alig behajló sorban, föbbre, mint szemátmérőnyire egymástól s közelebb a középsorhoz mint a homlok szélehez. A középsor két szeme nagy, szemátmérőnyire egymástól. A hátsó sor két szeme a középsőnél valamivel kisebb, kevéssel távolabbra egymástól mint a középsortól.

A zár egy nem bemélyedő, sík, barna terese, melynek közepén egy kettős, vékony borda fut, melynek szárai a légzőrés szélén jobbra-balra szethajolnak (A).

Mertekek: ♀ Törzs (legnagyobb)	14	$\frac{m}{mm}$ ebből
fejmell	6	»
I labpar	15.5	»
II »	12.5	»
III »	13.2	»
IV labpar	19	»

(E példánynál egy helyrepotolt III láb $9 \frac{m}{mm}$).

Más példány: I labpar	17.5	$\frac{m}{mm}$
II »	15.7	»
III »	15.2	»
IV »	21.7	»

Peteburka majdnem gömbölyű, szürke, $9 \frac{m}{mm}$ átmérőjű.

♂ Karesubb, kisebb. Előtesten az oldalszegely is elesrajzu, a végtest felülete elején \wedge szerű feheres rajz. Lábai nem foltosak. Az egész has fekete. A tapogató hosszú, száríze nem hosszabb a terdnel, nem vastagodott; a czomb, terd és szár egyszínűen világos vörösbarnak; a czomb felülete elején, harántsorban négy kurta tüske és még egy (? = példányom egyik tapogatóján 1, a másikon 2 tüske) karesu tüske; pikkelye sötetbarna, bőven kurta-szőrös, csucososan kanálalakú; nemzőszerve egy többszőrösen behorpasztott, sötetbarna gyűjtőből áll, a melyhez illeszkedve egy világosabb, reszútösen előre és befelé irányozott lemez látható; alulról és oldalt tekintve, a gyűjtő szélén még egy nehezen észrevehető, sötet, vaskos köröm is látható.

Mertekek: ♂ Törzs	14	$\frac{m}{mm}$ ebből
fejmell	6	»
I labpar	16.1	»
IV »	18.8	»

Ifjú korában a színezet világosabb, a lábak gyűrűsen foltosak. Helyenként leggyakoribb Tarentulaink közé tartozik, s úgy látszik, hogy az előhegységet és itt a meszes helyeket kedveli leginkább. Rendesen kövek alatt bujkál s gyakran laposan felfekvő kövek alá barlangot váj, a melyben a nőstény petezaeszkójával tartózkodik. Verőfenyes napokon a peteburkot a nap sugarának is kiteszi.

Ismerem az Also-Hamorból, különösen a «Hollós» nevű fenyves környekeről, hol mint nyári alak nem ritka. Egy ifjú példány a magyar nemz. Múzeumban, gyűjtötte Pavel János Budán. Egy példány birtokban Szász-Vesszősről Erdélyben (Kis-Küküllőmegye).

SPEC. 3. FAJ. TARENTULA SOLITARIA. N. SP. REMETE T. KINSIEDLER T.

(solitaria = magános, egyedülvaló; a tartózkodásról.)
(VIII-ik tábla, 183, *a* szemállás, *b* a ♀ zárja, *c* mérték.)

♀ Földbarna. Előtesten egy a nyelecske felett keskenyen induló, a hatrés táján szélesedő, fako közepesík, mely a szemtercsen és a pofákon is elterjed; szélein széles, fako szegely, mely belőlfelel tetemesen esipkezett szelű; a végtest sok vörhenyes szőrrel elegyítve, barna; hasa földszürke; lábai sárgás földszürkek, a czombok felülete és oldala barnán, elmosódva felhőzött (a borszeszben barna foltos). A rágók töve sárgás földszürke, vége barnuló.

A fej mell vaskos, fejeresze szelesedett, elkerekített, tetemesen pofás. A mellvert szelesen szivalaku, barna, elég szőrös. A tapogató színe a lábakéval egyenlő, szőrözete gazdag, végíze oly hosszú, mint a térd és szár együttvéve. A lábak erősek, elég hosszúk, erős végekkel; az első pár szárán, alul, három gyenge tüsképár, másodvégizén, a talpkefébe rejtve két (?) tüsképár, mind a két iz külső oldalán is két-két tüske egymás mögött; a harmadik és negyedik pár szárán alul, és oldalt több tüske, felül egy tüske, a másodvégizeken köröskörül sok hosszú tüske. Az első és második pár mind a két végizén erős, tömött, fekete talpkefé.

A végtest elöl felemelt, keskenyedő, hátul elkerekített.

Az alsó szemsor igen könnyedén behajló, középsői igen szembetűnőleg nagyobbak; a második sor két szeme nagy, nem egészen szemátmérőnyire egymástól; a harmadik sor két szeme kisebb s távolabbra egymástól, mint a második sortól.

A zár sötétbarna, közel háromszögletes, talpával a légzőrés felé fordított, belseje \wedge szerűen szétágazó lemezekből áll.

Mertekek: ♀ Torzs	13.8 $\frac{m}{mm}$ ebből
fej mell	7 »
I lábpár	17 »
II » 	15.5 »
III » 	14.9 »
IV » 	19.5 »

(Torzhosszát terhes állapotban 17—19 $\frac{m}{mm}$ -re tehetni.)

♂ Ismeretlen.

E tetemes nagyságú Tarentulát, mint őszi alakot (szeptember) Liptó megyében Lykaukán, az ottani varrom dombjának egy köve alatt találtam. Fogságban, legyekkel tartva, hamar kezessé lesz s a táplálékot a kézről is elfogadja. Predáját nagy szökéssel rohanja meg, azután kiszívja. Dr. THORELL e fajt nem ismerte.

SEEC. 4. FAJ. TARENTULA CRONEBERGII. THOR. CRONEBERG T. CRONEBERG T.



(Croneberg orosz természettudós tiszteltétére.)

Syn. 1875. *Tarentula Cronebergii*, THORELL «Verz. südruss. Spinnen» p. 65, et «Descr. of sev. Europ. and North Afr. Spiders» pag. 156.


♀ Sárgásszürke. A fej mell közepén, hosszában egy, a szemter szélességének megfelelő esik; a mell-resz oldalaiban egy széles, belső szélén melyen csipkes szegély. E rajzok megfelelő szőrözetből valók. A végtest eleje közepén egy rövid, világos lándzsafolt, minden oldalán két \wedge világos ág, mely alsó szelen feketesen szegélyezett, ezen alul, két oldalt sorakozva, 3—4 világosabb folt, szeles, fekete szegélyben (páva-szemszerű). A has világos sárgásszürke. Labai sárgásszürkek, a czombokon igen keves barnás folt (áttetszésre szemlélve leginkább feltűnik). A rajzok nem épen kirívók, az állat kitűnően «szárazföld színű». — A fej mell hosszúkás, fejeresze elég vastag; oldalról tekintve, a hátvonal előre kisse emelkedő, a szemter kisse lekonyult, a hátsó rész reszútösen majdnem egyenesen (nem ívesen) a nyelecskére lecsapott. A mellvert barnásvörös, szőrös. A rágók oly hosszúk mint az első lábpár végíze, e lábpár czombjánál nem vékonyabbak, tövük körül kevés sárgásszürke szőrökkel, máskülönben feketések, bőven hosszúszőrűek. Az állkapcsok barnásvörösek, végeik kisse világosodók, elkerekítettek; az alajk vaskos, majdnem negyszögletes, az állkapcsok felhosszán kisse alól marad. A tapogató egészben karesú, czombja barna foltos, a többi íze is itt-ott egy-egy elmosódó folttal; a czombfelület elején három vagy negy rövidebb tüske, harantsorban, e mögött két hosszabb tüske egymásután; végíze kevéssel rövidebb mint a térd és szár együttvéve. A lábak elég karesú; csipőik szennyes agyagsárgák. Az elő lábpár szárán, alul, két pár karesú, megflevő, a végén egy pár rövidebb, minden oldalon két-két tüske; a másodvégiz erős talpkeféjéből szintén tüskék látszanak (3 pár ?), minden oldalán két-két tüske. A harmadik és negyedik pár szára és másodvégíze feljül is tüskes, e

párok terdein csak tapintó szőrök állanak. Valamennyi pár czombja felületen több (7—9) tüske. Az első két páron a talpkéfe a másodikvégzire is átmegy.

Az alsó szemsor közepén, a homlok széle és középszemsor között, igen könnyedén behajló, középszemei a szelsőknel láthatólag nagyobbak s átmérőjüknek megfelelő távolságra esnek a homlok szelétől. A középsor két szeme igen nagy, nem egészen szemátmerőnyire egymástól. A hátsó sor két szeme a középsőnél valamivel kisebb s valamivel távolabbra egymástól mint a középsortól.

A zár két oldalt feketes szőrbe foglalva; téreseje barnás vörös s egy elkerekített szegletű háromszöget alkot, mely talpával a légzőrés, csucsával a nyelecske felé áll, e háromszögben egy finom középhosszlemez két oldalán  szerűen szétágazó, széles melléklemek láthatók. A középlemez a talplemezzel  szerű alakot alkot.

Mertekek: ♀ Törzs	11	$\frac{m}{m}$ ebből
fejmell	5.3	»
I lábpár	14	»
II „	13	»
III „	12.5	»
IV „	17.5	»

♂ Nem kisebb, valamivel karesubb, a nőstényéhez hasonló színezettel és rajzzal. Tapogatója elég hosszú, karesu, czombja a nőstényéhez hasonló fegyverzettel; szára oly hosszú mint terde, elég szőrös; pikkelye sötétedő, csücsösen kanál alakú, csúcsa alatt gazdagon, bozontosan szőrös; nemzőszerve, alulról tekintve, egy sárgászörös gyűjtőt mutat, a melyre — a külső szelről indulva — egy hegyes, fogalaku, széles, egybordás () sötét karej reáborul.

Mertekek: ♂ Törzs	11	$\frac{m}{m}$ ebből
fejmell	5.5	»
I lábpár	17	»
IV „	20.5	»

Mint nyári alakot csak kevés példány után ismerem, melyeket kopár talajon futva találtam. THORELL tanár csak a nőstényeket írta le, s így a ♂ itt először van ismertetve.

Találtam Erdélyben: Szász-Vesszősön (♀); Magyarországon: S.-A.-Újhelyen (♀) peteburokkal, mely fehér, $7\frac{m}{m}$ átmérőjű. Komjátiból dr. Horváth Geza ur szerzett egy ♂, Budáról egy ♂, a magyar nemz. Múzeum gyűjteményében (PÁVEL).

SPEC. 5. FAJ. TARENTULA EICHWALDII. THOR. EICHWALD T. EICHWALDS T.

(Eichwald híres orosz természetbuvár tiszteletére.)

Syn. 1875. *Tarentula Eichwaldii* THORELL «Verz. südruss. Spinnen» p. 65. et «Descr. of sev. Europ. and N. Afr. Spid.» 154.

♀ Barnásszürke. Az előtesten egy, a nyelecsketől induló, világosodó, széles hosszcsík, mely a szemek felé szélesedve, ezeket két felől körülfogja, a fejrészt oldalára is kiterjed, s itt a hasonló színű, széles oldalszegélylyel egyesül; a közepesík és oldalszegély közötti tér barnás, a hátrés tájából induló, küllőszzerűen elrendezett barázdák által osztott. A végtest felületének elején, közepén egy bársonyfekete landsaulaku hosszfoltt, világosabb szegélylyel, e mögött két sorban feketével határolt szürkés foltoeszkák (pávaszemserűek), melyek elmosódó haránt vonalak által egymással összekötve. A has barnásfekete. A lábak barnás-szürkék; czombjaik belső felőkön (áttetszésre vizsgálva) elmosódó, kevés barnás hosszfolttal.

A fejmell nyújtott, eléggé magas; oldalról tekintve, a hátvonal a szemtéresen kissé lekonyult, a nyelecske felé majdnem egyenletesen, ivesen leszálló. A mellvert tömötten szürkés szőrű, gyeren felálló

barna sertékkal is fedett. A rágók az első lábpár *másodvégizénél* valamivel hosszabbak, vaskosak, a mondott lábpár czombjánál vastagabbak, oldalról tekintve kórtve alakúak, a homlok előtt igen kidülök; tövük barnásszürke, végük feketebarnas. Az állkapcsok szelesek, elöl elkerékítettek, sok serteszerű szőrökkel borítottak; az alajk közel négyszögletes, elöl elmetsett, az állkapcsok felehosszát eléri. A tapogató aránylag karesú, barnásszürke, czombja felületén, elöl három rövid tüske harántsorban, e mögött egy (? vagy két) hosszabb tüske, végíze tömötten szőrös, alig rövidebb mint a térd és szár együttvéve.

A lábak aránylag rövidek, elég vaskosak, az első pár szárán, alul, három pár megfekvő tüske, belső oldalán meg két- vagy három egészen megfekvő tüske, másodvégizen szintén három pár a talpkefébe elrejtett tüske. A két hátsó pár szárai és másodvégizei felületükön is tüskések, a térdék végén csak tapintó szőrök állanak. Valamennyi czomb felületén elöl 3–4 kurtá tüske, e mögött két hosszabb és ettől oldalt még megfekvő, rövid tüskék látszanak.

Az alsó szemsor igen könnyeden behajló, középszemei valamivel nagyobbak s a sor közelebb áll a középsorhoz mint a homlok szelehez, a középsornál nem rövidebb. A középsor két szeme nagy, felszemátmérőnyire egymástól; a hátsó sor két szeme a középsőnél láthatólag kisebb s kevésbé távolabbra egymástól mint a középsortól.

A zár két oldalt kefeszerűen tömött, barnafekete szőrözetbe foglalva, egy terjedelmes, kerekded, vörösbarna és durván szemesezett tércséből áll, melynek a légzőrés felé eső szélén egy lóherelevél alakú benyomás látható.

Mertekek: ♀ Törzs (terhes)	17.5	$\frac{m}{mm}$ ebből
fej mell	1	»
I lábpár	15.5	»
II » 	14.5	»
III » 	14	»
IV » 	18.5	»

♂ Kisebb, karesűbb, a nősténynyel azonos színezetű. Az alsó szemsor azonban egyenes. A tapogató elég hosszú, czombja felületén, elöl négy rövidebb tüske harántsorban, e mögött két hosszabb tüske egymás-mögött; szára nem hosszabb a térdnél, alig vastagodott; pikkelye csúcsosan kanálalakú, sötétes, csúcsa alatt bozontosan szőrös; nemző szerve kevésbé domborodó, lenesealaku gyűjtőt mutat, mely előlről be és hátrafelé resümtösen igyekvő, széles harántlemez visel, mely egészen megfekvő, a csúcs alatt pedig csúcs-szerű büttyköt visel.

Mertekek: ♂ Törzs	13	$\frac{m}{mm}$ ebből
fej mell	6.4	»
I lábpár	17.6	»
IV » 	19.5	»

E fajt THORELL tanár Oroszországból ismertette.

Én Budáról ismerem, hol a Gellérthegy deli oldalán találtam; ugyanesak Budán gyűjté Pável János, s a példány egy igen típus nőstény, a nemz. Múzeum gyűjteményében van.

SPEC. 6. FAJ TARENTULA STRIATIPES. (DOLL.) CSÍKOSLÁBÚ T. GESTREIFTÜSSIGE P.

(striatipes = hosszvájás, láb; a lábakon észrevehető csíkosságról.)

Syn. 1852. *Lygosa striatipes* DOLESCHALL «Verz. der im Kais. Oest. vork. Spin.» p. 644.

Vide: THORELL «Deser. of several Europ. and North African Spil.» p. 152.

♀ Földszürke. Előtestén egy széles, világosszürke közepesik, mely a szemek felé szélesebbedve, ezeket körül fogja, s a fejrész oldalaira is elterjed, itt a világosszürke ollaszegélyvel egyesül; a csíkok közötti tér feketes, küllőszerűen elosztott, nem open és sugarakkal. A végtest elején, a nyelecske felett, két fekete

folt, mely néha felhódszerűen összefolyik; a felületen végig egy levelalakú ter, mely csücsával a fonóig leér és szelein \wedge szerűen álló öt-hét fekete folt által szegélyeztetik. A has barna, az oldalak szürkésége felé élesen határolt. A lábak szürkek, áttetszésre vizsgálva vörösbarnások, sötétebb hosszcsikokkal.

A fejmell hosszukás, elég magas; oldalról tekintve hátvonala vízszintes, a szemek fele kevéssé, a nyelecske fele tetemesen lekonyuló. A rágók az első lábpár *másod*-végizénél valamivel hosszabbak, oldalról tekintve körtve alakúak, nagyon kidülők, az első lábpár czombjánál alig vastagabbak, feketések, tövükön keves, szürkés szőrökkel. Az állkapcsok vörösbarnák, szélesek, végök elkerekített, sok, erős szőrökkel borítottak; az aljuk elöl elmetszett, az állkapcsok fele hosszát eléri. A tapogató nem epen vaskos, úgy mint a lábak hosszcsikos, czombja felületén, elöl, három vagy négy rövid tüske harántsorban, e mögött két hosszú tüske egymásmögött; végize tömötten szőrös, alig rövidebb, mint a terd és szár együttveve. A lábak nem epen hosszuk, elég vaskosak. Az első lábpár szárán, alul, egy pár rövidebb és két pár karesű, megfekvő tüske, belső oldalán meg egy tüske; másodvégizen jól látható három tüskepár. A harmadik és negyedik pár szár és másodvégize felül is tüskés; a terdek csücsán csak tapintószőrök állnak.

Az alsó szemsor egyenes, középsői valamivel nagyobbak; a sor a középső szemsor és a homlok széle között közepén áll, s a középsornál alig rövidebb. A középsor két szeme nagy, közel szemátmérőnyire egymástól. A hátsó sor két szeme a középsorénál kisebb, sokkal távolabbra áll egymástól mint a középsortól.

A zár körül semmi szőr; a tércse vörösbarna, durván-szemcsés, szélességénél magasabb, a nyelecske fele elkerekített, a légzőrés felől kissé csücsosan kivágott s e kivágásban egy kis, szívalakú betet (ω)

Mertekek: ♀ (legnagyobb) törzs	15	$\frac{m}{mm}$ ebből
fejmell	6	"
I lábpár	14	"
II "	13.3	"
III "	13.3	"
IV "	18.5	"

♂ Kisebb, karesubb; vegtesten a levelaku közepmező nem foltok, hanem az oldalakban elterjedő feketes szín által határoltatik. Az oldalak e színt a hasfele szürkebe enyesztik, mely utóbbi szín azután a has feketeségével élesen találkozik. Az első lábpár fegyverzete erősebb, a szár és másodvégiz oldalában is két-két tüske áll. A tapogató elég hosszú, száríze a terdnel nem hosszabb, alig vastagodó; pikkelye csücsosan kanálalakú, sötétedő, csücsa alatt bozotosan szőrös; nemzőszerve kevéssé domborodó, lenesealakú, sötét barnavörös, egy előlről és belőlfelől, hátra és kifelé irányozott sárgás hasitekkal.

Mertekek: ♂ Törzs	10	$\frac{m}{mm}$ ebből
fejmell	5.5	"
I lábpár	14	"
IV "	16.4	"

A T. Eichwaldii Th. legközelebbi fajrokona, melyet mint nyári és őszi alakot Erdélyből, Szász-Vesszősről ismerék. A magyar nemz. Múzeum gyűjteményében több példány Budáról (Pável) és Pestről (Múzeumkert, Mocsáry).

SPEC. 7. FAJ. TARENTULA TRABALIS. (CL.) SZÁLAS T. FESTE T.

(trabalis = szálas, erős; a vaskos testalkatról.)

Syn. 1757. *Araneus trabalis* CLERCK «Aran. Suec.» p. 97.

Vide: THORELL «Remarks» p. 321.

♀ Előteste sötétbarna, szürke rajzzal, vegteste szürkessárga; világosan szegélyezett, sötétebb lándzsafolttal. A két első lábpár czombja küloldalán egy elmosódó csík; a lábak szürkésbarnák. A fejmell közepén végig egy szürkés, széles hosszcsík, mely a szemekig tart s a fejresz oldalába nem terjed; a mellresz olda-

lain egy szürkés szegély, mely nem a legszálon fut, s a fejresz és homlok fele tartva, mindinkább keskenyedik; a hátres tájáról egy vagy két határozatlan szürkés küllősugar fut. A végtest elején, a nyelecske felett két elmosódó barnás folt, felülete elején egy közép lándzsa folt, mely a végtest közepe tájáig egyenletesen kihegyesedik, két oldalt világosan szegélyezett, e szegély a lándzsafolt csücsán túl egyesülve a fonóig tart; nem kirívó. A has világos.

A fejmell hosszukás, eléggé magas, oldalról tekintve a hátres táján igen könnyeden behorpasztott, a nyelecskere meredeken lecsapott. A mellvert agyagsárga, bőven szőrös és sertés. A rágók oly hosszúk, mint az első lábpár másodvégize, e lábpár czombjánál nem vékonyabbak, oldalról tekintve alig kidülők, végökkel kissé az állkapcsokra csapottak, tövük körül gyéren sárga szőrűek, egyébkint barnás feketek. Az állkapcsok barnás vörösek, szélesek, szőrösek, végök elkerekített, az alajk elől egyenesen elmetsett, az állkapcsok felét bőven eléri. A tapogató szürkésbarna, czombja felületen, elől három vagy négy rövid tüske harántsorban, e mögött két hosszú tüske egymásmögött, végize tömötten szőrös, oly hosszú, mint a térd és szár együttvéve. A lábak elég hosszúk. Az első pár szárán, alul, három és másodvégizén, ugyanott, szintén három pár megfekvő tüske, a szár belső oldalán azonkívül még 1—2 tüske. A két hátsó lábpár szára és másodvégize, felül is tüskes. A terdek csücsán csak tapintószőrök állnak. A végtest keskenyes, nyújtott, csücsosodó.

Az alsó szemsor szemei egyenlők, a sor a homlok széle és középszemsor között a közepén áll. A középsor két szeme nagy, szemátmérőnyire egymástól. A hátsó sor két szeme az utóbbinál valamivel kisebb, távolabbra egymástól mint a középsortól.

A zár egy szélességénél hosszabb, elől és hátul majdnem egyenesen elmetsett, tetemesen mely kivájás; szélei és belseje sötétvörösbarna, osztó lemeze durva s hátulról előre mindinkább a kivájásba be melyedő.

Mertekek:	♂	Törzs	14.5	$\frac{m}{m}$	ebből
		fejmell	5.7	»	
		I lábpár	15.3	»	
		II	»	13.2	»
		III	»	12.9	»
		IV	»	20	»

♂ Kisebb, karcsubb, sötétebb, élesebb rajzokkal.

A végtest felülete sötét barna, a lándzsafolt világosabb, szegélye fehéres, a has világos sárgásszurke, nem élesen határolt. A két első lábpár sötétebb vörösesbarna, végizei világosodók.

Az első pár szárának a fegyverzete erős. A tapogató vörösbarna, czombja felületen, elől, négy rövid tüske harántsorban, e mögött két hosszú tüske egymásmögött. A szár a térdnél valamivel rövidebb, vaskos; a pikkelye fekete, csücsosan kanálalaku, csücsa alatt bozontosan szőrös, nemzőszerve kevéssé kidomborodó, fényes barnavörös, a külső oldalról tekintve, a külső szálon egy vaskos, kurta, hegyes fogacs; alulról tekintve, elől egy sárgásbarna, nyelv alakú, visszahajtott karej látható.

Mertekek:	♂	Törzs	10	$\frac{m}{m}$	ebből
		fejmell	5	»	
		I lábpár	13.8	»	
		IV	»	17	»

Eddig csak Fiumeből ismerem, hol évekkal ezelőtt gyűjtöttem.

SPEC. 8. FAJ. TARENTULA ALBOFASCIATA. (BRULL.) FEHÉRDISZÜ T. WEISSGESCHMÜCKTE T.

(albu = fascia = fehér, szalag; a szalagos rajz élénkségéről.)

Syn. 1832. *Lycosa albofasciata* BRULLÉ «Exped. scientif. de Morée» III. T. Part. 1. Sect. 2. p. 54.

Vide: THORELL «Remarks» p. 317. (in § T. pinetorum).

♀ Sárgásszürke, elmosódó rajzokkal. Hasa tiszta fekete, a szín az oldalak fele élesen határolt, a has közepén a légzőrés és fonók között három fehér Λ szerű foltpar, melyek közül a légzőréshez legközelebb álló a legnagyobb. A lábak czombjai barnás foltokkal, az izék végei kissé sötétedők, a lábak különben sárgásszürkek. A fejmell közepén a hosszcsík, oldalain a szegély alig nyomokban jelentkezik; a végtest elején egy Λ szerű feheres rajz szakadozott, elmosódó maradványai észlelhetők.

A fejmell hosszúkas, mellreszeben eléggé szélesedő; oldalról tekintve hatvonalú vízszintes, a szemterese táján alig, a hátrés mögött tetemesen lekonyuló. A mellvert vöröses-barnás, szőrös. A rágók oly hosszúk mint az első lábpár másodvégize, oldalról tekintve tövükkel a homlok előtt kidomborodók, végükkel kissé az állkapesokra esapottak, vörösbarnák, tövük körül keves sárgás szőrökkel. Az állkapesok sárgásbarnák, vegeik felé alig világosodók, szélesek, sok serteszerű szőrökkel. Az alajk elől elmetesztett, az állkapesok felehosszát alig éri el. A tapogató czombja felületén, elől, néhány rövid tüske harántsorban, e mögött két hosszabb tüske egymás mögött; végize bőven oly hosszú, mint a terd és szár együttveve. Az első lábpár szárán és másodvégizén alul, három-három pár tüske, a talpkefe igen gyér és valamennyi lábpáron csak az elsődvégizre terjed. A végtest tojásdad.

Az alsó szemsor egyenes (alig észrevehetően behajló) szemei egyenlőek; a sor alig áll közelebbre a középsorhoz mint a homlok szélehez. A középsor két szeme nagy, bőven szemátmerőnyire egymástól. A hátsó sor két szeme a középsorénál valamivel kisebb, oly távolságra áll egymástól mint a középsortól.

A zár egy elenk-vörösbarna terese, a légzőrés felől benyomuló \bigcirc szerű bemélyedéssel, melyben nemi középlemez látható, a melyhez a légzőrés felől egy egyenetlen harántdudor csatlakozik, mely a bemélyedést a légzőrés felől elzárja.

Mértekek: ♂	Törzs	9.6 $\frac{m}{m}$ ebből
	fejmell	4.2 "
	I lábpár	10 "
	IV "	13 "

♀ Valamivel kisebb, karesubb, igen elenk rajzokkal.

A törzs alapszínezete kissé vöröslő-sötétbarna, a fejmell közepén egy fehér, széles hosszcsík, mely a szemteresen is áthatol, a mellrés legszele igen finom, fehér szegélylyel. A végtest elején egy sötét lándzsafolt, mely hegyével nem éri el a végtest hosszának felet, e folt szegélye ríktó fehér, a folt csücsán tul egyesülve, mint széles szalag a fonókig ér. A has fekete-barna, fehér szegélylyel, közepén három apró folt-párral. A lábak czombjai barnák keves feheres sűrűcskekkel, a többi barnássárga. A tapogató vörösbarna, a nőstényéhez hasonló fegyverzett; szára nem hosszabb a terdnel, pikkelye csücsosan kanálalaku, csücsa alatt sok feheres szőrökkel; felülete kurt, deres, meglehetősen tömött szőrözettel; nemzőszerve módosan domborodó, elenk vörösbarna, előrele körformára nyitott, e nyílás sárgásfehér, a külső oldalról tekintve, a vörösbarna rész külső oldalán egy majdnem gránátszínűen áttetsző, rövid fogacs látható.

Mértekek: ♂	Törzs	8 $\frac{m}{m}$ ebből
	fejmell	4 "
	I lábpár	9.8 "
	IV "	13 "

E szép Tarentulát, mely eddig leginkább csak Morea felszigetről volt ismeretes, tehát deli alaknak vehető, keves példányban Orsova környéken gyűjtöttem, mint kora nyári alakot, leginkább lehullott levelek alatt.

SPEC. 9. FAJ. TARENTULA CUNEATA. (CL.) METSZETT T. GESCHLITZTE T.

(cuneus = ék; a végtest ékalakú, mintegy hasított rajzáról.)

Syn. 1757. *Araneus cuneatus* CLERCK «*Aran. Suec.*» p. 99.Vide: THORELL, «*Remarks*» p. 330.

♀ Barna, sárgásszürkés szőrözettel. A fejmell közepén egy széles, sárgásszürkés hosszcsík, mely a szemek közé is behatol. A végtest elején egy keskeny, hegyes, barnás lándzsafolt, sárgásszürke szegélyzettel, mely utóbbi a folt csücsán túl egyesül és szalagot képezve a fonóig nyomul; hasa sárgásszürke. Lábai vöröses barnások; czombjaik, áttetszésre vizsgálva, belől homályosan foltosak.

A fejmell elég magas, mellrészében igen módosan szelesedő; oldalról tekintve a hátvonal vízszintes, hátul a nyelekskere meredeken lecsapott. A mellvert vörösbarna, fénylő, gyéren, finoman szőrös. A rágók vörösbarnák, vaskosak, az első lábpar *elsődvégizénél* csak kevéssel hosszabbak; oldalról tekintve tövük térszerűen kidomborodó. Az állkapesok sárgásbarnák, módosan szőrösek; az alajk sötétebb, elől elmetszett, a rágók felhosszát eléri. A tapogató vörösesbarna; czombja felületen, elől, négy apró tüske harántsorban, e mögött két hosszabb tüske egymás mögött; végíze oly hosszú mint terde és szára együttveve. A lábak karesuk, nem open hosszuk; az első pár száran és másodvégizen, alul, három-három pár tüske, a szár hátsó két párja hosszú, karesú. A végtest keskeny, hosszukás, csuesos.

Az alsó szemsor egyenes, szemei egyenlőek, a sor amnyira a homlok szeletől, a mennyire a közep-szemsortól. A középsor két szeme nagy, bőven szemátmerőnyire egymástól. A hátsó sor két szeme a közep-sorenál valamivel kisebb, alig kivethetőleg távolabbra egymástól mint a középsortól.

A zár, elenk sárgászörös tereseben, egy szélessegenel sokkal hosszabb bemélyedés, melynek oldalai kevesse hasasan tágulnak; a bemélyedés feneken egy jól kivethető, vaskos hosszborda, mely a legzöres fele a bemélyedest elrekesztő, láthatólag három reszből álló harántdudorba L módra utközik.

Mertekek: ♀ Torzs	10	$\frac{m}{m}$ ebből
fejmell	4	»
I lábpar	8.5	»
II "	8	»
III "	7.8	»
IV "	12.8	»

♂ Kisebb, karesubb, az első lábpar szára bunkószerűen vastagodott. Alapszmezeje sötétbarna, a has fehéres. A nősténynél észlelhető rajzok elesebbek. A lábvegek a czomboknál világosabbak. A tapogató vörösbarna, a nőstényéhez hasonló fegyverzettel; szára a terdnel rövidebb, szélességenel alig hosszabb; a pikkely csücsosan kanalakú, felületen rövid, deres szőrözetű, csuesa alatt hasonló, hosszabb szőrözettel nemzőszerve a Tar. albofasciataéhoz hasonló, a fogacs azonban barnásfekete.

Mertekek: ♂ Torzs	7	$\frac{m}{m}$ ebből
fejmell	4	»
I lábpar	8.3	»
IV "	11.5	»

Mint kora tavaszi és mint őszi alakot is, mely bokros és gyepes helyeken nem ritka; ismerem különösen Erdélyből: Kolozsvárról (Múzeumkert) és Szászvesszősről; magyar részekben eddig csupán csak Doroszlón találtam a «Hosszunegye» erdőresz lehullott levelei alatt.

SPEC. 10. FAJ. TARENTULA PULVERULENTA. (CL.) POROS T. STAUBIGE T.

(pulverulenta ab pulvis = poros; a színezetről.)

Syn. 1757. *Araucis pulverulentus* CLERCK «Aran. Suec.» p. 93.

Vide : THORELL «Remarks» p. 328.

♀ Porszürke, barnással elegyes színezetű. A fejmell közepén egy porszürke csik, mely a szemterre is behatol; a mellresz szélein semmi szegély. A végtest elején egy elmosódó lándzsafolt, elmosódó szegélyzettel. Lábai szürkesharnák, czombjaik — különösen áttetszősége vizsgálva — sötétbarnán foltosak. Lábai kevéssel hosszabbak mint a *T. cuneata*-é s e fajrokonanál mindig kisebb; egyebekben meglehetősen egyező.

Az alsó szemsor egyenes (behajlásra hajlandó), oly távolságra a homlok szeletétől, a minőre a középsortól. A középsor két szeme elég nagy, többre mint szemátmerőnyire egymástól; a hátsó sor szemei a középsor szemeinél alig kisebbek s oly távolságra egymástól, mint a középsortól. A zár egy vörösbarna, szélességénél hosszabb, párhuzamos oldalu és mely kivajás, mely a nyelecske felé kikerekített, a légzőrés fele egy barna dudor által elrekesztett; a fenéken fekvő durva hosszaborda alig látható.

Méretek:	♀ Torzs	8.8 m_m ebből
	fejmell	3.5 „
	I lábpár	8.3 „
	II „	8 „
	III „	7.9 „
	IV „	12 „

♂ Kisebb, karesőbb, a *T. cuneata* hímével egyező színezetű, az első lábpár szára azonban *nem* vastagodott, rajzai kissé elmosódók. A tapogató szára a terdnel nem rövidebb. A tapogatón más, szavakkal kifejezhető különbséget feltalálni nem bírtam s a megelőző fajával egyezőnek találtam.

Méretek:	♂ Torzs	6.9 m_m ebből
	fejmell	3.5 „
	I lábpár	7.9 „
	II „	10 „

Mint kora tavaszi alakot Doroszlóról, mint késő nyárit a Kárpátok fenyőöve felsőbb részeiből (Csorbai tó, Rakiton Wreh) ismerem. A magyar nemz. muzeumban Tatra-Füredről (Friwaldszky), Budáról (Pável) és Ungvárról (Vidra Ferd.).

SPEC. 11. FAJ. TARENTULA NEBULOSA. THOR. KÖDÖS T. NEBLIGE T.

(nebulosa = ködös, komor; a színezet elegyítéséről.)

Syn. 1872. *Tarentula nebulosa* THORELL «Remarks» p. 330.

♀ Nagyobb alak. Földszürke, a végtesten meglehetősen sorakozott sárgás pettyekkel, a melyek a fonóktól, előre felé szétágazó sorokat kepeznek; az oldalak sárgásszürke-elegyesek; a has agyagsárga.

A fejmell barna, agyagsárgás, megfekvő szőrözettel beborítva, a szemtérésen néhány felálló fekete sertével; a mellresz szélén kivethető kettős, világosabb szegélylyel.

A lábak agyagsárgák, sűrűn álló barna gyűrűkkel és foltokkal tarkázva.

A fejmell szivalaku, szélesedő, fejrésze elől elkerekített, oldalról tekintve, a fejrész alig kiemelkedő, a mellrészt hátul ívesen a nyelecskere hajló. A mellvért barna, agyagsárga szőrözettel. A rágók vörössárgák, sötettedő végekkel, agyagsárgás szőrözettel meglehetősen borítottak, az első lábpár elsővégizenél

alig rövidebbek, czombjánál nem vékonyabbak. Az állkapcsok vörössárgák, szélesek, elöl elkerekítettek, a sötétebb, hosszháromszögű aljuk felett meglehetősen összehajlók. A tapogató agyagsárga, barna foltokkal, melyek különösen a czombreszen tetemesebbek; az izek felületén, a gazdag szőrözet között, néhány tüske, a végiz oly hosszú mint a szár.

A lábak hosszúk, karesuk, vékonyodó végekkel.

Az első lábpár czombján, felül a végén, néhány rövid, ezek mögött egymásután álló két hosszú tüske; szárán, alul és elöl, egy pár rövidebb, e mögött két pár megfekvő, meglehetősen hosszú tüske; másodvégizén hasonlóképen. A harmadik és negyedik lábpár szára és másodvégize felül is tüskés. Valamennyi czomb felülete végén rövidebb tüskék, ezek mögött két-két egymásután álló hosszú tüske. A két első pár szára és a másodvégizén; felül, 1—2 tapintó szőr; a terd csücsén egy tapintó szőr; a harmadik és negyedik lábpár terde csücsén egy erős tüske.

Az alsó szemsor egyenes, a középső sornál rövidebb középső; két szeme a szélső kettőnél nagyobb s a homlok széletől majdnem két átmerőnyire elhelyezett. A középső két szeme nagy, az alsó sor oldal-szemeitől bőven felátmerőnyire állva, egymástól bőven egy szemátmerőnyire esik. A hátsó sor két szeme kisebb a közép sor szeménél, az alsó sor középsőinél nagyobb, a kétszer akkora távolságra áll egymástól, mint a középső két szemétől, a melylyel egy előre felé szűkülő trapezet alkot.

A zár egy barna négyszög, melynek sarkai elkerekítettek, s mely szélességénél hosszabb, belsejében \perp szerűen kivájt, e kivájasban egy finom, középhosszbordával.

Mertekek: ♀ Törzs	10	$\frac{m}{m}$ ebből
fejmell	5.5	"
I lábpár	15.7	"
II "	15.2	"
III "	15	"
IV "	21	"

Néha kisebb (törzs 9 $\frac{m}{m}$ IV lábpár 19 $\frac{m}{m}$). A peteburok szennyes-agyagsárga, lenesealakú, 9 $\frac{m}{m}$ átmérőjű.

♂ Kisebb, karesú, sötét előtesttel, éleesebben pettyegtetett végtesttel; lábai világos agyagsárgák, elmosódó gyűrűzettel. A tapogató füstbarna, szára és pikkelye fekete, bozontosan szőrös; a szár hosszabb a térdnél, előre felé vastagodó; pikkelye csücsös, a csücs alatt csak gyérén szőrös; nemzőszerve, oldalról tekintve, egy harántul ketté metszett, hosszukás gyűjtőt mutat, és a hol a felek egymáshoz közelednek, minden felen egy oldalt-kifele irányozott, rövid fogacs látható.

Mertekek: ♂ Törzs	7.5	$\frac{m}{m}$ ebből
fejmell	4	"
I lábpár	12	"
IV "	15.3	"

Ismertető jeleit egybevetve, azt tartom, hogy e faj a *Trochosa* nemhez úgy szervezetileg, mint életmódra nézve is közel áll. Kisse pofás, elkerekített feje, az alsó középszemek nagysága, eltávolítása a homlok szélétől, tartózkodása a folyók medrében elterülő görgetegek között, bujkálása, közel állítja a *Trochosákhoz*. A *Tarentulákkal* (sensu strictiori) inkább csak az alsó szemsor rövidege hozza kapcsolatba.

Ismerem, erdélyi részekből: Kutya-falváról, hol a Maros partjain tartózkodik s a nyirokban fekvő kövek alatt lappang, Szász-Vesszősről, az ottani jelentéktelen patak mellékéről (különösen sötét válfaj); magyar részekből csak Orsováról, hol a Cserna nagy görgetegeit lakja.

A him itt először iratott le, miután THORELL tr. a fajt csak nőstényekre alapítá, a melyek Olaszországból és Dalmátiából származtak. (Lásd THORELL l. c.)

SPEC. 12. FAJ. TARENTULA CURSOR. (HAHN.)¹ FUTÓ T. LAUFER T.

(cursor — futó; a gyors mozgásról.)

Syn. 1831. *Lycosa cursor* HAHN «Die Arachniden» p. 17.

Vide: THORELL «Remarks» p. 323, 578.

♂ Kicsiny. Barnássárga, barna rajzokkal. Az előtest egy világos barnássárga közepesikkal és hasonló oldalszegélyvel; a szemterese sötétbarna. A végtest elején egy barnássárga, világos, de elmosódó lándzsafolt, ettől két oldalt a szabálytalan alakú barnás foltoeszkák szabálytalan sora a fonóig követhető. A lábak világos olajszínűek, ennelfogva a sötét tüskék igen szembeszökők. A has egyszínűen barnássárga. A rágók nem domborodók, behuzottak, egyenesek, barnássárgák, a mellvért hasonló színű.

A szemek csillogó-gyantasárgák, feketes bogárral; az első sor egyenes, egyenlő távolságra a homlok szélétől és a középsortól, két középső szeme valamivel távolabbra egymástól, mint a szélsőktől. A középső sor két szeme elég nagy, másfél szemátmerőnyire egymástól, a hátsó sor két szeme a középső sorénál kisebb és sokkal távolabbra áll egymástól, mint a középsortól.

Az első lábpár szárán, alul, három pár finom tüske, oldalán szintén három-három tüske, másodvégizen hasonlóképen. Valamennyi pár czombja felületén, elől, három rövid tüske harántsorban, e mögött két hosszú tüske egymás mögött; a tapogató czombján, elől, négy tüske. A tapogató czombja, terde és szára olajszínű, pikkelye vörösesbarna; a szár vastagodott, a terdnel rövidebb; a pikkely esúcsosan — kamálalakú; a nemzőszerv vörösbarnás, kidomborodó, kívülről — oldalról tekintve — egy igen vastag, a nemzőszerv tövéből induló, elkerekített alap darab látható, mely egy előre irányozott, vaskos tüskét visel.

Mertekek:	^a Törzs	4	^m _m ebből
	fej mell	2	»
	I lábpár	6.5	»
	IV »	9	»

(Példányon a IV lábpár balfele reproducált és csak 6 m. m. hosszú).

Egyetlen példánya a nemz. Muzéum gyűjteményében, gyűjtötte Pavel János Rakos-Palota.

GEN. 4. NEM. TROCHOSA. C. K.

τροχάω = τροχάω = futni; a mozgás gyorsaságáról.)

Syn. 1848. C. Koch «Die Arachniden» XIV, p. 95.

Vide: THORELL «On europ. Sp.» p. 192.

Az alsó szemsor középsői oly vagy kevéssel nagyobb távolságra a homlok szélétől, a mekkora egy szemnek az átmerője. A felső fonó pár az alsónál kevéssel hosszabb. Az alsó szemsor a középsőnél láthatólag hosszabb. A szemter hosszúságánál szélesebb. Az alsó szemsor középszemei a szélsőknel nagyobbak és a hátsó sor szeménél, alig vagy nem kisebbek. Az arcz alacsony, ívesen-pofás; az előtest megfekvően tömött szőrű. A lábak vaskosak, néha hosszúk. Vájó alakok, a melyek eső vagy barlangszerű, allandó lakást készítenek, a melyben a nőstények a fonóikhoz erősített nagy peteburkot őrzik, a melyet a nap segítségével kiköltik. Fiaikat sokáig a hátukon czipelik; a harmadvedlésű nemzedék áttelel úgy az érett is.

A Trochosa cinerea első lábpárján a bordás körmök hosszúk, sarlóalakú kampóval, az első borda kevéssé görbe, lásd: II. köt. VI. t. 135. b).

¹ THORELL tr. «Remarks» p. 323. a *Lycosa cursor* (HAHN) fajt a *Tarentula aculeata* (CLERCK) synonymái közé sorolja ugyan, de az én példányomat határozottan: *Tarentula cursor* (HAHN) határozta meg. E nevet megtartom, mert a feunforgó, a synonymikáira vonatkozó kéte'yek elosztatására nem elegendő az anyagom.

SPEC. 1. FAJ. *TROCHOSA CINEREA*. (FABR.) SZÜRKE CSELŐPÖK. GRAUE BÄRENSPINNE.

(cinerea = hamvas; a színezetről.)

Syn. 1793. *Aranca cinerea* FABRICIUS «Ent. Syst.» II. p. 123.

Vide: THORELL «Remarks» p. 332.

♀ Hamvasszürke sárgással és feketéssel elegyes. Bozontosan szőrös nagy alak; vaskos, hosszú lábakkal. A fejmell szürkessárga alapon hamvas rajzokkal, melyek a közepen egy levelalakú rajzot alkotnak, melynek mintegy szárát a hátrés, bordáit a küllőszerűen oszló, szürkéssel jelölt izombarázdák képezik; a két hátsó szemtől, az illető oldal felé, egy-egy ékalakú, elmosódó folt áll; a mellrész szélein szürkéssel osztott sárgás foltok állanak. A szemterese feketés. A végtest elején, kétoldalt, egy sárgás rajz, melyben néha hússzínű lehellet is tapasztalható, s a melyben rendszeren két-két sárga foltoeska feketes szegélylyel szembetűnik. A végtest többi része, sárgás-szürkés és feketés színnel felhőzött. A lábak sárgásszürke alapon, hamvasan gyűrűsen-foltosak, e foltok csak a lábak felületén és oldalain határozottak. A lábak elálló, finom, világos szőrözettel borítottak. A rágók vörösesbarnák.

A fejmell vaskos, mellrész szélesedő, kissé lapuló; oldalról tekintve a hátvonal a fej búbjától kezdve a nyelecskéig folytonosan hanyatlik, úgy, hogy a feje a legmagasabb pontot képezi; a homlok majdnem egyenesen elmetsett. A mellyvert sötét hamvas, ritkán egy ékalakú, világos középfolttal. A rágók vaskosak, hosszúk, az első lábpár czombjánál vastagabbak s ugyan e lábpár másodvégizénél körülbelül $0.5 \frac{m}{m}$ -rel rövidebbek, egyszínűen vörösesbarnák, világos, hosszú szőrözettel, mely az alapszínt nem takarja el. Az állkapesok barnássárgák, elől elkerekítettek s világosodók, sok erős, sötét szőrökkel; az aljuk sötétebb, négy-szögletes, az állkapesok felehosszát nem éri el. A tapogató sárgásszürkés, csúcsa kissé sötétedő, rajta a tompa hegyű, bordátlan köröm; czombja felületén, elől, három rövid tüske harántsorban, e mögött két hosszabb tüske egymás mögött, a végiz tömötten szőrös és rövidebb mint a térd és szár együttvéve. Az első lábpár szárán, alul, három pár rövid, megfekvő tüske, két oldalt még két-két tüske; másodvégizén szintén három pár tüske a szürkésfehér, tömött talpkefébe elrejtve. Az első és második lábpáron mind a két, a többi párokon csak az elsődvégiz talpkefével. A végtest tojásdad; a has egyszínűen sárgásszürke.

Az alsó szemsor egyenes, a két középső valamivel távolabbra egymástól mint a szélsőktől és szeme nagyobb a két szélsőnél, e sor a középsőnél láthatólag hosszabb s valamivel közelebbre áll ehhez mint a homlok szélehez.

A középsor két szeme elég nagy, valamennyi szem között a legnagyobb, bőven szemátmérőnyire egymástól. A hátsó sor két szeme a középsőnél kisebb, az alsó sor középsőnél valamivel nagyobb, kétszer oly távolságra egymástól mint a közep sortól.

A zár vörösbarna; két egymásfelé hajló, a légzőrés felé szétágazó, vesicalakú (∞) nyílást mutat, melynek széles osztója, úgy mint kerülete is, bőven szőrös, úgy, hogy a zár részben el van fedve.

Mertekek: ♀ Törzs	18	$\frac{m}{m}$ ebből
fejmell	8.8	»
I lábpár	24	»
II »	23	»
III »	22.6	»
IV »	29	»

♂ A him kisebb, karesűbb; színezete a nőstényével azonos, rendszeren élénkebb. A tapogató ivarszerkezete alig feltűnő. A tapogató szára hosszabb a térdnél, nem vastagodott; czombja felületén, elől, három rövid tüske harántsorban, e mögött két hosszabb tüske egymásmögött; a pikkely aránylag kicsiny, a szárnál alig szélesebb, csúcsosan kamialakú, csúcsa alatt eléggé szőrös; nemzőszerve kicsiny, alig domborodó és a

kanal töve fele egy szennyesbarna, kisse szívalakú, lapos tert mutat, melyhez a külső szel felől egy vörös-barna, háromszögletes toldalek csatlakozik.

Mértékek :	♂ Törzs	14	$\frac{m}{m}$ ebből
	fejmell	8	»
	I lábpair	24	«
	IV »	27.8	»

Messze, a tengermellekeken is elterjedett s életmódja által igen érdekes faj, a mint ezt már az életmódról írt szakaszban (lásd I. köt. III. tábla, 63 és szövege) bővebben is megérintettem. Leginkább a kavicsos medrű patakok és folyamok árterületén, jelesen olyan helyeken tartózkodik, a hol a kavicsok között és alatt porond is létezik. Itt a porondba vájja csöveit és barlangjait, melyeknek nyílását laza szövettel biztosítja a beomlás ellen. Estve fele kőboról s meglopja prédáját; kőborlása sajátos, rövid futamokból áll, mire az állat egészen szétterpesztett, laposan felfekvő lábakkal mozdulatlanul meg-megáll: ilyenkor csak a gyakorlott szem különböztetheti meg a talaj színétől. Ivarérettsége tavaszra esik. A nőstény júniusban már peteit őrzi: peteburka kerek, hófehér vagy sárgás, néha 12—13 $\frac{m}{m}$ átmérőjű s 6—800 petét tartalmaz. Fiait a hátán hordozza s ilyenkor csak lábai szabadok, az egész törzs borítva van az apró fiakkal, melyek mehraj módjára, több rétegben ellepik. Különben tavasztól őszig a kifejlődés minden szakáiban található. Verőfenyes napokon a nőstény a napra cipéli ki peteburkát s veszély idejében gyorsan eltűnik vele. Rop-pant gyors futó, úgy vizen mint szárazon.

Ismerem, erdélyi részekből: Kutyalváról (Maros part), Kolozsvárról (Szamos medre), Retyiczeltől (Biharhegység patakjai), Szebenből (Sill és Bergleiter gyűjtemények), : magyar részekből: Orsovaról (Cserna görgetegei, Gratzkapatak), és Gyöngyösről; Nagy-Váradról (Muz. gy. Moesáry).

SPEC. 2. FAL. TROCHOSA INFERNALIS. (MOTSCH¹) POKOLI CS. HOLLSICHE B.

(infernus = alvilági, különösen isten; Pluto, Proserpina; a tartózkodásra vonatkozik.)

Syn. 1849. *Lycosa infernalis* MOTSCHOUJSZKY «Note sur deux Araïg. venimeuses etc.» p. 289.

Vide: THORELL «Descr. of several Europ. an North Afr. Spid.» p. 172.

(X. tábl. 206 ♀ term. magys. 207 u. a törzs alulról, 208 u. a oldalról, 209 a ♀ zárja, 210 a ♂ tüpögtője.)

♀ Sötétbarna, sárgás rajzokkal. A ragók töve tiszta fekete, azontul szélesen elenk rozsdavörös vagy narancssárga szőrökkel úgy borítva, hogy alapszínezetük nem látszik ki, végök ismét fekete. Nagy, vaskos, zömök alak, vaskos lábakkal. A fejmell felületén, a mellrész szelétől 1 $\frac{m}{m}$ -nyire s ezzel párhuzamosan haladva egy keskeny, sárgás esik, mely fele, a hátrestől indulva, minden oldalon három sárgás finom, küllő-vonal tart: ugyaninnen a szemek fele három sárgás vonal (f) szerűen, a nyelecske fele szinten három rövidebb vonal ugyanily alakban tart. A vegtest felülete elejen es közepén egy sötétebb, széles landszafolt, mely a nyelecske fele egy ketágu, szélesebb, sárgás vonal által elzárt, két oldalt finom egyenes, sárgás vonal által szegelyeztetik, hátul két \sim szerű ekfolt által jeleztetik; a landszafolt mögött s töle két oldalt három-három Δ sárgás foltoeska párosan állva es finom, kisse íves vonalak által összekötve. Az oldalak világos szürkesekek, fekete-barna pettyekkel. A has, mellvert es a csipők bársonyfeketék; a has színe a világos oldalak fele egészen élesen határolt.

A lábak sárgásszürkek feketes gyűrűzettel, a gyűrűzet, jelesen a szare, alul, tisztafelete.

¹ Megvallom, hogy ezt az elnevezést csak THORELL auctoritására alkalmaztam, mert MOTSCHOUJSZKY leírása és rajza a legese kélyebb támaszt sem nyújt arra nézve, hogy valóban ez az állat feküdt volna előtte. MOTSCHOUJSZKY leírása s rajza semmitmondó s reá illik bármely sötétszínű Lycosoidára. A biológiai adathalommal szintén úgy vagyunk: illik minden földbejáró Trochosára, a mellett ismeretes, hogy déli Oroszországban több nagy faj létezik: melyeknek az ifja volt tehát a M. kezében? mert tény, hogy az M. leírta es lerajzolta állat fejletlen. Egyáltalában MOTSCHOUJSZKY működése hova tovább mind kétes bb értékűvé válik, szerintem tehát kár volt őt es fáját az Aranéologiába bevonni.

A fej mell vaskos, feje részé emelkedett, pofás: oldalról tekintve a fej rész szemtere a legmagasabb pontot kepezi, innen a hátvonal igen lapos-ívesen a nyelecskére hanyatlik, az egész tömötten, megfekvően szőrös. A rágók igen erősek, oly hosszúk, mint az első lábpár *szára*, közel kétszer oly vastagok, mint a lábpár ezombja: legtöyükön és végükön feketék, barna szőrözettel, közbül szélesen rozsdá- vagy narancssárgák, úgy, hogy a szín mind a két allkapocsfelel át egy széles harántsávot kepez. Az allkapesok sötét vörösbarnák, elkerekítették, csúcsok fele világosodók, bőven, hosszan szőrösek; az alajk sötét, elől egyenesen elmetstett, az állkapesok felet alig éri. A tapogató szürkés, sok rozsdasárga szőrrel igen tömötten szőrös: ezombja felületen, elől, harántsorban álló három rövid tüskével, a mögött két egymásután álló hosszabb tüskével; végze igen kevés, rövidebb mint a terd és szár együttve. A lábak megfekvően, tömötten szőrösek, ezombjaik alul, világos szürkések s csak felületükön feketén foltosak, a többi íz, különösen alul, fekete gyűrűs; a talpkéfe bársonyfekete. Az első lábpár szárán, alul, három pár tüske: a hátsó páron (a leg-hosszabbik) két oldalt szintén két-két tüske: a másodvégiz tüskei a talpkéfében eltűnnek (3. pár); a ezombok felülete több megfekvő tüskével; az első és második lábpáron a talpkéfe a szárra is kiterjed, a többi párokon csak az elsővégiz nem épen erős kefével.

Az alsó szemsor egyenes, a középsornál hosszabb; középső két szeme a szélsőnél igen kevés, nagyobb, a szemek közötti távolság egyenlő, a sor közelebb áll a középsorhoz mint a homlok széléhez; szélső szemei mellett egy rozsdasárga folt, a homlok szélén ilyen szegély. A középsor két szeme valamennyinél nagyobb s szemátmérőnyire egymástól, a hátsó sor két szeme valamivel nagyobb az alsó középsőnél, kétszer akkora távolságra egymástól mint a középsortól.

A zár egy szélességénél magasabb, csúcsosodó, vörösbarna, mely kivájás, melynek szelei hasasan tagolnak: közép és elzáró bordája \perp szerű alakot alkotnak. Ha a szőrözet ep, úgy a zár szeleit fehér szőrözet borítja.

Mertekek: ♀	Törzs	25	$\frac{m}{m}$ ebből
	fej mell	10	„
	I lábpár	23.5	„
	II „	21.5	„
	III „	20	„
	IV „	27.3	„

♂ Kisebb, karesubb, hosszabb lábú: a fej mellnel sokkal kisebb végtesttel. A hatres körül egy terjedelmes sárgás folt csillagszerű kisugárzásokkal. A színezet többi része a nőstényével egyező. A tapogató elég hosszú, nemzőszerve elég feltűnő; ezombja felületen, elől, három rövidebb tüske harántsorban, a mögött két hosszabb tüske egymásmögött, a terdiz belső oldalán egy hosszú tüske: szára a terdnel hosszabb; pikkelye csúcsosan kanálalakú, csúcsa alatt bozontosan, gazdagon szőrös; nemzőszerve előlről-alulról tekintve, közepe táján egy befekvő, a külső szétől benyomuló harántlemez mutat, mely hossza közepe táján egy vaskos, rövid, tupa fogacsot visel.

Mertekek: ♂	Törzs	16	$\frac{m}{m}$ ebből
	fej mell	10	„
	I lábpár	29.5	„
	IV „	32	„

Tagadhatlanul legerdekesebb alakjaink egyike, melyet deli Oroszország pusztáival közösen birunk, s a mely fajrokonával, a Tr. Singoriensis (Laxmann) együtt a Kalmukok rettegett «Tchimje», melyhez épen annyi monda tapad, mint Olaszország Tarantulájához. Az életmódról írt szakaszban (lásd I. köt. III. tabla, 62 és szövege) tüzetesen értekeztem róla s az ott elmondottakat a helyen még a következőkkel bővitem ki. Elterjedésére nevezé eddig a Bácska számos pontjáról ismerem, úgy Orsova és Illok környékéről is; az utóbbi két helyen a hegyek lejtői alján is előfordul. De a sík, jelesen annak valódi pusztái, silányabb fűvű legelői,

mindenekelőtt kedvelt tartózkodási helyei. Itt furja 16--20 cm mélységű, 2--21 cm átmérőjű, függőlegesen lehatoló esőveit, melyeknek száját kikárpitozza és sok esélyességgel megvédi a víz betódulása ellen. Rendszeresen a cső száján lesekedik s előlábainak villámgyors csapásaival ragadja meg az arra menő, vagy közelebe letelepedő rovarokat, köztök leginkább a Doreadion és Cicindela bogárfeléket, melyeknek maradványai megtöltik esőve fenekét. A tavasz, nyár és őszi minden szakában a kifejlődés minden fokán található. Peteburka alig lenyomott, kerek, nagy, 15--16 mm átmérőjű, tömve tele köles nagyságú petekkel.

E burkot fonóihoz erősíti s a verőfényre czipelve úgy illesztgeti a cső nyílásába, hogy a nap sugarai érhessek. A fiak kikéltése idejében a cső száját finom, átlátszó és boltozatos hálózattal zárja el, s e boltozat alatt bevitteti burkát a nap sugarai által. A fiakat a hátán hordozza, gyakran sütkerezik velök a napon, mely alkalommal a parányi állatok majd szétfutnak s ismét az anya hátára gyűlnek, majd a füvekre kapaszkodnak, leugrálnak, a lyukba ki- s befutkosnak; majd ellepik a prédát, a melyet anyjuk ejtett.

A második vedlés után az anya elpusztul s a 4 mm nagyságú fiak, elszéledve, hozzáfognak a lak készítéséhez. A cső eleintén alig 4 cm mélység mellett, 3 mm átmérőjű. Úgy a mint növekednek, tágitják a csövet. Az ásást alkonyatkor és este végzik, a lekapart, daragnagyságú rögöcskéket állkapcsaikkal fogva szerteszét hordozzák, úgy, hogy az ásás nyomai nem látszanak. Úgy látszik, hogy a lakástvesztett példányok az elhagyott lakokat is elfoglalják, és folytatják az ásást, dacára annak, hogy a cső amúgy is elég mély volt már. Feltevésemet arra alapítom, hogy bár igen ritkán de mégis 30 és több cm mélységű esőveket is találtam, holott a rendes mélység átlag véve csak 16 és legfeljebb 20 cm . A hímek szintén esővekben növekednek, ivarerett korukban azonban barangolva keresik a nőtényt, melynek esőveben a párzást végzik. A párzást nem láthattam.

A fogságot e pók igen jól állja, és rövid idő alatt bizonyos kezességet mutat; a legyeket a kezéből veszi, de csak addig, a míg a légy el, a halottat nem érinti; menekülési ösztöne csak az ehseg vagy szomjúság behatása alatt nyilatkozik; jól tartva, igen esendesen viseli magát. A vizet nem nélkülözheti, s minden másodnapon möhön szívja fel a negy-öt vízcseppet. Néhány eleven példányt THORELL tanárnak küldtem el Svécziába, Upsalába, s ezek a 11 napi utat kiállottak. E pókok attelehnek. Hogy eziránt minden kétséget eloszlassam, 1874. év őszi Doroszló mellett néhány lyukat ezövekkel jelöltem meg, oly módon, hogy a hó alatt is megtalálhattam. Deczembeben az a sodrony, a melyvel a lyukakat kutattam, már csak 4 cm mélységig hatolt be s bizonyítja, hogy a pókok a téli időszakra betömik a csövet. Az 1875. év február havában beköszöntött kemény hidegben a megjegyzett lyukakat vizsgáltam, s a következő eredményhez jutottam: a talaj mintegy 40 cm mélységig kőkeménysegre fagyva, csak fejszevel volt vágható; a vágást úgy intéztem, hogy a cső sertetlen maradt; a kellő mélységet elérve a késhez folyamodtam, s óvatosan vágtam a cső falát. A cső 28 cm mélységre hatolt be; nyílásától mintegy negy cm mélységben be volt tömve földdel és növényi anyaggal, e dugó 4 cm vastagságú volt. A cső fenekén, a puszta földön, kissé összehuzott lábakkal ült a pók s érintésre csak igen lomhan mozgott, a dermedtség minden jele megvolt rajta. Kivettem s egy dobozba helyeztem, ezt pedig zsebre tettem. Alig egy percz múlva az állat a meleg behatása alatt egészen élénk, friss lett s otthon rögtön elfogadta a táplálékot. Az első kiasott példány egy teljesen ivarerett, pompás nőtény volt.

E vizsgálat igazolja régi feltevésemet arra nézve, hogy a Lycosoidák attelehnek; s valóban csakis így érthető az, hogy a tavasz első meleg sugaraiban már ivarerett Lycosoidákra akadhatni, sőt, hogy igen korán már peteburkokkal futkosókat is lelhetni.

Ismerem jelesen Doroszló környékéről, hol leginkább tanulmányoztam; továbbá Palánkáról, Pancsováról, Zomborból és Orsováról; sőt a Dunán túlról Illokról is, hol a várhegy gyalogútjaira nyílnak esővei. Legeszakibb elterjedési pontja eddig Budapest (a muzeum parkjában gyűjté FRIVALDSZKY JÁNOS); a budai oldalról több ♂ példány a beesi udvari muzeumban s ugyanitt Dalmácziból (Ragusa, Brennovölgy) is, homnan MANN JÓZSEF hozta.

SPEC. 3. Faj. TROCHOSA RURICOLA. (DE GEER). MEZEI CS. FELD B.

(ruricola = mezei; a tartózkodásról.)

Syn. 1778. *Arauca ruricola* De Geer «Mémoires» VII, p. 282. (Salt. ad partem.)

Vide: THORELL «Remarks» p. 336.

♀ Cserbarna; végteste olajbarnába átmenő. Lábai egyszínűen cserbarnák. A fejnell közepén és végig egy világosodó középesik, mely a hátgödör előtt két oldalát hacsát a szemek fele (l), a középesik a nyelecskefele leginkább látható s közvetlenül a nyelecske felett két csikkal egyesül, mely, a mellrész oldalain tartva, oldalszegelyt kepez s a fej táján megszűnik. A végtest elején egy világos, rövid és keskeny lúndzsafolt, mely a végtest hosszának közepét nem éri el. A has egyszínűen cserbarna, néha esersága.

A fejnell vastag; oldalról tekintve, hátvonala a szemektől a hátgödörig csak csekély mértékben, a hátgödörön túl tetemesen hanyatlik. A mellvért cserbarna, feketés szőrözettel. A rágók oly hosszúk, mint az első lábpar másodvégize s e pár czombjánál nem vastagabbak, sötét vörösbarnák, világosabb szőrözettel, mely alapszínüket nem fedi el. Az állkapcsok vöröslők, bőven szőrösek és elég szélesek; az alajk elől egyenesen elnetszett, az állkapcsok fele hosszát nem éri el. A tapogató cserbarna; czombja felületén, elől, harántsorban álló három rövid — e mögött két egymásmögött álló hosszú tüske; végize igen tömötten szőrös, rövidebb mint a terd és szár együttvéve.

A lábak elég hosszúk és vastagok, rövid szőrözetük nem fedi el egészen az alapszínt. Az első pár szárán és másodvégizén alul három-három tüskepár, az utóbbi részben a talpkefebe rejtve, mely az első két páron mind a két végizre kiterjed. A czombok felülete 5—7 tüskevel.

A végtest (nem terhesen) elől elnetszett és keskenyebb mint hátul; megfekvő, tömött szőrözettel.

Az alsó szemsor egyenes, középsői nagyobbak s közelebb állanak a homlok szélehez, mint a mekkora az egyik szem átmérője, s körülbelül közepén a homlok széle és a középsor között. A középső sor két szeme nagy, szemek kevesebbire mint szemátmérőnyire egymástól. A hátsó sor két szeme a középső soronál kisebb, az alsó sor középszemeinél valamivel nagyobb s közel háromszor oly távolságra egymástól, mint a középsőtől. A zár egy szélességénél kevesse hosszabb, a nyelecskefele laposívesen kikerekített kivájas, melyben az osztólemez közepén szívalakra, igen tetemesen kitágul. A zár kerülete vörösbarnás, az osztólemez vöröses sárga, fényes. Az osztó lemez a zárt a legzőres felől elrekesztő durva bordával együtt L alakot ölt.

Mertekek: I Törzs	13	$\frac{m}{m}$ ebből
fejnell	6.5	»
I lábpar	15	»
IV »	18	»

♂ Kisebb, karesubb; színezete és rajzai a nőstényével azonosak, néha az alapszín mindenütt olajbarnába játszik; az első lábparon mind a két végiz kisse barnuló. A tapogató elég hosszú; czombja felületén, elől, négy rövid tüske harántsorban, e mögött két hosszabb tüske egymásmögött; szára vastagságánál hosszabb, a terdnel alig rövidebb; a pikkely csúcsosan kanalakú, csúcsa alatt bozontosan szőrös; nemzőszerve egy haránt, kettémetszett, alig kidomborodó gyűjtőt mutat; e metszésbe, a külső szelről, egy lemez nyomul, mely — előlről-alulról tekintve — egy elég karesu, tompa fogacsot mutat.

Mertekek: I Törzs	10.5	$\frac{m}{m}$ ebből
fejnell	5.5	»
I lábpar	13	»
IV »	16.5	»

Messze elterjedt faj, mely kavicsos helyeken kovek alá, erdőkön fák és lehullott levelek alá assa kis barlangjait; a nyirkos helyeket különösen kedveli. A nőstény peteburka gömbölyű, hófehér 8—9 $\frac{m}{m}$ átmérőjű s takarói oly finomak, hogy a peték atlátszanak. Ismerem, erdélyi részekből: Kolozsvárról, Mező-

Záhról és Nagy-Szebenből (Sill gyűjtemény); magyar részekből: Doroszlóról, Apatinból, Palánkáról, Orsováról, Ogradenáról, Ungvárról, Alsó-Hannorból, Gyöngyösről, Rózsahegyről, Revről; Nagyváradról (Muz. gy. MOCSÁRY) és Budapestről (ugyanott, PÁVEL).

SPEC. 4. FAL. TROCHOSA TERRICOLA THOR. FÖLDI CS. ERD. B.

(terra = föld; a lakásról.)

Syn. 1856 *Trochosa terricola* THORELL «Recensio critica etc.» p. 62, 102

Vide: THORELL «Remarks» p. 339.

♀ A megelőző fajnál allandóan kisebb s ettől leginkább a nemzőrészek által megkülönböztetve. Lábai, jelesen a két hátsó pár, s itt leginkább a ezombok, nem igen elmosódó gyűrűfoltokkal. A végtest elején a lándzsafolt legtöbbször hiányzik, vagy alig látható.

Az alsó szemsor egyenes, középszemei a szélsőknél alig nagyobbak, szemátmérőnyire állanak a homlok széletől és ugyanennyire a középsortól is. A középsor két szeme nagy, felátmérényire egymástól. A hátsó sor két szeme a középsorénál valamivel kisebb, az alsó sor középsőinél sokkal nagyobb, bőven kétszer oly távolra egymástól mint a középsortól.

A zár egy, alapjával a legzőrés szélet erő, közel háromszögletes kivájtást mutat, melynek osztó lemeze, közepetűjén szélesedő s az elrekesztő bordáival \perp alakot alkot; az osztó lemez két oldalán, közel az elrekesztő bordához *egy-egy fényleő dudorodás*.

Mértékek: ♀ Torzs	10	$\frac{m}{m}$ ebből
fejmell	5.2	»
I lábpár	11.5	»
IV	»	13.6	»

♂ Kisebb. Az első lábpár szára és másodvegye sötét vörösbarna, az utóbbi az elsővéghez képest határozottan vastagodott; a hátsó két pár nem elmosódó gyűrűfoltokkal. A tapogató szára szélességénél alig hosszabb; a nemzőszervet kitüntető fogacs a megelőző fajénál vastkosabb.

Mértékek: ♂ Torzs	8	$\frac{m}{m}$ ebből
fejmell	4.5	»
I lábpár	10.2	»
IV	»	13	»

A *Tr. ruricolá*-nál ritkább faj, tartózkodásra és életmódra nézve azonban hozzá hasonló. A peteburok átmérője $6 \frac{m}{m}$.

Ismerem: Doroszlóról, Apatinból, Orsováról; Budapestről («Cillag és Farkasvölgy» jelzővel, Muz. gy. PÁVEL).

SPEC. 5. FAL. TROCHOSA HUNGARICA. N. SP. MAGYAR CS. UNGARISCHE B.

(VIII. tábla, 184. *a* szemesopont, *b* a ♀ zárja, *c* a ♂ tapogatója oldalról, *d* ugyanannak nemzőszerve alulról, *e* a mértékek.)

♀ Nagy. Az egész állat sötét eserbarna; előtestén végig egy, az alsó szemsornál kezdődő, keskeny, világos közepesik; ezombjainak külseje alig valamivel világosabb; rágóinak töve sötétebb, vége sok róka-vörös, durva szőrökkel. Az egész test tömött, megfekvő szőrözettel borítva.

A fejmell vastkos, fejezese szélesedő, elkeresített; a második szemsor két nagy szeme között egy előre irányozott, 8—10 sertehől álló üstök. A mellvert kördel, eserbarna, nemezszerű, tömött szőrözettel borítva. A rágók vastkosak, oldalról tekintve tövükkel igen tetemesen, térszerűen kiállóak, durva, serte-

szerű szőrözetűek. Az állkapcsok eserbarnák, elükön igen elénken rókavörös szőrökkel tömötten szegélyezettek; az alajk elmesztett, az állkapcsok hosszának mintegy felet éri el. A tapogató eserbarna, vaskos, igen tömötten szőrös, — ezombján, felül a végén, néhány tüske. A labák vaskosság mellett elég hosszúk; az első pár szárán, alul, három vaskos, egészen megfekvő tüskepár, a belső oldalon még egy tüske; második végizén, a tömött talpkefebe rejtve, három tüskepár; a harmadik pár szárán, alul négy tüskepár, és oldalt is több tüske; a negyedik pár szárán, alul három tüskepár, oldalt is több tüske; a két hátsó pár térdén, külső és belső oldalán egy megfekvő tüske. A végtest, kördel, elég magas.

A szemek gyantaszínűek, sötétes bogárral, bagolyszemekre emlékeztetők; az alsó sor igen könnyedén behajló, középsői a szélsőknél sokkal nagyobbak, a homlok szelétől bőven két átmérőnyi távolságra esnek; a második sor két szeme igen nagy, nem egészen szemátmérőnyire egymástól s körülbelül felátmérőlőnyire az alsó sor középsőitől; a harmadik sor két szeme igen kevéssel nagyobb az alsó középsőknél és sokkal távolabbra áll egymástól, mint a második sortól. A zár szélességénél sokkal hosszabb, osztólemeze széles s alsó felének két oldalán két gombostüfej alakú, sötét, fényes dudort mutat.

Mértekek: ♀ Törzs	21	$\frac{m}{m}$ ebből
fejmell	9.5	»
I lábpár	23.4	»
II »	21.6	»
III »	21	»
IV »	28	»

Néha kisebb: törzs 17 $\frac{m}{m}$, fejmell 8.7, I lábpár 21 $\frac{m}{m}$, IV lábpár 26.5 $\frac{m}{m}$.

♂ Kisebb, karesúbb, egészben világosabb alapszínezettel; lábái karesúk; fejmellén a közepesikon kívül még némi oldalszegély is megkülönböztethető. A tapogató karesú, kevéssé bunkós, szárán, térdén és ezombján több erős tüskével fegyverzett; szára a térdnél valamivel hosszabb; pikkelye keskeny, csúcsos, csúcsa alatt igen tömött szőrűstök látható; nemzőszerve egyszerű, barna gyűjtőt mutat, mely felső felén világosodik, s itt egy kigyózó csikot mutat.

Mértekek: ♂ Törzs	14	$\frac{m}{m}$ ebből
fejmell	7.5	»
I lábpár	23.5	»
II »	21.5	»
III »	20.3	»
IV »	28.3	»

E feltűnően nagy faj, legnagyobb pókjaink közé tartozik. Peldányaimat (2 ♀ 1 ♂) az 1865-dik év őszén a Balaton nyugoti partján B.-Füred közelében nyirkos helyeken heverő kövek alatt gyűjtöttem, hol az állatok vájt üregekben tartózkodtak. Dr. THORELL e fajt nem ismeri.

SPEC. G. F. A. J. TROCHOSA STIGMOSA. THOR. JEGYES CS. GEZEICHNETE B.

(stigma = jegy, bélyeg; a pettyes rajzokról.)

Syn. 1875. *Trochosa stigmosa* THORELL. «Verzeichniss südruss. Spinnen» p. 69. «Deser. of sev. Europ. and North Afr. Spiders.» p. 175.

♀ Kiesény. Előteste vörösesbarna, a hátres körül egy levélalakú világosodással, mely néha enyésző. A végtest olajbarna alapon sárga rajzokkal, elején egy terjedelmes sárga lándzsafolttal, melynek kiszélesedett részében egy sötétedő foltpár látható. E foltpáron kívül és hátrább még két feketés foltpár észlelhető, melynek állása ingódórsszerű (innen stigmosa). A labák sárgások, foltokkal és gyűrűfoltokkal tarkázottak.

A fejmell vaskos; a fejresz kevéssé elváló, a mellresz módosan szelesedő; oldalról tekintve a hatvonal a nyelecsketől ívesen emelkedik. A ragók elég vaskosak, oly hosszúk, mint az első lábpár másodvégize s ugyan e pár czombjánál vastagabbak, barnavörösek, módosan szőrösek. A mellvert barna. Az állkapcsok barnássárgák az alajk sötétebb, elől elnetszett. A tapogató gyenge fegyverzett, sárgás; a szár töve homályosan gyűrűs, végize sötétedő esücesal bőven szőrös, rövidebb mint a térd és szár együttveve. A lábak elég hosszúk, vaskos, foltos czombokkal, és karesu végekkel; az első pár száran, alul, 2 pár igen apró tüske, másodvégizén 3 pár; az első izek talpkfelei alig megkülönböztethetők.

A has elől keskenyebb, elvágott, hátul elkerekített.

Az alsó szemsor egyenes, szemei jóformán egyenlőek, a sor a középsort igen megközelelti s kevésebbre mint szemátmérőnyire áll a homlok szeletől.

A középsor két szeme nem igen nagy, szemátmérőnyire egymástól. A hátsó sor két szeme a középső sorénál alig kisebb, az alsó sor középsőinél sokkal nagyobb, bőven kétszer oly távolságra egymástól mint a középsortól.

A zár egy harántfekvő széles terese, két veselaku, O szerűen álló nyilással.

Mértékek: ♀ Törzs	7.2 $\frac{m}{\mu m}$	ebből
fejmell	3.8	»
I lábpár	8	»
IV »	9.5	»
(Gyakran kisebb, törzs 6 $\frac{m}{\mu m}$.)			

♂ Előttem ismeretlen.

Eddig patakok medrében fekvő görgetegek kövei alatt, nyirkos helyekről ismerem, hol kis barlangoskakat vajjal s bennök őrzi alig 4 $\frac{m}{\mu m}$ átmérőjű fehér peteburkát.

Találtam, mint nyári alakot: Orsován (Gratzkapatak), Rózsahegyen (Liptó, Vág folyó); Ungvárról (Muz. gy. VIDRA FERDINÁND).

GEN. 5. NEM. PIRATA. SUND.

($\pi\epsilon\tau\rho\alpha\tau\acute{\iota}\varsigma$ = kalóz, tengeri rabló; a vizek körül való tartózkodás ól.)

Syn. 1833. SUNDEWALL «Conspectus Arachn.» p. 24.

Vide: THORELL «Remarks» p. 193.

A felső fonópár az alsónál alig hosszabb. Az arcz alacsony; oldalai domboruak. A fejmell gyeren szőrös. Az alsó szemsor középsői határozottan kisebbek a hátsó sor szemeinél, alig szemátmérőnyire a homlok szeletől; e sor a középsőinél valamivel hosszabb. A szemterese magasságánál szélesebb.

Határozottan a vizekhez kötött alakok, a melyek a vízszinten cpen úgy, mint a talajon gyorsan futnak, gyakran a víz alá buknak. A nőstények peteburkaikat a fonókhoz erős tve magukkal czipelik.

A *Pirata piraticus* bordás körmei tövüknel vaskosak, kampójuk jó hajlasu, hegyes; bordaik, meglehetős szám mellett, sűrűn sorakozottak, lásd: II. köt. VI. t. 136. b.

SPEC. 1. FAJ. PIRATA PIRATICUS. (CL.). RABLÓ KALÓZPÓK. KÄPTE PIRATENS PINNE.

(piraticus = vide $\pi\epsilon\tau\rho\alpha\tau\acute{\iota}\varsigma$.)

Syn. 1757. *Araneus piraticus* CLERCK «Ar. Suec.» p. 102.

Vide: THORELL «Remarks» p. 341.

♀ Elötteste szemnyes olajsárga, végteste olajzöld, vöröslő alappal és olajsárga, elenk lándzsafolttal, e folttól ketoldalt két fehér pontsorról; e pontok derszerűek, mintegy reá lehelvek. Labai olaj-

sárgák, ritkán némi foltozat nyomaival; rendszeren egyszínűek. A fej mell hosszúka, gyéren szőrös, úgy hogy középrajzai, a melyek nem szőrözethöl való, áttetszenek: közepén egy olajsárga hosszcsík, mely a hátréstől a szemek felé három sugár ágra oszlik; a mellrész legszéle hófehér szőrözethöl való finom szegélylyel. A mellvért világos olajsárga. A rágók olajsárgák, az első lábpár másodvégizénél rövidebbek, eléggé szőrösök. Az állkapcsok olajsárgák; az aljuk barnás, elől elhatszett. A lábak gazdagon szőrösök.

Az első lábpár szárán és másodvégizén, alul, három-három pár tüske; semmi talpkefe. A végtest hossztojásdad, elől keskenyedő; hasfele világos olajsárga.

A hátsó és középszemsor patkószzerű, hátrafelé nyitott barnaságban fekszik. Az alsó sor, a középsornál láthatólag hosszabb, középszemei nagyobbak és láthatólag távolabbra állanak egymástól, mint az oldalszemektől, alig szemátmérőnyire a középsortól és a homlok szélétől. A középsor két szeme nagy, szemátmérőnyire egymástól. A hátsó sor két szeme a középsorénál kisebb, az alsó sor középsőinél határozottan nagyobb, kétszer oly távolra egymástól mint a középsortól.

A zár, a légzőrés közelében és felett álló barnás, apró dudorpárból áll.

Mértékek: ♀ Törzs	7.5 $\frac{m}{m}$ ebből
fej mell	3.7 "
I lábpár	8.4 "
IV "	11 "

♂ Karcsubb; színezete a nőstényével azonos. A tapogató szára szélességénél kétszer hosszabb és hosszabb a térdnél is; czombja felületen, elől, három rövid tüske harántsorban, e mögött két hosszabb tüske egymásmögött. A pikkely csúcsosan kanálalakú, csúcsa alatt szőrös; nemzőszerve eléggé kidagadó, oldalról tekintve egy harántlemezen egy felálló, igen apró fogacs látható.

Mértékek: ♂ Törzs	6.8 $\frac{m}{m}$ ebből
fej mell	3.7 "
I lábpár	10 "
IV "	12.2 "

Különösen álló vizek szelein és nevezetesen ott, a hol a növényzet a vízszínen felülkerekedik, nem ritka tavaszi és nyári alak. A nőstény peteburka hófehér, finom szövetű, úgy, hogy a petek átlátszanak. A víz színen ügyesen futkároz és igen gyakran az úszó növények alá bukik s hozzájuk tapad; ilyenkor végtestét légburok köríti.

Ismerem, erdélyi részekből: Kolozsvárról, Mező-Záhról, Gyekeből; magyar részekből: Doroszlóról Orsováról, a Kárpátokról (Jama tó a Kriván alatt), Nagyváradról (Muz. gy. Mocsáry).

SPEC. 2. FAJ. PIRATA LEOPARDUS. (SUND.). PÁRDUCZ K. PARDEL P.

(Leopardus = párducz; a színezetről.)

Syn. 1833. *Lycosa leopardus* SUNDEVALL «Swensk. Spind. Bescr.» p. 189.

Vide: THORELL «Remarks» p. 331

♀ Földszürkés, barnással elegyes; a végtest elején egy fehérés lándzsafolt, mely a nyelecske fele ketoldalt kiszélesített (borszeszben igen kirívó). A lábak sárgásbarnák, sűrűn barnán gyűrűsfoltosak; a foltok különösen a czombokon láthatók. A has barnássárga.

A fej mell vaskos; oldalról tekintve a nyelecskétől kezdve ívesen és magasán emelkedő, vörösbarna alapon, különösen a hátrés táján, barnássárgán szőrös. A mellvért barna, bőven szőrös. A rágók vaskosak, az első lábpár czombjánál vastagabbak, oly hosszúk, mint e pár másodvégize, sötét vörösbarnák, fenyések, gyér szőrözettel. Az állkapcsok vörösbarnák, elkerekített végök kissé világosodó, gazdagon szőrösök; az

alajk sötét, elöl elmetszett, szőrrel borított. A tapogató czombja sárgásbarna, sötét foltos, a többi íz vörösesbe húzó, bőven szőrös; a végiz rövidebb mint a térd és szár együttvéve.

A lábak elég hosszúk, elállóan és bőven szőrösök; a czombok inkább sárgába, a többi íz vörösesbe húzó; a czombok párduezszerűen tarkák; az első pár szárán, alul, két pár (vajjon mindig?) tüske, második végizen három pár tüske.

A végtest elöl keskenyedő; felületén a négy ingödör jól látható; földszürke-barnással elegyes szőrözete barnával felhőzött.

Az alsó szemsor szemei egyenlő nagyságúak, a középsők valamivel távolabbra egymástól mint a szélsőktől, szemátmérőnyire a homlok szelétől és a középsortól is. A középsor két szeme elég nagy, bőven szemátmérőnyire egymástól. A hátsó sor két szeme a középsorenél alig kisebb, az alsó sor középsőinél sokkal nagyobb, alig másfélszer oly távolságra egymástól mint a középsortól.

A zár egy magasságánál szélesebb, vörösbarnás terese egy $\mathcal{D} \subset$ szerű nyiláspárral.

Mertekek: ♀ Törzs	9	$\frac{m}{m}$ ebből
fejmell	4.8	»
I lábpár	11	»
IV »	14.4	»

♂ Kevéssel karcsúbb. A lábak czombjain a barna szín az uralkodó, a színezet egyebekben a nőstényével azonos. A tapogató aránylag vézna; nemzőszerve a többi ízhez képest nem vastagodott; szára vastagságánál két és félszer hosszabb, oly hosszú mint a térd; pikkelye a szárnál alig szélesebb, csücsa keskeny, hosszú, alul-felül bőven szőrös; nemzőszerve alig kidagadó, vörösbarna, elöl nyitott, semmi tüskevel.

Mertekek: ♂ Törzs	8	$\frac{m}{m}$ ebből
fejmell	4.8	»
I lábpár	13	»
IV »	14	»

E kevéssé ismert pókot Doroszlón és Orsován (itt különösen kis ♂) találtam nyirkos helyek friss földhányásaiban, hol kevéssé meredeken lehajadó, 6 $\frac{m}{m}$ átmerőjű csövekben tartózkodott. A nőstény peteburka fehér, gyér szövetű, 7 $\frac{m}{m}$ átmerőjű, gömbölyű. Szemei, fejmellének alkotása és a csövájás, közel helyezik a Trochosákhoz.

SPEC. 3. FAJ. PIRATA KNORRII. (Scop.). KNORR K. KNORR S P.

(Knorr, múlt, századbeli term. barát tiszteletére.)

Syn. 1763. *Arauca Knorrii* Scopoli «Ent. Carniol» p. 403.

Vide: Thorell «Remarks» p. 342. (in §. P. piraticu.)

♀ Előteste barnás, világosodó előrefelé villás közepesikkal; a mellrész világos szegélylyel, mely legszélén fehér szőrökkel borított. A végtest barna, sárgásbarna szőrökkel elegyes, elején egy vörös lándzsafolt (borszeszben olajsárga), ettől két oldalt és az oldalakban is sok fehér szörpont; a has sárgás szőrözetű. A lábak vöröses sárgák, barna gyűrűfoltokkal, a többi íz uralkodó színe a barnás vörös, mely helyenközön világosabb gyűrűfoltokat tüntet fel.

A fejmell hosszúkás; oldalról tekintve a hátvonal vízszintes, a hátrés mögött a nyelecskére meredeken lehanyatló, módosan szőrös; közep csikja enyésző, nem szőrözetből való, a hátréstől a szemek felé villásan oszlott. A mellvért vörösbarna, közepén egy keskeny, sárga, ék alakú csíkkal. A rágók az első lábpár második végizenel rövidebbek, ugyan e pár czombjánál nem vastagabbak, sötét vörösbarnák, eléggé szőrösök. A tapogató czombja sárgás, kevés barna folttal, a többi íz vöröslő; a végiz kevéssel rövidebb, mint a térd

es szár együttvéve. A lábak elég hosszúk, karesuk; az első pár szárán, alul, két pár, másodvégizén három pár hosszú tüske. A végtest tojásdad, elől kissé keskenyedő.

Az alsó szemsor egyenes; középsői valamivel nagyobbak, s valamivel távolabbra egymástól mint a szélsőktől; a homlok szélétől és a középsortól is szemátnérőnyi távolságra állanak. A középsor két szeme nagy, nem egészen szemátnérőnyire egymástól. A hátsó sor két szeme a középsorénál kisebb, az alsó sor középsőinél nagyobb, bőven kétszer oly távolra egymástól mint a középsortól.

A zár a légzőrés szélén álló apró dudorpárból való; hasonlít a *P. piraticus*-éhoz.

Mértékek: ♀ Törzs	7 $\frac{m}{m}$
fejmell	3.3 »
I lábpár	9.7 »
IV »	12.5 »

♂ Elöttem ismeretlen.

Csupán csak Doroszlóról és Báziasról ismerem nyirkos helyek és tavak széléről. A nőstény pete-burka fehér, lazaszövetű, gömbölyű, 4.8 $\frac{m}{m}$ átmérőjű.

GEN. 6. NEM. DOLOMEDES. (LATR.).

(*ὄλομος* = favasz, oroszva támadó; az állat természetéről.)

Syn. 1804. LATREILLE «Norv. Dict. d'Hist. Nat.» XXIV, p. 135.

Vide: THORELL «On europ. Spiders» p. 194.

Az alsó sor középsői oly távolságra a homlok szélétől, mely a legnagyobb szem átmérőjét kétszer meghaladja. Az alsó sor négy szeme közel egyenlő nagyságú (a középső kettő nagyobb). A lábak vaskosak, a terdek, szárazak és másodvégizek valamennyi lábón felül is kurta, vaskos tüskékkel fegyverezettek.

Erős nagy alak, mely gyors futásra és ugrásra alkalmas. Csak az, a vizek szélén található buja növényzetet lakja. A nőstény közel mogyoró nagyságú, sötétszínű peteburkát magával cipeli. A *Dolomedes fimbriatus* (CL.) bordáskörmei hosszúk, erősek, kampósak; az első borda erős és kissé előre irányul, lásd: II. köt. VI. tábla 137, b.

SPEC. I. FAJ. DOLOMEDES FIMBRIATUS (CL.) SZEGÉLYES VIDRAPÓK. GERANDETE OTTERSPINNE.

(fimbria = szegélyezett; az elő és végtest világos szegélyéről.)

Syn. 1757. *Araneus fimbriatus* + undatus + plantarius CLERCK «*Aran. Suec.*» p. 106, 100, 105.

Vide: THORELL «Remarks» p. 346.

♀ Nagy. Olajbarna vagy dohányszínű. A fejmell igen fejlett, szélességénél csak kevéssel hosszabb, íves oldalakkal, tetemes hátréssel; oldalról tekintve, a hátvonal egyenes, a fejtől a hátrésig láthatólag emelkedő, a hátrésen túl meredeken lecsapott. A mellvért barna, közepén kissé világosodó. A rágók vaskosak, az első lábpár elsődvégizénél valamivel hosszabbak, oly vastagok, mint a lábpár czombja; tövük táján duzzadtak, különben sötét vörösbarnák, gyér, durva szőrözettel. Az állkapcsok szélesek, az alajkkal együtt vörösbarnák, sűrűn, durván szőrösek. A tapogatók vaskosak, elég hosszúk, durva szőrözettel és itt-ott vaskos tüskékkel; a végiz oly hosszú mint a térd és szár együttvéve. A lábak hosszúk és vaskosak, olajbarnák vagy dohányszínűek, a czombok homályosan csikosak, bő és erős fegyverzettel; a czomb alsó fele és az első végiz fegyvertelen, a többi íz fegyverzett, a szár és másodvégiz felül is fegyveres; az első pár szára, alul, négy pár — oldalt két és felül egy tüskevel, másodvégize alul három pár, oldalt három, felül, a legvégén, egy tüske-

vel; a terd két oldalt egy-egy tüskével, a czomb felülete 8—10 kurta tüskével; az első két lábpár első végize talpkefével. A végtest (a letölt ♀-nel) elől elmetezett és keskenyebb, hátul tojásdadra végződik: felül al 1 egyszínű.

Az alsó szemsor láthatólag kihajló, a középsornál hosszabb, középsői a szélsőknél nagyobbak, szélsői tetemes dudorokon állanak. A középsor két szeme kevéssel nagyobb az alsó sor középsőinél, ezektől másfel (középsor szem) átmérőnyire és ugyanennyire egymástól. A hátsó sor két szeme, hosszúkás, tetemes dudorok hátsó végén állva, nem kisebb a középsor szeménél s kétszer akkora távolságra egymástól, mint a középsortól, a melylyel egy magasságánál sokkal szélesebb trapezet alkot.

A zár egy emelkedett köldök, szemnyes sárga, nyelv alakú betéttel, mely két oldalt és a légzőrés felé egy vörösbarna, meglehetősen ripacos, keskeny keretbe van foglalva (○).

Mértekek: ♀	Törzs	19	$\frac{m}{m}$ ebből
	fej mell (hosszu)	9.2	"
	" (széles)	8.3	"
	szem térese (hátsó sor) . . .	2.8	"
	I lábpár	29.5	"
	I-ső és 2-dik végze együtt	9.2	"

♂ Kisebb, karcsúbb. Előteste és lábai sárgásbarnák; végteste olajbarnás, világosabb oldalakkal, hasa barnássárga. Lábai karesuk, erősebb — különben a nőstényével azonos fegyverzetűek. Tapogatója eléggé bunkós; czombja felületén, elől, harántsorban álló négy rövidebb, e mögött két egymásután álló hosszabb tüske; terde felületén, elől és hátul, és belső oldalán egy-egy erős tüske; szára felületén három hosszú tüske pereszleyszerűen áll; szára a térdnél rövidebb, előre felé módosan vastagodott: külső oldalán, kissé alá felé, egy kurta, vaskos, sötét nyujtvány, melynek vége két fogacsba hasított, — alul a végén egy hosszú, vaskos, hegyes, előre irányozott és felfelé hajlott sötét tövis: pikkelye csúcsosan kanálalakú, belöl-felől kissé kivágott; nemzőszerve alig kidomborodó, igen szövevényes (egy dió-bélhez hasonló rovátkolású) semmi kiálló nyujtványnyal vagy tövissel.

Mértekek: ♂	Törzs	13	$\frac{m}{m}$ ebből
	fej mell (hossza)	6.5	"
	" (szélessége)	5.3	"
	I lábpár	25.5	"
	ennek végzei együtt	9.5	"
	IV lábpár	27.5	"
	ennek szára	7	"
	A hátsó szemsor	1.8	"

A mértékeknel a THORELL tanár által adottakkal conformitásra törekedtem azért, mert THORELL az idézett helyen a mértékek, illetőleg arányok ingadozását kimutatva, kételkedik abban, hogy a «D. plantarius» külön faj lenne, a mint azt VAN HASSELT (Over huid-en kleur-verwisseling v. Dolom. fimbriatus etc. Tijdschrift von Entom. I, 6, p. 164) vitatja. A magyar alak THORELL felfogása mellett bizonyít.

Legerősebb pókjaink közé tartozik, mely kizárólagosan a vízmellek buja növényzetén tanyázik s ott lesi prédáját, melyet hatalmas ugrásokkal s előlábainak csapásával keríti birtokába. Futása villámsebes a vízszínen szejjelterjesztett lábaival ugrálva halad és úszó növények alá le is bukik. A nőstény peteburka barnasárga, mogyorónagyságú, sűrű szövetű s az állat tapogatói és állkapcsai segítségével czipeli, azonfölül néhány fonállal fonóíhoz is köti.

Júniusban ivarérett. Ifjú nemzedéke igen élénk színezetű: alapszíne a ríktó olajzöldtől a feketéig változik s fej mellét és végtestét ríktóan fehér, néha ezitromsárga széles csik szegélyezi (innen fimbriatus). E változatosságra vezethető vissza a sok nev. a mely alatt e faj a tudományos irodalomban külön faj gyanánt szerepel.

Ismerem ivarérett állapotban, erdélyi részekből: Kolozsvárról (Múzeumkert tava ♀), Kutyalváról (Marospart ♂); magyar részekből csupán csak ifjabb nemzedékét ismerem: Doroszlóról (Mosztonga, barnások), Csorba (Liptó, a Kárpát töven «Pronyiszka» ingoványok), különösen élénk sárga szegélyűek, Ungvárról (Múz. gy. Vidra Ferd.)

GEN. 7. NEM. OCYALE. SAV. ET AUD.

(*ώζόαλος* : = tengernyi sebességű, oly értelemben mint «tengernyi sokaság».)

Syn. 1825—27. SAVIGNY ET AUDUIN «Descr. de l'Égypte» II. Éd. XXII p. 372.

Vide: THORELL «On europ. Spiders» p. 194.

Az alsó szemsor középsői oly távolságra a homlok szélétől, mely a legnagyobb szem átmérőjét kétszer is meghaladja. Az alsó szemsor oldalszemei a középsőknel nagyobbak. A lábak karesuk, hosszúk, karesú tüskékkel fegyverezettek. Leginkább bokros helyeken, magas fűben, száraz talajon is tartózkodó, gyors futású, nyulánk alak. A nőtény tapogatói és állkapcsai segítségével czipeli a hosszabb szájak által a fonókhöz erősített peteburkot.

Az *Ocyale mirabilis* Cl. bordáskörmei hossz-sarlóalakúak, hegyes kampóval s ugyanilyen bordákkal, a sánjaköröm egy fogacscsal, lásd II. köt. VI t. 138. b.

SPEC. I. FAJ. OCYALE MIRABILIS. (CL.) CSODÁS FURAPÓK. WUNDERBARE SCHLAUSPINNE.

(*mirabilis* = csodás; az életmódról.)

Syn. 1757. *Araneus mirabilis* CLERCK «Ar. Suec.» p. 108.

Vide: THORELL «Remarks» pag. 349.

♀ Szürkés, a barnásig és barnáig változó. A fej mell közepén végig egy fehéres, keskeny csík, mely a hosszú hátrés által hasított. A végtest oldaliban egy, a hát felé hullámosan kivágott, széles szegély, mely néha igen kirívó, néha enyészó, gyakran egészen hiányzik; a has barnássárga. A fej mell oldalai szürkés vagy szennyesfehér szőrözettel. A lábak szürkés szőrözöttiek.

A fej mell fejezésze kicsiny, jól elválasztott, mellrésze szélesedő; oldalról tekintve, a hátvonal a fej és hátrés között kissé behorpasztott, a hátrés táján kissé dagadó, azután ívesen a nyelecskere hanyatló.

A mellvált barna alapon szürkéssárga szőrözöttű, közepén egy világos hosszvonással, mely azonban csak a borszeszben látható. A rágók erősek, oly hosszúk mint az első láb pár végíze s ugyane láb pár czombjánál valamivel vastagabbak. Az állkapcsok elég szélesek, különösen végükön szőrösek, az alajk ívesen elvágott. A tapogató karesú; czombja elől barnafoltos, valamennyi ízén karesú tüskék bő szőrözet között; végíze bőven oly hosszú, mint a térd és szár együttvéve. A lábak hosszúk, karesuk; karesú, hosszú tüskékkel fegyverezettek.

A végtest hosszú, keskeny; hátul csücsbe kifutó.

Az alsó szemsor könnyedén kihajló, oldalszemei nagyobbak, a középsorénál alig kisebbek, középsői távolabbra esnek a homlok szélétől, mint a középsortól; e sor a középsornál sokkal hosszabb. A középsor két szeme az alsó sor szélsőinél alig nagyobb s bőven szemátmérőnyire egymástól, az alsó sor szélsőitől epen oly távolságra, mint a hátsó sor szemeitől. A hátsó sor két szeme a középsorénál nem kisebb, egy hosszúkas dudor hátsó végére helyezett, bőven kétszer oly távol egymástól, mint a középsortól. Az arez az állkapcsok felett eles szögletes.

A zár igen szövevényes; a nyelecske fele Y szerűen elágazó kettős lemezből áll, melynek felei

-- jobbra-balra -- horogszerűen kikanyarodnak s ismét lehajolnak s egy keretbe olvadnak, melylyel azután az Y alatt szemüvegszerű kettős tércsét alkotnak.

Mertekek: ♀ Torzs	15.5	$\frac{m}{m}$	ebből
fejmell (hossza)	4.5	"	
" (szélessége)	4.2	"	
I lábpár	21.3	"	
IV "	23	"	

♂ Kisebb, karsú. Színe változataiban a nőstényt követi, rajzai néha igen elesek; nevezetesen az előtest gesztenyebarna szelei és középsíkja finomak, fehérek; a végtest szürkés oldalai a hát fele egy hullámzatos, finom, fehér vonal által határoltak, ezek között a hátmező gesztenye-barna s a barnaságban egy világosodó, hosszú lándzsafolt. Az arcz vörösesbarna, meztelen, oldalai tömött, sárgásfehér szőrözettel. A tapogató nyele karsú, bunkója vaskos; a czombon, térden és száron néhány hosszú, karsú tüske; a szár a terdnel alig rövidebb, nem vastagodott, külső oldala végén egy hosszú, karsú, majdnem derekszögben elálló, kissé horgosvégű nyújtvány áll; a pikkely csücsösen kanálalakú, kiszélesedett részében felgömb-szerűen domború, csücsa alatt serteszerű szőrökkel; nemzőszerve kidagadó; oldalról tekintve, a kidagadás elején egy nyelvszerű, lefelé hajló nyújtvány látható.

Mertekek: ♂ Törzs	9.5	$\frac{m}{m}$	ebből
fejmell	3.8	"	
I lábpár	18	"	
IV "	19	"	

Az aljakban közönseges, messze elterjedett nyári alak, mely a buja növényzetet kedveli, a nélkül, hogy a vízhez kötné tartózkodását. Roppant sebességű futásával a fűben nehezen követhető. A növényzet szírmái, fűszálak csücsán lesekedve, majd ugrással, majd előlábai csapásával ejti hatalmába prédáját.

A peteburok 7—8 $\frac{m}{m}$ átmérőjű, szürke; czípeléséről a nem jellemzésében emlekeztem meg.

Ismerem erdélyi részekből: Kolozsvárról, Szász-Vesszősről, Mező-Záhról, a Körös-völgyből, Görögy-Szt-Imreről, Parajdról, a Mezőhavasaljáról, Nagy-Szebenből (Sill és Bergleiter gyűjtemények); magyar részekből: Doroszlóról, Apatinból, Palánkáról, Pancsováról, Orsováról, Tokajból, az Alsó-Hámorból, Veszprémből, Budapestről (Muz. gy. Pável), Nagy-Váradról (Muz. gy. Mocsáry), Pécs vidéke (Muz. gy. Friwaldszky és Pável), Orsováról (Muz. gy. Friwaldszky) «Magyarország» jelzővel (Muz. gy. Petényi S. J.)

Ocyale murina C. Koch («Die Arachniden» XIV. p. 111, tab. CCCLXXXII, fig. 1348), melyet Koch Görögországból mint fajt írt le, nem egyéb, mint sötét változata az O. mirabilisnek s nálunk nem ritka.

FAM. II. CSAL. OXYOPOIDAE. HÍŰZPÓKOK.

(ὄξυωπιός: élesszemű, éleslátású: ὄξυς = éles, ὤψ = szem; inkább a szem csoportosítás sajátágáról mondv.)

GEN. I. NEM. OXYOPES. LATR.

(vide: Oxyopidae.)

Syn. 1804. LATREILLE «Nouv. Dict. d'Hist. Natur.» XXIV. p. 135.

Vide: THORELL «On europ. Spid.» p. 197.

A szemek négy sorba elhelyezettek; az alsó szemsor két apró, közelített szemből áll; a második és negyedik sor szemei körülbelül dereknegyszöget alkotnak, a harmadik soréi e négyszögon kívül esnek (a második, harmadik és negyedik sor tehát hosszszöget alkot). A test simaszelű, majd elkerekített, majd kissé kivágott végű pikkelyekkel borított; a rajzok e pikkelyektől erednek. Zömök, csücsös végtestű, kis

alakok, láthatólag oldalt elterülő karesu lábakkal. Az aljakban a füves helyeket s a bokros helyek tisztasait lakják; a nőstények az apró peteburkot magukkal czipelik.


Az *Oxyopes transalpinus* Walek bordáskörmei közepök táján szelesedők, ehhez kepest a középső bordák is lefelé nyulnak úgy, hogy a bordák csücsai együttvéve ívben állanak; a sánjaköröm több fogacsesal, lásd II. köt. VI. tábla, 139. b.

SPEC. I. FAJ. OXYOPES RAMOSUS (PANZ) TÜSKÉS HIÚZPÓK. STACHLIGE LUCHSSP.

(ramosus = ágas, teli ágakkal; a lábak tüskés voltáról.)

Syn. 1804. *Aranca ramosa* PANZER «Syst. Nomencl.» p. 165.

Vide: THORELL «Rein. rks» pag. 350.

♀ Hófehéren, vörösesen és barnásan elegyítve tarka. Az arczon három fehér hosszvonal, melyek közül a középső a szemtércest metszi, a homlokon kiszélesedik; a fejrészt a mellresztől  szerű barna rajz választja el. A végtest elején, a nyelecske felett, egy felülről behasított fehér folt; az oldalakból a hát közepe felé, résüntösen állított, ékalakú, fehér pikkelyfoltok állanak, közeik vöröses és barnás pikkelyekkel kitöltve. A hason, kétoldalt, egy-egy fehér szegelycsík. A lábak hosszú, vékony tüskékkel fegyverzettek, vörösbarnák, ritkán álló feheres pikkelyekkel, elmosódó gyűrűzettel. (A pikkelyrajzok ritkán épek, mert igen könnyen leválnak s ilyenkor az állat vörösbarna.)

A fejmell, felülről tekintve, majdnem szabályos kupidomú, hátra fele szelesedő; oldalról tekintve, a hátvonal vízszintesen egyenes, a hátrésen túl hirtelenül lecsapott; az arcz magas, kupidomú. A mellvert barnásvörös, feheres pikkelyekkel és szőrökkel borított. A rágók vörösbarnák, kissé laposak, az első lábpar czombjánál sokkal vastagabbak s oly hosszúk, mint a lábpar első végze; oldalról tekintve, a homlokkal együtt kissé hátranyomottak, úgy, hogy a fej csücsa kissé kiálló. Az állkapcsok keskenyek, egyenesek, vörösbarnák; az alajk valamivel sötétebb, elől elvágott, az állkapcsok felehosszút meghaladja. A tapogató karesu, barnafoltos; czombja, térde és szára felületen karesu, hosszú tüskék állanak; végze oly hosszú, mint a czombja, ellenben rövidebb, mint szára és térde együttvéve. A lábak karesuk, igen sok karesú, hosszú, pereszlen formára, az ízek köre elrendezett tüskékkel fegyverzettek; a terdek, száruk és másodvégizek alul, felül és oldalt is tüskések. A végtest csücsosan vegződik, majdnem ékalakú.

Az alsó szemsor két igen apró, közelített szemből áll, melyek oly távolságra állanak a homlok széletől, a mily távolságra áll a második szemsor a negyediktől — egymástól pedig oly távolságra esnek mint a második sortól. A második sor két szeme az alsóknál bőven kétszer nagyobb, bőven szemátmérőnyire egymástól. A harmadik sor két szeme, oldalt irányuló dudor tetején állva, háromszor akkora távolságra esik egymástól, mint a második sor két szeme szinten egymástól s olyan távolságra e sorhoz, mint a negyedikehez. A negyedik sor két szeme alig kisebb a második sorénál s evvel oly dereknégyszöget alkot, mely szélességénél magasabb. A második, harmadik és negyedik sor tehát egy meglehetősen szabályos hosszszöveget alkotnak, melynek leghosszabb tengelye vegpontját a harmadik sor szemei kepezik.

A zár egy sötét vörösbarna, fényes, harántfekvő, emelkedett dudor, két szabályos, kerek nyilással; a nyilások között egy, a légzőrés felől a nyelecske fele görbülő fényes lemez látható.

Méretek: ♀ Törzs	7.5—8 $\frac{m}{m}$ ebből
fejmell	3 $\frac{m}{m}$
I lábpar	10 "
II "	9.4 "
III "	7.3 "
IV "	9 "

♂ Kisebb, karesu, végteste ekszerűen csücsos, lábai igen karesuk, aránylag rendkívül hosszú tüskékkel. A tapogató igen vékony nyelen roppant bunkós; szára a térddel rövidebb, alul; egy előre irányozott,

vaskos, tompa nyujtvánnyal; pikkelye a tövénél szelesebb mint a térd és szár hossza együttveve, csúcsosan és meggörbitve kanálalaku; nemzőszerve szövevényes, belső oldaláról és kisse felülről tekintve egy koszarvszerűen csavarodó, hegyes nyujtvány látható.

Mertekek: ♂ Törzs	6	m_m ebből
fejmell	2.9	"
I lábpár	11	"
IV "	8.7	"

E messze elterjedett (Svecziában is előfordul) csinos pókfaj, az aljak füves helyeit kedveli, hol a magas fűben igen gyorsan mozog. A nőstény peteburka kicsiny, lencsealaku.

Ismerem erdélyi részekből: Kolozsvárról (Szénafüvek), Mező-Záhról (Bottavölgy); magyar részekből: Palánkáról (Trnovácsi tisztások, majusban ivarerett), Pancsováról; Nagy-Váradról (Múz. gy. Mocsány).

SPEC. 2. FAJ. OXYOPES LINEATUS. LATR. CSÍKOS H. GESTREIFTE L.

(lineatus = vonalzott; az előtesten lévő két világos csíkról.)

Syn. 1806 *Oxyopes lineatus* LATREILLE «Gen. Crust. et Insect» I, p. 117

Vide: THORELL «Remarks» pag. 420.

Idem ibidem p. 354 Nota I, ♂ = O. dentatus THORELL

♀ A fejmellen a nyelecsketől induló, előrefele elágazó V szerű világos villa rajz. Az arcz sárgas, három barna hosszcsíkkal, melyek közül a két szelső a sárgás állkapcsokon is végig fut. A lábak karesűk, ágasan-tüskesek, világos barnássárgák sok barna gyűrűfolttal. A tapogatók sárgák, barnás gyűrűzettel. A fejmell rajzai a pikkelyek elvesztése után is megmaradnak. Egyebekben a megelőző fajhoz hasonló; de szemeinek viszonylagos nagysága más.

A második szemsor két szeme valamennyi közt a legnagyobb. Az első és negyedik sor két-két szeme majdnem egyenlő nagyságú.

A zár egy világos-szemnyessárga, kisse a nyelecskefele dülő harantdudor.

Mertekek: ♀ Törzs	6.7	m_m ebből
fejmell	3	"
I lábpár	11	"
IV "	9.5	"

♂ Kevéssel karesubb, hosszabb labu; a fejmellen a V alaku jegy hiányzik; arcza tiszta sárga, lyenek rágói és lábai is. A tapogató igen sajátos berendezést mutat: szára hosszabb a térdnél, oldalról tekintve, csúcsa kivágott s így alul és felül nyujtványt kepez; a szár tövénél külső oldalán, egy oldalt és előre irányuló, lapiczkás lemez áll, mely magánál a szárnál csak kevéssel rövidebb, állásban sarkantyú-szerű, aránylag igen tetemes; pikkelye terjedelmes, szemnyessárga; nemzőszerve egy csigaszerű, kiálló gyűjtőből áll; a pikkely csúcsa alul sugáregyenes, hosszú szőrök meredeznek ki és előre.

Mertekek: ♂ Törzs	6.8	m_m ebből
fejmell	3	"
I lábpár	12	"
IV "	10	"

Mint tavaszi alakot, füves helyekről ismerem: Kolozsvárról (Szenafű, ifjak), Doroszlóról (Pusztaszentegyház) és Orsováról (Csernamellek). -- THORELL tr. közlése szerint az általa leírt *O. dentatus* ♂ = *Ox. lineatus* LATR. (THORELL in litt.).

SPEC. 3. F. A. J. ONYOPES TRANSALPINUS. (WALCK.) OLASZ H. ITALIENISCHE L.

(transalpinus = havasontúli olasz.)

Syn. 1806--08. *Sphasus transalpinus*. WALCKENAER, «Hist. Nat. d'Araneides» fasc. 4 t. 8.

Vide: PAVESI, «Cat. sist. dei Ragni del Cant. Ticino» p. 182.

♀ Előteste és lábai zöldessárgák; minden szem egy fekete folt szelén áll; a fejmell közepén egy X szerű fekete jegy; a két alsó szemtől egy-egy barnás, finom, néha enyésző vonás indul, mely a rágókon folytatódik. A végtest felülete barnás, elején egy ilyen színű lándzsafolt szélesen zöldessárgán szegelyezve; a szegély, a folt csucsán túl egyesülve, a fonókig ér. A has közepe ekálakra fekete, oldalain zöldessárga. A lábak sötétszínű tüskékkel gazdagon fegyverezettek. A mellvert zöldes, elején sötétedő foltal. Külsőalakja és arányai szerint a megelőző két fajhoz talál, de kisebb.¹

A negyedik sor két szeme az első sorénál valamivel nagyobb. A harmadik sor szemei tavolabbra állanak a negyedik mint a második sorétól.

A zár egy sárgás, fenyes, apró emelkedés, mely egy emberi orrhoz hasonlít.

Mertekek: ♀	Törzs	6	$\frac{m}{mm}$ ebből
	fejmell	2.5	»
	I lábpár	8	»
	IV »	6.9	»

♂ Kisebb; igen kicsiny végtesttel, színezete a nőstényével azonos, rajzai mindenben eleesebbek; a mellvert feketes foltja terjedelmesebb, hátrafele kisze ágas. Lábai igen vékonyak. Tapogatója nem szerfelett, de elég bunkós, zöldessárga; szára a terdnel alig rövidebb, vastagodott, alul a végén, kétszer kivágott s a hol a kivágások találkoznak, kis tompa nyujtványok kepződnek; pikkelye csucosan kanálalakú, módosan görbült, felületen szőros, a szőrök között a belső oldal fele 2--3 sertetüskevel; nemzőszerve alig kidagado, a belső oldalról tekintve egy előre irányzott, megflekű, jelentektelen nyujtványt visel.

Mertekek, ♂	Törzs	4.9	$\frac{m}{mm}$ ebből
	fejmell	2.5	»
	I lábpár	9.8	»
	IV »	7.9	»

E faj, mely eddig leginkább Európa déli részeiből (Olaszország, Görögország, Morea felsziget) volt ismeretes, hazánk némely helyein gyakori lakója a reteknek, hol a fűben barangol s gyakran a fűszálak csucsán is lesekedik; nyár elején ivarérett.

Ismerem, magyar részekből: Doroszlóról, Palánkáról, Orsováról és Báziásról.

¹) Pikkelyei. I. köt. II. t. 31--33.

SUBORDO VII. ALREND.

S A L T I G R A D A E.

(saltare = ugrani, Springen; gradus = lépés, Schritt.)

UGRÓK.

Főjegyei az Ugrók alrendjének: a magas, felül lapos, függőleges oldalú, majdnem kockás alakú fej mell, melyhez erős, rövidkes, ugrásra alkotott lábak járulnak: ez utóbbiakból folyó ugrókepesseghez idomul a végtest aránya: a szemek három sorban állanak, az alsó szemsor négy szemből, a többi négy szem még két sort alkot.

Az alrend legtypicusabb alakjai, a Szökők (Attoidae), szervezet és életmód szerint egységes sort alkotnak, melynek szervezeti jellemzése az, hogy a szövőszerv kettős karomrendszerű s ehhez egy szőrtalp csatlakozik, mely utóbbi a szökéshez okvetetlenül szükséges biztosságot megadja: hogy továbbá az alsó szemsor négy szemből áll, melyek közül a két középső valamennyi szem között a legnagyobb, a többi négy szem, két sorban állva, egy négyszög sarkait képezi.

A látóképesseg tehát főleg *előre szolgál*, s a mozgás sajátlagosságával, az ugrással egyesülve, megalkotja azon sajátlagos módot, a melyvel ez alrend a pókműködés rendszerebe beilleszkedik, a mely szerint hat. E sajátlagos módhoz még más tulajdonság is járul: az állandó lakhely, minélfogva e pókok működésükkel bizonyos körhöz vannak kötve, a működési terre nézve távolról sem oly szabadok, mint a Futók rendjének legtypicusabb alakjai.

Az alrend körében általános tulajdonság az, hogy az alakok, védett helyen, néha épen telepszerűen, tehát társaságban építik, voltaképen szövök finom, tömött szövötű lakásaikat, a melyekben nyugalomra térnek, vedléseiken átesnek és petéiket őrzik. E lakások verőfényes környeke adja működésök terét.

Az elterjedésre nézve a fősúly az aljukra esik s csak egyes alakok hatolnak a fatenyésztő öv határáig. A nemzedékek sorát úgy látszik meleg burkokban áttelelő alakok tartják fenn, a mennyiben kétségtelennek látszik, hogy az anyák mindenkor bevárják a fiak kikeletét.

FAM. I. CSALÁD. ERESOIDAE. GYLKOSPÓKOK. MÖRDERSPINNEN.

(ἐρεσίδων = erősen támadó; a zömök testalkatról.)

SUBF. I. ALCSALÁD.¹ ERESINAE. FEJESPÓKOK.

GEN. I. NEM ERESUS. WALCK.

(ut supra.)

Syn. 1805. WALKENAEER, «Tabl. d'Aran.» p. 22.

Vide: THORELL «On europ. Spiders» p. 200.

A hátsó szemsor messzire hátrahúzott: az alsó sor oldalszeméi ugyan e sor középsőitől messzire elállók. A lábvegek két bordás és egy sánja körömmel (a nőstény tapogatója körmös). A fonók rövidke. Vaskos, zömök, erős lábú alakok, melyek kizárólagosan a földön és leginkább silányabb növényzetű, verő-

¹ E családnak második alesaládját a *Palpimaninae* képezik, melyeknél a fonalszűrő és a nyüst hiányzik, a három hátsó láb-páron a sánja köröm nincsen meg, a hátsó szemsor a másodikkal voltaképpen *egy* kihajló sort alkot. Hazánkban eddig ismeretlen.

fényes helyeken barangolnak. A bordas körmök az *E. cinabarinus*-nál nyújtottak, sokfognak, kampójuk az első bordánál nem feltűnően hosszabb; a sámljaköröm két fogaesesal; lásd: II. köt. VI. t. 140. b.

SPEC. 1. FAJ. *ERESUS CINABARINUS*. (OLIV.) SKARLÁT BIKAPÓK. SCHARLACH STIERSPINNE.

(cinabarinus — skarlát, ezinóbervörös; a végtest színe a σ^a -nél.)

Syn. 1789. *Aranca cinabarina* OLIVIER «Encyclop. Method.» IV. p. 221.

Vide: THORELL «Remarks» p. 420

Var. α σ^a Előteste feketés. Végtestének felülete skarlátvörös, négy fekete ponttal (az ingödröknek megfelelő elhelyezéssel); hasa sötét. A két első lábpár fekete, az ízek végei fehér szőrkoszorúval; a két hátsó lábpár skarlátvörös, vagy téglavörös.

Var. γ σ^a Előteste sok rőtarna szőrrel. Végtestének felülete szürkés, négy rőtarna ponttal. A két első lábpár rőtarna fehér, ízvégekkel; a két hátsó lábpár világosabb.

A fej mell igen vaskos; fejerésze párnaszerűen négyszögletes, emelkedett, elöl elvágott, tömötten szőrös, a szőrök megfekvőek s a középszemcsoporton ecetszerű üstökké tömörülnek; mellrésze vékonyodó, oldalról tekintve a fejrésztől felnyeregszerűen lehorpasztott; a mellvert keskeny, elöl-hátul csúcsosan kifutó, szőrös.

A rágók lapulók, tövüknél szélesedők, oly hosszúk mint az első lábpár másodvégize, bozontosan szőrösek. Az állkapcsok összehajlók; az alajk keskeny, csúcsos.

A lábuk vaskosak, igen tömötten szőrösek, fegyvertelenek.

A végtest körded, néha elöl keskenyebb; felülete lapos, tömött borítéka hosszúkás, hegyes, élesen fűrészes szélű pikkelyekből áll.

Az alsó szemsor közép-, és a második sor két szeme egy előre szűkülő kis trapezet alkotnak, mely alsó oldalát érinti annak a nagy négyszögnek, a melynek sarkait az alsó sor két oldalszeme és a hátsó sor két szeme képezi.

A tapogató vaskos; száríze alig egy harmada a térdíznek s a csúcsos pikkely tövével látszólag egybeforradt; nemzöszerve egy tojásdad, vöröses, fényes és harántgyűrűs gyűjtőből áll, melynek csúcsából egy kurta, vaskos, reszúntösen elvágott csövecske előre irányul.

Mértékek:	σ^a Törzs	7 — 9	m_m ebből
	fej mell	3.5 — 4.3	»
	I lábpár (legnagyobb)	8.5	»
	II »	7	»
	III »	6.8	»
	IV »	9.3	»

‡ Előttém ismeretlen.

A γ változat itt tárgyalatik először, a mennyiben t. i. az α változat (THORELL szerint) azonos a KOCH-fele *cinabarinus* es illustris nev alatt tárgyalt alakokkal, tehát a mi α változatunkkal is; a β változat azonos a HANN-fele «annulatus» alakkal, mely jelesen az által tűnik ki, hogy a végtest fekete pontjai fehér gyűrűbe foglaltak, a végtest különben skarlátvörös, de melyet eddig nem találtam; a γ változat a fent tárgyalt magyar alak.

Leginkább mint őszi alakot ismerem oly helyiségekről, a minőkre a nem jellemzésében utaltam.

Ismerem, erdélyi részekből: Kolozsvárról (muzeumkert), Mező-Záhról (Bottavölgy) var. α ; magyar részekből: Selmezbányáról var. α es Orsova tájáról (Muz. gy. FRIWALDSZKY) var. β , ugyan e válfaj «Magyarország» jelzővel KOVÁCS GYULÁ-tól szintén a Muz. gyűjteményében.

SPEC. 2. FALJ. ERESUS RUFICAPILLUS. C. K. VÖRÖSFEJŰ B. ROTHKÖPFIGE ST.

(rufus = vörös, caput = fej, vagy capillus : a fej hajzata; a fejrész szőrzetéről.)

Syn. 1846. *Eresus ruficapillus* C. Koch «Die Arachniden» XIII, p. 4

♂ Korombarna. A fejrész eleje majdnem háromszögletesen (a csücskesal hátrafele irányozva), továbbá a rágó felső fele vörössárga szőrözettel borított. Nagy, igen zömök alak, kurta, vaskos lábakkal.

A fejmell fejerésze koezkásan magasra felemelt; oldalról tekintve, a hátvonal a hátsó szemsortól a nyelecskére majdnem egyenletesen, lejtősen leereszkedik, a fejrész lapja előre lejtős. A mellvért az alajk fele elvágott, hátul elkerékitett, különben keskeny, finoman pontozott, elég szőrös; barna színű. A rágók felső fele vörössárga, alsó fele fekete, oly hosszúk, mint az első lábpár szára s tövüknel — együttvéve — hosszúságuknál sokkal szélesebbek. Az állkapcsok sötét vörösbarnák, szélesek és összehajlók; az alajk hasonló színű, keskeny; e részek szőrözete tömött. Az egész előtest szőrözete nemezszerűen tömött. A tapogató vaskos, aránylag rövid, szára nem hosszabb a terdnel s mind a kettő együttvéve nem hosszabb a végiznel. A lábak czombjai, alul elálló, hosszú szőrözettel borítottak, a többi szőrözet megfekvő és igen tömött; a fegyverzet egészen hiányzik. A végtest egyszínű, korombarna, tömötten borított, szélességénél alig hosszabb s kissé lelapított.

Az alsó szemsor két középső szeme a nagy szemnégyyszög alsó oldalába esik, s a második sor két szemével oly trapezet alakot, mely előre felé szűkülve, magasságánál szélesebb.

A zár egy harántfekvő, igen szabályosan vesealakú, kivíjt keret, mely a nyelecske felőli részen emelkedett; belsejében egy széles, lapos osztólemez látható.

Mértékek: ? Törzs	13.5 $\frac{m}{m}$ ebből
fejmell	6.6 »
I lábpár	11 »
IV »	11.8 »

♂ Ismeretlen.

Két példány a nemzeti Múzeum gyűjteményében, Buda és Baziás környékén gyűjtötte PÁVEL JÁNOS.

FAM. II. CSALÁD. ATTOIDAE. SZÖKŐPÓKOK.

($\alpha\tau\tau\omega$ v. $\alpha\tau\sigma\theta\omega$ = gyorsan mozogni; az ugró mozgásról.)

GEN. 1. NEM. SALTICUS. (LATR.).

(salticus = ugró; a mozgás módjáról.)

Syn. 1804. LATREILLE «Nouv. Dict. d'Hist. Nat.» XXIV, p. 135 (ad partem).

Vide: THORELL «On Europ. Spid.» p. 208.

A fejmell fejerésze a mellrész felibe hirtelenül kimagasló. A szemnégyyszög (a harmadik sor két- és az alsó sor két oldalszeme által képezve) szélességénél nem vagy alig magasabb. A test keskeny, nyulánk (hangyaszerű). A lábak karesuk.

Kövek között, repedésekben, kereszthónaljak sarkaiban tartózkodó alakok, melyek zacskószerű, egy kijáratú burkokat szőnek s rendszeren telepeket alkotnak; a verőfényt kedvelve, a legsimább tárgyakon is ügyesen mozognak, ugrásaikat fonállal biztosítják. A két bordásköröm a Salticus formicariusnál nyulánk, alig észrevehető, reszelőszerű fogacsolással — le galább ilyen a vizsgált első lábpáron, — ecetszörei szepen lapiczkások, lásd: II. köt. VI. tábla, 141. d.


SPEC. I. FAJ. *SALTICUS FORMICARIUS*. (DE GEER.) HANGYA SZÖCSKEPŐK. AMEISEN SCHRICKSPINNE.

(formica = hangya, az alakrokonságról.)

Syn. 1778. *Arauca formicaria* DE GEER «Mémoires» VII. p. 293.

Vide: THORELL «Remarks» pag. 357.

♀ A fejresz felső lapja fekete vagy barnásfekete, a mellrészt élénken sárgászöld, néha barnuló szélekkel.

A végtest eleje sárgászöldes, oldalfelől barnásan megszakítva, úgy, hogy néha egy, néha két  világos ágrajz képződik, hátulja barnás-fekete, a csücskére néha elmosódottan világosodó. A lábak sárgák; az első lábpár másodvégére feketés, a két hátsó lábpár hosszában barnasíkos. A has szemnyesfehér, legtöbbször egy sötét közepesíkkal, mely a fonóktól a légzőrés felé tart, gyakran enyésző, néha hiányzik.

A fejresz lapja kissé előre lekonyuló, finoman szemcsés, felülről tekintve négyszögletes, sarkain az alsó szemsor oldal- és a hátsó sor két szemével; a mellrészt törpebb és keskenyebb a fejresznél s azonkívül a nyelecske felé is vékonyodó; a szőrözete gyér. A mellvért igen keskeny, hosszú s nem külön lemez jellegű. A rágók majdnem függőlegesek, az első lábpár másodvégénél rövidebbek, vörösbarnák, szélességükkel kevéssel hosszabbak; az állkapcsok vörösbarnák, lapiezkások, előrenyújtottak; az alajk hosszú, keskeny, elől elkerekítve elvágott. A tapogató rövid, szára és végére laposra-szélesre nyomott, fekete; térde és ezombja füstösen vörösbarna. Az első lábpár szárán alul 5 pár hosszú, megfekvő tüske; másodvégén alul szintén néhány hosszú tüske; a második lábpár szára és másodvégére, alul szintén tüskés, a többi pár fegyvertelen. Az első és második lábpár, inkább belülről, barnás hosszúsíkkal. A végtest hengerded, fénylő; szőrözete igen gyér.

Az alsó sor két középső szeme nagy, majdnem érintkező s igen közel a homlok széléhez; gyantászerű, néha zöldes fényű; a sor két oldalszeme alig felig oly nagy, mint a két előbbi, s ehhez egy oldalszem fel átmérőjének megfelelő távolságra áll. A második sor két szeme igen kicsiny (pontoszerű), a fe négyzetű külső oldalán állva, valamivel közelebbre áll az alsó sor oldalszeméhez, mint a harmadik sorhoz. A harmadik sor két szeme nem kisebb az alsó sor oldalszeménél, valamivel távolabbra esik egymástól, mint a második sor két szeme szintén egymástól.

A zár egy orsóalakú, alig feltűnő, keskeny hosszlemez, mely a légzőrés közelében kissé tárgult.

Mértekek: ♀	Törzs	6.6 $\frac{m}{m}$ ebből
	fej mell	2.9 "
	I. lábpár	4.9 "
	IV "	5.4 "

♂ Állkapcsai rendkívül hosszúk, majdnem vízirányosan előre nyújtottak, fővük közel oly hosszú, mint a fej mell, lapos, harántirányozott, élénken kék-ibolya-zöld zománczozott, alsó élén számos fogacska, melyek előre felé nagybodnuk; csipő-körme igen hosszú, vékony, tövén és végén hajlott, alsó felén egy befelé irányozott ágszerűen elálló törrel. Világos színei a nőstényeinél élénkebbek; a végtest elejének sárgászöld színe néha harántul fehéresen szegélyezett. Az első lábpáron a ezomb is egészen feketés. A tapogató karesű; szára nem hosszabb, mint térde és alig vastagodott; pikkelye kanálalakú, nyújtott; nemzőszerve egy egyszerű, barnás, kissé fénylő, alig kidagadó gyűjtő.

Mértekek: ♂	Törzs (állkapocs nélkül) . . .	5.5 $\frac{m}{m}$ ebből
	állkapocs töve	2 "
	fej mell	2.5 "
	I lábpár	4 "
	IV "	5 "

Az epen oly szép, mint érdekes faj inkább a delibb reszekben található, habar altalanos elterjedese Svéd- es Angolországig is terjed; nálunk ugy, látszik, olyan elterjedest mutat, mint Franciaországban, hol Simon szerint az ejszakibb reszekben ritka, a deliekben közönseges. Nálunk tavaszkor es őszkor is előfordul. Tobbis számban tavaszkor talaltam Zomborban a temetők marvány sírkövein, hol a keresztónaljakba szövö kis burkait s igen jó egyetértésben látszott lenni a kis *Paederus longipennis*-sel, melylyel a színezet hasonlatossága alapján mimici viszonyban áll. Vadászatát a sírkövek verőfenyes oldalán, a nap heveben űzte s a függőleges, tükörsíma lapokon gyorsan es biztosan futkározott; a veszedelem elől egy szökessel leejtí magát a föbe, hogy rövid időn ismét visszatérjen. Balaton-Füreden egy elhasított mezsgékő repede-seben találtam. Budapestén gyűjtötte PÁVEL.

SPEC. 2. FAJ. *SALTICUS SIMONIS*. N. SP. *SIMON SZ.* *SIMONS SCH.*

(Simon Jenő híres francia Araneologus tiszteletére.)

(VIII. tábla, 185, *a* szemállás, *b* a ♀ zárja, *c* a ♂ tapogatója, *d* mérték, 186, ♂ nagyítva, 187, term. nagys., 188 fej erősen nagyítva.)

♀ Előteste barna, különösen a szemterese sötét. A vegtest vege barna, elejen két világos, kisse elfolyó \wedge szerű ágas rajz; hasa szemmyes barnás, világosodó, a fonóktól kezdve egy barna hosszesík indul, mely jóval a légzőrés előtt elenyeszik; labái barnássárgák, kisse elmosódó barnás hosszesíkokkal; az első pár másodvegize tisztabarna.

A fejmell fejeresse hirtelenül es koczkaszerűen a keskenyedő mellresz felibe emelkedik; az egész felület veghetetlen finoman szemecses-ránczos. A mellvert igen keskeny, nem kepez külön lemezet, barna. A rágók sötétbarnák, vaskosak, oly hosszuk, mint az első lábpár másodvégize; oldalról tekintve tövükkel terdszerűen kiállva, végők kisse előre irányozott. Az állkapesok keskenyek, barnák, kisse egymásra hajlók; az alajk szemmyes barna, elől elkerekített, széles. A tapogató barna, végize hosszú, lapított, felülről tekintve keskenyen kanálalakú. A lábak karesuk; az első pár szárán, alul, negy pár hosszú, megfekvő tüske, másodvégizén két pár tüske. A vegtest hosszukás, hengerded.

Az alsó sor két közepső szeme nagy, nem érintkezik egymással es zöld tűzben ragyog, a két oldal-szem sokkal kisebb s a középsőktől felátmerőnyi távolságra áll; a második sor két szeme igen apró s közlebbre esik az alsó, mint a hátsó sorhoz; a harmadik sor két szeme nem kisebb az alsó sor oldalszemeinél, egészen oldalra nez, távolabbra esik egymástól, mint a második sor szeme szinten egymástól s egyszersmind valamivel távolabbra egymástól, mint a homlok szeletől.

A zár egy szívalakú terese, melyet egy keskeny osztólemez két felre elválaszt; a felek alig valamiesket bemelyedők.

Mertekek: ♀ Torzs	6.5 $\frac{mm}{m}$ ebből
fejmell	3 "
I lábpár	4.9 "
II "	4 "
III "	4.4 "
IV "	6.5 "

♂ Igen sötétbarna; vegteste elejen egy \wedge szerű rajznak alig nyoma látható; a két hátsó lábpár tiszta barna, a második pár sárgás, az elsőnek czombja es másodvégize barna, szára, terde es elsővégize sárga. A rágók vízszintesen fekvők, vízirányosan előrenyújtottak, barnák, nemi gyenge bronz zománczezal, felül laposak, belső-alsó elükön 9 nagyobb es néhány kisebb foggal fegyverzettek; csipő-kormük barna, hosszú, karesú, toven es hegyen kisse hajlott, tovetől számítva hosszának első harmadán egy befele-oldalt elágazó, kisse előre irányzott, gyilokszerű, karesú fog áll, mely egy özágancs ágára emlékeztet. A tapogató karesú, vekony, barna; szára kisse vastagodó, külső oldalának vegen egy erős körömmel fegyverzett; a pikkely kanálalakú, szőrös; nemzőszerve egy kisse kidagadó, hosszukás, barna gyűjtőből áll.

Mertekek: ♂ Törzs	5·8 $\frac{m}{\mu}$ ebből
fej mell	2·5 "
alkapocs tove	2 "
I lábpár	4 "

E szép és érdekes faj, melynek ujságát dr. THORELL és SIMON urak is elismertek, csak egyetlen párban került birtokomba. Találtam Erdelyben Feketető mellett, a Körös melletti reten egy nagy kő alatt, mely igen mélyen beheveredett a gyepesbe.

GEN. 2. NEM. LEPTORCHESTES. THORELL.

(λεπτόσ = karesű, ὄρχηστος = tánczos; az alakról és mozgásról.)

Syn. 1870. *Leptorchestes* THORELL «On europ. Spid.» p. 209.

A fejresz a mellresznel nem magasabb. A szemnégyyszög szélessegenél hosszabb; a harmadik szemsor körülbelül a fejmell hosszának közepere (felére) esik. A test keskeny, karesű. A lábak vékonyak.

Leginkább elálló kergék alatt, száraz fák, karók stb. repedéseiben elő alakok, a melyek telepszámra egy kijárást, finom burkokban tanyáznak s a verőfényen vadásznak. A fákat látogató hangyákkal mimicri viszonyban állanak. Az első lábpár bordáskörme — a Leptorch. formicaformisnel — vaskos, kinyúló hosszu kampóval és kevés, erős bordával, lásd II. köt. VI. tábla, 142. c.

SPEC. 1. FAJ. LEPTORCHESTES FORMICAEFORMIS. (LUC.). HANGYAAALAKÚ TÁNCZOSP. AMEISENART. TANZSP.

(formica = forma = hangya, alak; az alakrokonságról.)

Syn. 1850. *Attus formicaformis* LUCAS «Revue de Zool.» (Guerin).

Vide: SIMON «Monogr. des Attiles» p. 708 (242).

♀ Fekete; a végtest közepén nyergesen benyomott, eleje szépen gesztenyebarna s e szín a feketetől egy fehér, keskeny harántöv által elválasztva. Az első lábpár czombja, töven, barnás; mind a ket első pár terden és szárán végig egy sötét csík; az első lábpár végize legnagyobb részben barna. A ket hátsó lábpár terde és szára kívülről és végig egy barna csikkal. A harmadik lábpár csipője barna, a többi páre sárga.

Var. α: egészen fekete; a végtest eleje nem barna, a fehér harántöv megvan; az első és a harmadik lábpár csipője barna, a többi páre sárga, az első pár czombja barnafekete s csak csücsán sárga; egyebekben a megelőző színezetével azonos.

A fejmell nyújtott, elég magas; függőleges oldalakkal, elől elvágott, hátul elkerekített; a hátsó szemek mögött harántul behorpasztott; felülete igen finoman és sűrűn szemecszett. A mellvért keskeny, hátul hegyesedő, szélein szőrös, különben sötét gesztenyebarna. A rágók függőlegesek, durván-szemecsesek, jól összeillők, oly hosszúk, mint az első lábpár mindkét végize együttvéve. Az állkapcsok nyújtottak, elől elkerekítve lapiczkások, az alajk eléggé széles, elől elkerekített, az állkapcsok felehoszszát túleri. A tapogató czombja fekete csikkal, terde és szára fekete; végize — csücsán — sárga s eléggé szőrös. Az első lábpár szára, alul, többnyire csak egy — másodvégize ket vagy három tövissel. A végtest nyújtott; oldalról tekintve, közepe előtt nyergesen benyomott; egészen fekete vagy előfelen barna, közepe táján egy, fehér pikkelyekből való, keskeny harántövvel, mely a hátfelen összeér, a hasfelen megszakított.

Az első szemsor ket középső szeme majdnem összeér, nagy, világos és fenyés; ugyane sor ket oldalszeme az előbbinél bőven ket harmadreszszel kisebb, a középsőkhöz igen közel áll s ezekkel együtt kihajló sort kepez; a második sor ket szeme igen apro és igen sokkal tavolabbra áll a harmadik mint

az első (alsó) sortól; a harmadik sor két szeme az alsó sor oldalszeménél nem kisebb s valamivel távolabbra áll egymástól, mint az alsó sor két oldalszeme szintén egymástól.

A zár egy, a légzőres fele szépen elkerekített, felkörü. fényes és terjedelmes barna terese.

Mértékek: ♀ Törzs	7·2	$\frac{m}{mm}$ ebből
fejmell	3	"
I lábpár	4·7	"
IV "	6·2	"

♂ Kisebb, karesubb; színezetben és a színezet változásában a nőtényt mindenben követi; vegtete igen karesú és igen tetemesen nyeregszerűen behorpasztott. Tapogatója egészen barnafekete, czombja elég erős, terde a szárnál sokkal tetemesebb; pikkelye nagy, kanálalakú, csúcsa felé kefeszerű, tömött, kurtá szőrözettel; nemzőszerve, oldalról tekintve, különösen hátul, erősen kidagadó, sima. a pikkely csúcsa alatt kissé nyerges, egészben egyszerű, s minden complicációt nélkülöző.

Mértékek: ♂ Törzs	5·8	6 $\frac{m}{mm}$ ebből
fejmell	2·7	"
I lábpár	4	"
IV "	5·8	"

E hangyaalakú kis és igen csinos pók, leginkább tavaszi alak s déli jellegű. Tapasztalásom szerint kizárólagosan ven gyümölcsfák és régi karók elálló kerge alá szövö finom burkait és fajtársaiva telepeket alkot. Vadászatát a verőfényen üzve, nem a tartózkodási helyéhez közel eső bokrok leveleire is elteved. Kövek alatt csak egyszer találtam.

Typicus színezetű példányait csak az Illok var alatti gyümölcsösből, a változatát ellenben több helyről ismerem, u. m.: Apatimból, Pancsováról, Orsováról, Parádról (kövek alatt) és Budáról («Csillag-völgy» Muz. gy.: PÁVEL).

GEN. 3. NEM. EPIBLEMUM. (HENTZ).

(ἐπιπλέγμα = ἐπι et πλέω — átvető, felvetett, kinyújtott; a mozgásról, de egyszersmind a typicus faj hímének kiálló rágóiról is.)

Syn. 1832. *Epiblemum* HENTZ «On North. Americ. Spid.» p. 108 (ad partem).

Vide: THORELL «On europ. Spiders» pag. 210.

A szemmegyszög — legalább hátul — magasságánál szélesebb. A lábak szárai és másodvegyzei legtöbbször fegyvertelenek. A fejmell körülbelül kétszer oly hosszú a milyen széles; alacsony; közel egyenes hátvonalú. Az alsó szemsor szemei érintkeznek s a homlok szelét majdnem elerik.

Elegge karesú, de nem hangyaalakú fajok, melyek a verőfényt igen kedvelik s a falakat különösen keresik; de futórzökön is előfordulnak. Kéreg alatt, résekben, kövek között telepszámra és módra szövök finom burkaikat, a melyekben áttelelnek.

Az első lábpár bordás körme — az *Epiblemum scenicum*-nál — karesú, kampója görbe, az egyik körömfel sűrűbben a másik ritkábban bordázott, a bordázás egyenetlen, lásd: II. köt. VI. tábla 143. c.

SPEC. 1. FAJ. EPIBLEMUM SCENICUM. (CL.). SZÍNÉSZ VETŐPÓK. MIMEN WURSPINNE.

(scenicum = jeleneti, színészi, — bántó értelemben «conlissa hős»; itt az életmódról, a sürgősforgásról).

Syn. 1754. *Araneus scenicus* CLERCK «Arat. Succ.» pag. 117.

Vide: THORELL «Remarks» p. 360.

♀ Előteste fekete, egészen ep állapotban sok fehér és keves barnás pikkelyekkel borított, melyek könnyű leválásuk folytán, különböző módon lekopnak, többnyire úgy, hogy egy fehér oldalszegélyt s azonkívül egy fehér pontot a fejresz eleje közepén és két fehér pontot a hátsó sor két szeme mögött kepeznek.

A végtest barnás földön elől fehéren szegélyezett, e szegély mögött még két $\swarrow \searrow$ szerű, széles, hófehér ágrajzzal, melynek csúcsai néha összeérnek; a fonók felett néha egy terjedelmesebb folt, néha egy apróbb folt pár. Lábai barnássárgák, néha barnák, fehér pikkelyekkel elegyesen szőrösek, az izek végein néha elmosódó foltokkal.

A fej mell nyújtott, módosan magas, elől el metszett, hátul elkerekített, a hátsó szemek mögött módos haránt-horpasztással; oldalról tekintve a hátvonal közel egyenes, hátul a nyeleckére leereszkedő; felülről tekintve a mellrész igen módosan tágult. A mellvért hosszúkás, kicsiny és keskeny; hosszú, fehéres szőrökkel elég bőven fedett. A rágók oly hosszúkás, mint a tapogató szára és végíze együttveve, barnák, ripacsosak, kevés fehéres szőrével. Az állkapcsok barnák, elég szélesek, előrenyújtottak és elkerekítettek; az aljuk hasonló színű, keskeny, a rágók felehozzát eléri. A tapogató világossárgás, sok fehéres, hosszacska szőrökkel; fegyvertelen végíze valamivel rövidebb mint térde és szára együttveve.

A lábak fegyvertelenek, a harmadik és negyedik lámpár másodvégíze csúcsán néha pereszlenyszerűen elrendezett, erősebb sertők észlelhetők.

A végtest nyújtott, kissé hengeres, elől elkerekített, hátul csúcsos; hátfele a fennemlített rajzzal; hasa barnás vagy fehér pikkelyekkel ritkán borított; a pikkelyek a has közepén rendszeren hosszcsík szerűen kikopottak.

Az alsó (első) sor szemei világos pikkelykörökbe foglalva s majdnem érintkeznek, a középsők az oldaliaknál bőven kétszer nagyobbak, ezekkel kihajlító sort alkotnak, mely a kivágott homlokszelt majdnem eléri. A szemégyszög magasságánál szélesebb, a harmadik sor két szeme az alsó sor oldal szeméinél nem kisebb; a második sor két szeme igen kicsiny s körülbelül ugyanakkora távolságra esik az alsó mint a hátsó sortól.

A zár egy haránt elterülő, terjedelmes, hosszúságánál szélesebb, ajkszerű karaj, mely barna színű és ripacsos.

Mértékek: ♀	Törzs	6.8 $\frac{m}{mm}$
	fej mell	2.6 "
	I lámpár	3.8 "
	IV "	5 "

♂ Alakra (nagyságra) nézve változó (törzs 3.5 $\frac{m}{mm}$ —6.8 $\frac{m}{mm}$), egészben sötétebb alapszínezettel és lábakkal. A fej mell és a szájszervek igen fejlettek. A barna, karsu állkapcsok előre irányozottak, szétágazók, csipő körük hosszú, kaszaalakú, nyulánk. A színezet a nőstényével azonos, de a rajzok rendszeren élésebbek. A tapogató hosszú, karsu, igen módosan bunkós; barna, sok fehéres szőrrel borított; térde sokkal hosszabb a szárnál, a szár vastagodott s külső oldala csúcsán egy erős, a pikkely töve fele görbült körmet visel. A pikkely keskeny, tompa csúcsú; nemzőszerve barna, egyszerű, módosan kidagado gyűjtőt mutat, mely a pikkely csúcsa fele kissé letörpül.

Mértékek. ♂	Törzs	6.8 $\frac{m}{mm}$ ebből
	fej mell (állkapocs nélkül)	2.8 "
	Állkapocs (töve)	2.8 "
	I lámpár	4.2 "
	IV "	5.7 "

E leírást úgy kezeltem, hogy a fajnak sok változata is felreismerhető legyen.

Igen messze elterjedt, mindenütt közönséges tavaszi és nyári faj, mely lakott helyeken (házakon, ablakokon, palánkokon, stb.), de ezektől távol is (bokrokon, kövek között, fák törzsén, stb.) előfordul s leginkább a verőfényen sűrűg-forog, gyakran meg-megáll, előtestét felemeli és széjel néz. Látóképessége kitűnő s a feleje irányozott útnak minden mozdulatát követi. Sík falakon, az ablakok üvegein igen biztosan mozog; de minden lépését és ugrását fonállal biztosítja. Reszekben, kövek között és kergek alatt rendszeren igen számos tagból álló telepek zacsói találhatóak, melyek tömötten együtt állanak s a melyekbe az állatok rossz időben, telelésre és peték lerakására úgy mint vedlésre is visszavonulnak.

Ismerem, erdélyi részekből: Kolozsvarrol, Szász-Vesszősről, Mező-Záhrol, Hosszutekeről, Parajdáról, Szebenből (Sill és Bergleiter gyűjtemény); magyar részekből: Doroszlóról, Apatinból, Palánkáról, Pancsováról, Tokajból, az Alsó-Hamorból; a m. nemz. muzeumban Budapestről (Frivaldszky), Ungvárról (Vidra Ferdinand).

SPEC. 2. FAJ. EPIBLEMUM CINGULATUM. (PANZ.). ÖVES V. GURTEL W.

(cingulum = öv; a végtest harántos rajzairól.)

Syn. 1797. *Aranea cingulata* PANZER «Faun. Ins. Germ.» 40, 22.

Vide: THORELL «Remarks» pag. 364, 367.

♀ Az előbbi fajnál sokkal kisebb. A fejmell felülete, jelesen a mellresz pikkelyzete, szivárványosan, de nem erősen fénylő; a hátsó szemek mögötti behorpasztás \vee alakban fehér pikkelyekkel borított.

A végtest felületének alapszíne fehér, benne néha egy, néha két, igen esinosan összefutó, \wedge szerű, szépen barna jegy. Labai sárgák; a negyedik pár szára és másodvegyze töven jól kivethető sötétes gyűrűvel.

A szemnegyszög elől-hátul magasságánál szélesebb.

A zár köldökszerűen kiemelkedő és egy egyszerű, kerekded kivájtást mutat.

Mertekek: ♀	Törzs	5 $\frac{m}{m}$ ebből
	fejmell	2·3 »
	I lábpár	3·8 »
	IV »	4·2 »

♂ Elöttem ismeretlen.

Tartózkodása és életmódja — úgy látszik — a megelőző fajával azonos.

Mint kora tavaszi alakot, keves példány után, csupán csak Doroszlóról ismerem.

SPEC. 3. FAJ. EPIBLEMUM TENERUM. (C. K.). TÖRPE V. ZWERG W.

(tenerum = zsenge; az alak picziségéről.)

Syn. 1846. *Callicthera tenera* C. KOCH «Die Arachniden» XIII. p. 43.

Vide: THORELL «Remarks» p. 365, 367.

♂ Kicsiny. Az elő- és végtest kissé szennyesfehér, pikkelyzete színes zomanczu. Labai barnák, a hátsó két pár terde legnagyobb részben világos.

A végtest rajzok nélkül való.

A rágók karesük, széjelágazók, lefele irányozottak s a fejmell felehoszszának megfelelők. A tapogató berendezése legjobb megkülönböztetője a fajnak. Terdize vastagságánál egy felszer hosszabb és hosszabb a szárnál is; a szár külső oldala esuesán egy göcsszerű, tompa dudorodás látható; alulról tekintve a szár vége melyen kivagott; pikkelye keskeny, kisse legörbülő; nemzőszerve egyszerű, eléggé kidagadó, elől kissé lenyomott.

Mertekek: ♂	Törzs	3 $\frac{m}{m}$ ebből
	fejmell	1·4 »

♀ Elöttem ismeretlen.

E fajnak csak egyetlen példányát ismerem Doroszlóról. Önállósága nem kétséges, legalább THORELL az idezett helyeken fajnak veszi, bár beismeri, hogy a nőstény ivarszerv szerint is alig különbözik az E. cingulatum nősténytől.

GEN. 4. NEM. HELIOPHANUS. C. K.

(ἥλιος = nap, φάινω = fényleni; a fénylő testfelületről.)

Syn. 1833. C. KOCH in Herrich-Schäffers «Deutschl. Ins. p. 119, 1. 2.

Vide: THORELL «On Europ. Spid.» p. 211.

Az első lábpárok másodvégizei tüskekké fegyverezettek. A harmadik szemsor két szeme nem áll távolabbra a fejrésztől, mint egymástól; a szemnégyyszög hátul kevésbé szélesebb; az első (alsó) sor szemei majdnem érintkezők, s a mélyen kivágott homlok szélét majdnem elérik. A fejmell szélességénél kétszer hosszabb, kissé magasló; oldalról tekintve hátvonala határozottan ívesen emelkedik.

Apró, sötétszínű, de élénken fénylő alakok, a melyek a verőfényt kedvelik, köveken, fatörzsökön tartózkodnak, folytonosan szökdécselnek s telepszámra szövik zacskóikat, úgy kövek alá mint repedésekbe is.

A bordás körmök — a Heliophanus cupreus I-ső labparján — kúcsuk, kampójuk horgos, fogacso-lásuk különböző; az egyik körömfélé rovidebb és sűrűbb, lásd: II. köt. VI. tábla 144. d.

SPEC. 1. FAJ. HELIOPHANUS CUPREUS. (WALCK.). REZES CSILLÁRPÓK. KUPFERIGE FLIMMERSPINNE

(cupreus = rezes; itt a fénylés minőségéről.)

Syn. 1802. *Aranca cuprea* WALCKENAER «Faun. Paris» II. p. 245 (salt. ad part.).

Vide: THORELL «Remarks» p. 399.

♀ Előteste fekete alapon zöldes-rezes zománczú pikkelyekkel borítva (rendesen lekopott); a hátsó szemek mögött egy haránt \cup vonal fehér pikkelyekből, a nyelecske felett szintén ily színű, páros vonalka. Végtestének felülete zöldes-rezes zománczú középterrel, melyben az ingödörök állásának megfelelő négy fehér foltocska, néha \wedge szerű vonalka látható, a végtest oldalalaiban egy fehér szalag, mely köröskörül fut. A végtest fehér rajzai különben igen változók; néha a fehér foltok enyészők, sőt hiányzanak is. A lábak s tapogatók kénsárgák, néha barnássárgák; néha a negyedik lábpár szára, belül, barna hosszesikkal.

A fejmell, felülről tekintve, majdnem párhuzamos oldalakkal, mellreszeben alig tángult, elől elvágott, hátul elkerekített; oldalról tekintve, a nyelecskétől ívesen emelkedik. A mellvért szélességénél kevéssel hosszabb, kissé domború, barna, sima. A rágók, oldalról tekintve, kissé hatratoltak, úgy hogy a homlok kiáll, majdnem hengeresek, barnák, a tapogató végizenel valamivel hosszabbak. Az állkapcsok barnák, az alajk elég széles, az állkapcsok felehosszát kissé felülmúlja. A tapogató sárga; szára és végíze mintegy össze-forrottak s az érintkezés helye a legvastagabb; a végíz alig rövidebb mint a térd és szár együttvéve. A lábak elég vaskosak; az első és második pár másodvégize, alul, két pár tüskevel, ugyane párok szárai, alul-kívül, egy vagy két sertetüskével. A végtest hossztojástad, módosan lapuló.

Az első (alsó) szemsor két középső szeme nagy, majdnem érintkezik; oldalszemei a középsőknek alig egy harmadát érik el s kissé feltoltak, úgy, hogy a sor alsó vonala kihajló; a második sor két szeme igen kiesiny s alig észrevehetőleg közelebbre esik az első mint a harmadik sorhoz; a harmadik sor két szeme az első sor oldalszemeinél nem kisebb s valamivel távolabbra áll egymástól, mint az első sor oldalszemei szintén egymástól.

A zár egy vörösbarna, majdnem köridomu, kissé domborodó térese, a légzőrés felől egy haránt-fekvő, keskeny, élénken barnászörös, gyantásszerű betettel.

Mértékek: 4 Törzs	6 $\frac{m}{\mu}$ ebből
fejmell	2.2 "
I labpar	3.2 "
IV "	4.9 "

♂ Kisebb; különösen a végteste az előtesthez kepest kicsiny. Labai barnassárgák, a czombok legnagyobb részben barnák; a többi iz, belül, hosszsesíkos. A tapogató sajátos berendezésű: czombja vastagodott, oldalt összenyomott, e szelesedés lefele terjed s egy egyszerű, vaskos, hátrafele és kevésse kihajló körömbé kifut; a térd hosszánál szelesebb; a szár vastagságánál és a térdnél hosszabb, alulról tekintve egy kigyózó hajlású, finom tüskét s egy erős, majdnem sarlóalakú körmöt visel; a pikkely a térdnél és szárnál hosszabb, keskeny; a nemzőrész egy majdnem háromszögletes, párnaszerűen dagadozó gyűjtőt mutat, mely felett a pikkely csücske messze kiáll, a gyűjtő külső oldalán egy rugószerű, vékony nyújtvány látható.

Mertekek, ♂: Törzs	4:3 $\frac{m}{m}$ ebből
fej mell	2:2 "
I lábpár	3:4 "
IV "	4:2 "

Messze elterjedett faj, mely az előhegysegbe is felnyomul s fűben, bokrokon, görgetegeken, fatörzsökön gyakori, a mellett tavasztól ősziig mindig kaplható; igen ügyes ugró es gyorsan mozogva halad. A verőfenyűt különösen kedveli, de azért a bokrok töven heverő száraz lomb között sem ritka. Finom szövetű apró zacsokot kis telepekbe rakja, neha résekre, neha kövek vagy tönkők alá.

Ismerem erdélyi részekből: Kolozsvárról, Mező-Záhról, Oláh-Fenesről, Gyekéből, Parajdrol, Nagy-Szebenből (Sill és Bergleiter gyűjtemény); magyar részekből: Doroszlóról, Apatinból, Pancsováról, Orsováról, Báziasról, Tokajból, Rakamazról, S.-A.-Ujhelyből, Alsó-Hámorból, Budapestről (Muz. gy. Pável és Frivaldszky János).

SPEC. 2. FAJ. HELIOPHANUS VARIANS. SIM. VÁLTOZÉKONY CS. VERÄNDERLICHE F.

(varians = változó; a szinről.)

Syn. 1869. *Heliophanus varians* SIMON «Monogr. des Attides» p. 682 (216).

♂ A megelőző faj alak-rokona. Simon szerint a *H. flavipes* Halm szomszédja, azonban más berendezésű tapogatóval. A tapogató czombja vastagodott s lefele irányozott nyújtványa nem egyszerű körmöt, hanem *villát* képez, melynek hátsó ága a rövidebbik; e nyújtvány egészen láthatólag hátrafele irányul; szára alig egy harmad rész olyan hosszú a milyen vastag s alulról egy hosszú, nyulánk, a végén hirtelenül és befele horgos nyújtványt boesát, mely előre irányozott; a nemzőszerv egy széles alaphól indulo, kúpszerűen csücsös gyűjtőt mutat.

A térdiz tojásdadra erősödött. Más hímeknél a szár nyújtványa hiányzik s a gyűjtő kevesebbe kúpos.

♀ Elöttem ismeretlen.

E fajt csak EUGÈNE SIMON auctoritására vettem be a Faunába, mint a ki oly szíves volt a *Heliophanus* fajokat szemle alá venni, s e ket, szerintem elege lenyegesen eltérő alakot, a «varians» névvel jelöle. E faj leírása (lásd az idezett helyen) nem volt elegendő kétségem eloszlatására. Saját leírásomat példányaimhoz szabtam.

Peldányaim Doroszlóról es Orsováról származnak.

SPEC. 3. FAJ. HELIOPHANUS KOCHII. SIM. KOCH CS. KOCHS F.

(vide: *Lioerannum Kochii*, *Nysticus Kochii*.)

Syn. 1869. *Heliophanus Kochii* SIMON «Monogr. d. Attides» p. 699 (233).

♂ Arany zomanczu: kicsiny. Tapogatójának czombja vastagodott, e vastagodás igen közel a czomb vegehez kétágu nyújtványt boesát, melynek ágai igen tetemesen (de kevesebbe mint a Simon rajza) szejjel-ágaznak, az egész nyújtvány amnyira hátra irányozott, hogy hátsó ága horogviszonyba jut a czomb alsó

vonalaival. A gyűjtő majdnem requalakra esuesos es oldalt irányult, föven két igen apró, kisse horgos nyujtvány látható. (Simon nem említi.)

Mertekek: ♂ Törzs 3 $\frac{m}{m}$ ebből
fejmell 1.5 »

E fajt SIMON ur auctoritására sorolom Faunánkba. Peldányom Orsováról való. A ♀ nem ismerem.

SPEC. 4. FAJ. HELIOPHANUS AURATUS. (C. K. ARANYOS CS. GOLDIGE F.

(auratus = aranyos; a fémlés jellegéről.)

Syn. 1848. *Heliophanus auratus* C. Koch «Die Arachniden» XIV, p. 54.

» 1869. — *Braniczkyi* SIMON «Monogr. des Att.» p. 684 (218).

♀ Aranylag szeles es magas, fekete előtesttel. Végteste aranyos pikkelyekkel borított; a has pikkelyei fehéressek, selymesen fenyők. A tapogató czombja barnás, a többi iz kénsárga. A labak legnagyobb részben barnak, végök fele világosodók, alsó felökről tekintve -- különösen az első pár — egy sárgás hosszcsikkal, mely a száron elesen határolt, a czombon és vegeken elmosódó.

A második szemsor két szeme láthatólag közelebb áll az alsó mint a hátsó sorhoz.

A zár egy harántfekvő, keskenyen vesecalaku terese, melynek — a légzőrés fele irányozott — homorúságában egy gyantaszerűen áttetsző, kis betet látható, mely a légzőrés felől be van horpasztva.

Mertekek: ♀ Törzs 5.3 $\frac{m}{m}$ ebből
fejmell. 2.6 »
I lábpar. 3.4 »
IV » 5 »

♂ Előteste magasra fölemelt, labai sötetebbek. Tapogatójának czombja módosan vastagodott s a czomb nyujtványa tetemesen hátra. föven az iz hátsó felebe elhelyezett, kétágas; a hátsó ág igen rövid, mind a két ág egy felig nyitott rakollóhoz hasonló; az egész nyujtvány láthatólag hátra irányozott; a terdiz vastagságánál nem hosszabb; a szár eltűnően rövidke s csak mintegy függelékét kepezi a hosszú pikkelynek; nemzőszerve módosan kidagadó, föven egy igen picziny esuesocska (ripacs) vehető észre.

Mertekek: ♂ Törzs 4 $\frac{m}{m}$ ebből
fejmell 2.3 »

E fajt Páncsováról es Szekes-Fehérvárról ismerem, az előbbi helyen tavaszi, az utóbbin őszi alak. Életmódja mint a Heliophanusoké általában.

GEN. 5. NEM. BALLUS. (C. K.)

(βόλλω = hajító, dobáló; a mozgásról.)

Syn. 1850. C. Koch «Uebersicht des Arach. Syst.» V, p. 68.

Vide: THORELL «On europ. Spid.» p. 212.

A fejmell szelessegenel alig hosszabb. A fejmell lelapított, felülete majdnem sík, a fejresz nagy es szeles. A harmadik szemsor két szeme sokkal távolabbra áll egymástól, mint a fej szeletől; a szemégyszög hátul szelesebb mint elől, a harmadik sor két szeme a fejmell hosszának felehez közel áll; az alsó szemsor a homlok szeletől meglehetősen távolságra esik.

♂ Simon az idézett rajzon a czomb nyujtványát úgy állítja elő, mintha az előlfelől éles derékszögben emelkednék, az én példányamon az nincsen meg.

E nemnek egyetlen fajat mint gyakori jelenséget ugyan, de csak barátságosan ismerem: fűben, de lehullott lomb alatt is előfordul s úgy látszik, hogy az árnyékot keresi.

A bordásköröm — a *Ballus depressus* I-ső lábparján — karsu, módosan kampós: az egyik fele bordatlan, a másik egyenetlen, apró fogacsokkal, lásd: II. köt. VI. tábla, 145 c.

SPEC. I. FAJ. *BALLUS DEPRESSUS*. (WALCK.). LAPOS, DÖCZÖGŐPÓK. FLACHE TROLLSPINNE.

(depressus = lenyomott; az alakról.)

Syn. 1802. *Aranca depressa* WALCKENAER «Faun. Paris» II. p. 242 (♀).

Vide: THORELL «Remarks» p. 370.

♀ Előteste fekete, megfekvő, sárgás szőrözettel, mely az alapszínt nem fedi el. Végteste szürkés földön vöröses barna rajzokat mutat, úgy, hogy a világos részek szőrösök, a sötétek kopaszok; a végtest hossza közepe táján két nagyobb, sötétes folt, ez alatt \wedge szerűen kikanyargó ágrajz; az oldalakra résüntös csikócskák hatolnak; hasfele barnászörös, szerfelett apró, gyér szőrözettel. A tapogató czombja és terde barna, szára és végíze világos sárgás. Az első lábpar szára és czombja vastagodott, legnagyobb részben barna, a végizek világos sárgák; a többi lábpar sárga, az ízek végei barna gyűrűfoltokkal.

A fej mell lapos, majdnem négyszögletes, mellrészében alig keveset tárgult; oldalról tekintve, hátvonala igen lapos-íves. A mellvért tojásdad, barna. A rágók kurták, oldalról tekintve, a homlok alá tolottak s kissé az állkapcsokra csapottak, barnák. Az állkapcsok sárgák, elég szélesek; az alajk barna, majdnem háromszögletes. A tapogató szára nem hosszabb a térdnél, végíze és szára kissé vastagodottak; a végíze bőven oly hosszú, mint a térd és szár együttvéve. A lábak rövidek és vaskosak, különösen a czombok fejlettek; az első pár különösen kivastagodott. Az első lábpar másodvégizén, alul, két pár — kivastagodott szárán, alul, szintén két pár tüske, az utóbbi sok szőr közé félig rejtve; a második pár szárán, alul, a belső oldalon, két tüske áll; a többi lábpar fegyvertelen.

A végtest szélességénél hosszabb, lelápitott, elől keskenyebb, mint hosszának második harmadában.

Az alsó szemsor két középső szeme nagy, nem érintkező és szép zöldes színben játszik; e sor két oldalszeme alig egy harmada a középsőnek s valamivel távolabbra áll a középsőktől, mint ezek egymástól, a sor alsó vonala kihajló; a második sor két szeme picziny s kétszernél is nagyobb távolságra áll a hátsó sortól, mint az alsó sor oldalszemeitől. A harmadik sor két szeme valamivel nagyobb az alsó sor oldalszemeinél.

A zár egy lencsealakú, *homorú* térese, mely a légzőrés felől egy harántfekvő, pálczikószerű lemezbe ütközik.

Mértékek: ♀ Törzs	4.4 $\frac{m}{m}$ ebből
fej mell	1.8 »
I lábpar	2.5 »
IV »	3 »

♂ Kurtább; rövidebb végtesttel, egészen sötétszínű. Az első lábpar aránylag roppantúl fejlett, vaskos, sötétbarna; végizei sárgák; a többi lábpar barnászárga, sötét gyűrűfolttal. A fej mell felülete durván szemeses. Tapogatója végig barna, czombja nem vastagodott; terde vastagságánál nem hosszabb, szára igen kiesiny, hosszánál kétszer vastagabb; pikkelye hosszú, keskeny, módosan szőrös; nemzőszerve egyszerű: oldalról tekintve tövén jobban mint végén kidagadó.

Mértékek: ♂ Törzs	3.5 $\frac{m}{m}$ ebből
fej mell	1.7 »

Mint tavaszi és nyári alak nem ritka: ismerem erdélyi részekből: Kolozsvárról, Tordáról (Tordai hasadék); magyar részekből: Doroszlóról, Apatinból, Palánkaról, Páncsovaról, Tokajból, Rakamazról, Szekes-Fehervárról, Budapestről (Muz. gy. Frivaldszky), Nagy-Váradról (Muz. gy. Mocsáry).

GEN. 6. NEM. MARPESSA. C. K.

(Μάρπσσα = görög név.)

Syn. 1846. C. Koch sub *Marpissa* «Die Arachniden» XIII, p. 56.

Vide : THORELL «On europ. Spiders» p. 213.

A fej mell nincsen kétszer oly hosszú, a milyen széles; lenyomott, majdnem sík felületű. A törzs elég hosszú, lapos (néha a végtest igen keskeny). A harmadik szemsor két szeme távolabbra áll egymástól, mint a fej szélétől. A szemnégyyszög hátul alig vagy nem szélesebb mint elől. A harmadik szemsor messzire az előtest hosszának fele előtt elhelyezve. Az alsó sor szemei között tetemes közök, e sor középsői a homloknak alig kivágott szélétől oly távolságra esnek, mely átmérőjük egy harmadának megfelelő.

Erős alkotású, kitünően ugró alakok, a melyek színezet szerint a tartózkodási helyekhez néha kitünően alkalmazkodnak, szeretik a verőfényt, kerítéseken, fatörzsökön, bokrokon és a nádakon nem ritkák, erős, egy kijáratu burkaikat résekbe vagy a nádak bojtjaiba szövögetik, hol a nőstények a petéket is lerakván, azoknak kikelését bevárják. Látóképeségök igen éles.

A bordáskörmök a különböző lábpárokon, legalább a *Marpessa muscosa*-nál, különbözőek; a kivastagodott első lábpáréi kurták, igen vaskosak, kutyakörmökre emlékeztetők, keves bordáik rövidkék és tömönten sorakozottak; a negyedik lábpáréi hosszúk, karesűk, közepök táján szélesedők, tövüknél is hajlottak, módosan kurtakampósak; az egyik körömfel sűrűbb, a másik ritkább fogacsolással, lásd: II. kötet, VI. tábla, 146 c, d.

SPEC. 1. FAJ. MARPESSA MUSCOSA. (CL.), MOHOS MARPESSAPÓK. MOOSIGE MARPESSASPINNE.

(muscosa = mohos; az előtest szőrözetéről — «pectus glaucum ut muscus sepimentorum inveteratus, CLERCK».)

Syn. 1757. *Araeus muscosus* CLERCK «Aran. Suec.» pag. 116.

Vide : THORELL «Remarks» p. 367.

♀ Előteste barnás, barnasárgával és fehéressel elegyes. Végteste barna földön fehérrel, feketével és vörösesbarnival olyformán elegyített, hogy némi csipkesszelű középsáv (hosszában) észlelhető; hasfele világos. Az első lábpár hatalmasan nekierősödött; barna, sárgással elegyes; a többi lábpár barnássárga, a czombokon terjedelmes barna folttal, a többi ízeken barna gyűrűzettel. A homloknak szemalatti része hosszú, testszín szőrökkel borítva, az alsó sor két nagy szeme rókavörös, néha tüzes szőrkarikába foglalva.

A fej mell erős, lapos; majdnem párhuzamos oldali; szélessége körülbelül két harmadát teszi a hosszúságnak; oldalról tekintve, a hátvonal hátul lekerekített, felül majdnem vízszintes, kissé előre lejtő; barna földön fehéres és vörösesbarnás, elfolyó, megfekvő pikkelyekkel borított; gyér és felálló szőrökkel. A mellvért tojásdad, aránylag kicsiny, barna; hosszú, fehéres szőrökkel borított. A rágók kurták, vaskosak, harántul kissé behorpasztottak, vörösbarnák, gyéren álló, hosszú, fehéres szőrözettel. Az állkapcsok vörösbarnák, szélesek, elől elkerekítettek s kissé széjjelállóak; az alajk hasonló színű. A tapogató kurták, fegyvertelen, igen szőrös; a szőrözet szárán és végizen kétsoros (úgy mint a mókus-farka), úgy, hogy az ízek lapítottaknak látszanak; a tapogató színe vöröses sárga, barna foltokkal, szőröze fehéres. A lábak vaskosak, pikkelyekkel, gyéren és elálló szőrökkel borítottak. Az első pár czombja és szára igen vastagodott; a szárán, alul, három - a másodvégizen, alul, két pár erős, vaskos, rövid tüske; a második pár hasonló ízein ugyanily fegyverrel; a többi lábpár szárain, alul, néhány gyenge tüske, másodvégizeiknek csücsán pereszlenyszerűen elrendezett néhány gyenge tüske.

A végtest hosszú, kissé lenyomott, hátul eszesbe kifutó; említett színezete bagolyszerű elegyítésre emlékeztet.

Az alsó szemsor két középső szeme igen nagy (száritott példányoknál határozottan kivethető bogárral), egymáshoz közelebb, mint az oldalszemekhez; az oldalszemek alig egy harmad részét teszik a középsők

nagyságának s annyira feltoltak, hogy a sor alsó vonala erősen, felsője módosan kihajló; a második sor két szeme apró s annyira áll az alsó, mint a hátsó sortól; a harmadik sor két szeme akkora, mint az alsó sor oldalszeme s alig áll távolabbra egymástól, mint az alsó sor oldalszeme szintén egymástól; de sokkal távolabbra egymástól, mint a homlok (fej) széletől.

A zár egy köldökszerű emelkedés, mely közepén legsötétebb barna s itt egy, szélességénél hosszabb, egyenetlen szélű nyílást mutat.

Méretekek: ♀ Törzs	12	$\frac{m}{m}$ ebből
fejmell	4.5	»
I lábpár	7	»
IV »	8.8	»
(legnagyobb példány).		

♂ Kisebb, karesőbb, a nőstényhez hasonló színezetű; a végtest rajza azonban élesebb, közepén \wedge szerű barna ágrajzokkal, a melyek egy közös szárból indulnak. A tapogató kurt; pikkelye, felülről tekintve, szélesen szivalaku; szára rövidebb a térdnél s külső oldalából egy erős, macskakörömalakú, hajlasi és élű, előre is befelé irányozott, sötétbarna körmöt bocsát, melynek csúcsa két tompa nyújtvány közé esik, a mely a nemzőszerv tövéből indul; a nemzőszerv, oldalról tekintve, kúscma-alakú, jól kiálló barnássárga.

Méretekek: ♂ Törzs	7	$\frac{m}{m}$ ebből
fejmell	3.3	»
I lábpár	5.7	»
IV »	5.9	»

Nyári alak, mely a régi, bebarnult palánkokat, karókat es ezölöpöket előszeretettel lakja; de regibb erdővagások tönkein is előfordul, a verőfenyt keresi, ügyesen ugrik, messze lát s immitált színezetével ügyesen kerül ki a gyakorlott szem figyelmét. Mozgása gyors; de sokszor meg-megáll, előtestével ágaskodik s forogva szertenéz; üldözés elől gyorsan s ügyesen menekül a deszkák közeibe, résekre.

Messze elterjedett faj, mely az előhegységben is előfordul.

Ismerem, erdelyi részekből: Szász-Vesszősről, Kolozsvárról, Mező-Záhról, Olahfenesről, Szebenből (Sill és Bergleiter gyűjteménye); magyar részekből: Doroszlóról, Apatinból, Pancsováról, Ogradena (Mragonya-völgy vágásai), Alsó-Hámorból, Ungvárról (Múz. gy. Vidra Ferd.)

SPEC. 2. FAJ. MARPESSA RADIATA (GRUBE) CSÍKOS M. GESTREIFTE M.

(radiata = sugaras, csíkos; a lábak rajzáról.)

Syn. 1859. *Attus radiatus* GRUBE «Verz. der Arachn. Kur-, Liv- und Esthlunds» p. 471. (37).

1861. — *strigipes* WESTRING «Ar. Suecice» p. 551.

1865. *Euophris radiata* OHLERT «Arachnol. Stud.» p. 10.

1867. — — — OHLERT «Aran. der Prov. Preussen» p. 162.

1871. *Marpissus radiatus* SIMON «Révis. d'Attides» p. 218. (4).

Vide: THORELL «Remarks» p. 368, 375, 423, 580.

(X. tábla, 211 a ♀ nagyítva, 212 a ♂ nagyítva, 213 a ♀ zárja, 214 a ♂ tapogatója oldalról, 215. u. a. nemzőszerve alólól.)

♀ Alapszíne — első tekintetre — sárgás. Fejmelle fehéres-sárgás és vöröses pikkelyekkel elegyesen fedett; végteste sárgás, elején neha két enyésző, vöröses csíkkal (borszeszben a fejrész barnafekete, a végtesten két fekete hosszcsík.)

Var. a) A végtesten a két fekete hosszcsík enyészett, vagy egészen hiányzik.

Var. b) A végtest két hosszcsíkja apró, rhombos foltokra szakadozott (♀ junior).

Borszeszben a fekete fej mögött két világosodó folt látható. A lábak sárgák; fegyverzetek es serteik barna foltokból indulnak, e foltok neha enyésző csíkokká alakulnak. Az első lábpár vastagodott.

A fejmeleg jól fejlett; oldalról tekintve, egyenes hatvonala hátul meredek ívesen hajlik a nyelecskére; mellresze alig tágult. A mellvért kicsiny, tojásdad, közepén sárga, szélein finom barna szegélylyel, különben fehéres szőrözött. A rágók rövidek, vörössárgák, fehéres szőrözött. Az állkapcsok és az alajk vörössárgák. A tapogató sárga, szára és végíze bőven, hosszú, fehéres szőrökkel fedett. Az első lábpár szára, alul három pár és oldalt még egy tüskével — másodvégíze, alul, két pár erős tüskével; a második pár szára, alul, öt tüskével, másodvégíze két párral; a harmadik és negyedik pár szárán, alul a végén, egy pár — másodvégíze végén pereszlenformára néha 4—5, néha 2 tüske.

Az alsó szemsor két középső szeme nagy, zöld tűzben ragyog s vöröses körrel kerített; a homlok-nak szem alatti része tömötten álló, elenken világos sárga szőrözettel teljesen borított; e sor két oldalszeme egy harmadát teszi a középsőknek s ezektől valamivel távolabbra áll, mint azok egymástól; a második sor két kis szeme valami kevéssel távolabbra áll a harmadik, mint az alsó sortól.

A végtest hosszú, közepén kisse tágult s alig lenyomott, hátul eszesos.

A zár egy vöröses-sárga, kis emelkedés, melynek legzöresfelőli oldalán két sötétbarna, apró 2 c szerű dudorka látható.

Mertekek: ♀ Törzs	10	$\frac{m}{m}$ ebből
fejmeleg	3.7	»
I lábpár	5.8	»
IV »	6.5	»

♂ Kisebb, karesű; vastagodott és hosszúra fejlett első láppárral. A lábak sárgák sok barnával, a barna szín elesrajzu, többnyire párosan futó hosszúsíkokat képez.

Az ékalakú, keskeny végtest felülete tiszta haragos-sárga, elenk selyemfenynyel; közepén és végig egy elenken vörös csikkal. A fejmeleg, mint a nősténynél.

Var. ♂) A végtest elenk-vörös s egy sárga ágrajz által több rhomboicus teresekre osztott (♂ junior).

A tapogató sárga; pikkelye szélesen szívalakú, elegge domború; száríze vastagságánál rövidebb, külső oldalán egy nyulánk, tompavégű oldalt és előre irányozott, vékony, barna nyujtvánnyal; a pikkely tövéen, külső oldalán (alulról tekintve) egy rövidke barna fogacs, mely a szár nyujtványával szemközt áll, a nemzőszerv egy kocsonyas kinezesű, süvegyszerű, tetemes dudorodás, mely tovább, elől, egy kifele kanyarított, vékony, barna nyujtványt bocsít.

Mertekek: ♂ Törzs	7	$\frac{m}{m}$ ebből
fejmeleg	3.2	»
I lábpár	7.4	»
IV »	6.3	»

A Grube-fele leírás felületessége s azon körülmény folytán, hogy a típusok elvesztek, e faj sok zavarra szolgáltatott okot. A magyar ♀ példányok után sem THORELL sem KOCH nem ismerte fel, mert mindaddig a ♀ tökéletesen ivarérett állapotban nem volt kellőleg ismertetve. SIMON azonban határozottan annak álltá. A faj eldöntése főleg a ♂ példányon fordult meg s megfeszített igyekezetemnek sikerült ♂ példányokat Doroszló nádjaiban keríteni. A hím a mellett tanúskodott, hogy teljesen egyezik az «*Euophrys radiata* Ohlert» azon példányaival, a melyeket Ohlert THORELL tanárnak ajándékozott. Ez a körülmény eldönté a fajt. THORELL tanár szavai szerint: «stimmt genau mit Original-exemplaren von *M. radiata* Ohlert überein; die Weibchen müssen dann auch wohl zu dieser Art gehören.»

Mint tavaszi, nyári, őszi és teli alakot a nádasokból ismerem, hol a nádbojtokat lakja, melyeknek szírmait zaeskövű szövű, e zaeskövű finom, tömött, hófehér szövettel kikárpitozza.

A nádbojtokban képezett e csomók már messziről feltűnnek. Itt rakja le a nőstény peteit is (38—40) s bevárja a fiak kikeleset. Ivarérett és harmadvedlesű alakok télen át is találhatók, a teli alom egy nemebe merülve.

Ismerem, erdélyi részekből: Mező-Zsáról; magyar részekről: Doroszlóról, mind a két helyen igen bőven található. A hímek igen ritkák.

SPEC. 3. FAJ. MARPESSA POMATIA (WALCK.) ALMAZÖLD M. APFELGRUNE M.

(pomatia = almazöld; az alapszínéről)

Syn. 1825. *Attus pomatius* WALCKENAER «Aran. de France» p. 26.1869. *Marpissus* — SIMON «Monogr. des Attid.» p. 19. (9).1869. — *monachus* SIMON, ibidem. p. 23. (13).

Vide: THORELL «Remarks» p. 368, 369. (in § Marpessa radiata).

♀ A törzs alapszíne (felülről) fekete; az előtesten fehéres és tüzes pikkelyek elfolyva elegyednek egymás közé, igen finomak s mintegy deresen borítják a tért. A végtest közepén végig egy keskeny, almazöldesbe (borszeszben fehérbe) játszó lándzsafolttal, inkább hosszsesikkal; ettől kétoldalt, az oldalakban is, fehéres és vöröses pikkelyek váltakoznak, a nélkül, hogy az alapszín elfednék; a pikkelyzet fénylő, de nem érezes zománczu; a has fekete; apró, gyéren álló, fehéres pikkelyekkel. Az első lábpár erősödött, világos barnás-sárga, barna foltokkal s vonásokkal, melyek helyenközön hosszsesík jellegét öltönek; a többi lábpár hasonló alapszínű, helyenközön kissé szakadozott barna hosszsesikkal.

A fej mell szélessége három negyedét teszi a hosszúságnak. A mellvert szeleín szélesen barna, közepén világos. Az állkapcsok és alajk vegei világosak. A rágók sárgás barnák, rövidek; fehéres, gyéren álló szőrökkel. A tapogató sárga, kevés barnás ponttal; hosszú, pereszleyszerűen körül- és elálló fehéres szőrözettel.

Az első lábpár szárán, alul négy, másodvégizén, alul két pár erős tüske; a második lábpár szárán, alul rendszeren csak öt tüske, a hátsó páratlan; valamennyi czomb felületén erős sertetüskék allanak; az első páren, elől a végén, három ilyen együttesen.

A végtest kevésbé lenyomott, hosszú, csuesos.

Az alsó szemsor két középső szeme pompás zöldes tűzben ragyog; alatta a homlok fehéres, hosszú szőrökkel takart. A második sor két apró szeme valamivel közelebbre áll az alsó, mint a hátsó sorhoz.

A zár egy barna, kissé harántránczos terese, melynek hátsó (légzőrés felőli) szélén egy kis nyílás látható, melyből egy fényes dudorka kissé kidomborodik.

Mertekek: ♀ törzs	10·5 $\frac{m}{m}$ ebből
fej mell	3·4 »
I. lábpár	6·5 »
IV »	6·7 »

♂ Ékalaku kisebb végtesttel, melyen a lándzsafolt hiányzik, ellenben a fehéres és vöröses pikkelyzet több és élénkebb, mint a nősténynél. Lábai erősek, az első pár a többinél vaskosabb. A tapogató kurt, vöröses sárga; pikkelye sajátágosan széles levelalakú, lapos és hajlott; szára a térdnél rövid-bb; külső oldalán egy kifelé s kissé előre irányzott, egyenes, tompa és gyenge nyujtvány áll, mely a hosszú szőrözettel által némileg borítottatik; a nemzőszerv (belülről oldalról tekintve), hátsó feleben világos, kúszma-szerű, elől barnult s itt egy felhajló, hosszú, finom tüskét visel.

Mertekek: ♂ Törzs	7·5 $\frac{m}{m}$ ebből
fej mell	3·4 »
I lábpár	7·1 »
IV »	6·9 »

SIMON jegyzése szerint, a leírt alak a voltakeppenű «pomatia Walck» fajnak változata; én azt tartom, hogy ugyan az, a melyet SIMON az idézett helyen «monacha» név alatt új faj gyanánt közölt volt.

Mint tavaszi alakot csupán csak Palánkáról, Apatinból és Pancsováról ismerem; mind a három helyen eleven bodzafasövényekről, melyeknek levelein e pókok a verőfényen vadászgattak, gyorsan mozogtak s üldözös ellen a levelek alá rejtőztek. Friss állapotban a végtest lándzsafoltja almazöldesbe játszik s talán erre vonatkozik Walckenaer adta fajneve (?) is.

SPEC. 4. FAJ. MARPESSA ENCARPATA. (WALCK.). KEZES M. HAND M.

(encarpata, talán *ἔν* és *σαρπαστα*, mi bizonyos mimikus tánczra vonatkozik s a mozgásra czélozva.)Syn. 1802. *Aranea encarpata* WALCKENAER «Faun. Par.» II. p. 241.

Vide: THORELL «Remarks» p. 370 (in §. M. museosa).

♀ Keskeny, nyújtott kisebb alak. Az első lábpár igen csekély mértékben erősödött. A fejmell alapszíne sötét s a fehéres, kevés barnással és vörössel elegyített pikkelyzet d érszerűen lepi el; szélein a fehér pikkelyek szegélylyé sűrűsödnek; a homlok szem alatti része fehér. A végtest felülete sötét, közepén végig egy, fehér pikkelyekből álló, láncszerű, keskeny rajz vonul; az oldalak és a has világosak sok fehéres pikkelyvel. A lábak barnasárgák, sok bebarnítással s gyűrűfolttal; fehér szőrözettel.

A fejmell kicsiny, nem épen széles, mellrészében alig águló; oldalról tekintve, hátvonala egyenes, hátul ívesen lekonyuló. A mellvert hosszukás, barna, fénylő, gyéren álló fehéres szőrözettel. A rágók vörös-barnák, ránczosak, de fénylők, néha gyengén zománczosak; nem éppen vaskosak. A tapogató sárgás, szára es végíze — különösen oldalt — hosszú, fehér szőrözettel; végíze oly hosszú, mint a térd és szár együttlve.

A lábak rövidék; a két első párnak különösen czombja vastagodott; az első pár szára módosan vastagodott.

Az első lábpár másodvégizén alul, két pár igen apró tüske; szárán alul néha egy, néha semmi tüske, a többi láb fegyvertelen (a negyedik pár másodvégíze csúcsán néha egy sertetüske).

A végtest hosszú, keskeny, hátul csucsodó, majdnem hengeres.

A szemnégyyszög hosszánál szélesebb; a második sor két apró szeme körülbelöl annyira esik az alsó sor oldalszemeihez, mint a harmadik sorhoz.

A zár egy vörösbarna térese λ szerű, kurta nyelű osztólemezzel, melynek hónaljaiban két sekély benyomás látható.

Mértékek: ♀	Törzs	7·3 $\frac{m}{m}$ ebből
	fejmell	2 »
	I. lábpár	2·8 »
	IV » 	3·2 »

♂ Kisebb; más színezetű. A törzs alapszíne szép sötét dohánybarna. A fejmell közepén egy fehér hosszcsík, mely a szemtérese mögött kezdődik, de a nyelecskét nem éri el; az oldalakban egy-egy finom fehér szegély. A végtesten végig, közepétől két oldalt () szerűen két fehér hosszcsík; a has közepe barnás, oldalai szennyesfehérek. Az első lábpár barna, hosszú és vastagodott; másodvégizén, alul, két pár rövid tüske, szárán, alul, a belső oldalon, egy tüske. A tapogató kurta, pikkelye kanalakú (nem szélesedett), szára nem hosszabb a térdnél, külső oldala végén egy kurta, vaskos nyújtvánnyal; a nemzőszerv, alulról tekintve, jól kidomborodik, barna, göcyszerű; töve belső oldalából egy finom, hosszú tüske indul, mely a pikkelybe befekszik s oldalról nem látható.

Mértékek: ♂	Törzs	4·7 $\frac{m}{m}$ ebből
	fejmell	2·1 »
	I. lábpár	4·3 »
	IV » 	4·6 »

E fajt, mint tavaszi alakot leginkább gyümölcsfák kérge alól ismerem, hol telepszámra szövögeti burkait s ugy e tulajdonsággal, mint alakrokonságával is közel áll az *Epiblemum* nemhez, melytől azonban lábfegyverzete elkülömti.

Ismerem, erdélyi reszekből: Szász-Vesszősről; magyar reszekből: Doroszlóról, Újvidekről és Veszprémből.

SPEC. 5. FAJ. MARPESSA CANESTRINI. PAVESI (?) (NINI?) CANESTRINI M. CANESTRINIS M.

(Canestrini, jeles olasz Araneologus tiszteletére.)

Syn. 1869. *Marpissa Canestrinii* PAVESI «Aran. Italiani» in Atti della Soc. italiana di Scien. Naturali» XI, 3, p. 129.

♀ Hosszú, nyulánk alak, aránytalanul fejlett első lábpár; pompás aranyfényben ragyogó rajzokkal. A fejmell szemtéresége fehér és aranyos pikkelyekkel elegyesen borított, a mellrész fehér (alapszíne fekete). A végtest közepén végig egy hófehér lándzsafolt, mely kétfelől színarany közé van foglalva; az arany szegély az oldalak felé két-három széles ágat bocsát, melyeknek közei bárszínűfeketék. Az oldalak és a has szennyesfehérek. Az első lábpárnak különösen térde és szára bebaráncított; a többi lábpár sárga.

A fejmell jól fejlett, szélességénél bőven másfélszer hosszabb, oldalról tekintve az egyenes hátvonal hátul laposívesen a nyelecskere hajlik. A mellvért barnás sárga, finom barna szegélylyel, kicsiny és körded; szőrözete hosszú. A rágók rövidek, elég vaskosak, vörösbarnák, tövük részben a homlok hosszú, fehéres szőrözete által fedett. Az alajk és az állkapcsok vöröses barnák. A tapogatók sárgák, végzük és száruk fehéres, hosszú szőrözettel. Az első lábpár vaskos, hosszú, erős fegyverzetű; másodvégizén két pár erős tüske; szárán, alul, a külső oldalon négy apró, a belső oldalon öt hosszú, erős tüske, az utóbbiak közül a két hátsó tüske egymás mellett és nem egymás mögött áll; a térd belső oldalán szintén egy — a czombon, elől, három tüske egy csoportban; — a második lábpár nem vastagodott; szárán, alul, öt tüske, másodvégizén két pár tüske.

A végtest hosszú, keskeny, csúcsos, nem épen lenyomott.

Az alsó szemsor két középső szeme igen nagy s annyira egymástól, mint az alig egy negyedrészes nagyságú oldalszemektől; az alsó oldal- és a második sor szemei alatt két-két felálló, fekete serte-cset; a második sor két apró szeme az alsó és hátsó sor között középen áll.

A zár barnás, köldökszerűen kiemelkedő s a légzőrés felől egy szívalakú kis nyílást mutat.

Mértékek: ♀	Törzs	11	$\frac{m}{mm}$ ebből
	fejmell	4	»
	I lábpár	8	»
	IV »	6·8	»

♂ Valamivel rövidebb (sokszor aránytalanul kicsiny); még feltünőbbre fejlett első lábpárral. Fekete, az előtestben gyéren álló aranyos pikkelyekkel; végtestének felülete egészen aranyozott, közbe-közbe gyéren álló fekete sertékkal. A lábak füstbarnák, a nőstényéhez hasonló fegyverzetű. A tapogató nyulánk, pikkelye nem feltűnő; szára a térdnél valamivel rövidebb s külső oldala csúcsán egy sarlóalakra hajlott körömmel fegyverzett; nemzőszerve fekete, egyszerű, majdnem hengerded, kevésse kidomborodó, hátsó vége kúpos és a pikkely tövén kissé túl terjedő.

Mértékek: ♂	Törzs	10	$\frac{m}{mm}$ ebből
	fejmell	4·4	»
	I lábpár	10	»
	IV »	8·9	»
Nekki:	Törzs	6·5	»
	fejmell	2·7	»
	I lábpár	4·5	»
	IV »	4·7	»

E pompás pók úgy látszik a nádasok lakója, hol verőfényen a nád és sás levelein vadászat. Ritka. Eddig mint a nádás lakóját csupán csak Doroszlóról és Apatinból ismerem, mint nyári és tavaszi alakot, s úgy tapasztaltam, hogy a fényes Domatiakkal mimikeri viszonyban áll. Eredetileg Olaszországból lett ismertette.

GEN. 7. NEM. DENDRYPHANTES. (C. K.).

(δένδρηνον = fatörzs, δρυάκης = takács; a lakásról.)

Syn. 1837. C. KOCH «Übers des Ar. Systems» I. p. 31, (ad partem).

Vide: THORELL «On europ. Spid.» p. 214.

A harmadik sor két szeme távolabbra esik a homlok elejétől, (szelétől) mint egymástól. A fejmell közkaszerűen igen kimagasló; a fej lapja előre felé annyira menedekesen lejtő, hogy a harmadik szemsor sokkal magasabban áll az első sor oldalszemeinel.

Az alsó szemsor kissé kihajló, középsői a kivágott homlokszéltől oly távolságra esnek, mely egy szem felátméréjének megfelel. A hátsó lábpárok másodvégizei pereszlenformára állított tüskékkel fegyverezettek. A test hosszabb szőrözettel borítva.

A bordáskörmök nyújtottak, jól kampósak; a Dendryphantes bilineatus I-ső lábpárján az egyik körömfel csak három nagyobb, a másik több kisebb, de egyenetlen bordát mutat, lásd: II. k. VI. tábla 148. d

SPEC. 1. FAJ. DENDRYPHANTES BILINEATUS. (WALCK.). KÉTSÍKOS LEJTŐPÓK. ZWEISTREIFIGE SCHWUNGSPE.

(bis, linea = kétszer, vonal; a végtest fehér rajzárol.)

Syn. 1837. (?) *Attus bilineatus* WALCKENAER «Hist. Nat. des Ins. Apt.» I. p. 405.1869. *Dendryphantes bilineatus* SIMON «Monogr. des Att.» p. 635, (169).

♀ Barnásfekete; a fejmellen egy finom, fehér középsík, mely a nyelecskét nem éri el, két oldalt hasonló két csik, mely a fej lapját szegélyezi s a mell közepe táján kissé összehajlik, de nem érintkezik; a végtesten két hófehér, finom csik, mely nem éri el a végtest elejét, a fonók felett pedig egymásfelé közeledik. A has és az oldalak szemnyesfehérek. A lábak sötétsárgák barnával, csipőik tiszta rozsdasárgák.

A fejmell, oldalról tekintve, a nyelecskétől meredeken emelkedik; magas; a szemtér előre lejtő, sok sárgásfehér pikkelylyel, melyből sok hosszú, erős szőr áll ki. A mellvert fekete, kevés fekete szőrökkel. A rágók barnásfeketék, vaskosak, bőven oly hosszúk, mint az első lábpár szára; kevés fehér szőrökkel. Az állkapcsok barnák, világosodó szélekkel. A tapogató rozsdasárga fehér szőrözettel s némi elmosodó gyűrűzettel; végíze oly hosszú mint a térd és szár együttve. A lábak közül az első pár a legvaskosabb; szárán, alul, öt, belső oldalán három tüskével, másodvégizen, alul, két pár, belső oldalán még két tüskével, a második lábpár hasonló helyen kevesebb tüskével; a negyedik lábpár szárán, alul, két pár, belső oldalán három tüske; másodvégizen, úgy a végén, mint köröskörül hosszában is pereszlenformára elrendezett több tüske.

A végtest tojásdad, vastag, kissé csúcsosodó véggel; pikkelyzete sárga, mi az alapszínnel barnafeketes kinezést eszközöl.

Az alsó szemsor kihajló; két középső szeme nagy, megközelített, részben — különösen alulról — tűzszű pikkelyekbe foglalt; az alatta elterülő homlok s felette a fej széle sárgásfehér; e sor két oldalszeme fele nagyságát éri el a középsőknek s távolabbra áll tőlük mint azok egymástól.

A második sor két apró szeme az első és harmadik sor között a közepet tartja. A harmadik sor tovább áll az alsó sor középsőitől mint egymástól s valamivel távolabbra egymástól, mint az alsó sor oldalszemei szintén egymástól.

A zár egy szemnyesbarna, szélességénél hosszabb terese, mely kétfelől sekélyen esatornás.

Mértekek, ♀ : Törzs	9	$\frac{mm}{mm}$ ebből
fejmell.	3.5	»
I lábpár	6.8	»
IV »	7.4	»

♂ Elöttem ismeretlen.

E fajt Erdelyből Kutyalváról és Magyarországból Palánkaról ismerem, igen keves példány után. Mindig füves helyeken találtam. SIMON Lengyelországból idézi. *Dendryphantes* volta előttem kétes, mert hátsó lábpárjainak másodvégizei nemcsak végeiken tüskések. Azonban úgy THORELL, mint SIMON a «*Dendryphantes*» jelzés ellen nem tettek kifogást.

SPEC. 2. FAJ. *DENDRYPHANTES MUCIDUS*. (C. K. PENÉSZES LEJTŐPÓK. SCHIMMEL. SCH.

(mucidus = penészes.)

Syn. 1846. *Dendryphantes mucidus* C. KOCH «Die Arach.» XIII, p. 86. Tab. 446. fig. 1149.

♀ «Elötteste fehér, rozsdabarna fejtetővel és egy ilyen hosszúsággal oldalt a szemek alatt; végteste a hátfelen rozsdabarna, az mgódrók szerint elhelyezett négy fehér ponttal; oldalai rozsdavörösek; tapogatója vörössárga; labai rozsdavörösek, fekete gyűrűzettel. Törzse $7 \frac{m}{m}$ ».

KOCH C. szerint Dr. Rosenhauer (Erlangen) a «Bánságból» hozta. Közelebből nem ismeretes.

GEN. 8. NEM. *EUOPHRYS*. (C. K.).

($\epsilon\beta$, $\delta\phi\rho\acute{o}\varsigma$ = szemöldök; a kiálló homlokról.)

Syn. 1834. C. KOCH in Herrich-Schaff «Deutschl. Ins.» 123. 7. 8. (ad partem.)

Vide: THORELL «On europ. Spiders.» p. 215.

Az első lámparok másodvégizei tüskések. A fej mell magas, elől nem keskenyedő, oldalról tekintve ivesen emelkedő. A harmadik szemsor két szeme valamivel továbbra egymástól mint a fej szeptől. A szemnegyszög elől-hátul egyenlő szélességű. Az alsó szemsor szemei érintkeznek; a középsők oly távolságra állanak a homlok szeptől, mely átmérőjük egy negyedét nem haladja meg. A végtest rajzai a bőrtől s nem pikkelyektől erednek.

SPEC. 1. FAJ. *EUOPHRYS FRONTALIS*. (WALCK.). HOMLOKOS BIGEPÓK. GESTIRNTE BALLSPINNE.

(frontalis = homlokos; a kiugró homlokról.)

Syn. 1802. *Aranca frontalis* WALCKENAER «Faun. Par.» II, p. 246. ♂.

Vide: THORELL «Remarks» p. 404.

♀ Füstbarna. Feje teteje fekete, elejen kevés sárgás pikkelyekkel. Végtesten egy tobbretű Λ szerű világos ágrajz. Labai szennyes-barnássárgások. Kicsiny.

Fejmelle kockásan magasra felemelt, elől elvágott; széles; oldalról tekintve a nyelecsketől reszütösen, majdnem egyenes vonalban emelkedik, háta laposíves. A mellvert tojásdad, keskeny, szennyes barna-sárga, kevés szőrözettel. A rágók messze a homlok alá tolva, rövidek, szennyes barna-sárgák. Az állkapcsok barna-sárgák, széleik fele elmosódva világosodók, szélesek, elkerekítettek; az alajk keskeny, elől elkerekített, az állkapcsok fele hosszát nem éri el. A tapogató czombja, térde vékony; szára és végíze kissé vastagodott, — terde, szára és végíze majdnem egyenlően rövidek. Labai elég hosszúk; az első pár szárán, alul, három — másodvégizen alul két pár karsu, elég hosszú tüske; a harmadik és negyedik lámpár száran és másodvégizen, alul és oldalt is keves karsu tüske.

A végtest tojásdad, a végen kiálló fonók következtében csúcsos.

A alsó sor szemei érintkeznek ; igen finom szennyessárgás korokba foglaltak ; a második sor két apró szeme annyira áll az alsó mint a hátsó sortól.

A zár, ifjabb példányomon, meg nem öltött határozott alakot.

Mértekek, ♀ : Törzs	4.4 $\frac{m}{m}$ ebből
fejmell	2 »
I lábpár	3 »
IV »	3.5 »

♂ Elöttem ismeretlen.

Egyetlen példányomat, mint tavaszi alakot, Doroszlóról, retről ismerem.

GEN. 9. NEM. PHILAEUS. THORELL.

(*Φιλαιος* = görög név.)

Syn. 1870. THORELL «On europ. Spiders.» p. 37, et 217.

A harmadik sor szemei távolabbra a fej szeptől mint egymástól. A fejmell magas, fejeresze előre lejtő, úgy hogy a harmadik szemsor magasabban áll az elsőnél. A rágók, előlről tekintve, az arez magasságnál legalább másfélszer (a himmel kétszer) hosszabbak. Az alsó szemsor módosan kihajló, szemei szétvetettek, a középsők a kivágott es gyeren szőrös homlok szeptől oly távolságra, mely fel átmerőjüknek alig felel meg. A lábak hosszacsakák.

E nemnek egyetlen képviselője jelesen a meszes hegységet s ott a görgetegeket lakja ; kedveli a verőfényt, elenk mozgású ügyes ugró.

A bordáskörnök hosszuk, meglehetősen kampósak ; az I. lábpáron az egyik körömfel ritkább, a másik sűrűbb bordázattal ; a talpceset különösen tomott, inkább bunkósodó mint lapiczkas szőrökből való, lásd : II. köt. VI. tabla 149. *d.*

SPEC. 1. FAJ. PHILAEUS CHRYSOPS. (PODA). ARANYSZEMŰ PHILAEUSPÓK. GOLDÄUGIGE PHILAEUSSPINNE.

(*χρυσός* = arany, *ὄψις* = szem ; a szemek fényéről.)

Syn. 1761. *Araneus chrysops* Poda «Ins. Mus. Graec.» p. 123.

Vide : THORELL «Remarks» p. 388.

♀ Fekete ; bozontosan szőrös ; rajzai fehéresek. Az előtest fekete, fehérrel mintegy lisztezve. A végtest közepen egy széles, tiszta fekete lándzsafolt, mely különösen a vége felé fehéredő, () szerűen álló csikpárba van foglalva ; a hát sárgás és fehéres szőrözettel borítva. A lábak sötétbarnák, sok rövidebb fehéres és hosszabb barna szőrözettel, végzeik barnasárgák, barna gyűrűkkel.

A fejmell koczkaszerűen, magasra emelkedő ; széles ; oldalról tekintve, a nyelecskétől ívesen emelkedik s szemtere előre lejt, úgy, hogy a harmadik sor szeme magasabban áll az alsó sor oldalszemeinél. A mellvért barna, fehéres szőrözettel. A rágók barnák, kissé nyújtottak, az arez magasságánál majdnem kétszer hosszabbak, oly hosszuk mint az első lábpár szára. Az állkapesok barnák, szeleiken (végökön) sárgák, lapiczkasok, elkerekítették s kissé szejelállók ; az alajk barna, keskeny, csücsösodó, az állkapesok fele-hosszát meghaladja.

A tapogató karesu, barnássárga, barna gyűrűs ; végze bőven, fehéresen szőrös, szinte bojtos s alig rövidebb mint a terd es szár együttvéve. A lábak vaskosság mellett elég hosszuk ; az első pár száran, alul három — másodvégizen, alul, két pár tüske ; a szár belső oldalán meg 2 — a terden 1, a ezomben, elől.

legalább 3 tuske; a második lábparen hasonlóképen. A harmadik és negyedik lábpar minden ize tuskes; a másodikvégiz, felül-alul, egész hosszában hosszú tuskékkal fegyverzett. A végtest elöl szélesedő, hátul csúcsos.

Az alsó szem sor két középsője nagy, megközelített, aranyosan ragyogó, — két szélsője a középsőnek kevesebb mint fele s ettől háromszor távolabbra mint a középsők egymástól; a sor kihajló. A második sor két szeme apró s közelebbre esik az első mint a harmadik sorhoz. A harmadik sor két szeme távolabbra esik a fej szélétől mint egymástól. A szemek között sok serteszőr ágaskodik.

A zár egy szélességénél hosszabb, barnás terese, mely egy lándzsához hasonlít.

Mertekek, ♀ : Törzs	10	$\frac{mm}{m}$ ebből
fejmell	4.5	»
I lábpar	9	»
IV »	10	»

♂ Nem kisebb; hosszabb lábakkal; más színezettel. Előteste fényesen fekete; sertetlen állapotban (mely igen ritka) finom, hófehér pikkelyek a harmadik szem sor szemeitől kezdve két vonást alkotnak, mely a hát közepe fele tart. Végteste ríktó ezinober vörös, közepén egy tiszta fekete, terjedelmes lándzsafolttal, mely elejétől majdnem a fonókig lehatol; hasa, a fonóktól a legzörésig, ezinobervörös, a légzőrés felett fekete. Az első és második lábpar szára legnagyobb részében rozsdavörös, a lábak különben barnafeketék. A rágók harántránczosak, barnák, oly hosszúk mint a hosszúra fejlett első lábpar szára.

A tapogató barna, karesu; végíze nincsen pikkelylve alakítva, csak kisse szélesedett s kivájt; rövid szára külső végén egy vaskos, rövid tuske; nemzőszerve egy ujj alakú, hosszú, barna gyűjtő, melynek belső feleből egy serteszzerű, igen hosszú nyújtvány indul, mely az egész gyűjtőt belőlfelől megkerüli s egy órárugóra emlékeztet.

Mertekek, ♂ : Törzs	10	$\frac{mm}{m}$ ebből
fejmell	4.7	»
I lábpar	14	»
IV »	11	»
nehé feltűnően kicsiny :		
törzs	6	»
fejmell	2.9	»

(Rákos Muz. gy.)

E szép faj ivarai a legközelebbi időkig is külön fajok gyanánt tárgyaltattak (lásd THORELL i. h.). Delics jellegű, de termőkerületeiben a hegységbe magasra felhatoló faj, mely a verőfényes helyeken heverő száraz sudarakat, de — tapasztalásom szerint — leginkább a meszkőhegység görgetegeit és Karst-szerű területeit kedveli, hol a kövek köze gyapjuszzerű szövetből terjedelmes burkokat szövöget, a melyekben rossz időben megvonul. Vadászatát nagy szökecskével a verőfény teljes hevében űzi. Mozgásának élénksége, tartózkodásának természete úgy hozza magával, hogy rajza gyorsan leköpi, különösen a nőstényé. Mint tavaszi és nyári alakot csak magyar részekből ismerem u. m.: Pancsováról, Mehádiáról (Dunocet csücsa), Orsováról, Ó-Ogradenáról, Tokajból, Bukkhegység (Kolyuk Galya csücs), Demanováról (Liptó), Veszpremből, B.-Füredről, Budapestről (Muz. gy. Pavel), Mehadia-Orsova (Muz. gy. Friwaldszky), Rákos-Palotáról (igen apró, Muz. gy. Pavel).

GEN. 10. NEM. ATTUS. (WALCK.).

(vide «Attoidae»).

Syn. 1805. WALCKENAER «Tabl. d'Aran.» p. 22, (ad partem).

Vide : THORELL «On Europ. Spiders» p. 218.

A hátsó lábparek másodikvégzei egész hosszasságukban gazdagon tuskesek. A rágók az arcznál kevéssel vagy nem magasabbak. Az alsó szem sor egyenes, vagy kevesse kihajló s oly távolsagra áll a homlok szélétől, mely a középső szemek átmerője felének megfelel.

A legtöbb fajt magába foglaló nem, mely messze elterjedett. Képviselői ügyes mozgásu, jó ugrók, melyek a verőfényt kedvelik; füves helyeken es bokrokon, köveken, görgetegeken, stb. tartózkodnak.

A bordáskörmök — legalább az *Attus falcatus* L. lábparján — karesuk, módosan kampósak; az egyik körömfel keves, ritkás, apró es egyenetlen bordákkal, a másik fel több, sűrűbb s előre fele növekedő, de általában kurta bordákkal, lásd II. kötet, VI. tábla, 150. c.

SPEC. I. FAJ. *ATTUS FALCATUS*. (CL.). SÁRLÓS SZOKÓPÓK. SICHEL HUPFSPINNE.

(*falcatus* = sárlókkal ellátott; az előtest félholdszerű, világos rajzáról.)

Syn. 1757. *Araneus falcatus* CLERCK «Ar. Succ.» p. 125.

Vide: THORELL «Remarks» p. 394.

♀ A szemnegyszög tere, tehát a fejtető, négyszögben tiszta fekete; a mellrész barna; a fekete fejtető mögött egy félhold (sarló) alakú, széles, harántfekvő (—), világos folt. A végtest felülete barnás, sok selymes fenyű, sárga pikkelylyel; az oldalakban határozatlan reszűtösen futó, bordaszerű, sötétes vonalak láthatók. A lábak barnássárgák néha vörösesbarnák, kisebb-nagyobb mértékben határozott barnás gyűrűzettel. (A fejtető rendszeren lekopott, tiszta fekete; sertetlen állapotban, mely ritka, rezes fenyű, sárga pikkelyekkel borított, a mellrész sok fehér pikkelylyel).

A fejmel aránylag kicsiny, kockásan magasra kiemelkedő; oldalról tekintve; a hátvonal vízszintes, hátul majdnem derékszögben hirtelenül és egyenesen a nyelecskére lecsapott. A mellvert kicsiny, tojásdad, barnássárga fehéres szőrözettel. A rágók az alsó szemsor két középszeme terfogatánál nem szélesebbek, az arcz magasságánál alig hosszabbak, vörössesárgák, finom, gyér, fehéres szőrözettel; az állkapcsok es az alajk vörössesárgák, az előbbieken néha világosodók. A tapogatók barnássárgák, sötétebb gyűrűzettel; a végiz alig valamivel hosszabb a szárnál es sokkal rövidebb mint a terd es szár együttvéve.

A lábak vaskosak; az első pár szárán, belül a végén, egy tüske; alul, három pár, a másodvégizen, alul, két pár erős, hosszú tüske; a második lábpar szárán, alul, külső oldalán rendszeren 3, belső oldalán egy vagy két tüske; a harmadik es negyedik pár szára es másodvégize felül is tüskés.

A végtest hossztojásdad, hátul csúcsosodó, elég pohós; hasfele szennyesfehér, néha egy sötétes középesik nyomaival.

Az alsó sor két középső szeme majdnem érintkezik, finom fehéres karikába foglalva (sertetlen példányoknál e karikák felül egy darabon vörössékek); az oldalszemek a középsőknek fele nagyságát erik el, — s kisse felfelé tolva — a sort módosan kihajlónvá teszik, valamivel tavolabbra esnek a középszemektől mint ezek egymástól. A második sor két apró szeme annyira áll az alsó mint a hátsó sortól.

A zár egy sötétbarna, haránt fekvő, félholdszerű s homoru oldalával a nyelecske fele nező lemez, melynek homoruságában két kis dudorodás látható.

Mértekek, ♀	Törzs	7—8 $\frac{m}{mm}$ ebből
	fejmel	2-7 "
	I lábpar	4-8 "
	IV "	6 "

♂ Rövidebb; fejlettebb fejmellet, kis végtesttel, elesebb rajzok mellett másnemű szemezettel. Fejtetője rezessárga (lekopottan vagy borszeszben fekete); a mellrész sötét barna, a hátsó szemektől ketoldalt egy-egy fehér } szerű csik.

A végtest közepe sárga, ketfelől fekete keretbe foglalva; a fekete keret tehát a végtest szelen köröskörül fut s keskenyen, fehéren szegelyezett; a has szennyesfehéres. Az első lábpar erősödött, sötét; czombtöve világos, a többi lábpar czombja alsó felen világos-, felső felen sötétbarna; a többi íz barnás, sötétebb karikákkal. Valamennyi labon sok világos pikkely. A tapogató barna, pikkelye elég terjedelmes, világos-

sabb és sárgás szőrözettel borított; szára vastagságánál nem hosszabb, külső oldala végén egy előreírányzott, hosszú és vastos, tompahegyű nyújtványnyal; nemzöszerve elől elkerékített, lenesealakú, lapos; hátul kissé, süvegesen kidomborodik; sötét vörösbarna.

Mertekek. ♂ : Törzs	5.5 m_m ebből
fejmell	3 »
I lábpár	5.5 »
IV »	5 »

Messze elterjedett tavaszi és őszi faj, mely a havasokra is felhatol; de ugylátszik a fenyő tenyésztő övét nem haladja meg; füves helyeken, bokrokon nem ritka.

Ismerem. erdélyi részekből; Kolozsvárról, Parajdrol (Szováti völgy), Gyergyó-Szt-Miklósról, Szász-Vesszősről; magyar részekből; Doroszlóról, Palánkáról, Orsováról, Ó-Ogradenáról, Báziasról, Rakamazról, Csorbáról (Kárpát, esorbai tó, «Rakitou Wreh», Jama tó).

SPEC. 2. FAJ. ATTUS FARINOSUS. (C. K.). LISZTES SZ. MEHLIGE II.


(farinosus = lisztes; a poros színről.)

Syn. 1846. *Euophrys farinosa* C. Koch «Die Arachniden» XIII. p. 223.

Vide: THORELL «Remarks» p. 396.

♀ Előteste szürkessárga (fejeteteje lekopva, fekete); mellrésze barnás. Végteste szürkessárga; a vége felé és végéig terjedve egy vöröslően szegélyezett, fekete V szerű rajz áll, melynek szárai hosszuk közepetáján részintösen megszakítottak. A lábak vöröses-agyagsárgák, minden gyűrűzet nélküliek.

Az Attus falcatusnak legközelebbi rokona, mely az érintett színezetbeli különbségeken kívül leginkább a zár berendezése által tűnik ki.

A zár egy felholdszerű, harántfekvő, széles, barna lemez, mely a nyelecske felé néző oldalon  szerűen kivágott, dudorokat nem kerít be, s a kivágások között kissé leneseyszerűen folytatódik.

Mertekek. ♀ : Törzs	6.9 m_m ebből
fejmell	2.6 »
I lábpár	5 »
IV »	5.5 »

♂ Elöttem ismeretlen.

Úgy látszik, hogy e faj a delibb fekvésű vidékeket inkább kedveli. Tartózkodásra nevezve kedveli a füves helyeket.


Ismerem: Doroszlóról, Apatinból, Palánkáról, Tokajból és Nagy-Váradról.

SPEC. 3. FAJ. ATTUS RUPICOLUS. (C. K.). KÖSZÁLI SZ. FELSÉN II.

(rupes = szikla; a tartózkodásról.)

Syn. 1848. *Euophrys rupicola* C. Koch «Die Arachniden» XIV. p. 49.

Vide: THORELL «Remarks» p. 392. (in § Att. floricola).

♂ Gyönyörűen sötét-bíborbarna. Előteste igen finom hófehér szegélylyel, mely a fej élén is végig fut tehát az előtestet előlről és oldalairól is körülfogja, -- közepén egy finom, fehér hosszcsík, mely a szem-négyszög közepe táján kezdődik s nem éri el a nyelecskét. Végtesten az első ingödörpár táján két igen finom, fehér pont, -- a második ingödörpár táján két harántfekvő, hófehér,  szerű folt, a fonók felett hasonló, kissé szennyesedő folt; a végtest közepén végig egy barna orsófolt, mely hátul kissé ágas; a

has sárgásfehér. A lábak haragos-vörössesárgák, sűrűn aló barna gyűrűzettel, a világos helyek sok hófehér pikkelylyel. A tapogató barnás, czomb-vege és térde hófehér pikkelyekkel fedett.

A fejmell szélességénél hosszabb, elől elvágott; oldalról tekintve elég magasán-ívesen emelkedett, legszele finom fehér szegélylyel; a szemnegyszög előlről és oldalról külön finom szegélybe foglalva. A mellvért barna, fehéres szőrökkel. A rágók bíborbarnák; az arcz magasságánál valamivel hosszabb. Az állkapcsok s az alajk bikorbarnák. A lábak czomb és szárrészekben erősek, végeik vékonyodók. Az első pár másodvégíze, alul, két pár, — szára, alul, a külső oldalán egy tüskével; a hátsó lábpárok másodvégizei körüskörül s egész hosszukban tüskések.

A végtest szélességénél csak kevéssel hosszabb, hátsó feleben tágult, legvégén csúcsosodó, kissé lenyomott.

Az alsó szemsor szemei opalizálók; a sor igen módosan kihajló, szemei tüzes színű finom karkikba foglaltak; az oldalszemek a középsőknek fele nagyságát megközelítik. A második sor két apró szeme közelebb áll az alsó mint a hátsó sorhoz.

A tapogató rövid, térde hosszabb a szárnál; a szár vastagságánál sokkal rövidebb; a pikkely kanálalakú, a nemzőszerv alig kidagadó, s egy laposan-lencsealakú, sötét vörösbarna gyűjtőt mutat.

Mertekek. ♂: Törzs	5 $\frac{m}{m}$ ebből
fejmell	2.6 "
I lábpár	4.4 "
IV "	5.2 "

E pompás faj nőstényet nem ismerem. Mint őszelői alakot (augusztus) ritkaságkepen a Kárpatokról (Kriván 4500' táján) és a Biharból (Vlegyásza) ismerem.

SPEC. 4. FAJ. ATTUS BRASSAYI N. SP. BRASSAY SZ. BRASSAYS II.

(Brassay Sámuel kitűnő magyar tudós tiszteletére.)

(X. tábla 216, a ♀ nagyítva, 217 annak zárja.)

♀ Elő-és végtestének felülete tiszta fekete, hófehér pikkelyekből álló rajzokkal: a fejrészen, elől, a két nagy szem felett, egy hófehér folt, a két hátsó szem mögött egy-egy hófehér szemöldök, — a végtest elején egy fehér ív, közepén végig egy fehér szalag, mely a fonókat megközelíti, de az említett ívet nem éri el, minden oldalon két, részüntösen alulról-hátulról fel és előre felé tartó, fehér csík; a homlok a szemek alatt hófehér, a két nagy szem keskeny, narancsvörös gyűrűben fekszik; a has és mellvért gyéren álló, fehér szőrözettel fedett; a lábak barnák, kevés fehéres pikkelylyel; a tapogatók sárgák.

A fejmell vaskos, kockásan emelkedett, egyáltalában az egész test zömök. A szájrészek sötét vörösbarnák.

A zár két öblös, sekély mélyedésből áll, a két mélyedés között egy egyszerű osztólemez, mely hasított s a nyelecske felőli végen nyílást mutat.

Mertekek: ♀ Törzs	5 $\frac{m}{m}$ ebből
fejmell	2.3 "
I lábpár	4 "

♂ Előttem ismeretlen.

E szép faj, melyet THORELL tanár nem ismert és SIMON is ujnak tart s az Attus arcigerus Walek közel rokonának mond, mint kora nyári alak az Orsova melletti Allion hegyen került birtokomba.

SPEC. 5. FAJ. ATTUS CRUCIGERUS WALCK. KERESZTES SZ. KREUTZ H.

(crux, gerere = kereszt, viselni; a végtest világos rajzáról.)

Syn. 1825. *Attus crucigerus* WALCKENAER «Faun. Franc.» p. 59.

Vide : THORELL «Remarks» p. 391.

♀ (junior). A fejmell fejerésze barna, sárgás pikkelyekkel; mellrésze barnás. Végteste elején egy fehéres, az első ingödörpár állásának megfelelő fekete, kis pontpárral; hátsó fele egy finom, fehéres kereszt által négy ablakszerű fekete mezőre van felosztva, a mezők koczkaalakúak; az oldalak és a has fehéresek. A tapogatók sárgák. A lábak czombjai sárgák, végökön barnulók; a többi iz sok vörösbarnával füstölt.

A fejmell szélességénél sokkal hosszabb, oldalról tekintve, a nyelecskétől ívesen emelkedik.

A rágók feketék, kevés, fehéres szőrözettel, az arcz magasságánál nem hosszabbak, az alsó szemsor két középszemének térfogatánál szélesebbek.

A tapogató sárga, fehéres szőrözettel. Az első lábpár szárán, alul, öt tüske (példányomon a jobb lábón 5 tüske, a balon csak két pár), másodvégizen, alul, két pár tüske.

Az alsó szemsor módosan kihajló, szemei egyenlő távolságra egymástól, a középsők felátmérőnyire a sárgásfehér szőrözettel tömötten borított homlok szélétől. A második sor két apró szeme valamivel közelebb az alsó, mint a hátsó sorhoz.

A zár példányomon nem fejlett.

Mértekek : ♀ (ifjabb) törzs 5 $\frac{m}{m}$ ebből

fejmell 2.4 »

I lábpár 3.8 »

IV » 4 »


♂ Elöttem ismeretlen.

Egyetlen példányomat a Buda melletti Gellérthegy erődje alatti kopár térségen, mint nyári alakot találtam. E fajnak jellemző rajza, mely könnyen felismerhetővé teszi, reá birt, hogy leírását egy ifjabb példányra alapítsam. Dr. THORELL a faj azonosságát megerősíté.

SPEC. 6. FAJ. ATTUS WAGAE SIM. WAGA SZ. WAGASH H.

(Waga, a faj gyűjtőjének tiszteletére.)

Syn. 1871—72. *Attus Waga* SIMON «Revis. des Att.» Ann. de la Soc. Ent. de France 4. Ser. x. p. 148.

♂ Az *Attus ruficollis* legközelebbi rokona; hosszú karesű, lábakkal. Elötteste biborbarnás, fején sok vöröses-sárgával elegyített; közepén egy finom, sárgásfehér hosszvonással, mely a szemtérce közepén kezdődik s a nyelecske felett megszűnik; a szemnégyyszög elöl és két oldalt egy elmosódó, világos keretbe foglalva, e keret az oldalakon az előtest végeig lenyomul s itt legvilágosabb. A végtest biborbarnás, vörösséssel elegyes; közepén egy fehér, vörösséssel elegyes ágrajz, melynek nyele, a végtest elején kezdődve, a második ingödörpár táján,  szerűen ágasodik; az egész ágrajz durva; az oldalak vörösesfehérek, a hátmező felé, jelesen hátul, csipkésék; a has sárgás. Lábai czombrészőkben vörösbarnák, végök felé világosodók és gyűrűzöttek, az elálló szőrözet között sok sárgás pikkelyvel; hosszúk, karesűk.

Az első lábpár szárán, alul, három finom tüsepár, — másodvégizen hasonlóképen; második lábpárján hasonlóképen; a többi lábpáron a szár és másodvégiz felül is tüskés.

A végtest tojásdad, kisse lenyomott, rövid.

Az alsó szemsor középsői oly távolságra a homlok szélétől, mely egy szem felátmérőjénél nagyobb, a sor módosan kihajló, oldalszemek távolabbra esnek a középsőktől, mint ezek egymástól; a második sor két igen apró szeme nem közelebbre az alsó, mint a hátsó sorhoz.

A tapogató vörössárga, sok sárgás pikkelyvel; a vége barna: pikkelye nem feltűnően fejlett; szára a térdnél rövidebb, vastagságánál nem hosszabb, alulról tekintve, külső oldala végén egy finom, befelé görbült, hegybe végződő sarokkal; nemzöszerve egy sötét vörösbarna, mandulaalakú, alig kidagadó gyűjtőből áll.

Mertekek: ♀	Törzs	6.2 $\frac{mm}{m}$ ebből
	fej mell	3.2 "
	I lábpár	9 "
IV	"	8.3 "
	(néha kisebb, törzs: 4.5 $\frac{mm}{m}$).	

Csupán csak két példány után ismerem, melyek egyikét a esorbai tó környékén (Kárpát) magam találtam; a másik, igen kis példány, a Rákosról való. (Muz. gy. Dr. Horváth Geza.)

SPEC. 7. FAJ. ATTUS NIDICOLENS WALCK. FÉSZKES SZ. NEST H.

(nidicolens = fészekben lakó; terjedelmes lakásáról.)

Syn. 1847. *Attus nidicolens* WALCKENAER «Hist. Nat. des Ins. Apt.» IV. p. 411.

Vide: THORELL «Remarks» p. 368, 380.

♀ (junior). Előteste agyagsárga pikkelyekkel borítva (borszeszben sötét vörösbarna). Végteste sárga pikkelyekkel borítva, oldalaiiban, különösen hátsó felében, néhány fehér \wedge szerűen álló bordacsik (borszeszben az alapszín hússzínű); hasa szennyessárgás, közepén egy széles, hússzínű hosszcsikkal. Lábai elenken vörössárgák.

Fejmelle rövid, kockásan felemelt, szélességénél csak kevéssel hosszabb; oldalról tekintve, a nyelecskétől ívesen emelkedett. A mellvert barna, fehéres szőrözettel. A rágek az arcz magasságánál alig hosszabbak, oly szélesek, mint az alsó szemsor két középső szemének a térfogata; tövük részben a homloknak világossárga tömött szőrözete által fedett. Az állkapcsok és az alajk sötétvörösbarnák. A tapogató sárga, végíze fehér szőrözettel eléggé borított s alig rövidebb, mint a térd és szár együttvéve. A lábak rövidek; az első pár vastagodott; a negyedik lábpár szára és végíze, töven, hússzínű, elmosódó gyűrű. Az első lábpár szárán, alul, három pár, — másodvégizén, szintén alul, két pár sötét tüske; a második lábpár szárán semmi tüske, másodvégizén, alul, két pár tüske; a többi lábpárokon a szárok fegyvertelenek; a másodvégizek végeiken 2—3 gyenge tüskével.

A végtest hossztojásdad, hátul csücsösödő; nem lenyomott.

Az alsó szemsor módosan kihajló, szemei egyforma távolságra egymástól; a középsők oly távolságra az igen szőrös, sárgásfehér homlok szelétől, mely egy középszem felátméréjét meghaladja, a közök sárgásfehér szőrrel kitöltve; a második sornak két apró szemesője kétszer akkora távolságra a hátsó, mint az alsó sortól.

A zár példányaimon nem egészen fejlett, egészben \perp szerű lemez-berendezést gyanítat.

Mertekek: ♀	Törzs	6 $\frac{mm}{m}$ ebből
	fej mell	2.2 "
	I lábpár	4.3 "
IV	"	5 "

♂ Alig rövidebb, fejlettebb fejmellel, vaskosra és hosszúra fejlett első lábpárral, mely barnavörös. A színezet úgy száraz állapotban, mint borszeszben a nőstényéhez hasonló, egyedül az előtest borszeszben világos barnavörös. A lábfegyverzet a nőstényével azonos. A tapogató vékony, végíze ninesen pikkelylővé tágitva és sokkal hosszabb, mint a térd és szár együttvéve, a szár vastagságánál nem hosszabb, fegyvertelen;

a nemzőszerv egy sötét-vörösbarna, hengeres gyűjtő, mely végéből egy igen finom, görbe, amszerű hajlasu, hosszú sertet bocsat, e serté a végz kivájásának külső oldalához illeszkedik s egészen megfekvő.

Mertekek: ♂ Törzs	5.5	6 m_m ebből
fejmell	2.8	"
I lábpár	5	"
IV "	4.8	"

Mint nyári alakot leginkább kőgöregtegekből, hol nagyterjedelmű burkokat szovoget, saját tapasztalásom szerint csupán csak Tokajból és Sátorajja-Ujhelyről (Kopaszhegy mindket helyen) ismerem. Továbbá Budapestről a muzeum-kertből (Muz. gy. Frivaldszky).

SPEC. 8. FAJ. ATTUS ARCUATUS (CL.) ÍVES SZ. BOGIGE H.

(arcuatus = íves, de boltozatos is; az előtest dombornáságáról.)

Syn. 1757. *Araneus arcuatus* CLERCK «Ar. Succ.» p. 125.

Vide: THORELL «Remarks» p. 390.

♂ Fekete; arcza s a tapogató szárának külső oldalán egy cset, fehérek; az első lábpár terde, alul sok fehér szőrrel; az elő és végtest felületén sok sárgás pikkely; a has szennyeessárga. A lábak, melyek közül az első pár aránytalanul vastag és hosszú, sötét barnafeketek, csipők és végzeik barnassárgák, az utóbbiak barna gyűrűzettel. Az első lábpár, alul, kofeszerű, tömött, hosszú szőrözettel.

A fejmell nagy, szelességenél hosszabb, koczkásan felemelt; oldalról tekintve, hatvonala vízszintes, hátul hirtelenül és meredeken a nyelecskére lecsapott.

A mellvert tojásdad, aránylag kicsiny, feheres szőrözött. A rágek vörösbarnak, az arcz magasságánál nem hosszabbak, az alsó szemsor két középszeme terfogatánál szelesebbek, tövükön hosszszorba tömörülő fehér szőrözettel; a homlok fehér szőrözete három harántsorba tömörül, melyek közül a felső sor, a szemsort felülről megkerüli. Az állkapcsok és az alajk vörösbarnak, az előbbiek végök belső szélén kissé világosodók. A lábak erősek; az első pár szárán, alul, három pár, a másodvégizen, alul, két pár erős tüske; terde belső oldalán egy kisebb tüskével; czombjának felületén, elől, négy tüske, ezek közül három egymás mögött; a többi pár czombja felületén 4—5 tüske; a második pár szárának és másodvégizének fegyverzete az első lábpárával azonos; a többi lábpár szára és másodvégize az oldalakban is tüskes s terdizeiken mindket oldalon egy-egy tüske.

A végtest csucosan tojásdad.

Az alsó szemsor kibajló; oldalszemei távolabbra esnek a középsőktől, mint ezek egymástól, a középsők a homlok széletől oly távolságra, mely közel szemátmerőnyi; a második sor két kis szeme láthatólag közelebbre esik az alsó mint a hátsó sorhoz.

A tapogató vörösbarna, pikkelye modosan fejlett; szára saját vastagságánál és a terdnel rovidebb; alulról tekintve, külső oldala végén egy farkasfülszerű, vaskos nyujtvány látható; nemzőszerve egy sötét vörösbarna, elől lelapított s elkerekített, hátul kissé dudorodó gyűjtőből áll, melyhez elől egy kis esavart, ujjyszerű, kívülről befele irányozott, tompa toldalek csatlakozik.

Mertekek: ♂ Törzs	7	m_m ebből
fejmell	3.7	"
I lábpár	8.2	"
IV "	7.2	"

(mella csak, törzs: 4.4 m_m ; e két nagyság között a közepet tartó alakok a leggyakoribbak).

♀ Előtte ismeretlen, úgy látszik, rejtett életet folytat.

A bokros helyek verőfenyes tisztásain igen gyakori tavaszi és nyári alak s a legjobb szokók egyike. Számos him mellett soha sem sikerült nőtényt találni s THORELL is ritkának mondja.

Ismerem: Doroszlóról, Apatinból, Palankáról, Tokajból és Rakamazról, a magy. nemz. Múzeumban: Nagy-Váradról (Mocsáry) és Pecs vidékeről (Frivaldszky).

SPEC. 9. FAJ. ATTUS FLORICOLA (C. K.) VIRÁGLAKÓ SZ. BLUMEN H.

(floricola = virágban lakó; a gyakori tartózkodási helyről.)

Syn. 1837. *Euophrys floricola* C. KOCH Uebersicht des Ar. Syst. I. p. 34.

Vide: THORELL «Remarks» p. 391.

♀ (junior). Vörössesszürke; a végtesten négy fekete folt, párban állva; a hátsó folt pár kisebb; a has sárgásszürke. A szemtérese hátsó feleben egy elmosódó, rövidke, finom, világos vonás; oldalan, a második és harmadik sor szemei alatt, a pikkelyzet szinten világosodó. Az egész test pikkelyzete fehéres-vörössel elegyesen felhőzött. A lábak barnássárgák, barnán gyűrűzöttek, sok fehéres pikkelylyel; az első pár nem vastagodott.

A fejmell koczkásan emelkedett, szelességeivel valamivel hosszabb; oldalról tekintve, a nyelecskétől ívesen emelkedett. A mellvért kicsiny, tojásdad, barna, kevés világos szőrözettel. A rágók, oldalról tekintve, tetemesen a homlok alá visszatolva, barnák, az arez magasságánál láthatólag rövidebbek. Az allkapesok s az alajk barnák. A tapogató sárgás, csücsán kissé füstös, ezombja barnás, végíze rövidebb mint a terd és szár együttvéve.

A lábak rövidek; az első pár szárán, alul, három pár, másodvégizen, alul, két pár karesű tüske.

A végtest tojásdad, elég pohós, hátul alig csücsösödő.

Az alsó szemsor szemei rókavörös gyűrűkbe foglalva, egyenlő távolságra egymástól; a sor könnyen kihajló; középsői körülbelül fél szemátmerőnyire a homlok szeletétől; a második sor két apró szemeséje annyira az alsó mint a hátsó sortól.

A zár harmadvellésű példányomon még nem fejlett.

Mertekek: +	Törzs	4.8	$\frac{m}{m}$ ebből
	fejmell	4.8	»
	I lábpár	3.2	»
	IV "	4.7	»

♂ Fejlettebb fejmmel: hosszabb, majdnem egyszínűen barnas labakkal és világosabb alapszínnel. A tapogató berendezésénél fogva könnyen megkülönböztethető. A tapogató szára nem rövidebb a terdnel, hosszúságánál nem vastagabb; külső oldalán egy lapos, párhuzamos oldalú, végén elkerekített, kissé előre irányozott nyújtvány áll, mely magánál a szárnál valamivel hosszabb. A pikkely domború, rövid; nemzőszerve laposan lencsealakú, nemi kigyózó sculpturával; különben sötétszínű.

Mertekek: ♂	Törzs	4.7	$\frac{m}{m}$
	fejmell	2.4	»
	I lábpár	4.5	»
	IV "	5.2	»

Mint őszi alakot csupán csak Erdelyből, Szász-Vesszősről ismerem, hol a Degenfeld-fele szőlő füves helyen találtam.

SPEC. 10. FAJ. ATTUS ERRATICUS WALCK. BOLYGO SZ. IRRENDE H.

(erraticus = bolygó, kóborló; a nyüzsgő élemtőről.)

Syn. 1825. *Attus erraticus* WALCKENAER «Fam. Franc.» p. 46.

Vide: THORELL «Remarks» p. 396.

♀ Előteste szürkessárga (lekopva: fényes fekete); végteste vöröses szürkés, vége fele \wedge szerűen állított néhány világos ágrajzzal, ezek felett az oldalból jövő néhány résüntös vonalkával (lekopva: barnas-fehéres rajzokkal, melyek a bőrtől erednek). Lábai sárgások, sűrűn álló barna gyűrűzettel.

A fejmell jól emelkedett, szélességénél hosszabb; oldalról tekintve, felülete vízszintes, szemtere kisse előre lekonyuló; hátul a mellrész meredeken lecsapott.

A mellvért tojásdad, barna, igen gyéren szőrös.

A rágók vörösesbarnák, meglehetősen hátrahúzódtak, az arcznál alig hosszabbak. Az állkapcsok és az alajk barnások. A tapogató sárga, enyésző barna gyűrűzettel; végze oly hosszú, mint a térd és szár együttveve. A lábak rövidek, nem erősödöttek; az első pár szárán, alul, három pár, másodvégizen szinten három pár hosszú, karesű tüske.

A végtest kisse lapított, szélesen tojásdad.

Az alsó szemsor alig kihajló; szemei, egyforma távolságra egymástól; finom, vöröses gyűrűkbe foglalva, a két középső körülbelül felátmerőnyire a homlok széletől; a második sor két apró szemeseje annyira az alsó, a mennyire a hátsó sortól.

A zár egy harántfekvő, felholdszerű, barna, fénylő lemez, mely domborúságával a legzőres fele áll.

Mertekek: ♀ Törzs	4	$\frac{m}{m}$ ebből
fejmell	2	»
I lábpár	2·7	»
IV »	3·2	»

♂ Alig kisebb; barna, csak a csuklókban világosodó lábakkal; tapogatójának czombja, terde és szára világos sárga, pikkelye sötétbarna; a szár vastagságánál rövidebb, külső oldala végén egy finom, egyenes, hegyes nyujtványnyal, mely magánál a szárnál hosszabb; a nemzőszerv egy jól kidagadó, hengeres, elől-hátul golyószerűen elkerekített vörösbarna gyűjtőt mutat.

Mertekek: ♂ Törzs	3·6	$\frac{m}{m}$
fejmell	1·8	»
I lábpár	3	»
IV »	3·5	»

Leginkább verőfényes fekvésű gorgetegeken, de reteken is tartozkodó tavaszi és nyári faj, mely nem ritka. A ♀ igen terjedelmes burkot sző, melyben a peteket a kikelesig őrzi.

Ismerem: Pancsováról, Orsováról, Ó-Ogradenáról, Szajolról, Tokajból, S.-A.-Újhelyről, az Alsó-Hámorból, B.-Füredről; Unglivarról (Muz. gy. Vidra Ferd.).

SPEC. 11. FAJ. ATTUS PUBESCENS (FABR.) BOZONTOS SZ. ZOTTIGE H.

(pubescens = szőrösödő; a szőrös-ségről.)

Syn. 1775. *Aranca pubescens* FABRICIUS «Syst. Entom.» p. 438.

Vide: THORELL «Remarks» p. 381.

♀ Szürke (lekopva: feketebarna). Lábai egyszínűen vörösbarnák, szürkés pikkelyekkel.

A fejmell fejezese koczkasan felemelt, elől egyenesen elvágott, oldalról tekintve, a nyelecsketől, boltozatosan emelkedett; a szemterese tetemesen előre lejtő; felülről tekintve, az alsó sor középszei csak

kevessé a homlok előtt kiállók. A rágók az arcz magasságánál nem hosszabbak, az alsó sor két középszemének terfogatínál nem szélesebbek, vöröses barnak, feheres szőrözettel. A tapogató vöröses barna, terde, szára es végíze majdnem egyforma hosszúságúak.

A lábak elég hosszúk, nem erősödöttek; az első pár szárán, alul, három pár karesu, — másodvégizen, alul, két pár igen hosszú, karesú túske.

A végtest rövid-tojásdad, hátul nem esúcsosodó.

Az alsó szemsor módosan kihajló, szemei egyforma távolságra egymástól, a középsők bőven egy fel szemátmerőnyire a homlok szeletől.

A második szemsor két igen apró szeme annyira az alsó a mennyire a hátsó sortól; a hátsó sor két szeme megkülönböztethetőleg közelebbre egymáshoz, mint az alsó sor oldalszemei szintén egymáshoz.

A zár egy terjedelmes, világos barna, majdnem kerek terese, melynek kellő közepen egy tetemes, szívalaku benyomás látható.

Mertekek: ♀ Törzs	5	$\frac{m}{m}$ ebből
fej mell	2.5	»
I lábpár	3.8	»
IV »	6	»

♂ Kisebb végtesttel, a nőstényéhez hasonló színezettel. A tapogató szára nem rövidebb a terdnel, külső oldalán egy lapos, elől elkerékített s kisse kanalszerűen kivájt, előre irányozott nyujtványt visel, mely magánál a szarnál hosszabb s a szár vastagságánál nem keskenyebb. A nemzőszerv egy sötét-vörösbarna, lapos gyűjtőből áll (a him tapogatója igen hasonlít az *A. floricola*éhoz).

Mertekek: ♂ Törzs	4	$\frac{m}{m}$ ebből
fej mell	2.3	»
I lábpár	4	»
IV »	6.2	»

Csupán csak egy pár után ismerem, melyet Pozsonyban a Dunaliget füvében találtam.

NEM. 11. GEN. AELUROPS. THORELL.

(*αἰλουρος* = macska, *ὄφθ* = szem; a nagy szemek fedett elhelyezéséről.)

Syn. 1870. THORELL «On Europ. Spiders» p. 219.

A homlok annyira kihajló, hogy — felülről tekintve a fejet — az alsó sor középszemei nem látszanak. Az alsó szemsor kihajló; középsői oly távolságra a homlok szeletől, mely fel átmerőjüket felülmúlja. A hátsó lábpárok az elsőknél hosszabbak. A negyedik lábpár szára láthatólag rövidebb mint másod- és elsődvégíze együttvéve.

A bordáskörmök karesuk s legalább az *Aelurops festivus* I-ső lábpárján hosszú bordákkal felszerelve; e bordázat mar egy erős nagyítólenese segítségével is kivehető, lásd: II. kötet, VI. tábla, 151. c.

SPEC. 1. FAJ. AELUROPS FESTIVUS (C. K.) DÍSZES MACSKAPÓK. GESCHMUCKTE KATZENSP.

(festivus = csinos; a rajzokra vonatkozik.)

Syn. 1834. *Euophrys festiva* C. Koch in Herrich-Schäffers «Deutschl. Ins.»

♀ Gesztenyebarna, sok fehér rajzzal. A szemteresen három fehér hosszvonalka, az egyik közbül, egy-egy a szemnegyszög belső oldalán; a mellresz közepén egy felhős, fehér rajz. A végtest legelejen két fehér, párhuzamos, rövid vonalka, a köztük elterülő köz fekete; e két vonalka terfogatának megfelelő szélességben s a fonóig érve, egy fehér-barna elegyítésű szalag vonul, mely ketfelől ket-ket barna folttal szegélyeztetik.

A végtest oldalai barnán és feheren, párduezszerűen és ríktóan tarkak. A has tiszta sárgásfehér. A lábak feheren és barnán, párduezszerűen tarkak.

A fej mell nagy, szelességénél hosszabb; oldalról tekintve, a nyelecsketől magasívesen domborodó, elől lekonyuló. A mellvert keskeny, hosszukás; feheres szőrrel bőven fedett. A rágók az állkapcsokra csapottak, az arc magasságánál rövidebbek, az alsó sor két középszemének térfogatánál sokkal szelesebbek. A tapogató sárga, fehér és barna szőrrel bőven fedett, szára nem hosszabb a terdnel, végíze alig rövidebb, mint a szár és terd együttve. A két első lámpar rövidített, vaskosodó; az első pár szárán, alul három pár, oldalt két tüske, másodvégizen, alul, két pár tüske, oldalon 1 (?) tüske: a hátsó lámpárokon különösen a másodvégizek sok karesu tüskekel fegyverezettek.

A végtest szélesen tojásdad, eléggé puhós.

Az alsó szemsor kibajló, oldalszemei sokkal távolabbra esnek a középsőtől, mint ezek egymástól; a középsők, zöldes tűzben égve, a fehér homlok széletől majdnem szemátmérőnyire allanak. A második sor kicsiny szemei annyira az alsó, mint a hátsó sortól; a szemnegyszög magasságánál alig szelesebb. Felülről tekintve, az alsó sor középszemei felett egy serteszerű szőrökből való ernyő látható.

A zár egy világos vörössesárga térese, \wedge szerű, sekely benyomással.

Mértekek: ♀ Törzs	7·8 $\frac{m}{mm}$ ebből
fej mell	3·8 »
I lámpár	5 »
IV. »	8·8 »

♂ Kisebbl, kevesebb tarka lábakkal és törzsszel. Tapogatója kurta, izei sárgák, feheres szőrözettel, a czombizen, felül két tüske; terde szelességénél alig hosszabb; a szár a terdnel valamivel rövidebb, kevesse tágult, s egy meglehetősen hosszú, nyulfél alakú nyujtványban végződik, mely nyujtvány a pikkelyre ráfekszik, de felülről bajosan kivethető, mert pikkelyszerű szőrözettel fedett; a pikkely kamálalakú, kisse barnult, keves szőrözettel; nemzőszerve, oldalról tekintve, egy barna, gesztenyealakúra kidagadó, sima gyűjtőt mutat.

Mértekek: ♂ Törzs	6·7 $\frac{m}{mm}$ ebből
fej mell	3·4 »
I lámpár	5 »
II »	5·8 »
III »	7·8 »
IV »	8·2 »

E fajt mint nyári alakot leginkább Erdélyből, meg pedig Sebesváraljáról és Kolozsvárról ismerem, hol rendszeren a dombok verőfenyes oldalain vadászgat; nagysága és nyüzsgése által rögtön feltűnik. Magyar részeken csupán csak Tokaj mellett találtam.

SPEC. 2. PAJ. AELUROPS SIMPLEX N. SP. EGYSZERŰ M. EINFACHE K.

(simplex = egyszerű; a színezetről.)

(VIII. tábla, 189 a ♂ tapogatója, 190 a ♀ tapogatójának száríze, 191 n. a. hátsó lába.)

♂ Előteste barna, fakó szőröcskéekkel; végteste fekete, szennyessárga pikkelyekkel; lábai barnak, valamivel világosabb czombokkal, a többi iz füstösen behomályosítva. Az első lámpár szárának belső oldalán, elől, három megfekvő, előre irányzott tüske.

A fej mell vaskos, magas; szemtereseje előrefelé lejtő, homloka áthajló, úgy, hogy az alsó sor két nagy szeme, a fejet felülről tekintve, nem látható; a szemterese sok durva szőrökkel borítva. A mellvert korded, kicsiny, barna, keves sárgás szőrözettel. A rágók tova barna, vege világosodó. A lábak vaskosak, a második pár szárán, belül és elől, két megfekvő tüske. A végtest hátsó feleben kisse tágult.

A tapogató elég bunkós; terde vastagságánál nem hosszabb, a szár a terddel rövidebb, a végén, felül, egy nyulfülszerű, kissé oldalt-kifele görbülő nyujtványnyal, mely a pikkely domborúságához alkalmazkodik és a bő szőrzet alatt eltűnik; a pikkely kanálalakú, durván szőrös, elég domboru; nemzőszerve egy egyszerű, barna, cipőalakú nagy gyűjtő, mely igen ki és kissé oldalt kifele dagadozik.

Mértekek:	♂ Törzs	6·3 $\frac{mm}{m}$ ebből
	fejmell	3·6 "
	I lábpár	4·9 "
	II "	5 "
	III "	6·5 "
	IV "	7·9 "

♀ Előttem ismeretlen.

E fajnak egyetlen példányát, mint tavaszi alakot Doroszló rétjein találtam; példányom arról is nevezetes, hogy jobb tapogatója esonka, nélkülözi a pikkelyt és a gyűjtőt.

SPEC. 3. FAJ. AELUROPS GILVUS (SIM.) MÉZES M. HONIG K.

(gilvus = mézsárga; az általános színezetről.)

Squ. 1869. *Attus gilvus* SIMON «Monogr. des Attid.» p. 532. (66.)

♂ Barnafekete s mindenütt sárgás pikkelyekkel úgy borítva, hogy az alapszín kilátszik. Lábai vörös-barnák, sok sárgás pikkelylyel; a két első pár kurtított, vaskos.

A fejmell szélességénél sokkal hosszabb, elől ívesen elvágott; oldalról tekintve, a nyelceskétől magas-ívesen emelkedő, a szenterezén ívesen lekonyuló. A mellvért hosszukás, keskeny, barna, szőrös. A rágók vörösbarnák, az állkapcsokra esapottak, az arc magasságánál valamivel rövidebbek. Az állkapcsok szelesek, elől elkerekítettek, vörösbarnák szemyes fehéres szőrzettel.

A lábak bőven fegyverzetek; az első pár szárán, alul, három pár, belső oldalán még két tüske; másodvégizen, alul, egy pár, belső oldalon három hosszú tüske; a czomb felületének vége fele három karcsu, hosszú tüske egymásmögött; a negyedik lábpár szára és másodvégize hosszabban, köröskörül tüskes. A végtest tojásdad, nem lapított, végét a kiálló fonók csücsossá teszik.

Az alsó szemsor kihajló, szemei között tetemes közök vannak, a középszemek, közel szemátmerőnyire az alig szőrös homlok szélétől, zöld tűzben ragyognak; a szemnégyszög magasságánál sokkal szelesebb; a második sor két apró szeme annyira az alsó, mint a hátsó sortól.

A tapogató barna; szára és pikkelye fehéres szőrzettel borított, a szár a terddel rövidebb, saját hosszánál vastagabb, fegyvertelen. A nemzőszerv, a külső oldalról tekintve tetemesen kidomborodó, süveg-alakú, sötét-vörösbarna.

Mértekek:	♂ Törzs	6·3 $\frac{mm}{m}$ ebből
	fejmell	3·2 "
	I lábpár	4·4 "
	IV "	7 "

♀ Előttem ismeretlen.

Egyetlen példányomat, mint őszei (szeptemberi) alakot, evekkel ezelőtt Veszprem mellett, az ottani meszes hasadékok silány növényzetű gyepesén találtam.

I.

FÜGGELÉK.

OPTILIONES. KASZÁSPOKOK

AZ EDDIG ISMERETES MAGYAR FAJOK ÁTNÉZETES TÁRGYALÁSA.

Az Opiliók vagyis Kaszáspókok magyar Faunája mindeddig még nem kepezte a tüzetesebb vizsgálódás és tanulmány tárgyát. Magam is csak mellekesen foglalkoztam vele; mindazonáltal hasznos dolgot velek mivelni, a midőn mindazt, a mi ezekről az alakokról tudomásomra jutott, legalább egy átnézetesen taglalt és tartott kis dolgozatban közreboesátom.

A nemek es fajok synopticus táblázatainal Dr. Koch Lajos kitünő szakbuvár módszeret követtem, ugyanazt, a melyet e buvár 1869-ben a következő czimű füzetben tárgyalt: „*Zoologische Mittheilungen aus Tyrol. Der 43. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte gewidmet vom tirol.-vorarlb. Landes-Museum (Ferdinandum). Innsbruck 1869.*”

A füzet synopticus tablazatai az összes nemekre es fajokra terjednek ki.

ORDO:

OPILION ES. KASZASPOKOK.

A fej mell a vegtesttel összeforradt. A fej es mellresz tokeletesen összeforrott; a mellresz es vegtest kozotti határ alulról még kivehető.

Két szem.

Nyolez, rendszerint hosszú, karesu lab. melynek izulete (7) a tulajdonkepeni pókokeval egyenlő beosztásu.

A rágó feleknek mindenike *kettős*, ollomödra működő csipőkorómmal.

A tapogató megvan s mind a két ivarnal egyforma.

Semmi fonószervezet.

A NEMEK SYNOPTICUS ÁTNÉZETE.

§ A tapogató vege semmi köröm.

1. A rágók feltünően meghosszabbítottak:

GENUS: ISCHYROPSALIS C. Koch.

2. A rágók nem feltünően hosszúk.

GENUS: NEMASTOMA C. Koch.

§§ A tapogató vege egy körömmel.

† A köröm fogacsolt.

3. A testen semmi tuskek:

GENUS: LEOBUNUM C. Koch.

†† A tapogató korne nem fogacsolt.

4. A negyedik lálpár czomb, terd, szar és másodvegye hosszabb, mint a többi lálpáron ugyanazon izek.

GENUS: EGAENUS C. KOCH.

5. A szemdudor igen nagy, hosszánál szelesebb:

GENUS: PLATYLOPHUS C. KOCH.

• A szemdudor arányos nagysága.

6. A tapogató hosszú, karesú; a rágók felül szarvszerűen kinyújtva:

GENUS: CERASTOMA C. KOCH.

7. A tapogató nem hosszabbított; a rágó nem szarvszerűen nyújtott:

GENUS: OPILIO HERBST.

A FAJOK SYNOPTICUS ÁTNÉZETE.

1. GENUS: ISCHYROPSALIS C. KOCH.

§ A két szem külön-külön dudoron áll.

1. *I. Helrigii* PANZER.

§§ A két szem közös dudoron áll. A lábak láthatólag szőrösek. A rágó és a tapogatópár fekete:

2. *I. manicata* L. KOCH.

2. GENUS: NEMASTOMA C. KOCH.

Egyszínű, sötét fajok:

§ A tapogatókon egyszerű szőrök:

1. *N. Dacicum*¹ L. KOCH.

§ Az egész tapogatón a szőrök gombokból indulnak. A szemdudor nem rovátkolt. Az állat egészen fekete:

2. *N. triste* C. KOCH.

Tarka fajok:

§ A tapogató fekete (a végtesten egy világos foltpár).

3. *N. bimaculatum* FABR.

§ A tapogatók világosabb színezetűek.

† A törzsön aranyos rajzok.

4. A háton, a szemek mögött, két esecsálaku dudor:

4. *N. Silbi* O. HERM.

5. A háton semmi dudor:

5. *N. glaucimanum* C. KOCH.

3. GENUS: LEIOBUNUM C. KOCH.

§ A czombok fogacsoltak.

1. A rágók töven, felül, egy-egy, sertebe végződő, kúpidomú dudor.

1. *Leobunum bicolor* FABR.

2. A rágó töve felett két széles lemez; a törzs felülete szemecsesen-ripacos, kopasz:

2. *L. hemisphaericum* HERBST.

§ A czombok sertekkel ellátva.

† A tapogató terdizen semmi nyújtvány.²

1. A lábak felülete durván szemecses-ripacos:

3. *L. nigricans* C. KOCH.

¹ Koch L. «Dacicum» n., szerintem Dacia után a «Dacicum» a helyes.

Az ellentétes faj; *L. bibrachiatum* a tapogató térdén nyújtványt visel; e faj eddig magyar földről ismeretlen.

2. A labák simák ; a szemdudor magas, elől függőleges :

4. *L. glabrum* L. KOCH.

4. GENUS: EGAENUS C. KOCH.

§ A végtesten semmi fogacsolások.¹

1. A rágók, a tapogató czombíze alul-felül, ez utóbbinak terdize is felül fogacsokkal fegyverzett :

1. *E. convexus* C. KOCH.

2. Ugyanazon részek csak sertekkel ellátva :

2. *E. ictericus* C. KOCH.

5. GENUS: PLATYLOPHUS C. KOCH.

§ A labák sertekkel ellátva.

1. A tapogatók végíze sertekkel borítva ; terdize oldalt három fogacsosál :

1. *P. pinctorum* C. KOCH.

§§ A labák fogacsokkal fegyverzettek.

2. A tapogató terdizen semmi fogacs :

2. *P. rufipes* C. KOCH.

+ A tapogató végizen, alul, semmi tüske.

3. A tapogató czombízen, alul, a tovon egy sertes kiszögelles :

3. *P. strigosus* L. KOCH.

4. A tapogató czombízen alul semmi kiszögelles.

A végtesten semmi fogacsolás.

4. *P. alpestris* C. KOCH.

6. GENUS: CERASTOMA C. KOCH.

§ A czombok tuskekkal fegyverzettek.

1. A fejresz előfelének a szele alatt, a rágók felett, két apró fogacs. A tapogató czombíze sertekkel ellátva :

1. *C. cornutum* LINNÉ.

§§ A czombok csak sertekkel ellátva.

2. A fejreszen semmi fogacs. A lábpárok szárizei hengerdedek.²

2. *C. molluscum* L. KOCH.

7. GENUS: OPILIO HERBST.

§ A test felszíne szemcses.

1. A test előszelen semmi előre- vagy kiálló tüske.³ A végtesten semmi fogacsorok.

1. *O. instratus* L. KOCH.

2. A végtesten harántsoros fogacsolás. A szárak hengerdedek.

2. *O. parictinus* DE GEER.

+ A szárak szögletesek (négyelűek).

* A rágók töve felett két fogacs.

3. A tapogató czombján, alul, hosszú, sertekben végződő fogacsok :

3. *O. pristis* L. KOCH.

4. A tapogató czombján, alul, kurta, a serteket oldalt bocsátó fogacsok :

4. *O. vorax* L. KOCH.

¹ Az ellentétes faj: *E. mordax* C. Koch a végtesten harántsorba állított fogacsokat visel. Eddig nem találtam

² Az ellentét: *C. brevicorne* szögletes szárakkal; nálunk nem találtatott.

Az ellentét: *O. terricola* 3 fogacsosál; nálunk nem találtatott.

†† A ragok töve felett semmi fogacs és semmi lemez.

a A tapogató czombíze sertekkel ellátva.

5. A czombok szögletesek (negyedűek).

6. A czombok hengerdedek:

5. *O. alpinus* HERBST.

6. *O. grossipes* HERBST.

§§ A test felszíne sima.

7. A tapogató sertekkel ellátva: czombíze felső végén egy befelé álló, kefeszerűen sertes kiszögellés; a második és negyedik lámpár czombja szögletes (negyedű):

7. *O. Rhododendri* L. KOCH.

AZ ELTERJEDÉS.

Ischyropsalis Helvigi PANZER. «Magyarbarlang» Bihar megyében, gyűjte Frivaldszky János: Erdelyből Kis-Disznódról és Praesbéról említi Sill Victor.

Ischyropsalis manicata L. KOCH. Erdélyi (Nagy-Szeben környékbeli) példányok után leírta Dr. KOCH L. (Zool. Mitth. aus Tirol. Der 43. Versammlung. deutscher Naturforscher und Aerzte gewidmet etc. Innsbruck 1869).

Nemastoma Daci(s)cum L. KOCH. Erdélyi példányok után leírta Dr. KOCH L. (mint a megelőző a). Magam Görgény-Szt-Imrén kövek alatt találtam.

Nemastoma triste C. KOCH. Pozsony (Dunai-göttek nyirkos, árnykos helyeken) gyűjte Dr. Böckh Gy. Magam Erdelyben, Görgény-Szt-Imrén gyűjtöttem, leginkább fakéreg alatt.

Nemastoma bimaculatum FABR. Pozsony (Dunai-göttek) Dr. Böckh. Alsó-Hámor (Borsod) kövek és hullott lomb alatt elgyűjtöttem.

Nemastoma Silli O. HERM. Erdely, Nagy-Szeben környékéről (leírása «Beitrag zur Kenntniss der Ar. Fauna Siebenbürgens. Verhandl. u. Mitth. des sich. Ver. für Naturwissenschaften in Hermanstadt. 1871): lásd jelen kötet X. tábla. 218 r. egész alak nagyítva, 219 törzs alulról, *m* rágó, *r* állkapocs, és a tapogató czombja, *c* csipők, *a* mellvért, *b* ráncz, *w* végbelnyílás.

Nemastoma flavimanum C. KOCH. Erdely: csiki havasok, a sziklafalak tövében gyűjtöttem. Seidlitz György Nagy-Szeben körül, Frivaldszky János a Krassó megyében fekvő «Plopa» barlangból szerezte.

Leiobanum bicolor FABR. Kolozsvár (Museumkert kerítése, valószínűleg a fenyvekkel került e kertbe); Bihar «Vlegyásza», «Piatra falherului» és az «Onesásza» barlang körüli sziklákon; azonkívül a Körösszoros szikláin is.

Leiobanum hemisphaericum HERBST. Kolozsvár (Museumkert kerítése).

Leiobanum nigricans C. KOCH. Csiki havasok (Egyeskő) Erdelyben; Sill Victor Praesbéról, Dr. Seidlitz N.-Szeben környékéről ismertettek.

Leiobanum glabrum L. KOCH. A Körösszoros sziklafalain.

Egacus convexus C. KOCH. Mehadiáról és Orsováról szerze Frivaldszky János; Nagy-Váradról Mocsáry Sándor. Erdelyben Deváról, K.-Disznódról Sillnel; Dr. Seidlitznel és Bergleiter G.-nel Nagy-Szebenből; az erdélyi muzeumban Kolozsvárról és Mező-Záhról.

Egacus ictericus C. KOCH. Kolozsvárról és Maros-Vásárhelyről az erd. muzeumban; Sillnel N.-Szeben környékéről.

Platylophus pinetorum C. KOCH. Kolozsvárról és a Hargita hegyegről (Mezőhavas) az erdélyi muzeumban; Tatra-Füreden gyűjte Frivaldszky János.

Platylophus rufipes C. KOCH. A Hargita hegyegről (Mezőhavas-Kacsa) az erd. Muzeumban; Sillnel Nagy-Szeben vidékéről.

Platylophus strigosus L. KOCH. Kolozsvárról és Nyarúdszeredáról az erdélyi muzeumban.

Platylophus alpestris C. Koch. Kolozsvárról s a Biharról (Onesásza sziklafal) az erdélyi múzeumban; Nagy-Szeben vidékéről Sillnel, Bergleiternél és Dr. Seidlitz jegyzékében.

Cerastoma cornutum L. Ungvár körül gyűjte Vidra Ferdinand; Kőszegről, továbbá Erdelyből (esiki havasok) és Nagy-Szebenből magam ismerem.

Cerastoma molluscum L. Koch. A esiki havasokról (Nagy-Hagymás-Kurmátura) az erdélyi múzeumban.

Opilio instratus L. Koch. Budapesten gyűjte Pavel János. Magam Erdelyből ismerem n. m.: a «Vlegyászáról», a «Mezőhavasról»; Bergleiter G. N.-Szeben körül gyűjtő.

Opilio parietinus DE GEER. Erdelyben Balánbánya, Kis-Disznód, Nagy-Szeben körül tenyeszik.

Opilio pristis L. Koch. Kolozsvár és Nagy-Szeben környéken fordul elő.

Opilio rorax L. Koch. Erdelyben a «Vlegyászán» és a «Praesben» találtatott.

Opilio alpinus HERBST. Erdelyben a «Nagy-Hagymás», «Mezőhavas» és «Vlegyásza» havasokról, továbbá Sillnel a Praesbéről ismeretes.

Opilio grossipes HERBST. Erdelyben Kolozsvárról és Nagy-Szeben körül találtatott.

Opilio Rhododendri L. Koch. Biharmegyében és Tatra-Füreden gyűjte Frivaldszky János: «Magyarország» jelzővel gyűjte Petenyi S.; magam a Krivan törpefenyő-övében (Händler) gyűjtöttem; Dr. Koch L. is Erdelyből említi.



II.

ANHANG.

ÜBERSICHT DER SPINNEN UNGARNS.

ÜBERSICHT DER SPINNEN UNGARNS.

Im Vorworte zum zweiten Bande dieses Werkes habe ich die Gründe angeführt, welche mich bewogen haben, von einer wortgetreuen Uebersetzung des III., beziehungsweise descriptiven Bandes abzugehen.

Ich habe mich aber auch entschlossen, diesem Bande eine Uebersicht beizugeben, welche den Anforderungen meiner ausländischen Freunde und Collegen entgegen kommen soll, und welcher ich hiermit einige Bemerkungen vorangehen lasse.

In der Einleitung des I. Bandes pag. 3 habe ich den Plan des Buches entwickelt und dort zweier Anhänge gedacht, deren erster eine kritische Recension derjenigen Arten enthalten sollte, welche in anderen Werken als aus Ungarn stammend angeführt erscheinen. Ich habe mich dieser mühevollen Arbeit auch unterzogen und dieselbe auch durchgeführt.

Es traten jedoch Umstände ein, welche mich bewogen haben von der Publication dieses Anhanges abzusehen.

Es ward mir nämlich mittlerweile gestattet, Spinnenarten zu untersuchen, welche die Grundlage zu verschiedenen Publicationen bildeten, und ich habe mich vollkommen überzeugt, dass die, zumeist auf W. HAUß und C. KOCH's grosses Werk und ausschliesslich auf Färbung basirten Bestimmungen so oberflächlich, eigentlich so unrichtig waren, dass eine Reduction derselben, d. h. der ihnen beigelegten C. KOCH'schen Benennungen, auf THORELL's synonymisch berichtigte Benennungen mehr als gewagt erschien. Dieser Umstand musste mein Vertrauen zu solchen Benennungen, welche ich mit den betreffenden Typen nicht confrontiren konnte, überhaupt vollkommen erschüttern.

So ward es mir z. B. gestattet, Dr. GEORG BÖCKH's gesamntes Materiale für das ungarische National-Museum zu erwerben, dasselbe zu überprüfen und mit den betreffenden Publicationen zu vergleichen. Ich habe mich bald überzeugt, dass meine, auf die kritische Richtigstellung der «Ueber die Spinnen der Umgebung Pressburgs» betitelten Abhandlung dieses Autors aufgewandte Mühe eine vergebliche war.

So führte Dr. BÖCKH z. B. unter «*Argyroneta aquatica*» an, die hintere Augenreihe sei «etwas gebogen» -- der Zeichnung nach «*procurva*» -- wo doch diese Reihe bei der wirklichen *Argyroneta* leicht ausgebogen, also «*recurva*» ist. Schon dieser Umstand war sehr störend. Weiters sagt er über das Vorkommen: „*unter Steinen*“. Die Ueberprüfung der sieben, in Dr. BÖCKH's Sammlung als «*Argyroneta aquatica*» bestimmten Thiere ergab, dass dieselben sammt und sonders *Amaurobius ferox* (WALCK) waren, auf welche Art dann Dr. BÖCKH's Kennzeichen allerdings passen.

Noch merkwürdiger erwies sich Dr. BÖCKH's «*Mithras undulatus*», also eine Orbitelarie, welche sich nach zahlreichen Exemplaren der Sammlung als *Monases cinctus* (C. KOCH), also eine Laterigrade erwiesen hat.

Eine Menge ähnlicher Fälle hat mich dazu bewogen den Anhang fallen zu lassen und diesen Gegenstand für eine spätere Zeit aufzubewahren.

Ich kann dies wohl um so leichter thun, als ich ja ohnehin bestrebt war, alles kritisch gesichtete, wichtigere Materiale zu verwenden und statt einer Recension von höchst problematischem Werth, eine auf kritisch bestimmtes Material gestützte Uebersicht zu geben.

Was nun diese Uebersicht anbelangt, so enthält dieselbe alle bisher beobachteten Arten nebst deren Verbreitung, soweit die letztere derzeit bekannt ist.

Eingefügt erscheinen alle neuen Arten, dann die Bemerkungen, welche sich für weniger bekannte oder sonst interessante Arten ergeben.

Mit Rücksicht auf den, im zweiten Bande publicirten Versuch eines biologischen Systemes, habe ich den Unterordnungen deren biologische Charakteristik vorangestellt.

Dann habe ich zu bemerken, dass ich mich rücksichtlich der Nomenclatur und der Schreibart, der Namen thunlichst an THORELL's synonymische Bestimmungen und die, die Schreibart regelnden Ausführungen gehalten habe.

Der Umstand, dass die nachfolgende Uebersicht mit dem im ersten Bande gegebenen Verzeichniss nicht ganz genau übereinstimmt, findet in Folgendem seine Erklärung: bei einigen Namen, wie z. B. bei *Meta fusca* (De Geer) musste auf Grund des *lex prioritatis* eine synonymische Richtigstellung platzgreifen u. z. zu Gunsten SCOPOLIS, der diese Art schon 1763 unter dem Speciesnamen „*Merianae*“ anführt; einige wenige Arten, so *Epeira regia* habe ich fortgelassen, weil mir hinsichtlich der betreffenden Thiere nachträglich Zweifel aufstiegen; dagegen habe ich einige neuere Funde eingereiht.

Endlich habe ich zu bemerken, dass das Manuscript des dritten, also descriptiven Bandes im März des Jahres 1875 der königlich ungarischen Naturwissenschaftlichen Gesellschaft eingereicht wurde, was bei Beurtheilung der Prioritätsrechte zu berücksichtigen sein wird.

Der Plan des Werkes, besonders aber die Erweiterung des zweiten Bandes haben es nicht gestattet, den descriptiven Theil früher erscheinen zu lassen.

Ausser diesen ergeben sich noch folgende ganz specielle Bemerkungen.

Die synonymischen Bestimmungen sind nach THORELL gegeben und habe ich in gegenwärtiger Uebersicht dem Genus und Speciesnamen ausser dem Autor auch noch die Jahreszahl der Creirung beigefügt. Im ungarischen Texte ist die Quelle für Synonymik sowohl beim Genus, als auch bei der Species immer angegeben und kann dort leicht nachgesehen werden.

ABKÜRZUNGEN.

AUS. = AUSSERER.	FABR. = FABRICIUS.	POD. = PODA.
BLACKW. = BLACKWALL.	FUES. = FUESLIN.	SAV. ET AUD. = SAVIGNY ET AUDUIN.
BRUL. = BRULLÉ.	KEYS. = KEYSERLING.	SCOP. = SCOPOLI.
CAMBR. = CAMBRIDGE.	LATR. = LATREILLE.	SIM. = SIMON.
CANESTR. = CANESTRINI.	L. = LINNÉ.	STR. = STROEM.
C. K. = CARL KOCH (SEN.).	L. K. = LUDW. KOCH (JUN.).	SUND. = SUNDEWALL.
CL. = CLERCK.	LUC. = LUCAS.	THOR. = THORELL.
DOBL. = DOBLIKA.	O. H. = HERMAN.	WALCK. = WALCKENAER.
DOL. = DOLESCHALL.	OLIV. = OLIVIER.	WESTR. = WESTRING.
DORTH. = DORTHÉS.	PALL. = PALLAS.	WID. = WIDER.
DUF. = DUFOUR.	PANZ. = PANZER.	

ORDNUNG:

A R A N E A E.

Orismologische Bestimmung.

Flügellose Thiere.

Der Leib besteht aus zwei Theilen: aus dem Cephalothorax und aus dem nicht segmentirten Hinterleib, welche beide durch ein dünnes Stielchen verbunden sind.

Am Thorax vier Paar siebengliedrige Füße.

Am Ende eines jeden Fusses ein, aus gezinkten Klauen bestehendes Webeorgan.

Am Ende des Hinterleibes ein warzenförmiges, paariges, gegliedertes, mit Spulen versehenes Spinnorgan.

Die Klaue der Mandibeln einschlagbar, der Länge nach durchbohrt.

Einfache Augen in symmetrischer Gruppierung.

Keine Fühler.

Die Maxillen mit fussförmigen Tastern, welche je nach dem Geschlechte anders eingerichtet sind und eine verschiedene Bestimmung haben.

Biologische Bestimmung.

Keine Metamorphose. Die Entwicklung geschieht durch Häutungen, welche an der postembryonalen Form des Thieres keine wesentliche Veränderung bewirken.

Letztes Moment der Entwicklung ist die volle Ausbildung der Geschlechtsorgane.

Das Spinn- und Webeorgan wirkt vom Momente des Ausschlüpfens aus dem Ei beständig.

Der Function dieser beiden Organe entspricht die Lebensweise und die Organisation.



I. SECTION.

THERATRICAÆ.

I. UNTERORDNUNG.

O R B I T E L A R I A E.

Die Radnetz-Spinnen geben der Organisation und Lebensweise nach unstreitig das typische Bild der Ordnung.

Die Art und Weise, wie dieselben in den Kreis der Naturerscheinungen eingreifen, ist die echte Spinnen-Art und Weise, und diese wird wie folgt charakterisirt: sie beherrschen leere Räume und nehmen dort Aufenthalt, wo fliegende Thiere blos durchzufliegen vermögen.

Das Hauptwerkzeug dieser Eigenschaft ist das, geometrische Formen weisende, in planer Fläche gespannte Radnetz, welches stets den Verhältnissen angepasst ist; die Extreme der Spannung bildet die vertikale und horizontale Stellung; zwischen beide fallen die endlosen Reihen der geneigten Stellungen.

Die Fähigkeit des Netzknüpfens ist innerhalb der Unterordnung nicht gleich; in der zweiten Unterfamilie, bei den Uloborinen nimmt dieselbe sichtlich ab.

Auf den vertikal und geneigt gespannten Netzen ist die Stellung der Thiere stets kopfabwärts und stets auf der geschützteren Seite.

Ihre Füsse sind zum Weben und zum Verkehre auf den Faden geschaffen, was besonders durch eine gewisse Steifheit der Tarsenglieder bekundet wird, welche eine Ausbiegung der Tarsen nur in geringem Maasse gestattet, woraus folgt, dass die Thiere auf dem Boden mit den Fusspitzen auftreten und auf glatten Flächen durchaus nicht fortkommen können.

Rücksichtlich der Körpergrösse sind Abstufungen vorhanden; sie variirt von der Grösse eines Hanfkornes bis zu jener einer Haselnuss; dieser Abstufung entsprechen auch die Netze besonders rücksichtlich der Fadenstärke.

Die Hauptperiode ihrer Wirksamkeit fällt der Tageszeit nach auf die Dämmerung, vorzüglich jene des Abends; dort jedoch, wo die Beute häufig ist, sind sie auch tagsüber thätig, vornehmlich im Schatten, welchen sie mit Vorliebe aufsuchen.

Eine gemeinschaftliche Eigenschaft Aller ist die, dass sie, berührt, zu Boden fallen und dort mit an den Leib gezogenen Füßen eine Weile liegen bleiben; sobald die Störung aufhört, kehren sie auf demselben Faden zum Netz zurück, welchen sie während des Falles entwickelt haben. Jene Erschütterung des Netzes, welche die einfallende Beute verursacht, unterscheiden sie von jener, welche ein in das Netz gerathener lebloser Körper bewirkt: sind sie über die Natur der Erschütterung im Zweifel, dann eilen sie zum Mittelpunkt des Netzes, krallen sich fest und vollführen ungemein schnelle schwingende Bewegungen,

welche das ganze Netz erschüttern und das Schlagen der Beute, beziehungsweise das Fallen des fremden Körpers bewirken.

Die starke Beute wird mit grosser Eile eingesponnen, sichtlich um das Netz zu schonen: zu diesem Behufe kehren sie der Beute die Spinnwarzen zu, drücken dieselben an die Beute, stellen sie in eine Reihe, wodurch die Fäden bandartig herausströmen und wickeln so die Beute mit Hülfe des hintersten Fusspaares förmlich ein.

Ist die Beute geeignet, so wird sie von der Fangstelle abgelöst, frei zum Mittelpunkte befördert und dort verzehrt; ist die Beute schwer, dann wird sie mittelst Fäden zum Mittelpunkte, beziehungsweise zum Verstecke befördert, u. z. so, dass die Fäden in der Förderungsrichtung stets straff gespannt, in der entgegengesetzten dagegen nach und nach gelockert werden.

Die allzuschwere Beute saugen sie auf der Fangstelle aus; hat dieselbe das Netz nicht ganz zerstört, so wird sie losgelöst und fallen gelassen, worauf das Netz sorgfältig ausgebessert wird. Die Ueberreste der kleineren Beute werden mit einer abstossenden Bewegung des Vorderleibes entfernt (blos *Cyrtophora conica* scheint hievon eine Ausnahme zu bilden).

Rücksichtlich des Aufenthaltes herrschen sie besonders in den Niederungen, im Vorgebirge und am Fusse des Hochgebirges und nehmen gegen die Baumgrenze der Alpen ab, werden über die Baumgrenze hinaus stets seltener, bis sie in einer Höhe von etwa 2000 Metern über dem Meere bloss durch eine Form repräsentirt werden. So weit in den Höhlen das Halbdunkel herrscht, sind sie ebenfalls vorhanden.

In ihrer Thätigkeit werden sie mehr durch die Feinheit des Fühlens, als durch die Sehkraft geleitet; vom Gehörsinne ist keine Spur vorhanden.¹

Ihre Thätigkeit kennt kaum irgend welche Grenzen, da sie mit Hülfe des Fadenschliessens überall hingelangen, wo ihr Eingriff am Platze ist.

In dem System, welches die Thätigkeit der Spinnenordnung darstellt, fällt ihnen die Aufgabe zu, die Insekten im Durchfluge zu massregeln.

Hinsichtlich der Generationsfolge ist diese Unterordnung die Winterperiode hindurch beinahe durchgehends nur durch Eier gesichert; in geschützten Lagen, besonders in den Wohnungen des Menschen jedoch, überwintern einige Arten und halten eine Kalte von 6 bis 10° R. ohne Schaden aus; die Winterperiode verbringen sie regungslos in einer Art Erstarrung.

Ihre Eier versorgen sie sehr umsichtig; dieselben sind in ein warmes Gewebe gehüllt und meist noch durch eine pergamentartige äussere Hülle geschützt.

¹ Rücksichtlich dieses Sinnes habe ich directe Beobachtungen angestellt. Auf dem Gange meiner Wohnung, welcher vor Luftzug vollkommen geschützt ist, habe ich *Epeira cornuta* (Cl.) angesiedelt, welche gar bald über die wohlverkitteten Fensterscheiben-Netze spannten. In der Abenddämmerung, als die Thiere im Mittelpunkte des Netzes Lauerstellung nahmen, also am regsten waren, näherte ich ihnen eine ausserordentlich hellklingende, b' gestimmte, mit federndem Klöppel versehene Tischglocke und liess dieselbe plötzlich erschallen, ohne dass die Thiere Unruhe gezeigt hätten. In einer Entfernung von etwa 2 Cfm wurden die Thiere gestört, nicht lich dadurch, dass das Schwingen des Klöppels die Luft und diese das Netz erschütterte. Da es aber gewiss ist, dass manche Thiere für gewisse Geräusche eine erhöhte Empfindlichkeit zeigen, führte mich die, den Insecten entnommene Analogie zur Anwendung eines schrillenden Geräusches, welches ich mittelst einer feinen Feile und eines Bleches bald schwächer, bald stärker hervorrief, jedoch ohne Erfolg. Es scheint gewiss, dass alle jene Fälle, welche in der Literatur enthalten sind und unter Anderem von einer musikalischen Vorliebe der Spinnen sprechen, auf *fühlbare* Schwingungserscheinungen zurückzuführen sind; hierher gehört die Spinne Grétrys, welche Praeludien «bewundert» hat; die Spinne Pelisson's in der Bastille, welche durch die Töne einer Geige hervorge lockt wurde; so Walckenaers Taucherspinnen, welche auf die Oberfläche kamen. Auf Fortepianos sieht man oft Spinnen, welche während des Spieles der Schwingung nachgehen.

I. FAMILIE. EPEIROIDAE. SPEICHENWEBER.

I. SUBFAMILIE. EPEIRINAE. KREUZSPINNEN.

1. GENUS: ARGIOPE DUF. (1825).

1. *Argiope lobata* (PALL 1772). Tafel IX 192 ♀, 193 ♂ nat. Gr. Budapest, Ofner Seite (Zugliget), Pester Seite (Rákos); Neograder Comitatus (unbekannter Punkt). Ende Juni geschlechtsreif; spannt ihr schönes Netz in schattigen Lagen der Gebüsche, im hohen Grase.

2. *Argiope Bruennichii* (Scop. 1772). Klausenburg, Hermannstadt, Grosswardein, Budapest, Doroszló. Im Juli geschlechtsreif; liebt feuchte, üppig bewachsene Lagen.

2. GENUS: EPEIRA (WALCK. 1805).

1. *Epeira grossa* C. K. (1845). Klausenburg, Bonezhida, Szász-Vesszős, Sátoraj-Ujhely, Fünfkirchen, Budapest. Im Juli geschlechtsreif; liebt Wälder, Gesträuche, Ziergärten.

2. *Epeira Circe* SAV. ET AUD. (1825?). Untere Donau, Gegend der Veterani Höhle an Felsen, Mehadia; mit der Bezeichnung «Banat» im Hofmuseum in Wien.

3. *Epeira angulata* (CL. 1757). Klausenburg, Balánbánya, Hosszutelke, Hermannstadt, Diósgyőr, Alsó-Hámar, Sátoraj-Ujhely, Budapest, Ungvár. Im Juli geschlechtsreif; in Wäldern und Parkanlagen häufig.

4. *Epeira dromadaria* WALCK (1802). Klausenburg, Mező-Záh, Szász-Vesszős, Apatin, Palánka, Illok, Pancsova, Orsova, Donauenge bis Bázias, Rakamaz, Tokaj, Grosswardein, Fünfkirchen, Budapest, Dabas. Oft schon Ende Mai geschlechtsreif; Netz im üppigen Graswuchse, meist nahe am Boden; häufig an Waldrändern auf Gesträuch.

5. *Epeira arbustorum* C. K. (1837). Hermannstadt unter dem Namen *E. bicornis* bei SILL angeführt.

6. *Epeira diademata* (CL. 1757). Von den Niederungen, wo sie überall häufig ist, bis zur Höhe von etwa 2000 Meter (Central-Karpathen) verbreitet. Im Spätsommer geschlechtsreif.

7. *Epeira marmorea* (CL. 1757). Mit vier Varietäten, worunter CLERCK's *Araneus marmoreus*, *habel* und *pyramidatus* und unzähligen Uebergängen. Klausenburg, Mező-Záh, Békás-Pässe (Ost-Siebenbürgen), Bonyha, Szász-Vesszős, Hermannstadt; «Prvnyiszka» bei Csorba in den Central-Karpathen besonders reich, Orsova, Alsó-Hámar, Lykanka, Ruttká, Lucivna, Insel Csepel.

8. *Epeira quadrata* (CL. 1757). Klausenburg, Mező-Záh, Parajd, Tölgyes, Hermannstadt, Szász-Vesszős, Csiker Alpen, Alsó-Hámar, Lucivna, Veszprém, Rákospalota. Ende Juli geschlechtsreif; liebt den hohen Pflanzenwuchs in feuchten Lagen, Disteln, Maispflanzungen, Sumpfränder.

9. *Epeira cornuta* (CL. 1757). Klausenburg, Szamosfalva, Mező-Záh, Gyeke, D.-Szt.-Márton, Hermannstadt, Doroszló, Zombor, Rác-Militics, Bogojeva, Apatin, Neusatz, Zimony, Pancsova, Békés-Csaba, Szajol, Rakamaz, Tokaj, S.-A.-Ujhely, Veszprém, Balaton-Füred, Stuhlweissenburg, Grosswardein, Fünfkirchen, Budapest, Gyilkostó in Siebenbürgen (merkwürdiges Vorkommen, da der See erst im 3. Jahrzehnt dieses Jahrhunderts durch Bergrutschung entstand und das Rohr erst später, wahrscheinlich durch Wasservögel verpflanzt wurde). Mehrere Generationen. Im Rohre der Sümpfe, sonst in feuchten Lagen überaus häufig; ausschliesslich den Niederungen angehörend.

10. *Epeira patagiata* (CL. 1757). Klausenburg, Szász-Vesszős, Hermannstadt, Bogojeva, Doroszló, Palánka, Pancsova, Tokaj, Rakamaz, S.-A.-Ujhely, Lucivna, Csorba, Liptó-Szt.-Miklós, Kremnitz, Veszprém, Grosswardein, Budapest, Ungvár, Balánbánya. Scheint nur eine Generation zu haben; im Gesträuche, oft auch im Grase häufig.

11. *Epeira Alsine* (WALCK. 1802). Als *E. lutea* C. K. bei SILL aus der Umgebung von Hermannstadt angeführt.

12. *Epeira umbratica* (CL. 1757). Klausenburg, Mezö-Záh, Gyeke, Parajd, Gyergyó-Szt-Miklós, Borszék, Ilva, Hosszútelke, Torda, Szász-Vesszös, Doroszló, Illok, Pancsova, Orsova, Jeselnicza, Mehadia, Ungvár, Alsó-Hámar, Miskolez, Schemnitz, Güns, Fünfkirchen, Hermannstadt. Scheint zwei Generationen zu haben; mit Vorliebe in der Umgebung menschlicher Wohnungen. Ausschliesslich Schattenthier und nur des Nachts thätig.

13. *Epeira scolopetaria* (CL. 1757). Gleiche Verbreitung und ähnliche Lebensweise mit der vorigen Art. Das ganze Jahr hindurch geschlechtsreife Individuen vorhanden. Ueberwintert in menschlichen Wohnungen.

14. *Epeira sollers* WALCK (1841). Klausenburg, Mezö-Záh, Doroszló, Fünfkirchen, Budapest, Orsova, Komjáti, Szász-Vesszös. Auf abgestorbenen Pflanzen im Frühjahr und Herbst.

15. *Epeira agalena* (WALCK. 1802). SILL führt dieselbe aus der Umgebung von Hermannstadt sub *E. agelena* C. Koch an.

16. *Epeira Victoria* THOR. (1870). Klausenburg, Gyeke, Budapest, Rákospalota. Scheint im Gegensatze zur folgenden Art, den Niederungen anzugehören.

17. *Epeira ceropegia* (WALCK. 1802). Hargita Trachytgebirge bis 1300 - 1500 Meter, Gyergyó-Szt-Miklós, Balánbánya, Csorba. Ausschliesslich in hohen Lagen, Grasthier.

18. *Epeira adianta* (WALCK. 1802). Klausenburg, Mezö-Záh. Mitte Sommers geschlechtsreif; bei Klausenburg auf Schlehdorn; bei M.-Záh besonders leicht gefärbte Varietät.

19. *Epeira cucurbitina* (CL. 1757). Klausenburg, Oláhfenés, Mezö-Záh, Gyergyó-Szt-Miklós, Hargita (bis 1500 Meter) Hermannstadt, Bázna, Pancsova, Orsova, Ogradena, Baziás, Tokaj, S.-A.-Újhely, Bükkgebirge, Csorba, Grosswardein, Budapest, Ungvár. Häufig; in den Niederungen Früh-, in höheren Lagen Hochsommerthier, mit ausgesprochener Vorliebe für Gesträuch.

20. *Epeira alpica* L. K. (1869). Alsó-Hámar, Tátrafüred. Bisher als seltene Erscheinung aus der Tannenregion bekannt.

21. *Epeira acalypha* (WALCK. 1802). Klausenburg, Szász-Vesszös, Korond, Balánbánya, Tölgyes, Mezö-Záh, Gyeke, Szent-László, Torda, Hermannstadt, Új-Palánka, Pancsova, Orsova, Ogradena, Baziás, Tokaj, Tarczai, Rakamaz, S.-A.-Újhely, Alsó-Hámar, Grosswardein, Fünfkirchen, Mehadia, Budapest. Im Mai geschlechtsreif; in hohem Pflanzenwuchs, am Rande der Gesträuche häufig; ausschliesslich Tagthier.

22. *Epeira diodia* (WALCK. 1802). Ogradena, Klausenburg. Am Fusse von Felsen, im Schatten.

3. GENUS: CYRTOPHORA (SIM. 1864).

1. *Cyrtophora conica* (PALL. 1772). Klausenburg, Szász-Vesszös, Mezö-Záh, Balánbánya, Békás-Pass, Hermannstadt, Bogojeva, Palánka, Orsova, Mehadia, Ogradena, Alsó-Hámar, Fünfkirchen, Budapest, Dabas. Zwei Generationen; in Gärten, auch in Wäldern theils am Rande, theils im Hochwald.

4. GENUS: SINGA (C. K. 1836).

1. *Singa hamata* (CL. 1757). Orsova, Rakamaz, Grosswardein, Klausenburg, Szamosfalva, Mezö-Záh, Hermannstadt, Disznód, Doroszló, Apatin, Palánka, Neusatz, Pancsova, Orsova, Ogradena, S.-A.-Újhely, Stuhlweissenburg, Grosswardein, Budapest. Im Frühjahre geschlechtsreif, hat wahrscheinlich auch eine Herbstgeneration; am häufigsten an Sumpfrändern, aber auch im hohen Grase.

2. *Singa Lucina* (SAY. ET AUD. 1825 ?) Doroszló und Plattensee. Mit syrischen Typen vollkommen übereinstimmend; im Rohre.

3. *Singa Herii* (HAHN. 1831). Pancsova, Klausenburg. Frühjahrsform; im Schilf der Sümpfe.

4. *Singa pygmaea* (SUND. 1830). Klausenburg, Balánbánya, Mező-Záh, Doroszló, Apatin, Palánka, Pancsova, Tokaj, Grosswardein Frühjahrsform; besond. an grasigen Böschungen der Dämme (nur ♀ bekannt.)
5. *Singa albovittata* (WESTR. 1851). Klausenburg (Heuwiesen).
6. *Singa sanguinea* C. K. (1845). Ó-Hutta, Rakamaz, Hermannstadt. Seltener Sommerform.

5. GENUS: CERCIDIA TH. (1869).

1. *Cercidia prominens* (WESTR. 1851). Apatin, Ogradena, Tokaj. In Schilf und Gesträuch ziemlich selten.

6. GENUS: ZILLA (C. K. 1834).

1. *Zilla x-notata* (CL. 1757). Pressburg (Donauauen) auf *Populus Canadensis*.
2. *Zilla montana* C. K. (1839). Hohe Tatra (Central-Karpathen) Kriván, Region über der Krummholz-Zone bis zum Zeleno-See; an Granitblöcken.
3. *Zilla Thorelli* AUS. (1871). In Dr. G. Böckh's Sammlung ein typisches Exemplar (♀) unter der Benennung «*Epeira Modrensis* Böckh», wornach der Fundort Modern ist. Unstreitig hat Dr. Böckh diese Form früher als Dr. G. MAYR entdeckt, sie aber nirgends beschrieben.
4. *Zilla Stroemii* TH. (1870). Doroszló, Pancsova, Görgény-Szt-Imre. Sommerform, besonders an Baumstämmen, Holzstössen

7. GENUS: META (C. K. 1836).

1. *Meta Menardii* (LATR. 1804). Klausenburg, Körös-Schluchten (in Höhlen), Bihargebirge (Ončasza-Höhle), Alsó-Hámor (Keller), ebendort Szeleta-Höhle, Grosswardein; La-Cruce-Höhle, Budapest. In wärmeren Höhlen beständig vorhanden; liebt das Halbdunkel.
2. *Meta Merianae* (SCOP. 1763). Im Verzeichnisse des I. Bandes als *M. fusca* (De Geer) angeführt. Illok, Mehadia, Ponyikova-Höhle (untere Donau), Ogradena, Báziás, Tokaj, Tarczal, Bodrog-Keresztur, S.-A.-Ujhely, Alsó-Hámor, Szilvás (Borsod), Ujlutta, Csorba (See), Kremnitz, Schemnitz, Budapest, Körös-Schluchten, Klausenburg, Csiker Alpen. Liebt feuchte Oertlichkeiten, weniger Pflanzen als Erdreich und Felsen. Den ganzen Sommer hindurch vorhanden.
3. *Meta segmentata* (CL. 1757). Klausenburg, Szamosfalva, Szász-Vesszős, D.-Szt-Márton, Illok, Pancsova, Mehadia, Rakamaz, Alsó-Hámor, Lykanka, Kremnitz, Veszprém, Budapest, Insel Csepel. Hat zwei Generationen; auf üppigen Pflanzen feuchter Oertlichkeiten tagsüber thätig.

8. GENUS: TETRAGNATHA (LATR. 1804).

1. *Tetragnatha extensa* (L. 1758.) Klausenburg, Oláhfenes, Mező-Záh, Gy.-Szt-Miklós, Hermannstadt, Doroszló, Apatin, Palánka, Illok, Neusatz, Zimony, Orsova, Pancsova, Mehadia, Schuppanek, Ogradena, Báziás, Rakamaz, Tarczal, S.-A.-Ujhely, Alsó-Hámor, Diósgyőr, Central-Karpathen bis zur Tannengrenze, Balatonfüred, Stuhlweissenburg, Grosswardein, Güns, Schmecks, Budapest, Ungvár. Zwei Generationen; am Rande der Gewässer besonders häufig; tagsüber thätig.
2. *Tetragnatha obtusa* WESTR. (1861). Doroszló, Apatin, Tokaj, Grosswardein, Ungvár. Im Sommer; scheint für das Laub der Bäume und trockenere Lagen eine Vorliebe zu haben.

II. SUBFAM. ULOBORINAE. FRESSSPINNEN.

9. GENUS: ULOBORUS. LATR. (1806).

1. *Uloborus Walckenaerii*. LATR. (1806). Orsova, Rákospalota. Sommerform; nach eigener Beobachtung auch in Bachgeröllen.

10. GENUS: HYPTIOTES WALCK. (1833).

1. *Hyptiotes paradoxus* (C. K. 1834). Sarpatak, Szász-Vesszős. An beiden Fundorten im Gesträuche von Berglehnen.

II. UNTERORDNUNG.

R E T I T E L A R I A E.

Die Unterordnung der Retitelarien zeigt der Gestalt, der Organisation und den Geweben nach Abweichungen: sie ist nicht so gleichmässig, wie die vorige.

So weit die Formen im Knüpfen der Gewebe Beständigkeit zeigen, beherrschen sie ebenfalls die leeren Räume, sie begnügen sich jedoch mit beschränkteren Localitäten, auch bildet der Fangapparat keine ebene Fläche, sondern ein empfindlich gespanntes Fadenlabyrinth, dem sich ein Segel oder ein aus fremden Körpern erbauter Schirm anschliesst.

In sehr beschränkten Localitäten werden eben nur einige, den Umständen angepasste Schlingen angebracht; manche Formen scheinen ihre Fäden in einem gewissen Umkreise anzubringen und diesen zu begehen.

Die Biegsamkeit der Tarsen gestattet es, dass sie sich auch auf dem Boden ziemlich rasch und sicher bewegen.

In ihren Geweben und Schirmen ist ihre Stellung stets mit dem Rücken nach abwärts gekehrt. Der Grösse nach stufen sie sich von Erbsengrösse bis zu jener eines Hanfkornes ab.

Ihrer Thätigkeit nach sind sie meist Tagthiere; ein gewisser Theil entzieht sich der directen Einwirkung der Sonnenstrahlen; ein anderer Theil sucht absoluten Schatten und liebt das Halbdunkel, ja sogar die ewige Finsterniss der Höhlen.

Berührt, lassen sich einige fallen; andere retten sich durch die Flucht oder das Verbergen.

In zweifelhaften Fällen erschüttern sie auch ihr Netz: die Beute befestigen sie durch Schlingen, auf die Art, dass sie ihr die Spitze des Hinterleibes zukehren, mit dem vierten Fusspaare Fäden ziehen und mit diesen die Beute bewerfen. Nur grosse Beute verzehren sie an der Fangstelle; die schwächere wird befreit, vermittelt eines Fadens an eines der Beine des vierten Paares befestigt und so schwebend zum Verstecke getragen; oft schleppen sie die Beute auch vermittelt Fadenspannung fort.

Rücksichtlich des Aufenthaltes entfällt die grössere Zahl ebenfalls auf die Niederungen; sie gehen aber auch über die Baumvegetation der Alpen hinaus, auch steigen sie bis in die tiefsten Tiefen der Schächte und Höhlen.

In ihrer Thätigkeit sind sie sehr frei; sowohl durch Fadenschiessen, als auch durch das Auf- und Nieder-Fahren vermittelt der Faden vermögen sie die denkbar verschiedensten Lagen zu erreichen. Das pendelartige Fortschwingen steht ebenfalls in ihrer Gewalt. Dieses besteht darin, dass sie sich an einem Faden hängend durch den Wind von Gegenstand zu Gegenstand fortschwingen lassen.¹

Im Systeme der Spinnenthätigkeit sehen sie es auch auf die Beschränkung durchfliegender Insecten ab, ganz besonders auf kleine und kleinste Formen derselben. Mit ihren Geweben überspannen sie nicht nur die Räume, sondern sie füllen dieselben auch aus.

¹ Dieses ist eine neuere Beobachtung. Diese Art von Ortsveränderung der Spinne ist höchst interessant und anziehend, ganz besonders dadurch, dass die Spinne die Länge des Fadens experimentell bestimmt, indem sie denselben bald verlängert, bald verkürzt und so denselben der Windstärke anpasst. Nachdem hier das Verhältniss des Thieres zum Faden jenem des Pendelkopfes zu dessen Stiele entspricht, habe ich diese Art der Fortbewegung «pendelartig» genannt.

Hinsichtlich der Generationsfolge hängen sie nicht ausschliesslich von überwinterten Eiern ab, sondern es überwintert der grössere Theil in postembryonalen Stadien, und setzt die Fortpflanzung fort.

Sowohl hinsichtlich der Lebensweise als auch der Generationsfolge zeigen sie eine Menge von Uebergängen zur vorigen und der nachfolgenden Unterordnung.

1. FAMILIE. THERIDIIDAE. WIRKSPINNEN.

1. GENUS. PACHYGNATHA, SUNDB. (1823).

1. *Pachygnatha Clerckii*, SUNDB. (1823). Doroszló, Apatin, Ungvár, Kaschau. Schon im März geschlechtsreif; Gewebe unbekannt; fleissig im Fadenschiessen. Ueberwinterung ganz ausser Zweifel; wurde bei starkem Frost am 5-ten Jänner 1874 unter einem Hufe eines umgestandenen Pferdes auf einer Wiese durch den tüchtigen Hemipterologen Dr. G. v. Horváth in Mehrzahl gesammelt.

2. *Pachygnatha Listeri*, SUNDB. (1830). Doroszló. Im Frühjahr beim Fadenschiessen beobachtet.

3. *Pachygnatha De Geerii*, SUNDB. (1830). Klausenburg, Torda, Szász-Vesszős, Csiker Alpen, Mező-Záh, Hermannstadt, Doroszló, Pancsova, Lykauka, Kremnitz, Balaton-Füred, Budapest, Ungvár, Komjáti, Kaschau. Weitaus die häufigste und weitverbreiteteste Art, welche ebenfalls überwintert (durch Dr. v. Horváth mit *P. Clerckii*, Sundb. unter ganz gleichen Umständen und zusammen gesammelt.)

2. GENUS. EPISINUS, WALCK. (1809).

1. *Episinus truncatus*, WALCK. (1809). Pressburg, Apatin, Ogradena, Tokaj, S.-A.-Újhely, Budapest. Sommerthier, welches ich im Verdachte einer Orbitelarie habe; wenigstens fand ich ein ♀ am Fusse des Felsens Csukár mare in der unteren Donauenge auf dem Leitfaden eines kleinen Radnetzes in Streckstellung, ohne dort ein anderes Thier entdecken zu können. Freilich war ebendort die kleine *Epeira dio-dia* häufig. Sonst Sommerthier; oft im Moose herumstreifend.

3. GENUS: LINYPHIA (LATR. 1804).

1. *Linyphia montana* (CL. 1757). Klausenburg, Nagy-Czég, Görgény-Szt-Imre, Hermannstadt, Szász-Vesszős, D.-Szent-Márton, Apatin, Doroszló, Zimony, Pancsova, Orsova, Ungvár. Das ganze Jahr hindurch vorkommend, überwintert sie in halbwegs geschützten Localitäten; ist vorwiegend in der Nähe von Wohnungen, besonders in Gärten zu treffen, liebt aber auch Auen, besonders die Höhlungen alter Weiden und Eichen.

2. *Linyphia bucculenta* (CL. 1757). Doroszló, Kaschau, Klausenburg, Hermannstadt. Sicher überwinterte Art, welche besonders den Rasen an festen Gegenständen, wie Grabsteine etc. liebt. Wurde von Dr. Horváth mit *Pachygnatha Clerckii* und *De Geerii* (vide oben) im Winter gesammelt.

3. *Linyphia marginata* C. K. (1834). Klausenburg, Parajd, Mező-Záh, Nagy-Czég, Hermannstadt, Doroszló, Pancsova, Orsova, Ogradena, Báziás, Tokaj, Tarczal, Alsó-Háamor. Sommerthier; vorwiegend auf Gesträuchen; im Süden des Landes besonders häufig.

4. *Linyphia emphana* (WALCK.) Alsó-Háamor, Diósgyőr. Sommerthier; besonders in Schlagen im Geäste gefällter, ausgedorrter Bäume.

5. *Linyphia phrygiana*, C. K. (1836). Tatra-Füred (Schmecks). Von J. von Frivaldszky unter unbekannten Umständen gesammelt.

6. *Linyphia triangularis* (CL. 1757). Alsó-Háamor, Csorba, Central-Karpaten, Pribilina, Zakameniszko, Lykauka, Ruttka, Kremnitz, Schemnitz, Veszprém, Budapest, Szász-Vesszős, Körös-Pass, Klau-

senburg, Hermannstadt. Bergthier auf Gesträuchen; steigt vom Vorgebirge weit in die subalpine Region hinauf; Körpergrösse stark variirend.

7. *Linyphia frutetorum*, C. K. (1834). Palánka, Illok, Orsova, Mehádia, Ogradena, S.-A.-Ujhely, Alsó-Hámar, Fünfkirchen, Klausenburg. Auf Gesträuchen häufig; im Süden des Landes im Frühjare, im Norden Sommers geschlechtsreif.

8. *Linyphia hortensis* SUND. (1830). Doroszló, Tokaj, Alsó-Hámar. Als Frühlings- und Sommer-Erscheinung, jedoch nicht näher beobachtet.

9. *Linyphia clathrata* SUND. (1830). Zombor. In den Achselwinkeln von Grabkreuzen.

10. *Linyphia pusilla* SUND. (1830). Tarczal, Klausenburg, Mező-Záh. Meist unter dem überhängenden Rasen abstürzenden Erdreiches.

11. *Linyphia alticeps*, SUND. (1833). Central-Karpathen, Kriván-Stock an der oberen Baumgrenze im üppigen Grase am Fusse von Tannen. Im August geschlechtsreif.

12. **LINYPHIA ALPINA** n. sp. (VII. Tafel, 152, *a* Augenstellung, *b* Hinterleib des ♀ Seitenansicht, *c* desselben Epigyne von rückwärts betrachtet, *d* Taster des ♂ von der Seite dargestellt).

♀ Klein. Cephalothorax licht braungelb mit haarfeinem, schwärzlichen Rand. Beine licht braungelb.

Oberfläche des Hinterleibes weisslich, mit schmutzigbraunem Geäder netzartig überzogen, in der Mitte ein verwaschener bräunlicher Mittelstreif, in den Seiten ein braunes Feld, welches vom schwärzlichen Bauche weiss abgegrenzt ist. Brustplatte braun.

Mittelaugen der vorderen Augenreihe so wie die Seitenaugen beider Augenreihen in gemeinschaftlichen schwarzen Flecken; die Mittelaugen der hinteren Reihe je in einem besonderen schwarzen Ringe. Die Mittelaugen beider Reihen in ein nach vorne verengtes Trapez gestellt; die hintere Augenreihe beinahe gerade, die vordere Reihe ausgebogen; die Seitenaugen der Vorderreihe um ihren Durchmesser von den Mittelaugen entfernt, letztere unter Allen die kleinsten. Maasse, Leib $3 \frac{m}{m}$, Cepth. $1.1 \frac{m}{m}$, Beinpaar 5.2, II 4, III 3, IV $4.7 \frac{m}{m}$ lang.

♂ Kaum kleiner. Vorderleib und Beine röthlichgelb; Hinterleib wie beim ♀, jedoch reiner gefärbt und schärfer gezeichnet. Taster schlank, kolbig; Tibia kürzer und stärker als Patella; Deckschuppe löffelförmig, seitwärts nach innen gestellt; Sexualorgan complizirt, vorne mit hufeisenförmig hervorstehendem Embolus. Maasse, Leib: 3— Cepth. $1.2 \frac{m}{m}$.

Im August an der oberen Baumgrenze des Krivanstockes (Central-Karpathen) im Grase erbeutet. Dr. Koch kennt diese Art aus den tyroler Alpen.

13. *Linyphia alacris* BLACKW. (1853). Hermannstadt. SILL erwähnt dieselbe unter dem Namen «*Linyphia terricola* Koch».

14. *Linyphia leprosa* OHL. (1865). Veterani Höhle, Tokaj, Alsó-Hámar, Lucivna, Schemnitz, Pribilina, Ungvár, Hermannstadt. Liebt das Halbdunkel der Höhlen, Stallungen aber auch im Wurzelwerk der Bäume.

15. *Linyphia Rosenhaueri* L. K. (1872). Baradla Tropfsteinhöhle bei Aggtelek. Ursprünglich aus den Höhlen des fränkischen Jura beschrieben, fand Dr. v. Horváth dieses Thier in der Entfernung von nahezu 5000 Metern vom Eingange der berühmten Höhle, also im ewigen Dunkel.

16. **LINYPHIA THORELLII** n. Sp. (VII. Tafel, 153, *a* Augenstellung, *b* Webeklauen, *c* Hinterleib des ♀ mit der Epigyne, *d* Taster des ♂).

Sehr klein. Vorderleib und Beine einfarbig lebhaft bräunlichroth; Hinterleib erbsengelb. Keine Zeichnungen. Cephalothorax herzförmig, Kopftheil etwas erweitert, kaum erhöht, seicht abgegrenzt; Mittelritze bedeutend. Brustplatte sehr breit-herzförmig, bräunlichroth, dünnbehaart. Mandibeln stark, bräunlichroth, von der Seite betrachtet, leicht zurückgedrängt, äusserst spärlich behaart, glatt. Maxillen und Lippe bräunlichroth. Taster schlank, bräunlichroth, dessen Patella, Tibia und Tarsus, besonders das letztere Glied stark, zum theil stachelborstig behaart — keine Klaue. Beine schlank. Femur mit wenigen Borsten, Tibien oben mit 2—3 Fühlhaaren, unten reichlich borstenhaarig; Klauen sehr schlank, fein, sichelförmig, deren Zinken ungemein zart, die Aferklaue einzähmig.

Hinterleib sehr schön oval.

Die hintere Augenreihe leicht eingebogen, die vordere leicht ausgebogen; die Mittelaugen beider Reihen in ein nach vorne verengtes Trapez gestellt, die unteren klein; die Seitenaugen beider Reihen auf einer gemeinsamen, flachen, schwärzlichen Erhöhung, weiter entfernt von den Mittelaugen ihrer Reihen, als diese von einander.

Maase, Leib: $2.6 \frac{m}{m}$, Cepth. $1 \frac{m}{m}$. I. Beinpaar 3.8, II 3, III 2.8, IV $4 \frac{m}{m}$.

♂ Kleiner, schlanker: in der Färbung übereinstimmend. Der Taster schlank, kolbig; dessen Patella kurz, dünn; Tibia einfach verstärkt, napfförmig; Deckschuppe schmal-löffelförmig; seitwärts nach innen gekehrt, behaart, das Sexualorgan zeigt einen schlängelnd quergestreiften Bulbus, an dessen Vordertheil eine knorplartige Erhöhung sichtbar ist, und dessen untere Parthie einen schwärzlichen, ankerförmigen Umschlag zeigt.

Maase, Leib: $2.4 \frac{m}{m}$, Cepth. $1.2 \frac{m}{m}$.

Diese interessante Spinne fand ich zuerst in der Szeleta-Höhle (Alsó-Hámar). Sie hält sich an den rauhesten, trockenen Stellen der übersinterten Wände auf, wo sie ihre Fäden zieht und vor dem Kerzenlicht verschwindet. Sie bewohnt das ewige Dunkel. Merkwürdigerweise fand ich dieselbe Art auch in der 148-ten Klafter des Schachtes des Glanzenberg Unterstollens in Schemnitz.

4. GENUS. ERIGONE SAV. ET AUD. (1825—7).

1. *Erigone altifrons* (CAMBR. 1863). Tafel IX, 194 ♂ vergr. Pancsova. Als Sommerthier auf Holzstössen.

2. *Erigone apicata* (BLACKW. 1850). Doroszló, Pancsova. Schon im März zu Tausenden beim Fadenschliessen besonders auf dürrer Pflanzen, welche förmlich eingewebt erscheinen.

3. *Erigone dentipalpis* (WID. 1834). Tokaj, Budapest, Szász-Vesszös. Im Juni geschlechtsreif.

4. *Erigone isabellina* (C. K. 1841). Klausenburg, Hermannstadt, Central-Karpaten (Baumregion).

5. *Erigone bituberculata* (WID. 1834). Mező-Záh. Sehr zeitig im Frühjahr (März) besonders an schwer zugänglichen Stellen im Rohre der Seen.

6. *Erigone rubens* (BLACKW. 1833). Sátor-Alja-Újhely. Als Sommerform auf Pflanzen des »Kopasz«-Berges.

7. *Erigone rufipes* (L. 1758). Aus Grosswardein bekannt.

8. *Erigone cornuta* (BLACKW. 1833). Pancsova, Tokaj. Als Baumform erbeutet.

9. *Erigone fuscipalpis* (C. K. 1836). Budapest (Blocksberg) auf Pflanzen.

5. GENUS. NESTICUS TH. (1869—70).

1. *Nesticus cellulanus* (CL. 1757). Alsó-Hámar (Höhlen), Erlau (Keller), Schemnitz (Schachte), Klausenburg (Southerain). Liebt feuchtere Winkel dunkler oder halbdunkler Localitäten; je dunkler der Aufenthalt, desto verwischter die Zeichnung. In Höhlen ist es auffallend, dass sich an die Fäden ihres Gewebes Tipuliden und sonstige Dipteren zur Ruhe an den Vorderfüssen aufhängen, ohne haften zu bleiben oder die Spinne dadurch zu stören.

6. GENUS. ERO (C. K. 1837).

1. *Ero thoracica* (WID. 1834). Doroszló. In Ziegelhaufen als Frühlingform.

2. *Ero tuberculata* (DE GEER. 1778). Rakamaz. Als Sommerform in üppigen Gesträuchen.

7. GENUS. MIMETUS HENTZ (1832).

1. *Minetus laevigatus* (KEYS. 1863). Auf Eichen der Hutweiden zwischen Tokaj und Rakamaz als Sommerform.

1. *Dipoea melanogaster* (C. K. 1843). Homonna. Auf *Pinus sylvestris*.

9. GENUS. PHYLLONETHIS. TH. (1869—70).

1. *Phyllonethis breata* (Cl. 1757). Klausenburg, Szová (Hargita-Zug bis 1000 Meter), Gyergyó-Szt-Miklós, Pancsova, Báziás, Tarczai, Tokaj, S.-A.-Újhely, Alsó-Hámor, Mocsolrás, Schemnitz, Bihar (?), Budapest. Sommerform in Gärten; auch subalpin: die gelbe und rothgezeichnete Varietät meist in derselben Localität: scheint Linyphien zu vertreiben und deren Gewebe zu usurpiren.

10. GENUS. THERIDIUM (WALCK. 1805).

1. *Theridium Tepidarium* C. K. (1841). Klausenburg (Glashaus), Görgény-Szt-Inre (Kastell-Gänge), Ogradena (Baracken). Scheint in Glashäusern immer gegenwärtig zu sein.

2. *Theridium formosum* Cl. 1757. Klausenburg, Mező-Záh, Dicső-Szt-Márton, Doroszló, Apatin, Pancsova, Palánka, Mehádia, Schuppanek, Orsova, Jeselnicza, S.-A.-Újhely, Ungvár, Alsó-Hámor, Diósgyőr. In den Niederungen auch in der Nähe von Wohnungen, besonders in Gärten weit verbreitet. Sommerthier.

3. *Theridium denticulatum* (WALCK. 1804). Orsova, Mehádia, Ogradena, Báziás, Szajol, Tokaj, Alsó-Hámor, Budapest. Sommerthier, welches die Felsen besonders liebt, jedoch auch an Wohnungen vorkommt.

4. *Theridium riparium* BLACKW. (1834). Hermannstadt. SILL. führt die Art unter dem Namen (*Theridium saxatile* Koch) an.

5. *Theridium varians* HANN. (1831). Klausenburg. Eichen der Hutweiden bei Tokaj. Als Sommerform im Laube.

6. *Theridium dyspnum* (Cl. 1757). Szajol, Alsó-Hámor, Csorba-See, Lucsivna, Prábilina, Lykanka, N.-Hagymás. Stock in Ostsiebenbürgen. Von der Ebene bis in die obere Baumgrenze der Alpen verbreitete Art.

7. *Theridium pictum* (WALCK. 1802). Centralkarpathen auf *Juniperus*.

8. **THERIDIUM FRIVALDSZKY** in. sp. VII Tafel, 154. a Augenstellung & Leib, erstes Beinpaar, d männlicher Taster.

? Vorderleib licht bräunlichgelb, mit feinem, braunem Rand, mit feinem bräunlichem Mittelstreif, welcher gegen den Kopftheil hin gabelig wird, die Augengruppe jedoch nicht erreicht.

Beine licht bräunlichgelb, am Ende eines jeden Gliedes ein breiter, schwarzer Ring. Oberfläche des Hinterleibes weiss mit sechs oder sieben schwarzen Punkten, wovon drei auf die Mitte entfallen, seitlich am Ende je ein ausgedehnter schwarzer Fleck. Abdomen bräunlich. Die Zeichnung in der Regel scharf, auffallend, nur manchmal etwas verschwommen.

Cephalothorax erweitert. Brusttheil rundlich, in der Mitte der Länge nach mässig rinnenförmig vertieft, der Kopf wenig erhaben. Brustplatte herzförmig, bräunlichgelb, mit feiner schwarzer Einfassung. Mundtheile bräunlichgelb, etwas röthlich angehaucht. Die Beine lang, schlank, die Ringelung auffallend: auf den Patellen je eine Fühlborste. Hinterleib oval, von der Seite betrachtet ziemlich gewölbt.

Die Mittelaugen beider Reihen im Rechteck stehend, die unteren kleiner, schwarz; die hinteren opacisirend. Die hintere Reihe kaum merklich eingebogen, die untere ausgebogen; die Augen der hinteren Reihe in gleicher Entfernung von einander; die Mittelaugen der Vorderreihe weiter vom Stirnrand, als von den hinteren Mittelaugen.

Die Taster schlank, dessen Patella nicht länger als dick, die Tibia noch kürzer, an äusseren Ende mit langem, schmalen, abgestumpftem Fortsatz, welcher sich an den Geschlechtstheil anschmiegt.

und nach vorne gerichtet ist; der Bulbus von aussen birnenförmig, etwas abgeflacht, auf der Fläche mit schwarzem Schlingelband.

Maase, Leib: 3·5 $\frac{m}{m}$, Cepth. 1·5, I Beinpaar 11·5, II 7·3, III 5·2, IV 7·5 $\frac{m}{m}$.

♀ Unbekannt.

Bei Tokaj und Rakamaz Auf Eichen. Frivaldszky hat diese Art schon früher um Fünfkirchen herum gesammelt.

9. *Theridium triste*, HAHN (1831). Hutweide bei Tokaj auf Eichen.

10. *Theridium bimaculatum* (L. 1767). Wie die vorige Art. SILL besitzt Exemplare aus der Umgebung von Hermannstadt.

11. *Theridium pulchellum* (WALCK. 1802). Palánka. Dr. SEIDLITZ und SILL führen die Art aus Siebenbürgen an.

11. GENUS. STEATODA SUND (1833).

1. *Steatoda castanea* (CL. 1757). Klausenburg, Mezö-Záh, Görgény-Szt-Imre, Sárpatak, Oláh-fenes, Parajd, Gyergyó-Szt-Miklós, Hermannstadt, Doroszló, Apatin, Neusatz, Zimony, Pancsova, Mehádia, Orsova, Báziás, Szajol, Rakamaz, S.-A.-Újhely, Ungvár, Paráđ, Veszprém, Budapest. Beinahe ausschliesslich dem Aufenthalte des Menschen angepasst, selten an Waldrändern und auch dort stets in der Nähe menschlicher Wohnungen.

2. *Steatoda bipunctata* (L. 1758). Torda, Sárospatak, Klausenburg, Hermannstadt, Görgény-Szt-Imre, Balánbánya, Doroszló, Zombor, Apatin, Orsova, Pribilina, Budapest, Ungvár. Seltener als die vorige Art, mehr im Freien, besonders unter abstehenden Baumrinden. Auch in Ställen.

3. *Steatoda triangulosa* (WALCK. 1802). Doroszló, Pancsova, Orsova. Neigt dem Süden zu (THORELL fand sie in Florenz und Niza l. c. im ung. Text). Lebensweise mit *St. castanea* übereinstimmend, das Gewebe jedoch stets bescheidener.

4. *Steatoda guttata* (WID. 1834). Alsó-Hámor. In Geröllen.

12. GENUS. LITHYPHANTES TH. (1869—70).

1. *Lithyphantes corollatus* (L. 1758). Orsova, Báziás, S.-A.-Újhely. Sommerform; stets in Geröllen der Bäche gefunden.

2. *Lithyphantes Paykullianus* (WALCK. 1806—8). Klausenburg. Auf berasten Hügeln in Löchern von *Gryllus campestris* durch C. SCHUSTER entdeckt.

13. GENUS. ASAGENA SUND. (1833).

1. *Asagena phalerata* (PANZ. 1801). Szász-Vesszős, Doroszló. Sommerthier, meist umherschweifend oder in Mehrzahl unter Steinen gefunden.

II. FAMILIE. SCYTODOIDAE. NACKTSPINNEN.

I. SUBFAMILIE. PHOLCINAE. SCHIELSPINNEN.

1. GENUS. PHOLCUS (WALCK. 1805).

1. *Pholcus Forskälli* THOR. (1870). Zombor, Orsova, überhaupt im Süden des Landes; in lichteren Kellern und schattigen Winkeln häufig. Die Art wurde auch ursprünglich nach ungarischen Exemplaren beschrieben, siehe «Remarks on Synonymus» p. 151.

2. *Pholeus phalangioides* (Fuesl. 1775). Nagy-Barom, Rakospalota, Klausenburg. In Stallungen, Hühnersteigen häufig.

3. *Pholeus Pluchii* (Scop. 1763). Klausenburg, Szent-László, Torda, Várfalva, Mehádia, Orsova, Ogradena, Szajol, Tarczal, Ungvár, Alsó-Hámar, Balaton-Füred. Sowohl unter Dachtraufen besonders der ländlichen Wohnungen als auch im Freien an Felsen, in Steinhaufen. Sommerform.

II. SUBFAMILIE. SCYTODINAE. BUCKELSPINNEN.

2. GENUS. SCYTODES. LATR. (1804).

1. *Scytodes thoracica* LATR. (1804). Zimony, Budapest. Szarvas. Selten, wenig beobachtet, jedoch hinsichtlich des Gewebes und der Haltung vielfach an *Pholeus* erinnernd.

III. FAMILIE. ENYOIDAE. SCHOBERSPINNEN.

1. GENUS. ENYO. SAV. ET AUD. (1825—7).

1. *Enyo germanica* (C. K. 1837). Balaton-Füred, Alsó-Hámar. Sommerthier; unter Steinen; mit schoberförmiger, aus fremden Gegenständen zusammengewebter Wohnung. Selten.

III. UNTERORDNUNG.

T U B I T E L A R I A E.

So vielartig die Organisation dieser Unterordnung, so verschiedenartig ist deren Lebensweise und so manigfach sind deren Gewebe: und wenn wir das System der Spinnenthätigkeit als ein ununterbrochenes Ganzes betrachten, so können wir es aussprechen, dass die Tubitelarien mit ihrer Thätigkeit diejenigen Lücken ausfüllen, welche sonst entstehen würden. Eben dieses zeigt auch die grosse Formverwandtschaft mit anderen Unterordnungen.

Die Hauptorgane sind im Kreise dieser Unterordnung sehr verschieden. Bei dem Webeorgan finden wir sowohl das Drei-, als auch das Zweiklauensystem vertreten, dabei den Umstand, dass mit dem Zweiklauensystem eigenthümliche Haarsohlen verbunden sind, welche andeuten, dass hier neben der specifischen Spinnenthätigkeit, d. h. neben dem Fangnetz auch das Gehen platzgreift. Das Spinnorgan zeigt ebenfalls Verschiedenheiten; manche Spinnwarzen sind verlängert, mehrgliedrig, das System der Spulen ist anders angebracht, daher sind auch die Gewebe anders beschaffen. Die Grösse des Hinterleibes bleibt fort. Zum kräftig entwickelten Cephalothorax kommt ein verhältnissmässiger Hinterleib hinzu; die Füsse sind kräftig und selbst die gestreckteren zum Gehen eingerichtet. Indem bei den vorhergehenden zwei Unterordnungen die Ernährung in erster Linie von der Einrichtung und Anbringung des Gewebes und vom geduldigen Abwarten der Beute abhängt, also eine gewisse Passivität zur Schau trägt, tritt bei den Tubitelarien die Activität in den Vordergrund; sie offenbart sich im meuchlerischen Ueberfall der Beute.

Selbst in jenen Gruppen dieser Unterordnung, bei denen auf die Gewebe noch grosses Gewicht fällt (Agalenoidae), ist der Charakter der Gewebe, so auch deren Wirkung von jenen der Orbitelarien und

Retitelarien wesentlich verschieden. Denn indem diese letzteren ihre Gewebe den fliegenden Insecten in den Weg stellen, ihre Beute also dadurch erlangen, weil diese das Gewebe *nicht sieht*, sehen es die Tubitelarien mit ihren Geweben auf das *Aufsitzen* der Insecten ab; ja die Mehrzahl ladet die Beute förmlich zum Aufsitzen ein. Die weitläufigen Gewebe der Winkelspinnen (Tegenaria), welche horizontal gespannt sind und mit der Zeit auch noch staubig werden, locken die Insecten förmlich an; so auch das trichterförmige Gewebe der Agalenen. Die Amaurobiinen *belegen* mit ihren Geweben solche Punkte, welche zu Ruheplätzen für Insecten besondere Eignung haben.

Bei den Drassoiden fällt das Gewicht nicht mehr auf das Gewebe, sondern auf die Organisation der Gangorgane; bei diesen herrscht das Zweiklauensystem und die Scopula; diese verlegen sich auf die Lauer, um die Beute zu überfallen, oder sie verbergen sich in künstlich erzeugte oder natürliche Höhlungen, und erwarten die Beute, welche sich dahin verirrt. Diesem entspricht auch die Taucherspinne — Argyroneta — welche ihre Taucherglocke verlässt, um ihre Beute im Utricularien Dickicht zu beschleichen.

Eine allgemeine Eigenschaft ist die, dass bei den Geweben überhaupt auf die Wohnung ein grosses Gewicht fällt, bei mancher Familie sogar das Hauptgewicht; in diesen letzteren Fällen ist das Gewebe nurmehr für Momente der Vermehrung und Entwicklung bestimmt und hat mit der Ernährung nichts mehr zu schaffen.

Hier beginnt also neben der Fixirung des Aufenthaltes die Freiheit der Bewegung in einem gewissen Umkreise.

In der Veränderung des Aufenthaltsortes sind sie weniger frei, auch in der Wahl desselben sind sie beschränkter; sie sind in höherem Maasse an die Scholle gebunden, als dies bei den vorgehenden Unterordnungen der Fall ist. Es überwiegt hier schon die Zahl derjenigen Formen, welche unter Steinen, Schollen, unter abgefallenem Laub lebt und wirken.

Hinsichtlich der vertikalen Verbreitung gehört die Mehrzahl der Formen zwar den Niederungen an; sie steigen aber auch in bedeutende Höhe hinauf. Die Cryphoea carpathica O. H. lebt auf den Gipfeln der hohen Tátra, hingegen gibt es Formen, welche in der Tiefe der Höhlen zuhause sind.

Die Generationsfolge wird hauptsächlich (ich kann nicht sagen ausschliesslich) durch überwinternde Thiere gesichert; die Sicherung besorgt die überwinternde Generation selbst. Die Mutter bewacht die Eier, sorgt so lange für die Jungen, bis sich diese selbst fortzuhelfen vermögen.

I. FAMILIE. UROCTEOIDAE. ZOTTELSPINNEN.

1. GENUS. UROCTEA. DUF. (1820).

1. Uroctea Durandii (WALCK. 1809). Fiume unter Steinen.

II. FAMILIE. AGALENOIDAE. FLÜCHTSPINNEN.

1. SUBFAMILIE. AMAUROBIINAE. KETZERSPINNEN.

1. GENUS. DICTYNA. SUND. (1833).

1. Dictyna arundinacea (L. 1758). Klausenburg, Szász-Vesszős, Torda, Mezö-Záh, Hermannstadt, Doroszló, Apatin, Pakánka, Pancsova, Orsova, Ogradena, B. Csaba, Tokaj, Ó-Hutta, Stuhlweissenburg, Grosswardein, Budapest. Frühjahrs- und Sommerform, welche besonders die abgestorbenen Doldenpflanzen liebt. Gemein.

2. *Dictyna latens* (FABR. 1775). Hermannstadt. Dr. SEIDLITZ führt dieselbe auf Grund von L. KOCH's Bestimmung an.

3. *Dictyna vicina* SIM. (1874). Hutweide bei Tokaj, auf Eichen. Scheint südlich verbreitet zu sein. (SIMON beschrieb die Form von der Insel Corsica).

4. *Dictyna uncinata* THOR. (1856). Budapest (Stadtwäldchen auf Gesträuch).

5. *Dictyna variabilis* C. K. (1836). Budapest, Rákos-Palota, Tokaj, B.-Füred. Besonders auf den Blättern von *Syringa vulgaris*.

2. GENUS. TITANOECA TH. 1869—70.

1. *Titanoeca quadriguttata* (HAHN. 1831). Orsova, Mehádia, Báziás, Alsó-Hámar, Mocsolyás, Paráđ, Schemnitz, Fünfkirchen. Sommerform, steigt hoch in das Gebirge; meist unter Steinen.

2. *Titanoeca Schineri* L. K. (1872). S.-A.-Újhely, Tokaj, Veszprem. Sommerform; besonders an steinigten Stellen.

3. **TITANOECA VETERANICA** n. sp. (VII. Tafel, 155, *a* Augengruppe, *b* Epigyne des ♀, *c* Taster des ♂).

♀ Vorderleib dunkel rothbraun mit wenig gelblichen Haaren; Beine ebenso gefärbt, etwas rauchiger. Hinterleib braun, mit nicht eben dünner aber erst bei Vergrösserung auffällender, gelblichröthlicher Behaarung.

Cephalothorax so lang als Tibia und Patella des IV. Beinpaares zusammen; Kopftheil etwas verlängert, vorne abgerundet, von seitwärts betrachtet aus der bedeutenden Rückengrube sanft aufsteigend. Der ganze Cephalothorax fein gerandet.

Brustplatte oval, braun, mit schmutziggelber Behaarung.

Mandibeln ziemlich stark, etwas rauh und genügend behaart — von der Seite betrachtet — mit dem Grunde vorgewölbt. Maxillen gerade, parallel, vorne abgerundet; rothbraun; die Lippe schmaler als eine Maxille, abgerundet, von halber Länge der Maxillen.

Der Taster rauchig rothbraun, dessen Tarsus reichlich behaart und beborstet und so lang als Patella und Tibia zusammen. Die Beine ziemlich schlank, die Behaarung ziemlich reichlich, gelbbraun gemischt, die Bestachelung nicht beständig; Femur des I. Paares oben am Ende 2—3 anliegende Stachel; oft an der Tibia, unten vorne, ein Stachel. Das Abdomen breitoval, etwas flachgedrückt.

Die vordere Augenreihe sehr leicht, die hintere mehr eingebogen; die Seitenaugen getrennt; die Seitenaugen von den Mittelaugen ihrer Reihen weiter, als letztere von einander entfernt; die Mittelaugen beider Reihen in ein nach vorne bedeutend verengtes Trapez gestellt, die unteren kleiner als die oberen; die hinteren Mittelaugen weiter von den vorderen Mittelaugen als von einander.

Maase, Leib: 5·5 $\frac{m}{m}$, Cepth. 2·3, I Beinpaar 6, II 5, III 4, IV 5·6 $\frac{m}{m}$.

♂ Schlanker, etwas kleiner. Vorderleib sehr lebhaft rothbraun; Beine rauchbraun; Hinterleib schwarz, spärlich gelb behaart, ohne Zeichnung. Auf allen Tibien, unten, in einer Reihe mehrere Stachelborsten. Der Taster stark, kolbig; dessen Patella nicht länger als dick; die Tibia sehr complizirt: an der inneren Seite ein am Grunde starker, in eine feine Spitze auslaufender, glänzend schwarzer, geschwungener, nach vorne gerichteter Fortsatz, am Grunde desselben, nach innen, ein daumenförmiger, kurzer stumpfer Fortsatz, dahinter ein dritter, nach rückwärts offener, ohrförmiger Fortsatz.

Maase, Leib: 4·6 $\frac{m}{m}$, Cepth.: 2·4, I Beinpaar 7·5, II 5·8, III 4·7, IV 5·6 $\frac{m}{m}$.

Diese hübsche, kleine Spinne fand ich im Juni in der unteren Donauenge, besonders in der Nähe der historisch berühmten Veterani-Höhle, dann bei Jeselnicza, wo dieselbe auf rasigen Stellen unter Kalksteinhaufen vorkam. Das Thier lebt an der Unterseite der Steine in einer sehr schütter gewebten Röhre, zieht sich bei Berührung zusammen und muss sehr beunruhigt werden, ehe es flüchtet. Die Art ist nahe verwandt mit SIMON's *Titanoeca monticola*, welche derselbe aus den Pyrenäen und den Alpen der Provence beschrieb, jedoch auch nach Dr. L. KOCH verschieden (vide «Les Arachnides de France 1874, I, p. 214, Pl. III, fig. 10).

3. GENUS: AMAUROBIUS (C. K. 1837).

1. *Amaurobius ferox* (WALCK. 1830). Klausenburg, Mezö-Záh, Hermannstadt, Doroszló, Palánka, Diósgyör, Miskolcz, Görömbölyi-Tapolca, Erlau, Güns, Budapest, Mehadia. Im Frühjahr geschlechtsreif; in Kellern, Winkeln, aber auch in Felsenspalten; in wärmeren Localitäten wahrscheinlich stets vorhanden. Gewebe vielfach angepasst.

2. *Amaurobius fenestralis* (STR. 1768). Klausenburg, Görgény-Szt-Imre, Mezöhavas, Buesin, Nagy-Hagymás, Hermannstadt (Dr. SEIDLITZ sub *Ciniflo atrox*), Mehadia, Alsó-Hámar, Pribilina, Lykauka, Schemnitz, Budapest. Weit verbreitete Art, welche auch in das Hochgebirge steigt, besonders in Nadelhölzern unter abstehender Rinde häufig; kommt auch in der Nähe menschlicher Wohnungen, am Eingange der Grubenstollen, in Steinhaufen und Mauerritzen vor; nächtliches Thier, Nachts oft auf dem Laube der Gebüsche herumstreifend.

3. *Amaurobius claustrarius* (HAHN. 1831). Bisher nur in den Karpathen: Csorba-See, Pribilina, im August unter Steinen angetroffen. Nach L. KOCH auch in Siebenbürgen. (Dr. SEIDLITZ sub *Ciniflo*).

4. *Amaurobius pallidus* L. K. (1868). IX. Tafel, 195 ♀; 196 ♂, 197 Epigyne des ♀, 198 Taster des ♂. ♀ Durch Dr. L. KOCH beschrieben. ♂ Kleiner, schlanker, lichter gefärbt, die Zeichnung des Hinterleibes lebhafter. Die Beine gestreckter. Der Taster proportionirt: auf der Oberfläche des Femur vorne 3 Stacheln; die kurze Tibia handförmig, von oben betrachtet, zeigt sie drei kurze Fortsätze, von welchen der innere der kürzeste ist, er ist gebogen, stumpf; der äussere ist derb, cylindrisch, am Ende abgerundet, röthlichgelb; die Deckschuppe ist stark convex, an der Spitze büstenartig behaart, am äusseren Rande des Grundes bedeutend ausgeschnitten: Geschlechtstheil stark hervorquellend, von unten betrachtet erscheint der Bulbus einem starken halben Ringe ähnlich, aus dessen Mitte eine schnabelförmige, kurze, rothbraune Doppelspitze hervorsteht, am Grunde dagegen ein unten licht, an der Spitze dunkel gefärbter Fortsatz nach vorne gerichtet ist.

Maase: Leib 8 $\frac{m}{m}$, Cepth. 4 $\frac{m}{m}$, I Beinpaar 15 $\frac{m}{m}$.

Diese Art wurde ursprünglich durch Dr. Paliardi bei Mehadia gesammelt, ich selbst kenne sie auch ausschliesslich aus dieser Gegend als Frühjahrsform, wo sie meist im Gerölle, seltener unter der Rinde gestürzter Bäume vorkommt und weit in die Höhe geht. So bei Orsova (Allion), Mehadia (Nadelholz-region), Ogradena, Báziás (Ausläufer).

5. *Amaurobius Erberi* (KEYS. 1863). Ausschliesslich Budapest (Blocksberg); ist weiters nur von Syra, Lesina und aus den Pyrenäen bekannt.

II. SUBFAMILIE. AGALENINAE. TRICHTERSPINNEN.

4. GENUS: CYBAEUS L. K. (1868).

1. *Cybaeus tetricus* (C. K. 1839). Alsó-Hámar, Máramaros (Pietrosz Stock) selten unter Steinen.

5. GENUS: COELOTES. BLACKW. (1841).

1. *Coelotes atropos* (WALCK. 1830). Görgény-Szt-Imre, Mezö-Havas, Hermannstadt, Orsova, Ogradena, Alsó-Hámar, Central-Karpathen, Pribilina, Ruttká, Schemnitz, Tatra-Füred. Gebirgsform im Sommer geschlechtsreif. Geht bis 2000 Meter in den Alpen, wo sie dann das Labyrinth vertieft und complizirt.

2. *Coelotes inermis* L. K. (1855). Görgény-Szt-Imre, Schemnitz. An beiden Orten Herbstthier, im Gerölle von Mauerwerk.

3. *Coelotes roseidus*? (C. K. 1837). Bratka im Köröspass. Ein ♂ im September erbeutet. Zur Anbringung des ? hat mich der Umstand bewogen, dass von *Coelotes roseidus* C. K. = *segestriiformis* Dufour bis jetzt nur ♀ bekannt sind. Da dieses ♂ jedoch zu keiner der bekannten Arten gehört, und dem Grössenverhältniss nach der grossen weiblichen Form Koch's resp. Dufour's entspricht, so habe ich es mit Vorbehalt hieher gestellt.

4. *Coelotes solitarius* L. K. (1868). In Dr. H. Zimmermann's (Limburg) Sammlung aus der hohen Tatra: Dr. Seidlitz fand die Art um Hermannstadt.

6. GENUS: TEGENARIA (LATR. 1804).

1. *Tegenaria Domestica* (CL. 1757). Ueberall, besonders in und um Wohnungen verbreitet; kommt jedoch auch im Freien vor.

2. *Tegenaria Derhamii* (Scop. 1763). Ganz besonders in Wohnungen, und da vorzüglich in Kellerräumen, Fenstern, dann in Stallungen sehr häufig.

3. *Tegenaria campestris* C. K. (1848). Klausenburg, Hermannstadt, Doroszló, Orsova, Baziás, Also-Hamor, Pribilina, Budapest. Geht bis 1000 Meter in das Hochgebirge; meist im Wurzelwerk und in Steinhaufen.

7 GENUS. CRYPHOECA THOR (1869—70).

1. *CRYPHOECA CARPATHICA* n. s. p. (VII. Tafel, 156, *a* Augengruppe, *b* Epigyne des ♀, *c* Taster des ♂).

♀ Vorderleib und Beine grünlichgelb; Hinterleib öhlbraun, mit gelblichen \triangle Zeichnungen. An allen Beinen die Tibia und Metatarsus mit langen, anliegenden, lichten Stacheln bewehrt, welche auf den zwei ersten Paaren in zwei Reihen paarig gestellt sind. Die vordere Augenreihe stark eingebogen, deren Mittelaugen viel kleiner als die seitlichen; die hintere Augenreihe leicht eingebogen, deren Augen von gleicher Grösse; die Mittelaugen der vorderen Reihe vom Stirnrande um mehr als den Durchmesser eines Seitenauges entfernt.

Cephalothorax länglich-herzförmig; Kopftheil gut abgegrenzt, verschmälert, vorne abgerundet; Rückengrube punktartig; der Thoraxtheil mit einigen sternförmig auslaufenden Vertiefungen, welche der Lage der Beine entsprechen. Brustplatte länglich-schildförmig, zwischen den Hüften des IV. Beinpaars zugespitzt, etwas convex, lehmgelb, spärlich behaart. Die Mandibeln lehmgelb, gut entwickelt, schwächer als der Schenkel des ersten Beinpaars, nicht vorgewölbt und mit dem Ende auf die Maxillen zurückgedrängt. Maxillen lehmgelblich, breit, vorne abgerundet, nicht gegeneinander geneigt, dünn behaart; die Lippe ähnlich gefärbt, breit, vorne abgestutzt, erreicht nicht die halbe Länge der Maxillen. Taster grünlichgelb, dessen Tarsus stark, so lang als die Tibia, beiderseits mit mehreren anliegenden, langen Stacheln. Sämmtliche Schenkel der Beine grünlichgelb, die übrigen Glieder mehr ins Röthliche ziehend; auf der Patella des III. Paares, oben, ein aufrechter, langer Stachel. Hinterleib länglich-eiförmig, hinten etwas zugespitzt; oben, vorne, in der Mitte ein unregelmässiger, lichter Fleck, darunter einige Winkelfleckchen, welche sich schlängelnd in den Seiten verlieren und oft sehr undeutlich sind; Bauchfläche olivengrünlich; der ganze Hinterleib anliegend, nicht eben dicht behaart. Spinnwarzen in ein Trapez gestellt, gelblich, gleichlang; das Endglied des oberen Paares zugespitzt und sehr kurz, etwa einem Viertel des Grundgliedes entsprechend.

Maasse: Leib $4.2 \frac{m}{m}$. Cepth. 1.9 , I. Beinpaar 5 , IV. $5.8 \frac{m}{m}$. Verhältniss der Füsse $4, 1, 2, 3$.

♂ Etwas kleiner, mit schlankeren Beinen und lichterem Vorderleib. Die Bestachelung der Beine schwacher. Der Taster verhältnissmässig stark, dessen Patella und Tibia gleichlang, am Grunde der äusseren Seite der Tibia ein nach vorne und seitwärts gerichteter, gestreckt ohrförmiger Fortsatz; Deckschuppe sehr convex, weisslich, spärlich behaart; Geschlechtstheil sehr hervorquellend; von unten betrachtet, durch einen langen, spiraligen embolus ausgezeichnet.

Maasse: Leib 3·5 m_m , Cepth. 1·6, IV. Beinpaar 5·4 m_m .

Central-Karpathen; auf dem Kriván im August nicht selten, steigt beinahe bis zum Gipfel. Ist stets auf der unteren Seite der Steine in einem schütter gewebten Röhren zu treffen und leicht zu sammeln, da sie sich statt zu flüchten, nur zusammenzieht.

8. GENUS AGALENA WALCK (1805).

1. *Agalena labyrinthica* (CL. 1757). In der Ebene eben so gut als auch im Vorgebirge und der entschieden subalpinen Region zuhause. In den Niederungen an manchen Punkten geradezu in Masse vorhanden.

2. *Agalena similis* KEYS. (1863). Klausenburg; durch Dr. G. Böckh auch in Pressburg gesammelt und als «*Ag. labyrinthica*» bestimmt (zu finden im Wiener Hofmuseum), besonders Herbstform.

9. GENUS HISTOPONA THOR. (1869—70).

1. *Histopona torpida* (C. K. 1844). Doroszló. Als Sommerform unter Rinden nur einmal gefunden.

10. GENUS: TETRIS SUND. (1833).

1. *Tetrix denticulata* (OLIV. 1789). Doroszló. Als Sommerthier einmal angetroffen.

11. GENUS: AGROECA WESTR. (1861).

1. *Agroeca Haglundii* THOR. (1874). Apatin, Szász-Vesszős. Zweimal als Sommerthier angetroffen.

III. SUBFAMILIE. ARGYRONETINAE. TAUCHERSPINNEN.

12. GENUS: ARGYRONETA LATR. (1804).

1. *Argyroneta aquatica* (CL. 1757). Szamosfalva, Szász-Vesszős, Doroszló, Budapest (im Abzuggraben der Ofner Thermen!). Sonstige Daten im allgemeinen Theile und im biologischen System (I., II. B.).

III. FAMILIE. DRASSOIDAE. MEUCHELSPINNEN.

1. GENUS: ZORA (C. K. 1848).

1. *Zora maculata* (BLACKW. 1833). Doroszló, Apatin, Orsova, Schuppanek, Tokaj, Rakamaz, Kaschau. Eine seltenere Sommererscheinung; bisher stets umhersehweifend im abgestorbenem Laube unter Bäumen und Gesträuchen gesammelt; besonders dort häufig, wo Poduren reichlich vorhanden sind. Geht nicht auffallend hoch ins Gebirge und überwintert bestimmt. Dr. von Horváth fand sie im strengsten Winter vor (siehe: *Pachygnatha Clerckii* Sund).

2. GENUS: LIOCRANUM L. K. (1866).

1. *Liocranum domesticum* (WID. 1834). Szász-Vesszős, Pressburg. In Wohnungen, des Nachts auch bei Kerzenschein thätig; mit fixer Wohnung und Jagdgebiet. Dr. G. Böckh sammelte diese Art mehrfach, und bezeichnete sie mit «*Drassus*».

2. **LIOCRANUM KOCHII** n. sp. (VII. Tafel, 157, *a* Augengruppe, *b* Taster des σ , Seitenansicht; *c* Genitaltheil von unten).

Vorderleib und Beine licht braungelb; Hinterleib graulich, mit verwaschenen, undeutlichen, dunkleren Flecken und anliegender Behaarung.

Cephalothorax herzförmig; Kopftheil verengt, von der Seite betrachtet eher niedergedrückt als erhoben; Mittelritze sehr fein, ziemlich lang. Brustplatte schildförmig, braungelb, spärlich behaart. Die Mandibeln gelb, nicht eben kräftig, genügend behaart; seitlich betrachtet knieförmig vorgewölbt; Maxillen breit, etwas gegeneinander geneigt; die Lippe zungenförmig von halber Maxillenlänge. Beine lang, schlank, bewehrt und behaart; auf den Schenkeln oben zwei anliegende, lange Stacheln; auf der Tibia des ersten Paares, unten, fünf Stacheln in zwei Reihen, wovon drei auf der inneren Seite; auf dem Metatarsus desselben Paares, unten drei Paar Stacheln; auf der Tibia und dem Metatarsus des zweiten Paares unten je drei Paar Stacheln; auf denselben Gliedern der beiden letzten Paare, unten 5—6 Stacheln. Der Hinterleib oben und unten einfarbig; sonst eiförmig, vorne etwas verengt; verhältnissmässig klein.

Die vordere Augenreihe kaum bemerkbar, die hintere merklich eingebogen; die hinteren Mittelaugen viel weiter von einander als von den Seitenaugen entfernt; die Mittelaugen der vorderen Reihe schwarz und grösser als die Seitenaugen, die letzteren so wie jene der hinteren Reihe opalisirend. Die Seitenaugen berühren sich.

Der Taster ziemlich kräftig; Deckschuppe spitz-löffelförmig, am äusseren Rande mit einer fingerförmigen Nebenschuppe; Patella wenig länger als dick, die Tibia kürzer als die Patella, einfach, unbewehrt; das Geschlechtsorgan sehr charakteristisch: der ziemlich flache Bulbus verwandelt sich hinten in ein schlängelndes Rohr, welches verloren in eine feine, gekrümmte Spitze ausläuft.

Maasse: Leib 5·2 $\frac{mm}{mm}$, Cepth. 2·6, I. Beinpaar 8, II. 7·2, III. 6·9, IV. 9·9.

♀ unbekannt.

Diese sehr interessante Art fand mein Neffe E. Vukolinszky in Schemnitz. Ist von *L. domesticum* auch nach Dr. L. Koch specifisch verschieden.

3. GENUS: ANYPHEANA SUNDB. (1833).

1. *Anyphaena accentuata* (WALCK. 1802). Doroszló, Bogojeva, Illok, Pancsova, Alsó-Hámor, Budapest. Als Sommerform besonders auf dem Laube der Bäume vorkommend.

4. GENUS: CLUBIONA LATR. (1804).

1. *Clubiona corticalis* (WALCK. 1802). Schemnitz. Im Basaltgerölle des «Kalvarienberges», im Spätsommer.

2. *Clubiona trivialis* ¹ C. K. (1841). Mehadia, Spitze des Damoclet: aus den Central-Karpathen von Dr. L. Koch bestimmt, in der Sammlung des Dr. Zimmermann (Limburg); scheint eine Alpenform zu sein.

3. *Clubiona montana* L. K. (1867). Kremnitz. Als herbstliche Form unter Steinen gesammelt.

4. *Clubiona holosericea* (DE GEER. 1778). Doroszló. Gleicher Aufenthalt mit der nachfolgenden Art.

5. *Clubiona pallidula* (1757). Szász-Vesszős, Klausenburg. Szamosfalva, Parajd, Hermannstadt, Doroszló, Apatin, Palánka, Illok, Tokaj, Diósgyőr, Lúcsivna, Grosswardein, Budapest. In Gärten, im Rohre, im Gesträuch und überhaupt in üppiger Vegetation zu finden. In der Abenddämmerung umher-schweifend. Sackartige Wohnung sehr mannigfaltig.

6. *Clubiona terrestris* WESTR. (1851). Tokaj. In einem Steinbruche als Sommerthier.

7. *Clubiona coerulescens* L. K. (1866). Palánka. Im Frühjahr, unter einem Holzscheite.

¹ Im Verzeichnisse des I. Bandes unter dem Synonym «pallens» angeführt

8. *Clubiona lutescens* WESTR. (1851). Szász-Vesszös, Budapest. Im Gesträuche, selten.
9. *Clubiona paradoxa* L. K. (1867). In der Sammlung des Grafen Keyserling, aus Orsova stammend.
10. *Clubiona frutetorum* L. K. (1866). Tokaj, Budapest? Ungvár? (die Exemplare von letzteren Orten als jüngere Formen nicht ganz sicher). Auf Eichen als Sommerthier.
11. *Clubiona brevipes*¹ BLACKW. (1841). In der Sammlung des Grafen Keyserling, aus Orsova stammend.

5. GENUS: CHIRACANTHIUM (C. K. 1839).

1. *Chiracanthium italicum* CANESTR. et PAV. (1869). Klausenburg, Szász-Vesszös, Görgény-Szent Imre, Budapest, Doroszló. Hochsommerform; webt in Pflanzen einen geräumigen Sack, wo die Paarung erfolgt und auch die Eier bewacht werden.
2. *Chiracanthium carnifex* (FABR. 1775). Klausenburg, Rakamaz. Sommerform; webt ihre Sackwohnung in die Rispen der Gräser.
3. *Chiracanthium Pennyi* CAMBR. (1874). Palánka, Rakamaz. Wie die vorige Art.
4. *Chiracanthium nutrix* (WALCK. 1802). Klausenburg, Mező-Záh, Gyeke, Szász-Vesszös, Hermannstadt, Doroszló. Wie die vorige Art.
5. *Chiracanthium elegans* THOR. (1875). Ogradena. Webt ihre Säcke in das Gerölle der Kalkberge. Sommerform.

6. **CHIRACANTHIUM RUPESTRE** n. sp. (VII. Tafel 158, *a* Augengruppe, *b* Epigyne, *c* Cephalothorax von der Seite).

♀ Cephalothorax röthlichgelb, in der Augengegend etwas verdunkelt; Mandibeln bräunlichroth. Beine gelb; Hinterleib bräunlichgelb.

Cephalothorax derb, hochgewölbt, so lang als Patella und Tibia des IV. Fusspaares zusammen; seitlich betrachtet ist die Rückenlinie gewölbt, vom Scheitel nach rückwärts halbkreisförmig abfallend; der ganze Theil mit feinen, anliegenden Haaren bedeckt. Die Mittelritze ist durch eine kaum wahrnehmbare Verdunkelung angedeutet. Brustplatte schildförmig, bräunlichgelb, ziemlich behaart. Die Mandibeln derb, kräftig, etwas nach vorne gerichtet, am Rande des Klauenfalzes mit einer dichten Borstenreihe versehen, etwas kürzer als der Metatarsus des I. Beinpaares; die Maxillen breit, vorne abgerundet, etwas gegeneinander geneigt, bräunlichroth, vorne lichter; Lippe rothbräunlich, breit, zungenförmig, erreicht $\frac{3}{4}$ der Länge der Maxillen. Der Taster schlank, blass röthlichgelb, am Tarsus bräunlichroth, ziemlich behaart, dessen Tarsus so lang als Patella und Tibia zusammen. Die Beine schlank, lang; Tibia und Metatarsus des ersten Paares, unten, in der Mitte mit einem Stachelpaare, Hinterleib oval, mit gelblicher Behaarung bedeckt.

Die Augengruppe ist sichtlich dreitheilig; die Mittelaugen beider Reihen in ein, nach vorne verengtes Trapez gestellt, und dieses Trapez weiter von den Seitenaugen, als die grösste Entfernung der Mittelaugen untereinander; die vorderen Mittelaugen in einem gemeinschaftlichen dunkeln Fleck, die übrigen Augen jedes für sich dunkel eingefasst. Die Seitenaugen einander genähert; die vordere Reihe sehr leicht ausgebogen.

Maasse: Leib 9 $\frac{m}{m}$, Cephlth. 4·6, I. Beinpaar 15·6, II. 13, III. 9·7, IV. 13·4.

♂ unbekannt.

In einem steinigen Graben bei Majláth (Diós-Győr) unter einem Steine erbeutet.

7. **CHIRACANTHIUM EFOSSUM** n. sp. (VII. Tafel 159, *a* Augengruppe, *b* Cephalothorax von der Seite, *c* Epigyne).

♀ Cephalothorax bräunlichgelb ohne Verdunkelung; Mandibeln ins Bräunlichrothe ziehend; Beine grünlichgelb. Hinterleib schmutzig-lehmgelb.

¹ Im Verzeichniss des ersten Bandes als «*fuscula* Westr.» angeführt.

Cephalothorax von der Seite betrachtet genügend gewölbt, kürzer als Patella und Tibia des IV. Beinpaares zusammen; Kopftheil bogig (weniger convex, als bei der vorigen Art). Brustplatte herzförmig, schmutziggelb mit bräunlicher, am Rande verdichteter Behaarung. Mandibeln ziemlich stark, gestreckt, mässig nach vorne gerichtet, am Grunde licht, gegen das Ende verdunkelt, etwas länger als der Metatarsus des ersten Beinpaares. Die Maxillen schmutzigbraun, an den Enden lichter, gerade, vorne zugerundet; die Lippe zungenförmig, vorne abgestutzt, reichlich $\frac{2}{3}$ der Maxillen lang. Der Taster schlank, grünlichgelb, an der Spitze rauchig verdunkelt, reichlich, anliegend behaart, dessen Tarsus so lang als Patella und Tibia zusammen. Die Beine schlank, lang; Tibia des ersten Paares, unten, in der Mitte mit einem Paar — der Metatarsus, unten, an beiden Enden mit je einem Paar Stacheln. Der Hinterleib oval, feinbehaart.

Die Augengruppe dreitheilig: die Mittelaugen beider Reihen in ein, nach vorne nur wenig verengtes Trapez gestellt; die Seitenaugen der vorderen Reihe von den Mittelaugen nur wenig weiter, als letztere voneinander; die vordere Reihe gerade, die hintere leicht eingebogen; die Seitenaugen berühren sich nicht, jedes für sich steht in einer Verdunkelung.

Maasse, Leib: 10 $\frac{m}{m}$, Cepth. 3·8, I. Fusspaar 18·7, II. 12, III. 9, IV. 14.

♂ unbekannt.

Diese Art fand ich auf dem Kopasz-Berge bei S.-A.-Ujhely, tief in der Erde, unter einem Steine, u. z.: als Sommerform.

8. **CHIRACANTHIUM CUNICULUM** n. sp. (VII. Tafel, 160, *a* Augengruppe, *b* Cephalothorax, *c* Epigyne).

♀ Vorderleib schön licht-bräunlichgelb, vorne verdunkelt; Mandibeln bräunlich, vertical. Der Hinterleib gelblich-leibfarben, unter Vergrösserung mit vielen, lichterem Hirseflecken besät.

Cephalothorax im Ganzen gewölbt, am Scheitel etwas abgeflacht, etwas kürzer als Patella und Tibia des IV. Beinpaares zusammen. Die Brustplatte herzförmig, blassgelblich. Die Maxillen gestreckt vertical, am Ende dunkelbraun, gegen den Grund verwaschen lichter, so lang wie der Tarsus des ersten Beinpaares. Die Maxillen gerade, vorne abgerundet und lichter, am Grunde rothbräunlich, die Lippe zungenförmig, abgestutzt rothbraunlich. Der Taster sehr schlank, gelblich, feinbehaart, am Ende etwas verdunkelt, dessen Tarsus länger als Patella und Tibia zusammen. Die Beine lang, fein; Tibia des ersten Paares unten, in der Mitte mit einem Stachel; der Metatarsus, unten, an beiden Enden mit einem Stachelpaare. Der Hinterleib oval, etwas zugespitzt.

Die Mittelaugen beider Reihen in ein nach vorne verengtes Trapez gestellt, jene der vorderen Reihe in einen gemeinsamen dunklen Fleck; die Seitenaugen der hinteren Reihe weiter von den Mittelaugen, als diese von einander entfernt; die Mittelaugen der vorderen Reihe grösser als die Seitenaugen derselben Reihe; die vordere Reihe gerade, die hintere eingebogen. Die Seitenaugen beider Reihen berühren einander nicht.

Maasse, Leib: 7·5 $\frac{m}{m}$, Cepth. 3, I. Beinpaar 11·5, II. 7·9, III. 7, IV. 9·7.

Diese Art fand E. Vlkolinszky in Schemnitz, in Steinhaufen vor dem Eingange des Klingerstollens.

6. GENUS: PHRUROLITHUS (C. K. 1839).

1. **Phrurolithus festivus** (C. K. 1835). Alsó-Hámar, im Moose auf der Spitze des Szent-István, als Sommerform.

2. **PHRUROLITHUS SZILYI** n. sp. (VII. Tafel, 161, *a* Augenstellung, *b* Epigyne des ♀, *c* Taster des Mannes.)

♀ Sehr klein. Vorderleib braun, mit vielen weissen Härchen, welche einigermassen eine sternförmige Zeichnung bilden. Der Hinterleib schwärzlich, auf der oberen Fläche vorne ein, in der Mitte drei, über den Spinnwarzen ein weisses Fleckchen. Die Schenkel des ersten Beinpaares braun, die übrigen

Glieder so wie auch die übrigen Fusspaare gelb; an den Schenkeln der beiden letzten Paare noch wenig Braun zu sehen. Bauch schwärzlich mit weisslicher Behaarung.

Cephalothorax breit-herzförmig, mit etwas verschmälertem Kopftheil; Brustplatte braun. Die Mandibeln stark, braun, dünn behaart, der das Genus charakterisirende Stachel borstenförmig. Der Taster ziemlich stark, braun, dessen Tarsus mit vielen weissen Haaren und so lang wie dessen Patella und Tibia zusammen. Die Beine in den Schenkeln etwas verdickt, sonst dünn auslaufend; die Schenkel der beiden ersten Paare seitlich und unten braun, oben gelblich; Tibia und Metatarsus des ersten Paares unten mit je vier aufstellbaren, langen, gelben Stachelpaaren. Der Hinterleib länglichoval, sehr mässig abgeflacht.

Die Mittelaugen der vorderen Reihe unter Allen die kleinsten; beide Reihen leicht eingebogen; die Entfernungen der Augen, sowohl in den Reihen als auch sonst, gleichförmig.

Maasse, Leib: $2.6 \frac{m}{m}$, Cepth. I, I. Beinpaar 2.5, II. 2.2, III. 2, IV. $3.6 \frac{m}{m}$.

♂ Kaum kleiner. Die Beine sehr lebhaft gefärbt und auch auf den hinteren Schenkeln mit so viel Braun, dass die gelbe Farbe einen längsstreif bildet. Der Taster kräftig, kolbig; dessen Schenkel verbreitert, unten mit einer Ecke endend; die Patella nicht eben schlank; die Tibia kürzer als Patella, an ihrer äusseren Seite ein starker, hornförmiger, mit der Spitze gegen die Deckschuppe geschwungener, schwarzer Fortsatz.

Maasse, Leib: 2.5, Cepth. $1.2 \frac{m}{m}$.

Bei Orsova, im Monate Juni auf üppigen Pflanzen des sogenannten neutralen Gebietes erbeutet.

7. GENUS: MICARIA WESTR. (1851).

1. **MICARIA ROGENFOHERI** n. sp. (VII. Tafel, 162, *a* Augengruppe, *b* Epigyne des ♀, *c* Taster des ♂).

♀ Prächtig schimmernd. Vorderleib rothbraun mit kupferig schimmernden Schuppen, auf der hinteren Parthie des Brusttheiles ein ^ förmiger, schneeweisser Winkelfleck. Der Hinterleib mit kupferig und grünlich schimmernden Schuppen bedeckt, vorne mit zwei bohnenförmigen, querliegenden weissen Flecken, in der Mitte mit einem weissen, schmalen Gürtel, der in den Seiten kräftiger ist und auf die Bauchseite nicht übergeht, diese kupferig und violett schimmernd. Die Schenkel der vorderen Beinpaare beinahe ganz braun, mit schimmernden Schuppen, sonst blassgelb; die beiden Hinterpaare bräunlich.

Cephalothorax gestreckt; keine Mittelritze; der Kopftheil verschmälert, von der Seite besehen etwas niedergedrückt. Die Brustplatte länglichoval, schwarzbraun mit weisser, etwas sternförmig angeordneter Behaarung. Die Mandibeln nicht eben kräftig, gerade, vertical, röthlich-braun, am Grunde lichter. Die Maxillen eingedrückt, rothbräunlich mit lichterem Rändern; die Lippe dunkel. Die Beine, besonders die beiden ersten Paare in den Schenkeln verstärkt, auf allen Tibien unten 1—4 Stacheln, am Metatarsus unten am Ende meistens ein Stachelpaar.

Der Hinterleib etwas walzig, zugespitzt, in der Gegend des Gürtels mässig eingeschnürt.

Die vordere Augenreihe mässig, die hintere stark eingebogen; die Mittelaugen der hinteren Reihe sehr bedeutend weiter von einander als von den Seitenaugen; die Augen der vorderen Reihe gleichgros, gleich weit von einander; der Zwischenraum zwischen den Seitenaugen beider Reihen wenig kleiner als jener zwischen den Mittelaugen beider Reihen.

Maasse, Leib: 5—7 $\frac{m}{m}$, Cepth. 2—2.6, I. Beinpaar 5, II. 5.8, III. 5.5, IV. 8.5.

♂ Schlanker, mit in die Breite entwickeltem Cephalothorax, mit lebhafterem Glanz. Der Taster schlank, mit ziemlich kräftigem Schenkel, an dessen Unterseite die Behaarung abstehend gereiht ist; die Patella mindestens dreimal so lang als dick, die Tibia nicht kürzer als das vorige Glied, aussen, am Ende mit einem kurzen Sporn; die Deckschuppe schmal, zugespitzt; der Bulbus länglich-oval, auf der äusseren Seite mit einem dunkleren Längsband.

Maasse, Leib: 5 $\frac{m}{m}$, Cepth. $2.5 \frac{m}{m}$. Oft sehr klein.

Dieses prachtvolle Thierchen kam anfangs Juni in der Umgebung von Orsova unter Steinen vor, liebt besonders die oberen, trockenen Parthien in Steinhaufen. Jedes Thierchen ruht tagsüber in einem besondern Säckchen, und gestört, flüchtet es mit wahrer Blitzesschnelligkeit.

2. *Micaria radiata* L. K. (1866). Gombos-Bogojeva. Als Frühjahrsform in Schlägen der Donauauen unter der Rinde gefällter Riesenbäume (*Populus Canadensis*).

3. *Micaria cincta* L. K. (1866). Orsova. Diese Art wurde auch ursprünglich nach Orsovaer Exemplaren beschrieben, welche aus der Sammlung des Grafen Keyserling stammten. In der ersten Beschreibung wird der Metatarsus I als wehrlos angeführt, bei meinem Exemplare trägt er unten am Grunde ein Stachelpaar, wesswegen Dr. THORELL die Art nicht ganz bestimmt entschied; Dr. L. KOON hat mir jedoch mitgetheilt (in litt.) dass das Verhältniss der Bestachelung nicht constant ist und er selbst Exemplare besitze, deren Metatarsus I bewehrt ist.

4. *Micaria pulicaria* (SUND. 1832). Grenzstein zwischen Rosenberg und Lykanka als Herbstform; massenhaft in einem gemeinschaftlichen Zellengewebe.

8. GENUS: DRASSUS (WALCK. (1805).

1. *Drassus quadripunctatus* (L. 1758). Alsó-Hámar. Im Juli geschlechtsreif.

2. *Drassus rubens* (WALCK 1837—47). Ungvár, Doroszló.

3. *Drassus scutulatus* L. K. (1866). Klausenburg, Mező-Záh. Hosszutelke, Hermannstadt. Budapest, Orsova, Doroszló. In Doroszló besonders in Wohnungen, auch im Winter; in Orsova jedoch auch in Bachgeröllen.

4. *Drassus minusculus* L. K. (1866). Orsova. Sommerform unter Steinen.

5. *Drassus umbratilis* L. K. (1866). Orsova, Alsó-Hámar. Als Frühjahrs- und Sommerform unter Steinen.

6. *Drassus troglodytes* C. K. (1839). Klausenburg, als Waldthier unter abgefallenem Laub.

7. *Drassus lapidicola* (WALCK. 1802). Ueberall verbreitet, scheint jedoch die Vegetationsgrenze der Buche nicht zu überschreiten. Besonders unter Rinden und im Steingerölle häufig.

8. *Drassus angustifrons* WESTR. (1861). Alsó-Hámar. Nur ein ♀ in einer Felsenritze erbeutet.

9. *Drassus loricatus* L. K. (1866). Doroszló, Schemnitz. Selten. Beidesmal in Wohnungen bei Kerzenschein erbeutet.

10. *Drassus pubescens* THOR. (1856). Bihar (Vlegyásza Stock) in der Nadelholzregion im Juni erbeutet.

9. GENUS: PROSTHESIMA L. K. (1872).

1. *Prosthesima Petiverii* (Scop). Mehadia, S.-A.-Ujhely, Alsó-Hámar. Gebirgsform, welche über die Region des Laubwaldes emporsteigt.

2. *Prosthesima oblonga* (C. K. 1844). Orsova, Baziás. Als Sommerform unter Steinen. War bis jetzt nur aus Tyrol bekannt.

3. *Prosthesima atra* (LATR. 1806). Fünfkirchen. Durch Frivaldszky einmal erbeutet.

4. *Prosthesima praefica* (L. K. 1866). Orsova. Wurde auch ursprünglich nach Orsovaer Exemplaren beschrieben.

5. *Prosthesima longipes* (L. K. 1866). Budapest. Als Herbstform einmal auf dem Blocksberge erbeutet.

6. *Prosthesima pedestris* (C. K. 1839). Orsova. In Geröllen des Gratzka Baches.

7. **PROSTHESIMA CALCEOLATA** n. sp. (VII. Tafel, 163. *a* Augenstellung, *b* Vorderfuss, *c* Taster des ♂).

♂ Reinschwarz; Vorderleib kaum bemerkbar bräunlich angehaucht. Beine rauchbraun, die Tar-

sen der beiden ersten Paare rötlichgelb, jene der übrigen weniger auffallend, bräunlichroth. Der herzförmige Cephalothorax um etwas kürzer als Patella und Tibia des IV. Beinpaares zusammen.

Die Hüftgelenke der beiden hinteren Fusspaare bräunlichgelb, jene der übrigen Paare braun. Alle Beine mit Ausnahme der Tarsenglieder verstärkt, die Tarsen schlank. Die Tibien der beiden ersten Paare ohne Stacheln, deren Metatarsen, unten, in der Mitte mit einem Stachelpaare; die Tibien der Hinterpaare, so der Metatarsus, unten, mit mehreren Stacheln, die letzteren auch seitwärts bewehrt.

Die Augen sehr flach, wenig opalisirend; die Mittelaugen der vorderen Reihe auf einer kleinen Erhebung, rund, die übrigen Augen unregelmässig in der Form; beide Reihen beinahe gerad, die Entfernungen nahezu gleich; die Mittelaugen der vorderen Reihe kaum etwas weiter von einander, als jene der hinteren Reihe ebenfalls von einander entfernt.

Der Taster sehr charakteristisch; dessen Schenkel verstärkt, bildet unten eine abgerundete Ecke; die Patella mindestens $1\frac{1}{2}$ -mal so lang als dick, die Tibia kaum kürzer, lang behaart, aussen, am Ende ein derber, spitzer, etwas gegen die Deckschuppe gekrümmter Nagel; die Deckschuppe tief-stumpf-löffelförmig, behaart; der Geschlechtstheil durch einen nach unten und aussen widerhornförmig gewundenen, starken, breiten Embolus ausgezeichnet.

Maasse, Leib: 5·7, Cepth. 2·4, I. Beinpaar 6·7, II. 5·7, III. 5, IV. 7·8 $\frac{m}{m}$.

♀ Unbekannt.

Auf dem Blocksberge bei Budapest unter Steinen erbeutet.

8. *Prothesima serotina* (L. K. 1866). Orsova (Allion-Berg). Sommerform, unter Steinen.

9. *Prothesima femella* (L. K. 1866). Wie die vorige Art.

10. *Prothesima conspicua* (L. K. 1866). Güns, Mehadia. Einmal in abgelöstem Rasen an einer Kellermauer erbeutet.

11. *Prothesima bimaculata* (C. K. 1839). Pancsova. Als Frühlingsform auf *Urtica* erbeutet. C. Koch beschrieb die Art nach griechischen Typen, Dr. L. Koch fand jedoch diese in der Sammlung nicht vor, wesshalb er die Art nicht sicher aussprach. Es ist gewiss, dass sie eine Verwandte der *P. conspicua* ist (Cepth. länger als Patella und Tibia IV). ♀ Schwarz; Cephalothorax in der Mitte mit weissen Häarchen; Hinterleib vorne ebenfalls weiss behaart, in der Mitte, zu beiden Seiten je ein schneeweisser Fleck. Die Hüftgelenke der beiden hinteren Beinpaare schwefelgelb, alle Schenkel wie auch die Hüftgelenke der beiden Vorderpaare schwarz, die übrigen Glieder schwefelgelb. Kleine, schlanke Gestalt. Totallänge 5·7 $\frac{m}{m}$.

Epigyne: eine beinahe quadrate Platte, am Grunde zwei ∞ förmige Oeffnungen.

12. *Prothesima petrensis* (C. K. 1839). Alsó-Hámar. Hochsommerform.

13. **PROTHESIMA ALLIONICA** n. sp. (VII. Tafel, 164, *a* Augengruppe, *b* Taster des ♂ von der Seite, *c* dessen Genitaltheil von unten).

♂ Vorderleib dunkel schmutzigröthbraun; Hinterleib dunkel ohlbraun; Beine licht olivengrün, Tibien und Patellen der beiden ersten Paare rauchbraun; alle Beine schlank, ungewöhnlich lang, das vierte Paar besonders auffallend. Cephalothorax so lang als die Tibia des IV. Beinpaares allein. Brustplatte schön oval, olivenfarben; Maxillen und Lippe ebenso gefärbt.

Die Schenkel verstärkt, sonst schlank; Tibia des ersten Paares unbewehrt, Metatarsus desselben Paares unten mit zwei Paar Stacheln; Tibia des zweiten Paares unten mit zwei starken Borsten, Metatarsus wie beim ersten Paar; die Tibien der übrigen Paare, unten mit mehreren Stacheln, die Metatarsen unten und an den Seiten bewehrt.

Hinterleib schmal, beinahe parallel; das untere Spinnwarzenpaar walzig, auffallend lang (beinahe 1 $\frac{m}{m}$).

Die Mittelaugen der hinteren Reihe, gross, oval, gegen einander geneigt, in der hinteren Näherung näher zu einander als die Mittelaugen der unteren Reihe gleichfalls zu einander.

Der Taster lang, schlank, ziemlich kolbig; dessen Patella gestreckt, die Tibia kürzer, aussen, am Ende mit einer Erhöhung, welche plötzlich in einen feinen Dorn ausläuft; Deckschuppe löffelförmig

genügend behaart, am äusseren Rande ausgerandet, unter der Spitze ein seitwärts nach aussen gerichteter, sichelförmiger, feiner und spitzer, braunröthlicher Embolus.

Maasse: Leib 4·9, Cepth. 2·3, I. Beinpaar 7·8, II. 6, III. 5, IV. 9·5 $\frac{m}{m}$.

♀ Unbekannt.

Bei Orsova auf dem Berge Allion Ende Mai erbeutet. Nach Dr. L. Kocn eine höchst auffallende neue Form.

14. *PROSTHESIMA TRAGICA* n. sp. (VII. Tafel, 165, *a* Augengruppe, *b* Epigyne).

♀ Vorderleib dunkelrothbraun, Hinterleib öhlbraun mit anliegender, grober Behaarung. Die Beine dunkelrothbraun, die Schenkel des ersten Paares am Grunde fleckförmig durchscheinend, jene des zweiten Paares weniger, und mit undeutlichem Längsstreif.

Cephalothorax herzförmig mit verengtem Kopftheil, so lang als Patella und Tibia des vierten Beinpaars zusammen. Brustplatte oval, rothbräunlich, behaart. Maxillen eingedrückt, gestreckt, am Ende heller; die Lippe dunkler, zungenförmig, reichlich $\frac{2}{3}$ der Maxillen lang.

Der Taster derb, dessen Schenkel verstärkt, die Behaarung mit Stachelborsten untermischt, dessen Tarsus etwas kürzer als Patella und Tibia zusammen.

Die Beine in den Schenkeln verstärkt; die Tarsen im Verhältniss zu den Tibien, schlank. Tibien und Metatarsen der beiden Vorderpaare unbewehrt; Tibia des dritten Paares unten und oben mit einem Stachel, jene des vierten Paares, unten, mit zwei Paar langen Stacheln.

Hinterleib gestreckt, etwas niedergedrückt.

Die Augen klein; die Seitenaugen der vorderen Reihe die grössten, oval, nach auswärts divergirend; die hinteren und vorderen Mittelaugen gleichweit von einander entfernt.

Epigyne: laut Abbildung.

Maasse: Leib 5·7, Cepth. 2·5, I. Beinpaar 5 $\frac{m}{m}$.

♂ Unbekannt.

Ein Exemplar im Frühjahr im Gratzka-Thale nächst Orsova erbeutet.

15. *PROSTHESIMA ACCEPTA* n. sp. (VII. Tafel, 166, *a* Augengruppe, *b* Epigyne).

♀ Vorderleib öhlbraun; Hinterleib schwarz mit Öhlbraun angehaucht; Beine öhlgrün, alle Tibien verdunkelt.

Cephalothorax herzförmig, so lang als Patella und Tibia des IV. Beinpaars zusammen. Brustplatte herzförmig, dunkelöhlbraun, behaart. Die Maxillen eingedrückt, licht öhlgrün; die Lippe etwas dunkler, zungenförmig, $\frac{2}{3}$ der Maxillen lang. Der Taster licht öhlgrün, mit abstehenden Borsten untermischt behaart, dessen Tarsus kürzer als Patella und Tibia zusammen.

Die Beine, besonders deren Schenkel, kräftig, die Tarsen schlank, licht öhlgelb. Tibia des ersten Paares unbewehrt, dessen Metatarsus, unten, am Grunde mit einem Stachelpaar, am zweiten Paare ebenso; an den Tibien und Metatarsen der beiden Hinterpaare, unten und an den Seiten, mehrere Stachel.

Der Hinterleib verhältnissmässig klein.

Die untere Augenreihe leicht eingebogen, deren Mittelaugen rund, die Seitenaugen unregelmässig geformt; die Mittelaugen der hinteren Reihe flach, gross, unregelmässig geformt, einander sehr genähert.

Epigyne: laut Abbildung, auffallend gross.

Maasse: Leib 5·7, Cepth. 2·8, I. Beinpaar 6·8, II. 6, III. 4·2, IV. 8·8 $\frac{m}{m}$.

♂ Unbekannt.

Im Juni auf dem Berge Allion nächst Orsova erbeutet. Ich bemerke, dass die Art der *P. Allionica* O. H. nahe verwandt zu sein scheint, der Unterschied ist in der Bestachelung des Metatarsus des ersten Fusspaares ausgesprochen.

16. *Prosthesima nigrita* (FABR. 1775). Fünfkirchen. Durch J. von Frivaldszky gesammelt.

10. GENUS: GNAPHOSA (LATR. 1804).

1. *Gnaphosa lucifuga* (WALCK. 1802). Klausenburg, Mezö-Záh, Parajd, Balánbánya, Tölgyes, Hermannstadt, Mehadia, Orsova, S.-A.-Ujhely, Gyöngyös, Fünfkirchen (hier besonders gross). Sommerform, häufig, besonders in den tiefsten, dunkelsten Lagen von Steinhäufen; ihr Biss dringt leicht durch die Haut, erzeugt einen dumpfen Schmerz und bei Fingern Steifheit, welche 24—36 Stunden lang dauert.

2. *Gnaphosa lugubris* (C. K. 1839). S.-A.-Ujhely. Als Sommerform auf dem Berge «Kopasz» einmal angetroffen.

3. **GNAPHOSA SOROR** n. sp. (VII. Tafel, 169, *a* Augengruppe, *b* Epigyne).

♀ Vorderleib dunkelrothbraun, die Beine etwas lichter; der Hinterleib bräunlichgrau, staubig, bei Vergrösserung, mit bräunlichen Hirseflecken bestreut. Grosse, kräftige Form.

Cephalothorax derb, herzförmig, mit dickem Kopffheil, länger als Patella und Tibia des IV-ten Beinpaares zusammen. Brustplatte breitoval, dunkelrothbraun, behaart. Die Mandibeln dunkelrothbraun, derb, länger als der Metatarsus des ersten Beinpaares; die Maxillen sammt Lippe dunkelrothbraun, bilden in ihrer Gesamtheit beinahe einen Kreis; die Lippe $\frac{3}{4}$ der Maxillen lang. Der Taster rothbraun, an der Spitze dunkler, dicht behaart, dessen Tibia und Tarsus, oben, mit 2—3 in der Behaarung verborgenen Stacheln, das letztere Glied so lang als Patella und Tibia zusammen. Die Beine kräftig, verhältnissmässig kurz; am Metatarsus des ersten Paares, unten, in der Mitte ein Stachelpaar; die Tibia unbewehrt; Tibia des zweiten Paares, unten, am Ende mit einem Stachel (oder Paar?), Metatarsus unten, in der Mitte mit einem Stachelpaar; an den übrigen Füssen Tibia und Metatarsus, unten, mehrere Stacheln.

Hinterleib länglichoval, ziemlich convex; Beschuppung mit gesägten Rändern.

Die untere Augenreihe leicht eingebogen, deren Mittelaugen kleiner als die Seitenaugen und etwas weiter von einander als von den seitlichen entfernt; die hintere Reihe ausgebogen, deren Mittelaugen unregelmässig geformt, divergiren nach vorne, in der Convergenz näher bei einander als die unteren untereinander; die hinteren Seitenaugen weiter von den unteren Seitenaugen als von den hinteren Mittelaugen entfernt.

Epigyne: laut Abbildung.

Maasse: Leib 14, Cephlh. 5·3, I Beinpaar 11, II 10, III 9·8, IV 12·5 $\frac{mm}{mm}$.

♂ Unbekannt.

Budapest: durch Johann Pável gesammelt.

4. *Gnaphosa fumosa* (C. K. 1843). Ein ♀ in S.-A.-Ujhely auf dem Berge Kopasz im Juni erbeutet. Diese Spinne wurde sowohl durch THORELL als L. KOCH mit Vorbehalt als *fumosa* (C. K.) bestimmt. Rücksichtlich der Bestachelung der Füsse stimmt sie mit *G. lapponum* L. K. überein, unterscheidet sich jedoch durch die Augenstellung.

5. **GNAPHOSA DOLOSA** n. sp. (VII. Tafel, 167, *a* Augengruppe, *b* Epigyne, *c* Taster des ♂, *d* dessen Genitaltheil von unten).

♀ Vorderleib dunkler, Beine lichter schmutzig-braungelb; Hinterleib öhlbraun; Spinnwarzen lichter braungelb; Cephalothorax in der Augengegend verdunkelt.

Cephalothorax flachgewölbt, breitherzförmig, so lang als Patella und Tibia des IV. Beinpaares zusammen, oben mit spärlicher, schwarzer Behaarung; Brustplatte oval, rothbraun, behaart. Die Mandibeln derb, rothbraun, mit langen, abstehenden, dunkeln Borsten reichlich bedeckt. Die Maxillen rothbraun, eingedrückt, beisszangenartig gegeneinander geneigt, am Ende etwas heller; die Lippe dunkler, breitoval, reichlich $\frac{3}{4}$ der Maxillen lang. Der Taster kräftig, rauh; dessen Schenkel oben mit einigen aufrechten, geschwungenen, schwarzen Stacheln, übrigens haarborstig. Die Beine genügend lang, kräftig, mit spärlicher, abstehender Behaarung; Tibia des ersten Paares unbewehrt, Metatarsus, unten, innen mit einem Stachel; Tibia des zweiten Paares manchmal unbewehrt, manchmal, unten, mit zwei Stacheln hinter-

einander, Metatarsus bald mit einem Stachel, bald mit einem Stachelpaar; Tibien und Metatarsen der Hinterpaare unten und seitlich mit mehreren Stacheln. Am Tarsus der vorderen Beinpaare und auch auf den Metatarsus übergehend eine dichte Scopula.

Hinterleib etwas flach, verbreitert, oben und unten spärlich behaart.

Die vordere Augenreihe leicht eingebogen, die hintere bedeutend ausgebogen; die Mittelaugen der vorderen Reihe kleiner als die seitlichen und weiter von einander, als von den letzteren entfernt; die hinteren Mittelaugen Mandelförmig, mit dem spitzigeren Ende convergirend und hier viel näher zu einander, als die unteren ebenfalls zu einander stehend; die hinteren Seitenaugen von den Mittelaugen um den doppelten Durchmesser geschieden.

Epigyne: laut Abbildung.

Maase: Leib 10, Cephth. 4.8, I Beinpaar 12, II 11.3, III 9.6, IV 15.5 $\frac{m}{m}$.

♂ Kaum kleiner, im Ganzen dunkler; dessen Cephalothorax rothbraun. Der Taster massig kolbig; dessen Patella kaum länger als die Tibia, am äusseren Ende der letzteren ein kurzer, derber, etwas gekrümmter, dunkler Fortsatz; auf dem Schenkel, oben, aufrechte Stachelborsten; Deckschuppe löffelförmig, grob behaart; der Bulbus gelblich, vorne mit einem Knötchen, längs der inneren Seite eine rothbraune Hornleiste, welche unter der Spitze der Deckschuppe in einen leicht geschwungenen, spitzen Embolus ausläuft.

Maase: Leib 10, Cephth. 5.2 $\frac{m}{m}$.

Die Art variirt in der Grösse von 6 bis 10 $\frac{m}{m}$ Leibeslänge.

Bei Orsova im Juni besonders unter abgefallenen Laub und zwischen Steinen ziemlich häufig. Dr. L. Koch hebt ihre Verwandtschaft mit *G. lucifuga* hervor, hält sie aber für neu.

6. *Gnaphosa leporina* (L. K. 1866). Dr. G. Seidlitz hat diese Art in Siebenbürgen entdeckt. Ich kenne sie nicht.

7. *Gnaphosa bicolor* (Hahn 1831). Als Sommerform in Alsó-Hämor unter Steinen.

8. **GNAPHOSA SUSPECTA** n. sp. (VII. Tafel, 168, *a* Augengruppe, *b* Epigyne).

♀ Cephalothorax röthlichbraun, graulich behaart; die Beine gelblichbraun, röthlich angehaucht; Hinterleib öhlbraun, staubig.

Cephalothorax herzförmig, mit ziemlich breitem Kopftheil, etwas länger als Patella und Tibia des IV. Beinpaares zusammen.

Brustplatte oval, gelblichbraun, behaart. Die Mandibeln verhältnissmässig, am Grunde knieartig vorgewölbt, rothbraun, mit spärlicher, abstehender, borstenartiger Behaarung; die Maxillen gelbbraun. Der Taster derb, dessen Tarsus verdunkelt, die Tibia und Tarsus etwas verstärkt, der letztere etwas kürzer, als Patella und Tibia zusammen. Die Beine kräftig; auf dem Metatarsus des ersten Paares, unten vor der Mitte ein langes Stachelpaar, die Tibia unbewehrt; die Tibia des zweiten Paares, unten, am Ende mit einem, der Metatarsus unten ebenfalls mit einem Stachelpaar; Tibien und Metatarsen der Hinterpaare unten und seitlich mit mehreren Stacheln.

Der Hinterleib breitoval, etwas flachgedrückt.

Die vordere Augenreihe beinahe gerade deren Mittelaugen kleiner, alle ihre Augen rund; die hintere Reihe ausgebogen, deren Mittelaugen oval, hinten convergirend und hier näher zu einander, als die vorderen Mittelaugen von einander entfernt.

Epigyne: laut Abbildung.

Maase: Leib 7.5, Cephth. 3.4, I. Beinpaar 7, II. 6.7, III. 6, IV. 9.8 $\frac{m}{m}$.

♂ Unbekannt.

Bei Orsova und S.-A.-Ujhely im Juni unter Steinen gesammelt. Ich habe diese Art ursprünglich für *G. fumosa* C. K. gehalten, Herr Dr. L. K. hält sie jedoch für selbstständig.

9. **GNAPHOSA MOLESTA** n. sp. (VII. Tafel, 170, *a* Augengruppe, *b* Epigyne).

♀ Vorderleib schmutzig röthlichbraun; Beine in den Schenkeln licht röthlich-braungelb, die übrigen Glieder dunkel-rothbraun; Hinterleib öhlgrün.

Cephalothorax derb, herzförmig, spärlich behaart mit ziemlich breitem schwärzlichem Randschlag. Die Brustplatte clyptisch, licht rothbraun, spärlich behaart. Die Mandibeln dunkelrothbraun, kräftig, nicht lang, am Grunde knieartig vorgewölbt, mit vielen abstehenden Borstenhaaren bedeckt; die Maxillen lichtrothbraun, am Ende heller, im Ganzen kreisförmig; die Lippe zungenförmig, am Grunde verengt, dunkler als die Maxillen, mehr als $\frac{2}{3}$ dieser letzteren lang. Die Beine verhältnissmässig, ziemlich kräftig; Tibia der ersten Paare, unten, am inneren Ende mit einem Stachel, die Metatarsen unten in der Mitte mit einem Stachelpaar; Tibien und Metatarsen der übrigen Paare unten und seitlich mit mehreren langen Stacheln.

Der Hinterleib mässig behaart, länglich, etwas flach.

Die vordere Augenreihe eingebogen, die hintere ausgebogen; die Seitenaugen der vorderen Reihe viel grösser als die Mittelaugen und viel näher zu den Mittelaugen, als diese zu einander; die Mittelaugen der hinteren Reihe oval, hinten convergirend ihre längere Achse nicht länger, als der Durchmesser der Seitenaugen; die Seitenaugen der hinteren Reihe reichlich um anderthalb Durchmesser von den Mittelaugen entfernt, diese viel näher unter einander, als die vorderen Mittelaugen ebenfalls unter einander entfernt.

Epigyne: laut Abbildung.

Maase: Leib 9, Cepth. 4, I. Beinpaar 8.5, II. 7.5, III. 7, IV. 11 $\frac{m}{m}$.

♂ Unbekannt.

Bei Orsova unter Steinen gesammelt. Mit *G. suspecta* O. H. nahe verwandt, jedoch auch durch Dr. L. Koch unterschieden.

10. **GNAPHOSA OPACA** n. sp. (VII. Tafel, 171, *a* Augengruppe, *b* Taster des ♂, *c* desselben Genitaltheil von unten).

♂ Vorderleib dunkel, schmutzig-gelbbraun; Beine öhlgrün; Hinterleib öhlbraun. Kleine Form.

Cephalothorax herzförmig, mässig behaart, mit feiner, etwas rauher Randnath. Brustplatte bräunlich öhlgrün, spärlich behaart. Die Mandibeln ziemlich kräftig, öhlbräunlich, ihre Klaue röthlich, ihr Grund hervorgewölbt, mit wenigen Borsten; die Maxillen im Verhältniss zur Lippe sehr breit, im Ganzen kreisförmig, bedeutend eingedrückt, licht öhlgrünlich; die Lippe verhältnissmässig schmal, zungenförmig, reichlich $\frac{2}{3}$ der Maxillen lang. Die Beine ziemlich kräftig, lang, im Tarsaltheil schlank, mit auffallend grober Behaarung; Tibia des ersten Paares unten, am Ende und in der Mitte mit je einem Stachelpaar, Metatarsus, unten, ebenfalls mit einem Stachelpaar, das zweite Beinpaar wie das vorige; die Tibien und Metatarsen der übrigen Paare unten und seitlich mit mehreren Stacheln, welche besonders am Ende des Metatarsus IV quirlförmig gestellt sind.

Der Hinterleib klein, spitzoval.

Die hinteren Mittelaugen nicht oval, aber flach, mit jenen der vorderen Reihe beinahe in ein Quadrat gestellt, welches nur um wenig höher als breit ist; die hintere Reihe stark ausgebogen, die vordere gerade, deren Seitenaugen grösser.

Der Taster ziemlich kräftig und kolbig, dessen Patella länger als dick; die Tibia, kürzer als die Patella, endet aussen in einen derben wolfssohrförmigen Fortsatz; Deckschuppe löffelförmig, ziemlich behaart; der Bulbus licht, einfach, ausgedehnt, unter dem inneren Rande der Deckschuppe etwas vorstehend, am Ende, unter der Spitze der Deckschuppe in einen fingerförmigen Fortsatz endend; längs des inneren Randes der Deckschuppe läuft der feine, rothbraune beinahe borstenförmige Embolus, welcher die Spitze der Deckschuppe erreicht.

Maasse: Leib 5, Cepth. 2, I. Beinpaar 5.5, II. 5, III. 4.2, IV. 6.2 $\frac{m}{m}$.

♀ Unbekannt.

S.-A.-Ujhely auf dem Berge «Kopasz» im Juni unter Steinen erbeutet.

11. **GNAPHOSA FALLAX** n. sp. (VIII. Tafel, 173, *a* Augengruppe, *b* Epigyne).

♀ Vorderleib schmutzig öhlbraun ins Röthliche ziehend; die Beine lichter; Hinterleib öhlbraun mit staubiger Behaarung.

Cephalothorax herzförmig, mit ziemlich derbem Kopftheil und spärlicher, staubgrauer Behaarung; Brustplatte breitelyptisch, braun, spärlich, kurz behaart. Die Mandibeln derb, braunröthlich, am Grunde knieartig hervorgewölbt, mit spärlicher; kaum auffallender, borstiger Behaarung, die Klaue röthlich. Die Maxillen gelblichbraun, gegen einander geneigt, breit; die Lippe dunkler, zungenförmig, breit, $\frac{2}{3}$ der Maxillen lang. Der Schenkel des Tasters öhlgelblich, dessen Tarsus etwas röthelnd, ziemlich behaart und so lang als Patella und Tibia zusammen. Die Beine ziemlich kräftig, grob behaart; Tibia des ersten Paares, unten, am Ende mit schwachem Stachel, der Metatarsus, unten, in der Mitte mit einem Stachelpaar: die Tibia des zweiten Paares, unten, am Ende mit einem Stachelpaar, Metatarsus wie vor; die Tibien und Metatarsen der übrigen Paare unten und seitlich mit mehreren Stacheln.

Der Hinterleib länglich, etwas abgeplattet.

Die vordere Augenreihe eingebogen, deren Seitenaugen viel grösser als die Mittelaugen; die hintere Reihe stark ausgebogen, deren Mittelaugen oval, klein, hinten dicht convergirend.

Epigyne: laut Abbildung.

Maasse: Leib 5·6, Cepth. 2·5, I. Beinpaar 5, II. 4·5, III. 4·2, IV. 6·5.

♂ Unbekannt.

Orsova und S.-A.-Ujhely im Juni erbeutet.

12. *Gnaphosa exornata* (C. K. 1839). Orsova, Báziás. Sommerform, an sonnigen Stellen zwischen abgefallenem Laub; ungemein rasch. Hinsichtlich ihrer Verbreitung (Sahara, Griechenland, Südtirol) jedenfalls eine interessante Form.

13. *Gnaphosa montana* (L. K. 1866). Central-Karpathen. In der Sammlung des Dr. Zimmermann (Limburg); durch Dr. L. Koch bestimmt.

14. *Gnaphosa nocturna* (L. 1758). Klausenburg, Hermannstadt, Pancsova, Orsova. Sommerform; besonders unter der Rinde ausgedorrter, starkbeschieener Holzstöcke; ungemein rasch, daher unbeschädigt nur selten zu erhalten.

15. **GNAPHOSA SCHUSZTERI** n. sp. (VIII. Tafel, 172. *a* Augengruppe, *b* Mandibel, *c* Epigyne, *d* Taster des ♂, *e* dessen Genitaltheil von unten).

♀ Vorderleib reinschwarz, mit gelblichweissen, atlasglänzenden, gefiederten Schuppen bedeckt; Hinterleib schwarz mit gelblich untermischt, vorne mit halbmondförmigem Fleck, in der Gegend des zweiten Rückenstigmen-Paares mit zwei Punkten, ober den Spinnwarzen abermals mit zwei Flecken; sämtliche Zeichnungen gelblichweiss, atlasglänzend; die Schenkel der Beine braunschwarz, alle übrigen Glieder lebhaftgelb; der innere Falzrand der Mandibeln mit einem derben, stumpfen, knotenartigen Zahn

Cephalothorax herzförmig, Kopftheil bedeutend verschmälert, zugespitzt. Brustplatte spitzoval, pechbraun, spärlich behaart. Die Mandibeln braun, glatt, glänzend, von der Seite betrachtet birnförmig, am Grunde knieartig vorgewölbt, mit spärlicher, schwacher Behaarung. Die Maxillen schmutzig-bräunlichgelb, breit, eingedrückt, gegeneinander geneigt, am äussern Rande mit stumpfer Ecke; die Lippe zungenförmig, ziemlich breit, kaum $\frac{2}{3}$ der Länge der Maxillen erreichend. Die Beine schlank, lang, deren Schenkel etwas verstärkt; die Tibia des ersten Paares etwas rauchig, unten mit drei Paar langen, schwachen Stacheln, am Metatarsus, unten — am Ende — ein Stachelpaar; das zweite Paar wie das erste bewehrt; die Tibien und Metatarsen der übrigen Beine unten und seitlich mit einigen schlanken Stacheln.

Hinterleib länglich, etwas abgeplattet.

Die vordere Augenreihe sehr mässig eingebogen, die Seitenaugen grösser; die hintere Reihe gerade, deren Mittelaugen länglich, querliegend; der Zwischenraum zwischen den Seitenaugen beider Reihen etwas grösser als jener zwischen den Mittelaugen beider Reihen.

Epigyne: laut Abbildung.

Maasse: Leib 5·8, Cepth. 2, I. Beinpaar 5·7, II. 4·8, III. 4·9, IV. 7·4 $\frac{m}{mm}$.

♂ Kleiner, schlanker; die Zeichnung des Hinterleibes sehr ausgedehnt. Der Taster dunkel, ziemlich derb; dessen Patella ein wenig länger als dick, die Tibia kürzer als die Patella, mit langen, abstehenden Borstenhaaren; die Deckschuppe löffelförmig, behaart; von der Seite betrachtet, steht unter der

Spitze der Deckschuppe ein kleines Köpfchen hervor, welches sich — von unten gesehen — als gewundener Embolus darstellt.

Maasse: Leib 4·3, Cepth. 2, I. Beinpaar 5·5, II. 4·8, III. 4·6, IV. 6·5 $\frac{mm}{mm}$.

Im Juni bei Orsova erbeutet. Sie lebt in trocken liegenden Steinhaufen, ist ungemein rasch, daher schwer zu erbeuten.

? GENUS: THYSA (?) KEMPELEN (1867).¹

Syn. Gnaphosa lucifuga WALCK.

Dieses fragliche Genus, welches in den seit 1867 erschienenen systematischen Arbeiten stets nur mit Vorbehalt angeführt wurde, hat sich nach eingehender Untersuchung, welche nach dem Tode des Autors an dem Thiere, welches in das Eigenthum des kaiserl. Hofmuseums in Wien überging, vollführt wurde, als eine interessante Monstruosität der *Gnaphosa lucifuga* WALCK herausgestellt.

Die Monstruosität betrifft die Augengruppe, deren vordere Mittelaugen fehlen; die übrigen sind minder gut entwickelt.

Das Exemplar wird wie folgt characterisirt: Am inneren Falzrande der Mandibeln eine breite, feingezähnte Platte mit vorspringenden Ecken, jener von *Gnaphosa lucifuga* (WALCK) vollkommen entsprechend.

Der Cephalothorax mit breitem Randumschlag, länger als Tibia und Patella des IV. Beinpaares zusammen; der Kopftheil deutlich abgegrenzt; die Mandibeln so lang als Patella I, so dick, wie der Schenkel I, am Grunde hervorgewölbt; der Metatarsus IV länger als die Tibia. Das untere Spinnwarzenpaar das längste und stärkste.

Die hintere Augenreihe stark ausgebogen, deren Seitenaugen von den Mittelaugen beiläufig so weit, wie von den vorderen Seitenaugen.

Die Epigyne stimmt vollkommen mit jener Form überein, welche Dr. L. KOCH im I. Hefte der «Fam. der Drassiden» Fig. 5 abgebildet hat.

Die Bestachelung ging verloren.

Das schlecht conservirte Exemplar stammt von Erlau.

IV. FAMILIE. DYSDEROIDAE. MORDSPINNEN.

1. GENUS: SEGESTRIA LATR. (1804).

1. *Segestria senoculata* (L. 1758). Mezőhavas (Hargita-Zug), Nagy-Hagymás (Csiker Alpen), Hermannstadt, Mehádia, Alsó-Hámor, Schemnitz. Als Sommerform kenne ich sie nur aus dem Gebirge, wo sie sich bis in die Nadelholzregion erhebt. Besonders unter Rinden abgestorbener Bäume, manchmal unter und zwischen Steinen thätig.

2. GENUS: DYSDERA LATR. (1804).

1. *Dysdera Cambridgii* THOR. (1873). Báziás, Orsova, Alsó-Hámor, Grosswardein, Ungvar. Sommerform; unter Rinden und in Steinhaufen lebend.

2. *Dysdera Ninii* PAV. (1871). Mehádia. In Felsenritzen. Durch Dr. L. KOCH bestätigt; mit Typen aus Südtirol verglichen, zeigen diese letzteren eine etwas dichtere Punktirung des Cephalothorax.

3. *Dysdera Westringii* CAMER. (1872). Budapest (Rákos) durch Dr. G. v. Horváth gesammelt. Dr. L. KOCH hat die Art revidirt.

4. *Dysdera longitarsis* (DOBL. (1853). Orsova, Mehádia. Sommerform; unter Steinen.

¹ Siehe: O. HERMAN, «Über Thysa etc.» in den Verh. der k. k. zool. bot. Ges. Jahrgang 1878 p. 471.

3. GENUS: HARPACTES TEMPLETON (1834).

1. *Harpactes rubicundus* (C. K. 1839). IX. Tafel 199 ♂ vergr., 200 Brustplatte und Mundtheile von unten, 201 Klauensystem, 202 Kopf von vorne). Torda, Szász-Vesszős, Klausenburg, Oláhfenés, Mező-Záh, Gyeké, Görgény-Szt-Imre, Hermannstadt, Doroszló, Tokaj, S.-A.-Ujhely, Alsó-Hámar, Erlau, Schemnitz, B.-Füred, Budapest, Mehadia. Sommerthier: die gemeinste Dysderoide, welche das ganze Jahr hindurch auch in Wohnungen — besonders ländlichen — vorkommt. Ungemein verwegen und kräftig im Angriffe, wagt sich selbst an *Camponotus ligniperdus*. Hat als „*Dysdera*“ *rubicunda* vielfache Irrthümer herbeigeführt und wird in diesem Werke auf Grund des Klauensystemes und der verticalen Stellung der Mandibeln voraussichtlich endgiltig als echter *Harpactes* eingestellt.

2. *HARPACTES SAEVUS* n. sp. (Tafel VIII. 174, *a* Augengruppe, *b* Taster des ♂).

♀ Vorderleib rauchbraun mit röthlichem Anhauch: Beine röthlichgelb; Hinterleib grau. Schlanke Form.

Cephalothorax herzförmig, etwas erweitert, mit abgerundetem Kopftheil, die Oberfläche ungemein fein gekörnt. Brustplatte röthlichgelb, lang-elyptisch, den Hüften entsprechend ausgerandet. Die Mandibeln senkrecht gestellt, etwas kürzer als Patella I, sonst gestreckt, walzig, dunkel-gelblichroth, mässig behaart. Die Maxillen schmal, gerade, die Einlenkungsstelle (stipes) des Tasters frei sichtbar — gelblichroth; die Lippe von gleicher Färbung, schmal, zungenförmig, $\frac{2}{3}$ der Maxillen lang. Der Taster gelblichroth, schlank, gleichmässig, nicht eben dicht behaart, dessen Tarsus kürzer als Patella und Tibia zusammen. Die Beine ziemlich lang, schlank, gleichmässig behaart, auf den Schenkeln der beiden ersten Paare, oben, vorne je drei Stacheln, am ersten Paare, oben — am zweiten hintereinander; auf den Schenkeln beider Hinterpaare, oben, vier Stacheln, am dritten gegen das Ende, am vierten gegen den Grund zu: Patella des dritten Paares, oben, am Ende mit einem Stachel; die Tibien und Metatarsen der beiden hinteren Paare, unten und seitlich mit mehreren Stacheln.

Der Hinterleib lang, walzig.

Die sechs Augen hufeisenförmig gestellt; die zwei vorderen einen halben Durchmesser von einander entfernt; alle Augen opalisirend.

Die Epigyne eine glatte, häutige Fläche, durch nichts ausgezeichnet.

Maasse: Leib 8, Cepth. 3, I. Beinpaar 8, II. 7·2, III. 6, IV. 8·7 $\frac{m}{mm}$.

♂ Schlanker; Cephalothorax schön braunroth. Der Taster sehr charakteristisch gebaut: dessen Schenkel ungleichmässig verdickt, glatt, glänzend, die Patella kürzer als die Tibia, der Tarsus entspricht $\frac{3}{4}$ Theilen der Tibia; am Grunde des Tarsus, sehr kurz gestielt, hängt der kugelförmige glatte, glänzende Bulbus, dessen Embolus derb, etwas nach vorne gerichtet und an den Kanten gezähnt ist.

Maasse: Leib 8, Cepth. 3, I. Beinpaar 9, II. 7·8, III. 6, IV. 9·4 $\frac{m}{mm}$.

Orsova (Allion-Berg) Ogradena (Mragonya-Thal) unter Rinden gesammelt. Ist sehr lebhaft und rasch.

IV. UNTERORDNUNG.

T E R R I T E L A R I A E.

Bei dieser Unterordnung erreicht die Fixirung der Wohnung und daher des Jagdgebietes ihren Gipfelpunkt, wie dieses besonders durch die verschliessbaren Wohnungen bewiesen wird, welche uns auch belehren, dass die so wohnenden Formen auf Lebensdauer an einen Punkt gebunden sind.

Da diese Unterordnung hinsichtlich des Reichthums der Formen in den Tropen culminirt, so wird ihre Stelle im Systeme der Spinnenthätigkeit erst dann bestimmt werden können, wenn es uns gelingt,

ausser den Formen selbst, auch noch die nöthigen biologischen Daten zu erwerben. Leider sind wir davon noch weit entfernt.

So viel wissen wir jedoch schon, dass die Fixirung der Wohnung bei den Tubitelarien beginnend, bei den Territelarien culminirt; und wenn wir auf Uebergänge — sei es auch nur muthmasslich — Schlüsse ziehen wollen, so müssen wir dann zur folgenden Ordnung der Laterigraden übergeben. Gewisse Laterigraden, besonders Micrommata, und überhaupt die europaeischen Repräsentanten der Heteropodoiden, nähern sich der Form nach gewissen Formen der Territelariae, wogegen es den Anschein hat, dass bei den Territelarien die vollkommene Fixirung der Wohnung nach und nach in Vereinfachung, endlich in eine Adaptirung geeigneter Lauerplätze übergeht, was dann ebenfalls zu den Laterigraden hinüberleiten würde.

1. FAMILIE. THERAPHOSOIDAE. MINIRSPINNEN.

1. SUBFAM. ATYPINAE. KOPFSPINNEN.

1. GENUS: ATYPUS LATR. (1804).

1. *Atypus piceus* (SULZER 1776). Tafel IX, 203 ♂ von oben, 204 dessen Leib von der Seite. Ein schönes ♂ frei herumschweifend, im Juni 1868 zu Mezö-Záh, erbeutet; Wohnungen bei Klauenburg, Torda und Budapest angetroffen. THORELL hält mein Exemplar mit *A. anachoreta* L. K. (AUSSENER) für identisch und zieht auch *A. Sulzeri* BLACKWALL hierher. Ich wünsche hier anzudeuten, dass die Augenstellung hinsichtlich der relativen Entfernungen nach den Beschreibungen und Abbildungen grosse Unterschiede zeigen, u. z.:

- A. Sulzeri* BLACKWALL Die beiden grossen Mittelaugen auf einen Durchmesser von einander entfernt; die beiden grossen Seitenaugen von den Mittelaugen mehr als um einen Radius des Mittelauges entfernt, länglich elyptisch; die beiden hinteren Augen rund, klein, auf Augdurchmesser von einander entfernt.
- Atypus piceus* AUSSENER Die beiden Mittelaugen um ein und um einen halben Durchmesser von einander und noch weiter von dem unteren Seitenauge entfernt.
- Atypus anachoreta* AUSSENER Die beiden Mittelaugen kaum auf Durchmesser-Entfernung von einander, und beinahe eben so weit vom grösseren Seitenauge entfernt.
- Atypus piceus* THORELL Die beiden Mittelaugen nicht ganz auf einen und einen halben Durchmesser von einander entfernt und eben so weit von den grösseren Seitenaugen.
- Atypus piceus* MIH Die beiden Mittelaugen auf doppelten Durchmesser von einander, und kaum auf Durchmesser-Entfernung von den Seitenaugen.

Daraus folgt, dass THORELL's *Atypus piceus* mit *Atypus piceus* AUSSENER übereinstimmt; *Atypus Sulzeri* BLACKWALL hingegen dem *Atypus anachoreta* AUSSENER entspricht; mein *Atypus* dagegen keiner dieser Formen beigezählt werden könnte.

THORELL vermuthet Uebergänge. Ich für meinen Theil wünsche blos zu bemerken, dass die relativen Entfernungen der Augen nebst den Genitalien die treuesten und beständigsten Charactere abgeben, und ich mich mit einer so bedeutenden Schwankung nur schwer befreunden kann. Ich gestehe aber auch, dass ich mich zur Entscheidung der Sache nicht berufen fühle, weil ich dafür halte, dass diese nur durch Vergleichung der Typen und nicht auf Grund von Beschreibungen und Abbildungen gefällt werden kann.

II. SUBFAM. TAPINOCEPHALI. MINIRSPINNEN.

2. GENUS: NEMESIA SAV. et AUD. (1825.)

1. **NEMESIA PANNONICA** n. sp. (VIII. Tafel. 175, *a* Augengruppe, *b* Vorderfuss des ♂, *c* Klaen, *d* Taster des ♂).

♂ Fuchsröth. im Ganzen ins Gelbliche ziehend. Cephalothorax ziemlich spitz-herzförmig, mit kleinem Kopftheil, \cap förmiger Rückengrube; der Kopftheil gut abgegrenzt; aus der Rückengrube ziehen der Lage der Beine entsprechende Strahlen; von der Seite betrachtet ist die Rückenlinie horizontal, durch die Rückengrube vertieft, hinter dieser bogenförmig abfallend. Die Brustplatte elyptisch, mässig convex, gelblichroth, mit dichter, jedoch nicht zottiger Behaarung. Die Mandibeln viel schwächer als der Schenkel des ersten Beinpaars, so lang als der Metatarsus dieses Paares, parallel, gegen das Ende zu büstenförmig gelbroth behaart, am Ende mit fünf ziemlich langen, dünnen, rechenförmig nach vorne gestellten Grablammellen. — von der Seite betrachtet sind die Mandibeln etwas nach vorne gerichtet und schwach bogig gewölbt: ihre Klaue ist braunroth, stark, nicht kürzer als der Stock, nach hinten einschlagbar. Die Maxillen vollkommen hüftenartig, an der inneren Kante zottig behaart, röthlichgelb; die Lippe klein, halbkreisförmig. Die Beine lang, kräftig, in den Tarsen schlank, ihre Bewaffnung ist sehr bedeutend. Die Schenkel, oben, mit 5–6 Stacheln; die Tibia des ersten Paares verdickt, am Ende, unten, mit einem gewaltigen, nach vorne starrenden und nach oben gesshwungenen Stachel, dahinter noch zwei Paar, seitlich noch je zwei Stacheln; die Tibia des zweiten Paares, vorne, unten mit drei, dann noch mit zwei Paar Stacheln, jene des dritten Paares mit drei Paar Stacheln, so auch jene des vierten Paares; die Tibia des dritten Paares auch oben und seitlich, jene des vierten Paares nur seitlich bestachelt. Die Metatarsen überall dicht bestachelt, die Tarsen unbewehrt, jene der beiden ersten Beinpaare mit Scopula, welche auch auf den Metatarsus übergeht.

Der Hinterleib röthlichgelb, mit anliegender, kurzer, goldig-glanzender Behaarung, welche mit zahlreichen braunen, hervorstehenden Borsten untermischt ist. Das obere Spinnwarzenpaar kräftig, cylindrisch, zweigliedrig, das Endglied sehr kurz; das untere Paar sehr klein, kaum auffallend.

Die Augen auf gemeinsamer, brauner Erhöhung; die beiden mittleren so gross wie die vorderen seitlichen, die übrigen kleiner; die mittleren um ihren Durchmesser von einander und um etwas weniger von den vorderen Seitenaugen entfernt; der durch diese vier Augen gebildete Bogen ist so beschaffen, dass eine unter den Mittelaugen gezogene Linie die vorderen Seitenaugen tangiren würde; die hinteren Seitenaugen langelyptisch, beiläufig um den kleinen Durchmesser von den vorderen Seitenaugen entfernt; die hinteren mittleren Augen rund, von den Mittelaugen beiläufig auf Halbmesser-Entfernung und mit den hinteren Seitenaugen beinahe in Berührung; die unteren Seitenaugen so weit vom Stirnrande entfernt, als die Augengruppe hoch ist.

Der Taster fussförmig, kräftig; dessen Schenkel, oben, am Ende mit fünf Stacheln; die Tibia, oben, am Ende mit drei lamellenförmigen Stacheln, welche im Baue jenen der Mandibeln entsprechen und mit diesen wahrscheinlich die gleiche Bestimmung haben; das Endglied ist mehr Tarsus als Deckschuppe, kurz, kaum ein Drittel der Tibia, oben, vorne mit 8–10 Stacheln bewehrt; der Bulbus angehängt, zwiebelförmig kurzgestielt, in eine lange sehr feine Spitze auslaufend.

Maasse: Leib 10, Cepth. 5, I. Beinpaar 12·5, II. 11·5, III. 10·6, IV. 16 $\frac{m}{m}$.

Zimony (Semlin) im Vorsommer umherschweifend angetroffen. Lebensweise unbekannt.

2. **Nemesia Sauvagesii** (DORTH. s. 1794). Budapest (Farkasvölgy = Wolfsthal?) durch Johann Pável erbeutet. Sonach wäre nicht Wippach bei Görz (AUSSENER), sondern derzeit Budapest der bekannte nördlichste Punkt der Verbreitung dieser merkwürdigen Spinnen; ich muss aber bemerken, dass es mir bis jetzt nicht gelingen wollte die Art durch neue Funde zu bestätigen, und es hat mich nur die ausserordentliche Pünktlichkeit und Verlässlichkeit des Sammlers unserer Anstalt (National Museum) bewogen auf die Behandlung einzugehen.

II. SECTION.

DIOTRICEÆ.

V. UNTERORDNUNG.

LATERIGRADAÆ.

Eine Folge des Baues der Beine ist es, dass sich die Formen dieser Unterordnung nach vorrück- und seitwärts zu bewegen im Stande sind.

Das Spinnen und Weben beginnt hier also schon sichtlich in den Hintergrund zu treten und obwohl wir hier noch ein wohl entwickeltes Zwei-Klauensystem antreffen, ist dasselbe nicht mehr Hauptbedingung der Erhaltung, sondern nur ein nebensächliches Hilfsmittel.

Das Gewicht fällt auf die Eigenthümlichkeit der Bewegung.

Die *ruhende* Beute zu beschleichen, diese mit den horizontal gehaltenen, sichelförmig geschwungenen Vorderbeinen zu umklammern, das ist die echte Art und Weise der Laterigraden, womit sie in das System der Spinnenthätigkeit eingreifen.

Wir finden wohl noch Wohnungen (siehe Diaea I. Band, Tafel III, 61), aber die meisten Formen begnügen sich schon mit Schlupfwinkeln, wie sie der Zufall eben bietet, sie richten ihre Angriffe also schon umherschweifend gegen die Beute.

In ihrer Thätigkeit ist diese Unterordnung schon sehr frei, da sie von Punkt zu Punkt fortwandernd (Fadenschüssen) sofort ihrer Nahrung nachgehen kann.

Hinsichtlich der Verbreitung gehören diese Formen überwiegend den Niederungen an und nur wenige steigen bis über die Baumvegetation hinauf.¹

Die Generationsfolge wird, wie es scheint, durch überwinternde Formen gesichert, da es gewiss ist, dass die Weibchen das Ausschlüpfen der Jungen abwarten.

I. FAMILIE. HETEROPODOIDÆ. FUSSSPINNEN.

I. GENUS: MICROMMATA LATR. (1804).

1. *Micrommata virescens* (Cl. 1757). Klausenburg, Szász-Vesszös, Mezö-Záh, Balánbánya, Hermannstadt, Doroszló, Pancsova, Orsova, Ogradena, Baziás, Tokaj, Rakamaz, Alsó-Hámar, Csorba (See), Grosswardein, Fünfkirchen und noch mehrere Orte. Frühjahrs- und Sommerform, welche bis in die Nähe des Krummholzes in die Höhe geht, jedoch in den Niederungen, im hohen Pflanzenwuchs am häufigsten angetroffen wird. Die Form, welche C. Koch «Arachniden» XII. p. 90, Tafel 417, Fig. 1021 unter dem Namen *Sparassus ornatus* beschrieben und abgebildet hat, THORELL jedoch als Art bezweifelt, kommt bei Klausenburg nicht selten vor. Ich fand sie stets unentwickelt, und nur ♂, halte sie bestimmt für das junge Männchen von *M. virescens*. (Cl.)

¹ PAVESI «Ragni del Cantone Ticino» p. 116 fund *Thanaos Arenarius* 2200 hoch.

2. GENUS: PHILODROMUS. WALCK (1825).

1. *Philodromus aureolus* (Cl. 1757). Sehr verbreitet: ausschliesslich Pflanzenthier, welches den Sonnenschein liebt.

2. **PHILODROMUS PELLAX** n. sp. (Tafel VIII, 176, *a* Augengruppe, *b* Epigyne).

? Vorderleib blass röthlichgelb; Beine blass grünlichgelb; Hinterleib blass gelblichweiss. Die ganze Oberfläche bei Vergrösserung wie mit Kohlenstaub bestreut.

Cephalothorax herzförmig, mit erweitertem Kopftheil, in der Mitte bandartig breit gelichtet. Die Brustplatte herzförmig, schmutzigweiss, wie mit Kohle bestäubt. Die Mandibeln und überhaupt die Mundtheile gelblichweiss. Der Taster grünlichgelb, sehr leicht, am Tarsus mit einigen dunklen Borsten, nicht länger als Patella und Tibia zusammen. Die Beine schlank; auf den Schenkeln, oben, wenig Stacheln, auf den Tibien und Metatarsen, unten und seitlich einige schlanke Stacheln.

Hinterleib flach, länglich, in der Mitte am breitesten, hinten zugespitzt.

Die vordere Augenreihe mehr, die hintere weniger ausgebogen, die letztere viel länger; die Mittelaugen beider Reihen in ein nach vorne verengtes Trapez gestellt; die unteren Seitenaugen mit den hinteren mittleren in ein nach hinten verengtes Trapez geordnet; die Seitenaugen der hinteren Reihe näher zu den mittleren, als diese zu einander.

Epigyne: laut Abbildung.

Maasse, Leib: 5·2, Cephal. 1·9, I. Beinpaar 7·8, II. 10, III. 6·9, IV. 6·4 $\frac{m}{mm}$.

♂ Unbekannt.

Bei Orsova im Gratzkathale im Grase. Dr. THORELL schreibt mir, er kenne die Form auch aus Schweden.

3. *Philodromus poecilus* (THOR. 1870—73). Doroszló, Neusatz, Rakamaz, Budapest und noch von mehreren Punkten. Ueber dessen Mimicrismus siehe biologisches System im II. Bande, so auch im ersten Bande «Gestalt und Färbung».

3. GENUS: THANATUS C. K. 1837.

1. *Thanatus oblongus* (WALCK. 1802). Szász-Vesszős, Klausenburg, Mező-Záh, Hermannstadt, Doroszló, Pancsova, Orsova, Stuhlweissenburg, Komjáti. Schon im Frühjahr geschlechtsreif; gehört zu den fleissigsten Luftschildern; höchst listig und verschlagen.

2. *Thanatus formicinus* (Cl. 1757). Klausenburg, Doroszló, Kaschau, Veszprem, Budapest. Auf sterilen Stellen und in der Nähe von Ameisenhaufen, nicht eben häufig; überwintert bestimmt, da er durch Dr. G. v. HORVÁTH im strengsten Winter aufgefunden wurde.

II. FAMILIE. THOMISOIDAE. ARMSPINNEN.

1. GENUS: MONAESES THOR (1869—70).

1. *Monaeses cuneolus* (C. K. 1838). Klausenburg, Doroszló, Pancsova, Tokaj, Budapest. Frühlings- und Sommerform; am liebsten an sonnigen Waldrändern im Grase.

2. GENUS: THOMISUS (WALCK. 1805).

1. *Thomisus onustus* WALCK. 1805. Klausenburg, Mező-Záh, Hermannstadt, Doroszló, Orsova, Fünfkirchen, Budapest. Nicht eben selten. Dessen Eigenschaften im allgemeinen und systematischen Theile reichlich abgehandelt.

3. GENUS: MISUMENA LATR. (1804).

1. *Misumena vatia* (CL. 1757). In den Niederungen weit verbreitete Art, welche aber auch in der Nadelholzregion vorkommt.

2. *Misumena truncata* (PALL. 1772). Klausenburg, Nyárad-Szereda, Hermannstadt, Palánka, Orsova, Budapest. Diese Art scheint für Stachelbeersträucher, so auch Rosensträucher eine besondere Vorliebe zu besitzen.

3. *Misumena villosa* (WALCK. 1837). Güns. Budapest. Komjáti. Aus üppigen Pflanzenwuchs der Niederungen bekannt.

4. GENUS: DIAEA THOR. (1869—70).

1. *Diaea globosa* (FABR. 1775). Klausenburg, Szász-Vesszős, Mező-Záh, Palánka, Pancsova, Orsova, Báziaás, Alsó-Hámor, Grosswardein, Ungvár, Budapest. Frühjahrs- und Vorsommerform, welche besonders die Schirme der Doldenpflanzen liebt.

2. *Diaea tricuspidata* (FABR. 1775). Klausenburg, Mező-Záh, Hermannstadt, Doroszló, Apatin, Palánka, Pancsova, Orsova, Tokaj, Rakamaz, Grosswardein, Budapest, Ungvár, Mehadia. Besonders auf üppigen Wiesen zu treffen.

3. *Diaea capparina* (C. K. 1845). Eine Form, welche Dr. Rosenhauer 1844 im «Banate» gesammelt hat. Mir unbekannt.

5. GENUS: XYSTICUS (C. K. 1835).

1. *Xysticus impavidus* THOR. (1871). Klausenburg, Mező-Záh, Alsó-Dabas. Sommerform; im Gesträucher. Dürfte wohl mit Dr. L. Koch's *X. luctator* identisch sein, welcher letzterer dann die Priorität (1870) hätte.

2. *Xysticus cristatus* (CL. 1757). Klausenburg, Mező-Záh, Medgyes, Szász-Vesszős, Doroszló, Palánka, Orsova, Tokaj, Rakamaz, Schemnitz, Grosswardein, Fünfkirchen, Ungvár. Frühjahrs- und Sommerform; mit der folgenden Art übereinstimmend.

3. *Xysticus Kochii* THOR. (1871). Von zahlreichen Punkten bekannt. Auf staubigen Wegen, Gesträuchen, Pfählen u. s. w. umherschleichend; höchst gewandt im Anschlich, benützt sehr umsichtig Deckungen um der Beute beizukommen.

4. *Xysticus lateralis* (HAHN. 1831). Doroszló, Fünfkirchen. Sommerform.

5. *Xysticus sabulosus* (HAHN. 1831). Klausenburg. Mir weniger bekannt.

6. *Xysticus bifasciatus* C. K. 1835. Doroszló, Mehadia und Orsova. Mir weniger bekannt.

7. *Xysticus Ulmi* (HAHN. 1831). Doroszló. Besonders auf Weiden am Rande der Sümpfe; scheint für solchen Aufenthalt eine besondere Vorliebe zu besitzen.

8. *Xysticus perogaster* THOR. (1871). Veszprém. Als Herbstform ausschliesslich auf Schlehdorn an Wegrändern erbeutet.

9. *Xysticus marmoratus* THOR. (1875). Rákospalota. Im Grase. Wurde durch THORELL nach süd-russischen Exemplaren beschrieben.

10. *Xysticus robustus* (HAHN. 1831). Szász-Vesszős. Auf abgestorbenen Disteln. Die Identität mit *fucatus* (WALCK) ist noch fraglich und bin ich nicht im Stande dieselbe zu entscheiden.

11. *Xysticus acerbus* THOR. (1871). Illok, Pancsova, Orsova, Ogradena, Báziaás, Grosswardein, Budapest. Auf Blössen der Gesträucher im Grase, manchmal auf abgestorbenen Disteln.

12. *XYSTICUS FRATER* n. sp. (Tafel VIII, 177, *a* Augengruppe, *b* Epigyne, IX. Tafel, 205 ♀ von oben).

♀ Vorderleib schön bräunlichschwarz; Hinterleib schön gelblich lichtgrau, schwarz gesprenkelt, so, dass manchmal die diesem Genus eigenthümliche gesägte Zeichnung zum Vorschein kommt. Die

Schenkel der beiden vorderen Beinpaare schön bräunlichschwarz, die Tarsen gelblichroth, am Ende schwarz geringelt; die Tibien beider Hinterbeinpaare schön gelblichroth, am Ende mit einem Ring; die Patellen und Tibien dieser Paare schön braun, mit lichtem, gelblichweissm Längsstreif (auf dem dritten Fusspaar am schärfsten und doppelt), die Tarsen wie auf den ersten Paaren. Das Gesicht licht, längs der vorderen Augenreihe ein gelblichweisses Querband; ober dem Stielchen beginnt ein breites, gelblichweisses Mittelband, welches sich bald in zwei Aeste theilt, welche gabelförmig bis zu den hinteren Augen reichen: hinter den hinteren Mittelaugen drei verwaschene, lichte Längsstrichelchen, welche manchmal die Gabel ausfüllen. Die Mandibeln am Grunde dunkelbraun, an der Spitze gelblichweiss. Die Brustplatte gelb und braun schäckig. Die Hüften besonders zierlich: lichtbraun, am Ende schön weiss eingefasst, am Grunde mit mehreren lichten Längsstrichelchen. Der Taster kurz, dessen braungelber Tarsus verdünnt, der ganze Taster wenig behaart. Die beiden vorderen Beinpaare kräftig, lang: die beiden Hinterpaare kürzer und schwächer. Auf dem Schenkel des ersten Beinpaares, oben, drei aufrechte Borsten in etwas schiefer Reihe, die Tibia, unten, mit vier, der Metatarsus ebendort mit drei Stachelpaaren.

Der Hinterleib breitoval, nur wenig länger als breit, hinten zugerundet.

Die vordere Augenreihe wenig, die hintere leicht ausgebogen: die Mittelaugen beider Reihen in ein etwas breiteres als hohes Rechteck gestellt; die Seitenaugen beider Reihen grösser als die mittleren, die vorderen grösser als die hinteren: die hinteren Seitenaugen weiter von den hinteren Mittelaugen als von den vorderen Seitenaugen.

Epigyne: laut Abbildung.

Maasse, Leib: 6, Cephal. 2·3, I. Beinpaar 7·5, II. 7·6, III. 5, IV. 5·1.

Palánka; als Frühlingsform im Grase einer Waldblösse erbeutet.

13. *Xysticus praticola* C. K. (1837—8). Doroszló auf Grasplätzen.

14. *Xysticus horticola* (C. K. 1837.). Hermannstadt. Bei Sill sub. *Thomisus horticola* C. K. angeführt.

15. *Xysticus? devius* (C. K. 1845). Aus dem «Banát» durch C. Kocn beschrieben. Scheint mir eine auffallendere Farbenvarietät von *Misumena vatia* (Cl.) zu sein.

16. *Xysticus? cerinus* (C. K. 1845). Wie die vorige Art.

VI. UNTERORDNUNG.

C I T I G R A D A E.

Trotzdem die Beine ohne Unterschied das Dreiklassensystem weisen, tritt das Weben in den Hintergrund, was auch dadurch charakterisirt wird, dass bei den typischen Formen dieser Unterordnung (*Lycosoidae*) hin und wieder schon eine Verkümmernng der Webeklauen beobachtet werden kann. Die verhältnissmässige Entwicklung der Gehwerkzeuge hat die Befähigung zu raschem Laufe, überhaupt rasche Bewegung zur Folge, und macht die Formen dieser Unterordnung zu *beutesuchenden Jägern*.

Die typischsten Formen sind derartig unstät, dass selbst die zur Sicherung der Generationsfolge gehörigen Momente sie nicht an einen Ort fesseln: das Weibchen trägt die in ein Gewebe gehüllten Eier fortwährend mit sich, ebenso wie später die ausgeschlüpften Jungen auf seinem Rücken, so lange, bis diese ihr Leben selbstständig zu erhalten vermögen.

Wir finden wohl auch hier Wohnungen (*Trochosa*): aber diese folgen nicht aus der speciellen biologischen Richtung dieser Unterordnung, sondern sie folgen aus den Umständen, unter welchen diese Formen leben, wo ihre Sicherheit an das Vorhandensein einer Wohnung geknüpft ist (*Trochosa infernalis* in der Steppe, *Trochosa cinerea* auf Flussgerollen).

Diese Wohnungen knüpfen diese Formen einigermaßen an die Territelarien (biologisch). Hinsichtlich der Organisation finden wir Anklänge an die Tabitelarien (Zora), und wieder an die Laterigraden (Oxyopes mit Micrommata).

Die ruhende oder umherschweifende Beute aufzusuchen, sie offen anzugreifen, wenn sie flüchtet, oder die Annäherung an dieselbe erschwert ist, sie mit einem Sprunge zu überfallen: dieses ist die Art und Weise dieser Formen.

Das Weben als Hilfsmittel bei der Ernährung, tritt gänzlich in den Hintergrund: das Gewicht fällt auf die Bewegung.

Mit einigen Ausnahmen begnügen sich diese Formen mit solcher Unterkunft, wie sie eben der Zufall gewährt; sie schweifen daher frei umher.

Hinsichtlich der Einwirkung sind sie — obzwar eigentlich an die Scholle gebunden — in horizontaler Richtung gänzlich frei.

Von der Scholle der Niederungen bis zum ewigen Schnee der Alpen überall finden wir Repräsentanten dieser Unterordnung; ihren Formenreichtum entfaltet sie jedoch in den Niederungen.

Auf trockenem Boden, an Gewässern, auf den Gewässern, überall finden wir Citigraden, deren Artreihen Luftfahrten unternehmen, daher in grossem Umkreise wirken.

Die Sicherung der Generationsfolge wird, wie es scheint, durch überwinternde Formen besorgt.

1. FAMILIE. LYCOSOIDAE. WOLFSSPINNEN.

1. GENUS: AULONIA C. K. (1848).

1. *Aulonia albimana* (WALCK. 1805). Doroszló. Die jüngere Generation beginnt schon an schönen Märztagen mit dem Fadenschliessen; sie liebt ihre Luftschifferkünste besonders auf der Spitze der Pfähle längs der Gewässer zu betreiben, wo sie meist in Gesellschaft angetroffen werden kann.

2. GENUS: LYCOSA LATR. (1804).

1. *Lycosa amentata* (CL. 1757). Eine der gemeinsten Arten, welche sowohl im Frühjahre als auch im Herbst angetroffen wird. Scheint die Type des obscuren Namens «*Lycosa saccata*» zu sein, welcher in der Systematik so viel Verwirrung verursachte, da er auf alle kleineren Lycosoiden passt. Ihre jüngere Generation ist sehr fleissig beim Luftschiffen.

2. *Lycosa lignaria* (CL. 1757). Sommerform, welche in höheren Lagen und wie es scheint, auch hochalpin vorkommt. Ich kenne sie aus Holzschlägen in Alsó-Hámar, und halte jene Art, welche in den Central-Karpathen selbst auf der Krivanspitze vorkommt, jedoch dort zwischen den Blöcken kaum zu erbeuten ist, für *L. lignaria* (CL.). Ihr Eiersack ist grünlichblau.

3. *Lycosa lugubris* (WALCK. 1802). Klausenburg, Mező-Záh, Doroszló, Apatin, Orsova. Als Frühjahrsform bisher nur in den Niederungen angetroffen.

4. *Lycosa monticola* (CL. 1757). Doroszló, Mehadia, Tokaj, Alsó-Hámar, Kriván (unterm Gipfel), Lykanka. Obwohl auch in der Ebene vorhanden, ist diese Art doch vorwiegend Gebirgsform, welche weit über die Baumgrenze emporsteigt.

5. **LYCOSA PROFUGA** n. sp. (VIII. Tafel, 181, *a* Augengruppe, *b* Taster des ♂).

^a Vorderleib schwarz, mit weisslichen Härchen; der Hinterleib mit staubgrauer Behaarung; die Schenkel der beiden vorderen Beinpaare vom Grunde an bis zur Mitte schwarz, die übrigen Glieder lebhaft hell-braungelb, die beiden Hinterpaare ganz bräunlichgelb. Die Beine schlank, lang.

Der Kopftheil prismatisch, der Thoraxtheil erweitert. Die Brustplatte bräunlichschwarz, behaart. Die Hüften der hinteren Beinpaare bräunlichgelb, jene der Vorderpaare schwarz mit bräunlichgelb

gemischt. Die Mandibeln schwarz, ganz am Ende in geringem Grade bräunlichgelb; die Maxillen braunlichgelb. Die Tibia des ersten Beinpaars mit vier, der Metatarsus mit drei Paar langen, schlanken Stacheln; das zweite Paar desgleichen. Der Hinterleib klein, verschmälert.

Die Stirne schmutzig-rothgelb. Die zweite Augenreihe länger als die vordere, die Augen der letzteren sehr klein, gleichgross; die Augen der zweiten Reihe gross, etwas weiter als um ihren Durchmesser von einander; die Augen der dritten Reihe etwas weiter von einander, als von den Augen der zweiten Reihe.

Der Taster schwarz, dessen Tibia etwas länger als Patella und ziemlich verdickt; die Behaarung lang, abstehend; die Deckschuppe niedergeneigt, spitz-löffelförmig; der Genitaltheil, von der Seite betrachtet, zeigt einen schwarzbraunen sattelförmig eingedrückten Bulbus, dessen rückwärtige Partie beinahe kegelförmig hervorsticht.

Maasse: Leib 5, Cepth. 2·5, I. Beinpaar 7, II. 6·5, III. 5·5, IV. 8·8.

♂ Unbekannt.

Die ungemein rasche, hüpfende Art erbeutete ich auf der Hutweide zwischen Tokaj und Rakamaz, u. z. im Juni.

6. *Lycosa proxima* C. K. (1848). Doroszló. Frühjahrsform in den grasigen Rändern der Sümpfe. Dr. Thorell kennt sie aus der Umgegend von Rom: scheint also nach Süden zu incliniren.

7. *Lycosa prativaga* L. K. (1870). Apatin, Tokaj. Als Sommerform erbeutet.

8. *Lycosa anulata* Tuor. (1871). Doroszló. Sumpfränder. Dr. Thorell hat die Art auf französische und italienische Formen begründet; scheint also südlich zu sein.

9. **LYCOSA POECILA** n. sp. (VIII. Tafel, 178, *a* Augengruppe, *b* Leib, *c* Epigyne.)

♀ Vorderleib braun; das Augenfeld schwarz; Rand des Cephalothorax mit breiter, gelblicher Einfassung, welche auf der Stirne zusammentrifft, ober dem Stielchen dagegen unterbrochen ist; vom Stielchen an beginnt ein Mittelstreif, der vor dem Augenfeld verschwindet; Beine schlank, rothgelb, das vierte Paar sehr lang; alle Glieder mit dichten, ungleichrandigen, braunen Ringen geziert. Hinterleib ohlbraun, vorne mit gelblichem Spindelstrich; die Bauchseite schmutzig-gelblich.

Cephalothorax länglich, beinahe prismatisch; die Mandibeln röthlichgelb, von der Seite gesehen gegen die Maxillen gedrückt. Die Brustplatte elyptisch, gelb, dicht behaart. Der Taster gelblich, mit wenigen, sehr verwachsenen Flecken, mässig behaart, auf jedem Gliede einige Stachelborsten, dessen Tarsus so lang als Patella und Tibia zusammen. Die Beine schlank, fein endend; die Tibia des ersten Paares, unten ganz am Ende, mit zwei kurzen, in der Mitte und gegen den Grund zu je ein Paar sehr langen Stacheln, der Metatarsus ebenso; das zweite Beinpaar ebenso, jedoch die Tibia auch an der inneren Seite mit einem Stachel; die Tibien und Metatarsen der beiden Hinterpaare unten und seitlich mit mehreren Stacheln.

Der Hinterleib elyptisch, verhältnissmässig klein. Die vordere Augenreihe gerade, etwas kürzer als die mittlere, ihre Mittelaugen etwas vergrössert, so weit vom Stirnrande wie von der mittleren Reihe; die beiden Augen der mittleren Reihe gross, auf anderthalb Durchmesser von einander entfernt; die beiden Augen der hinteren Reihe kleiner als die vorigen, viel weiter von einander als von der letzteren Reihe.

Epigyne: laut Abbildung.

Maasse: Leib 6, Cepth. 3·4, I. Beinpaar 9, II. 8·3, III. 8, IV. 13 m_m .

♂ unbekannt.

Szász-Vesszós, Körös-Engel, Apatin, Lúcsivna, S.-A. Ujhely. Das hübsche Thierchen fällt durch seine Behändigkeit auf und liebt feuchtere Wiesengründe.

10. **LYCOSA FARINOSA** (VIII. Tafel, 179, *a* Augengruppe, *b* Epigyne, *c* Taster des ♂, *d* dessen Genitaltheil von unten).

♂ Vorderleib braun mit weisslicher Behaarung, welche auch das Augenfeld bedeckt; der Hinterleib braun, mit schmutzigweisser Behaarung, welche gegen das Ende zu einige \wedge gestaltete Winkelflecken bildet; die Bauchseite braun, schmutzigweiss behaart; die Beine röthlichbraun mit schmutzigweisser Behaarung, verwachsen fleckig und derb.

Cephalothorax mässig prismatisch, vorne abgerundet; die Wangen etwas gewölbt. Die Brustplatte breit, herzförmig, röthlichbraun, glänzend, spärlich behaart; die Mandibeln am Grunde schmutzig gelbweiss, am Ende gebräunt. Der Taster mit viel gelb, und verwaschen gefleckt; dessen Tarsus kürzer als Patella und Tibia zusammen. Die Tibia des ersten Beinpaars, unten, mit drei Stachelpaaren, der Metatarsus desgleichen.

Hinterleib länglich clyptisch, genügend hoch. Die vordere Augenreihe so lang als die mittlere, um wenig weiter vom Stirnrande als von der mittleren Reihe, ihre Augen gleichgross; die beiden Augen der mittleren Reihe gross, reichlich auf Durchmesser-Entfernung von einander; die beiden Augen der hinteren Reihe etwas kleiner, weiter von einander als von den Mittleren.

Epigyne: laut Abbildung.

Maasse: Leib 10, Cepth. 4.3, I. Beinpaar 9, II. 8.6, III. 8, IV. 11 $\frac{m}{m}$.

♂ Kaum kleiner, mit längeren, kräftigen Beinen. Die Behaarung des Cephalothorax bildet ein Mittelband von Augenbreite, die Farbe ist schmutzigweiss, das Band ist braun begrenzt; auf dem Hinterleib oben ein gleiches Band; in der Behaarung ist viel schmutzig-rothgelb, was die Färbung erdfarben erscheinen lässt. Der Taster dunkel; dessen Patella etwas länger als die Tibia; die Deckschuppe löffelförmig; der Genitaltheil, von der Seite betrachtet zeigt einen einfachen Bulbus, von unten betrachtet, weist der Bulbus eine quere Windung; am äusseren Rande der Deckschuppe ist ein kleiner, etwas gebogener Stachel zu sehen.

Maasse: Leib 8, Cepth. 4.4, I. Beinpaar 10.3, II. 9.9, III. 9.5, IV. 12.

Das einzige Paar habe ich auf den morastigen Ufern der Sümpfe von Doroszló erbeutet. Die Beschaffenheit der Backen weist diese Form gewissermassen zu Tarentula.

11. **LYCOSA FESTINANS** n. sp. (VIII. Tafel 180, *a* Augengruppe, *b* Epigyne.

♀ Vorderleib braun, in der Gegend der Mittelritze licht; die Beine schlank, lang, röthlichbraun mit zahlreichen Ringflecken; der Hinterleib braun, vorne mit kurzem Spindelstrich.

Kopftheil prismatisch, Thoraxtheil etwas erweitert; das Augenfeld dunkel, die Backen ein wenig lichter. Die Brustplatte breit, herzförmig, dunkel rothbraun, spärlich weiss behaart. Die Mandibeln am Grunde verwaschen bräunlichgelb, am Ende verdunkelt. Der Taster bräunlichgelb mit zahlreichen bräunlichen Ringflecken, ziemlich behaart mit wenig Borsten; dessen Tarsus so lang als Tibia und Patella zusammen. Die Tibia des ersten Beinpaars unten mit drei Paar-, seitlich mit zwei Stacheln; der Metatarsus unten mit drei Stachelpaaren; das zweite Paar desgleichen; die am Ende der Glieder stehenden Stacheln kurz, die übrigen lang, fein.

Der Hinterleib breit-clyptisch, verhältnissmässig klein. Die vordere Augenreihe gerade, ihre Augen klein, diese Reihe kürzer als die mittlere, vom Stirnrande so weit als von der Mittelreihe entfernt; die beiden Augen der zweiten Reihe gross, mehr als einen Durchmesser von einander entfernt; die hinteren Augen kleiner, viel weiter von einander als von den Mittelaugen.

Epigyne: laut Abbildung.

Maasse: Leib 5.8, Cepth. 2.6, I. Beinpaar 7.8, II. 7.3, III. 7, IV. 11.4.

♂ Unbekannt.

Als Frühjahrsform an sumpfiger Stelle bei Doroszló gefunden.

12. **LYCOSA EXORNATA** n. sp. (VIII. Tafel, 182, *a* Augengruppe, *b* Leib, *c* Vorderbein).

♂ (junior). Cephalothorax mit gelblichweisser Behaarung, welche ein breites Mittelband und eine ziemlich breite Einfassung bildet; Hinterleib schwärzlichbraun, auf der Oberfläche eine auffallende, vorne ästige, hinten gezackte Zeichnung aus gelblicher Behaarung gebildet; die Bauchseite schmutziggelb; Schenkel, Tibia und Patella dunkel; der Schenkel etwas gefleckt, jener des ersten Beinpaars mit lichtem Längsstreif; die Tarsen schmutzig-röthlichgelb.

Kopftheil prismatisch, der Thoraxtheil mässig erweitert. Die Brustplatte braunlichschwarz, glänzend, spärlich behaart. Die Mandibeln bräunlichschwarz, am Grunde mit schmutzig-röthlichgelber Behaarung. Der Taster schmutzig-rothbräunlich, dessen Schenkel dunkel gefleckt, dessen Tarsus etwas

kürzer, als Patella und Tibia zusammen. Tibia und Metatarsus des ersten Beinpaares, unten mit je drei Stachelpaaren.

Der Hinterleib langeiförmig, hinten etwas zugespitzt. Die vordere Augenreihe sichtlich eingebogen, die Mittelaugen etwas grösser; die Augen der Mittelreihe gross, beiläufig auf Durchmesser-Entfernung (eher mehr) von einander; die hinteren Augen etwas kleiner, weiter von einander als von der Mittelreihe.

Epigyne: unentwickelt.

Maasse: Leib 6·5, Cepth. 3, I. Beinpaar 6, II. 5·8, III. 5·5, IV. 9·5 $\frac{m}{mm}$.

♂ (junior). Noch lebhafter gefärbt mit schärferen Zeichnungen.

Die Exemplare hatten die dritte Häutung hinter sich. Mit Rücksicht auf die aussergewöhnliche Färbung und die Beschaffenheit der vorderen Augenreihe, wagte ich es die Art zu beschreiben.

Fundort: Rákos bei Budapest.

3. GENUS: TARENTULA SUND. (1833).

1. *Tarentula radiata* (LATR. 1817). Bei Komjáti durch Dr. G. v. Horváth erbeutet. Das Exemplar entspricht der Varietät γ , welche Thorell angeführt hat.

2. *Tarentula inquilina* (CL. 1757). Alsó-Hámar, Budapest, Szász-Vesszős. Stellenweise häufig; scheint für kalkige Vorgebirge eine Vorliebe zu haben; gräbt oft unter flach aufliegende Steine Höhlen und setzt an deren Mündung den Eiersack der Sonnenwärme aus.

3. **TARENTULA SOLITARIA** n. sp. (Tafel VIII. 183, *a* Augengruppe, *b* Epigyne.

♀ Erdbraun. Auf dem Cephalothorax ein vom Stielchen kommendes, in der Gegend der Mittelritze erweitertes, schmutziges Mittelband, welches dann auf das Augenfeld und die Backen übergeht; eine gleiche, am inneren Rande ausgezackte Randeinfassung ebenfalls vorhanden; der Hinterleib mit vielem Erdgelbgrauen gemischt, braun; die Bauchseite erdgrau; die Beine gelblich erdgrau, die Schenkel oben und seitlich braun gewölkt; die Mandibeln am Grunde gelblich erdgrau, am Ende gebräunt.

Cephalothorax derb, dessen Kopftheil erweitert, abgerundet, bedeutend backig. Die Brustplatte breit, herzförmig, braun, ziemlich behaart. Der Taster wie die Beine gefärbt, reich behaart, dessen Tarsus so lang als Tibia und Patella zusammen. Die Beine kräftig, ziemlich lang, mit kräftigen Tarsen; Tibia des ersten Paares, unten, mit drei schwachen Stachelpaaren, der Metatarsus unten — in der Scopula verborgen — mit 2 (?) Stachelpaaren, an beiden Gliedern auch seitlich je zwei Stacheln hintereinander; Tibien der Hinterpaare, unten und seitlich, mit mehreren Stacheln, die Metatarsen überall mit langen Stacheln bedeckt. Der Tarsus und Metatarsus der vorderen Beinpaare mit dichter, schwarzer Scopula.

Die vordere Augenreihe sehr leicht eingebogen, deren Mittelaugen sichtlich grösser; die beiden Augen der mittleren Reihe gross, nicht ganz auf Durchmesser-Entfernung von einander; die beiden hinteren Augen kleiner als die vorigen und weiter von einander als von der Mittelreihe.

Epigyne: laut Abbildung.

Maasse: Leib 13·8, Cepth. 7, I. Beinpaar 17, II. 15·5, III. 14·9, IV. 19·5.

♂ unbekannt.

Diese ansehnliche Tarantel habe ich als Herbstform bei Lykauka nächst Rosenberg, am Fusse der Burgruine unter einem Steine erbeutet. In der Gefangenschaft wurde sie bald ganz sanft und nahm die Fliegen aus der Hand.

4. *Tarentula Cronebergii* THOR. (1875). Szász-Vesszős, S.-A.-Ujhely, Komjáti, Budapest. Ursprünglich aus Russland beschrieben.

♂ Nicht kleiner, bloss etwas schlanker als das ♀, mit gleicher Farbe und Zeichnung. Der Taster ziemlich lang, schlank, dessen Schenkel wie jener des ♀ bewehrt (3—4 Stacheln oben, am Ende, quer gestellt, dahinter zwei hinter einander), dessen Tibia so lang als die Patella, ziemlich behaart; die Deckschuppe dunkel, spitz-löffelförmig, unter der Spitze reichlich, zottig behaart; der Bulbus gelblichroth,

welchem sich von dem äusseren Rande aus ein spitzer, zahnformiger, einmal langgerippter, dunkler Fortsatz anschmiegt. Das ♂ hier zum ersten Mal beschrieben.

5. *Tarentula Eichwaldii* THOR. (1875). Budapest (Blocksberg). Unter Steinen als Sommerform erbeutet.

6. *Tarentula striatipes* (DOL. 1852). Szász-Vesszös, Budapest. Als Sommerform stellenweise ziemlich häufig.

7. *Tarentula trabalis* (CL. 1757). Fiume. Als Sommerform einmal unter Steinen angetroffen.

8. *Tarentula albofasciata* (BRÜLL. 1832). Orsova. Ursprünglich von der Halbinsel Morea beschrieben, kommt diese schöne Tarantel in ganz typischen Formen als Frühjahrsform unter abgefallenem Laube vor.

9. *Tarentula cuneata* (CL. 1757). Klausenburg, Szász-Vesszös, Doroszló. Im Frühjahre und Herbst im Gesträuche und auf Grasplätzen nicht selten.

10. *Tarentula pulverulenta* (CL. 1757). Doroszló, Central-Karpathen, Ungvár. Ist im Süden des Landes Frühjahrs-, im Norden Spätsommerform.

11. *Tarentula nebulosa* THOR. (1872). Kutyfalva (Maros-Ufer), Szász-Vesszös (Bachufer), Orsova (oft inundirte Gerölle der reissenden Cserna). Lebensweise und Organisation nähern diese Spinne sehr zu den Trochosen. Der abgerundete Kopf, die Grösse der Mittelaugen der Vorderreihe, deren Entfernung (beinahe 2 Durchmesser) vom Stirnrande weisen sie zu den Trochosen; mit *Tarentula* hat sie nur die Kürze der vorderen Augenreihe gemein.

♂. Kleiner, schlanker; mit lebhafter geflecktem Hinterleibe als das ♀; die Beine licht lehmgelb mit verwaschener Ringelung. Der Taster rauchbraun, dessen Tibia und Deckschuppe schwarz, zottig behaart; die Tibia länger als Patella, nach vorne verdickt; die Deckschuppe spitz, unter der Spitze nur mässig behaart; der Bulbus — von der Seite betrachtet — länglich, mitten getheilt, auf jedem der Theilungsränder ein seitlich auswärts gerichtetes Zähnchen. Hier zum ersten Male beschrieben.

12. *Tarentula cursor* (HAUN. 1831). Rákos-Palota. Lebensweise mir nicht bekannt. Obzwar THORELL diesen Namen den Synonymen der *T. aculeata* beigezählt hat, stellte er die Art (Remarks p. 323 und 578) wieder her. Ich habe sie auf THORELL'S Autorität eingereiht.

4. GENUS: TROCHOSA C. K. (1848).

1. *Trochosa cinerea* (FABR. 1793). Kutyfalva (Maros Ufer), Klausenburg (Szamos Gerölle), Retyiczal (Gebigsbach-Gerölle), Hermannstadt, Orsova (Cserna-Gerölle), Gyöngyös, Grosswardein. Lebt auf Inundationsgebieten der Flüsse und Bäche, besonders dort, wo das Gerölle auf dem Sande aufliegt. Sie gräbt ihre Röhren und Höhlen in Sand und sichert sie durch schütteres Gewebe vor dem Einstürzen. Sie schweift in der Abenddämmerung umher und beschleicht ihre Beute; ihre Bewegung ist ganz eigenthümlich, sie besteht aus ruckweisen Läufen; während der Pausen streckt das Thier die Beine flach aus und bleibt ganz unbeweglich; in dieser Stellung ist es selbst dem geübten Auge kaum bemerkbar, da die Färbung genau dem Farbungemische des Sandes entspricht. Im Frühjahre ist sie geschlechtsreif. Im Juni bewacht das ♀ schon die Eier; der Cocon ist rund, schneeweiss oder gelblich, oft 12—13 $\frac{m}{mm}$ im Durchmesser haltend, mit 6—800 Eiern gefüllt. Die ausgeschlüpften Jungen trägt die Mutterspinne auf dem Rücken, sie bedecken dieselbe gleich einem Bienenschwarm in mehreren Schichten, so, dass nur die Beine frei bleiben. An sonnigen Tagen setzt die Spinne den Eiersack der Sonnenwärme aus und verschwindet damit bei nahender Gefahr wie der Blitz, bleibt 5—15 Minuten lang am Grunde der Röhre, um dann wieder langsam und vorsichtig zum Vorschein zu kommen. Manchesmal schiebt sie den Sack vor sich her, meistens zieht sie ihn jedoch hinter sich nach, und macht erst an der Röhrenmündung eine entsprechende Wendung.

2. *Trochosa infernalis* (Mors. 1849).¹ (Tafel X, 206 φ nat. Grösse, 207 Bauchseite, 208 Leib von der Seite, 209 Epigyne, 210 Taster des σ). Doroszló, Palánka, Pancsova, Zombor, Orsova, Illok. Unstreitig eine unserer interessantesten Arten, welche wir mit den Russischen Steppen gemeinsam besitzen und die im Verein mit *T. Singoriensis* (Laxm.) der berühmte «Tchin» der Kalmücken ist. An diese Spinne knüpfen sich eine Menge von Sagen, gerade wie an die Tarantel Italiens. In der Darstellung der Lebensweise (I. Band, Tafel III, Fig. 62 und Text), habe ich diese Spinne eingehender behandelt, finde es jedoch angezeigt, meine ferneren Beobachtungen hierher zu setzen. Hinsichtlich der Verbreitung kenne ich die Spinne von zahlreichen Punkten der Bácska, so auch von Orsova und Illok (letzterer Ort schon jenseits der Donau, westliches Ufer) her; bei Orsova und Illok steigt sie nun auch an den Berglehnen empor. Ihr Lieblingsaufenthalt ist aber dennoch die Ebene, namentlich die echte Steppe und der kümmerlichere Weideplatz. Hier gräbt sie ihre 16—20 $\frac{c}{m}$ tiefen, 2—2.5 $\frac{c}{m}$ weiten, senkrechten Röhren, deren Mündung sie austapeziert und mit grosser Findigkeit vor Wassergefahr sichert. Sie lauert gewöhnlich in der Mündung der Röhre und packt mit blitzschnellem Schlage ihres Vorderbeinpaars die vorüberziehenden Insecten, darunter besonders Doreadion und Cicindela-Arten, deren Reste dann auf dem Boden der Röhre oft in Menge vorkommen. Sie kommt das ganze Jahr hindurch in allen möglichen Entwicklungsstadien vor. Ihr Eiersack ist kaum etwas abgeflacht, rund, 15—16 $\frac{m}{m}$ im Durchmesser, gefüllt voll mit anfangs hirsekorngrossen Eiern. Den Eiersack befestigt sie an ihre Spinnwarzen und setzt ihn in der Mündung der Röhre der Sonnenwärme aus. Zur Zeit des Ausschlüpfens der Jungen schliesst sie die Röhrenmündung mit einem feinen, durchsichtigen, gewölbten Netze ab, und setzt darunter das Brutgeschäft mit Hilfe der Sonne fort. Ihre Jungen trägt sie auf dem Rücken, bringt sie häufig an das Tageslicht, wobei die Jungen bald auseinander gehen, sich dann wieder auf dem Rücken der Mutter versammeln; bald besteigen sie Grashalme, springen hinab, laufen in die Röhre, bald wieder hinaus, bald bedecken sie die erlegte Beute.

Nach der zweiten Häutung der Jungen stirbt die Mutter, die Jungen zerstreuen sich und beginnen zu graben. Die Röhre ist anfangs kaum 4 $\frac{c}{m}$ tief und 3 $\frac{m}{m}$ weit. So, wie nun die Spinne an Grösse zunimmt, erweitert sie auch die Röhre. Das Graben wird in der Abenddämmerung und des Nachts betrieben; die kleinen Erdklümpchen werden sorgfältig zerschleppt, so, dass keine Spur der Arbeit zu sehen ist. Es scheint, dass die Thiere, welche ihre Wohnung verlieren, verlassene Wohnungen beziehen und das Graben fortsetzen, trotzdem, dass die Röhre schon tief genug war. Ich schliesse dies daraus, dass ich, wenn auch selten, dennoch bis 30 $\frac{c}{m}$ tiefe Röhren angetroffen habe, wo doch die normale Tiefe durchschnittlich 16—20 $\frac{c}{m}$ beträgt. Die Männchen wohnen ebenfalls in Röhren, verlassen jedoch dieselben zur Paarungszeit und suchen die Weibchen in ihren Wohnungen auf.

In der Gefangenschaft befinden sie sich bald ganz wohl und werden ziemlich zutraulich, nehmen lebende Fliegen aus der Hand; Fluchtversuche machen sie nur, wenn sie von Hunger und Durst geplagt werden; gut gepflegt, verhalten sie sich sehr ruhig. Das Wasser können sie nicht entbehren und saugen jeden zweiten Tag ihre vier-fünf Tropfen auf. Ich habe einige lebende Exemplare an Prof. THORELL nach Upsala gesendet, welche die eilftägige Reise gut überstanden haben.

Diese Spinnen überwintern. Um auch den letzten Zweifel zu beseitigen, habe ich im Herbst 1874 bei Doroszló einige Röhren mit Pföcken so bezeichnet, dass ich dieselben auch bei Schnee wieder finden konnte. Im December drang die Sonde nur mehr 4 $\frac{c}{m}$ tief ein, woraus folgte, dass die Spinne die

¹ Ich habe diese Art für neu gehalten und sie Prof. THORELL unter dem Namen «*Trochosa hungarica*» mitgeteilt. THORELL meint aber, es sei die MORSCHOULSKYSche Art, was ich — wenn gleich mit Widerstreben — nun angenommen habe. Es ist gewiss, dass die nichtssagende Beschreibung MORSCHOULSKY's auf jede dunkle Lycosoide passt, ebenso, wie auch die beigegebene Abbildung durchaus nichts bietet, was der Beschreibung zu Hülfe kommen könnte. MORSCHOULSKY kann eben so gut eine junge *T. Singoriensis*, als *T. vultuosa* in Händen gehabt haben. Mir scheint es mehr als gewiss, dass MORSCHOULSKY überhaupt nie eine echte *T. infernalis* THOR. gesehen hat, denn die jungen Thiere der *T. infernalis* THORELL sind so lebhaft gefärbt und gezeichnet, dass Färbung und Zeichnung selbst MORSCHOULSKY aufgefallen wären. Ich glaube, es müsse die erste Beschreibung eines Thieres doch wenigstens ein Kennzeichen, woran man die Art wiedererkennen kann, enthalten. MORSCHOULSKY's Beschreibung und Abbildung enthält kein einziges! Was er über die Lebensweise sagt, das passt eben auch auf die grossen Artverwandten. Da jedoch THORELL in «*Europ. and North-African Spiders*» die Art unter MORSCHOULSKY's Namen fixirt hat, so wollte ich damit keine Veränderung vornehmen.

Spinne die Röhre verstopft hat. Im Februar 1875 stellte sich strenge Kälte ein und ich schritt zur Untersuchung der meist exponirten Röhre. Der Boden war etwa 40 μ m tief steinhart gefroren, so, dass ich zum Beile greifen musste. In gehörige Tiefe gelangt, griff ich zum Messer und öffnete vorsichtig die Röhre der ganzen Länge nach; die Röhre drang 28 μ m tief in den Boden ein, war etwa 4 μ m von der Mündung mit Erde und Pflanzentheilen verstopft, der Pfropf war 4 μ m lang. Auf dem nackten Boden der Röhre sass ein prachtvolles, geschlechtsreifes Weibchen, mit etwas angezogenen Beinen, welches sich — berührt — träge bewegte. Ich versorgte dasselbe in einer Schachtel und steckte diese in die Tasche. Unter dem Einflusse der Wärme wurde das Thier in einer Minute vollkommen frisch und munter und nahm sofort Nahrung an.

Diese Untersuchung bestätigte meine alte Vermuthung, wornach die Lycosoiden überwintern; es ist wohl auch nur so zu begreifen, dass die ersten, wärmeren Sonnenstrahlen des Frühjahres, schon geschlechtsreife Lycosoiden bescheinen, ja dass diese schon Eiersäckchen umhertragen.

3. *Trochosa ruricola* (DE GEER, 1778). Klausenburg, Mező-Záh, Hermannstadt, Doroszló, Apatin, Palánka, Orsova, Ogradena, Ungvár, Alsó-Hámor, Gyöngyös, Rosenberg, Rév, Grosswardein, Budapest. Weit verbreitete Art, welche an steinigen Punkten unter Steinen, in Wäldern unter Bäumen und abgefallenem Laub ihre Höhlen gräbt.

4. *Trochosa terricola* TUN. (1856). Doroszló, Apatin, Orsova, Budapest. Ihre Lebensweise entspricht jener der vorhergehenden Form; sie ist aber etwas seltener.

5. **TROCHOSA HUNGARICA** n. sp. (Tafel VIII. 184, *a* Augengruppe, *b* Epigyne, *c* Taster des ♂ von der Seite, *d* dessen Genitaltheil von unten).

♀ Gross. Das ganze Thier lohbraun. Cephalothorax mit einem schmalen Mittelstreif; die Schenkel, aussen, kaum merklich lichter; die Mandibeln am Grunde dunkler, am Ende mit reichlicher fuchsrother Behaarung. Der ganze Leib mit dichter, anliegender Behaarung bedeckt.

Cephalothorax derb, mit erweitertem, vorne zugerundetem Kopftheil; zwischen den grossen Augen der Mittelreihe ein nach vorne gerichteter, aus 8—10 Borsten bestehender Schopf. Die Brustplatte elyptisch, lohbraun, mit filzartig dichter Behaarung. Die Mandibeln derb, von der Seite betrachtet am Grunde stark knieartig vorgewölbt, grob, borstenförmig behaart. Die Mandibeln lohbraun, an ihren Enden lebhaft fuchsroth behaart; die Lippe abgestutzt, von halber Länge der Maxillen. Der Taster lohbraun, derb, sehr dicht behaart, auf dessen Schenkel, oben, am Ende einige Stacheln. Die Beine kräftig, ziemlich lang; die Tibia des ersten Paares unten, mit drei Paar anliegenden derben Stacheln, seitlich innen noch ein Stachel; der Metatarsus mit drei Paar in der dichten Scopula verborgenen Stachelpaaren; die Tibia des dritten Paares, unten, mit vier Stachelpaaren, seitlich noch einige Stacheln; die Tibia des vierten Paares, unten mit drei Paar, seitlich mit mehreren Stacheln; die Patella der beiden Hinterpaare aussen und seitlich mit je einem anliegenden Stachel.

Der Hinterleib elyptisch, ziemlich gewölbt.

Die Augen bernsteinartig, mit dunkler Pupille, wie Eulenaugen; die vordere Reihe sehr leicht eingebogen, deren Mittelaugen bedeutend grösser als die seitlichen, auf gut zwei Durchmesser vom Stirnrande entfernt; die beiden Augen der mittleren Reihe sehr gross, nicht ganz auf Durchmesser-Entfernung von einander und beiläufig auf Halbmesser-Entfernung von der Vorderreihe; die beiden hinteren Augen wenig grösser als die vorderen Mittelaugen, viel weiter von einander, als von der Mittelreihe.

Epigyne: laut Abbildung.

Maasse: Leib 21, Cepth. 9.5 $\frac{m}{\mu}$, I. Beinpaar 23.4, II. 21.6, III. 21, IV. 28 $\frac{m}{\mu}$. Manchmal kleiner: Leib 17, Cepth. 8.0, I. Bp. 21, IV. 26.5 $\frac{m}{\mu}$.

♂ Kleiner, schlanker, im Ganzen lichter gefärbt; die Beine schlank; Cephalothorax ausser dem Mittelstreifen auch noch undeutlich eingefasst. Der Taster schlank, wenig kolbig; dessen Schenkel, Patella und Tibia mit mehreren, kräftigen Stacheln bewehrt; die Tibia etwas länger als die Patella; die Deckschuppe schmal, zugespitzt, unter der Spitze mit dichtem Haarpinsel; Bulbus einfach, braun, vorne lichter und hier durch einen hackenförmig gewundenen Farbeinsatz gezeichnet.

Maasser: Leib 14, Cephal. 7·5, I. Beinpaar 23·5, II. 21·5, III. 20·3, IV. 28·3 $\frac{m}{mm}$.

Eine unserer grössten Spinnen, welche ich am Ufer des Plattensees unter Steinen antraf.

6. *Trochosa stigmosa* THOR. (1875). Orsova, Rosenberg, Ungvár. In Fluss und Bachgeröllen. Ist der Gestalt und Lebensweise nach das Diminutiv der *T. cinerea*.

5. GENUS: PIRATA SUNDB. (1833).

1. *Pirata piraticus* (CL. 1757). Klausenburg, Mezö-Záh, Gyekc, Doroszló, Orsova, Central-Karpathen, Grosswardein. Besonders an stehenden Gewässern, und besonders wo Wasserpflanzen an die Oberfläche gelangen. Das Thier läuft gut auf dem Wasser, und taucht oft unter Pflanzen, wobei den Hinterleib eine silberig glänzende Luftblase einhüllt.

2. *Pirata Leopardus* (SUND. 1833). Doroszló, Orsova. Als Sommerform selten, besonders in frisch aufgegrabenem Erdreich, in unmittelbarer Nähe feuchter Stellen. Sie grabt 6 $\frac{m}{mm}$ weite horizontale Röhren. Auf Grund der Augen und des Cephalothorax nähert sich diese Form dem vorgehenden Genus.

3. *Pirata Knorrii* (SCOP. 1763). Doroszló, Báziás. An Sumpfrändern und feuchten Stellen zweimal, stets ♀, beobachtet.

6. GENUS: DOLOMEDES (LATR. 1804).

1. *Dolomedes fimbriatus* (CL. 1757). Klausenburg, Kutyfalva, Csorba, Ungvár. Auf Grund genauer Untersuchung theile ich die Auffassung THORELL'S, wornach *D. plantarius* bloss eine Farbenvarietät der CLERCK'schen Stammform ist. Die junge Generation variirt von Gelbgrün bis Dunkelschwarz, hat schreiend lichte Einfassung. Eine unserer grössten Spinnen, welche ausschliesslich an Gewässern vorkommt, kühne Sprungjagd treibt, auf der Oberfläche des Wassers hüpfend fortkommt. Das ♀ befestigt den beinahe hasenhussgrossen Eiersack mit längeren Fäden an die Spinnwarzen und fasst denselben dann mit den Mandibeln. Im Juni geschlechtsreif.

7. GENUS: OCYALE. SAV. ET AUD. (1825).

1. *Ocyale mirabilis* (CL. 1757). Von zahlreichen Punkten bekannt. Geht bis zur subalpinen Region hinauf, gehört jedoch besonders den Niederungen an. Sie variirt bis zum einfachen Braun.

II. FAMILIE. OXYOPOIDIE. LUCHSSPINNEN.

1. GENUS: OXYOPES. LATR. (1804).

1. *Oxyopes ramosus* (PANZ. 1804). Klausenburg, Mezö-Záh, Palánka, Pancsova, Grosswardein. Sommerform; besonders im üppigen Grase lebend; scheint mehr den Niederungen anzugehören.

2. *Oxyopes lineatus* LATR. (1806). Klausenburg, Doroszló, Orsova. Nach Aufenthalt mit der vorigen übereinstimmend, beide Arten kommen zusammen vor, die vorgehende scheint jedoch die häufigere zu sein.

3. *Oxyopes transalpinus* (WALCK. 1806—8). Doroszló, Palánka, Orsova, Báziás. Sommerform von südlichem Character, welche im Grase stellenweise sehr häufig vorkommt.

VII. UNTERORDNUNG.

S A L T I G R A D A E.

Die typischste Form dieser Unterordnung, die Attoiden, bilden eine gleichartige, zusammenhängende Formenreihe, welche dadurch charakterisirt wird, dass das Webeorgan dem Zweiklauensysteme angehört und mit der Scopula zusammen vorkommt, welch' letztere zur Sicherung des Sprunges, zur Fortbewegung auf glatten Flächen unbedingt nothwendig ist; dass ferner die vordere Augenreihe aus vier Augen besteht, worunter die mittleren besonders gross sind, die übrigen vier, weniger entwickelten Augen dagegen, in zwei Reihen vertheilt, die Ecken eines Viereckes markiren.

Das Sehvermögen ist also in der Richtung nach vorne gesteigert und resultirt in Verbindung mit den Eigenthümlichkeiten der Bewegungsart diejenige Art und Weise, vermittelt welcher diese Formen in das System der Spinnenthätigkeit einflüssen. Zu diesen Eigenthümlichkeiten kommt auch noch eine andere hinzu, nämlich die ziemlich stabile Wohnung, vermöge welcher diese Formen an einen gewissen Umkreis gekettet sind; hinsichtlich des Ortes ihrer Thätigkeit sind sie bei weitem nicht so frei, als die typischsten Formen der Citigradae.

Eine allgemeine Eigenschaft ist die, dass diese Formen in geschützten Örtlichkeiten, manchmal geradezu in Colonie ihre dichten, feinen Wohnungen weben, wo sie zu ruhen pflegen, ihre Häutungen durchmachen und ihre Eier bewachen. Die sonnige Umgebung dieser Colonien bildet das Gebiet für ihre Thätigkeit.

Hinsichtlich der Verbreitung, gehören sie überwiegend den Niederungen an, und nur wenige Arten steigen in alpine Regionen. Die Sicherung der Generationen scheinen durchgehends überwinternde Thiere zu besorgen.

I. FAMILIE. ERESOIDAE. MORDERSPINNEN.

I. SUBFAM. ERESINAE. STIERSPINNEN.

I. GENUS: ERESUS WALCK. (1805).

1. *Eresus cinabarinus* (OLIV. 1789). Klausenburg, Mezö-Záh, Schemnitz, Orsova. Ich kenne die Art als herbstliche Erscheinung und durchaus nur ♂. Es kommen vor die Varietäten α , β (laut THORELL); eine dritte Varietät, welche ich mit γ bezeichne, ist die folgende: ♂ Vorderleib mit vielen schmutzig gelbbraunen Haaren; Hinterleib oben graulich, mit vier schmutzig gelbbraunen Punktflecken. Das erste Beinpaar schmutzig gelbbraun, die Enden der Glieder weiss; die hinteren Beinpaare lichter. Die ♀ scheinen in Löchern zu leben.

2. *Eresus ruficapillus* C. K. (1846). Budapest, Bázias. Stets in horizontal gegrabenen, tiefen Röhren durch J. Pável erbeutet, u. z.: immer ♀. Dieser Umstand führt mich zu der Vermuthung, dass *Eresus* unterirdisch lebt, die ♀ desswegen so selten erbeutet werden, die ♂ dagegen zur Zeit der Begattung umherschweifen und eben desswegen nicht selten sind.

II. FAMILIE. ATTOIDAE. HUPESPINNEN.

1. GENUS: SALTICUS (LATR. 1804).

1. *Salticus formicarius* (DE GEER, 1778). Zombor, Balaton-Fured, Budapest. Sommerform, welche, wie es scheint, im Norden des Landes fehlt und südlich inclinirt. Steht mit *Paederus longipennis* im Mimicri-Verhältniss.

2. *SALTICUS SIMONIS* n. sp. (Tafel VIII, 185, *a* Augengruppe, *b* Epigyne, *c* Taster des ♂, 186 ♂ vergrössert, 187 ♂ nat. Gr., 188 Kopftheil von oben, vergr.)

♀ Vorderleib braun, das Augenfeld besonders dunkel. Das Ende des Hinterleibes braun; vorne zwei lichte, verschwommene \wedge förmige Winkelfleckchen; die Bauchseite schmutzig-lichtbraun, von den Spinnwarzen beginnend ein dunkles Mittelband, welches vor der Rima verschwindet. Die Beine bräunlich-gelb, mit verschwommenen, bräunlichen Längsstreifen; der Metatarsus des ersten Paares reinbraun.

Kopftheil über den Thoraxtheil aufgesetzt, würfelförmig erhoben, der Thoraxtheil ausserdem verengt, die ganze Oberfläche ungemein fein punktirt-runzlich. Die Brustplatte ungemein schmal, braun. Die Mandibeln dunkelbraun, derb, so lang als der Metatarsus des ersten Beinpaars; seitlich betrachtet sind sie am Grunde stark, knieartig vorgewölbt, etwas nach vorne gerichtet. Die Maxillen schmal, braun, etwas gegeneinander geneigt; die Lippe schmutzigbraun, vorne abgerundet, breit. Der Taster braun, lang, das Endglied abgeflacht; von oben betrachtet zeigt der Tarsus zwei Stacheln.

Hinterleib länglich-walzenförmig.

Die beiden Mittelaugen der vorderen Reihe gross, feurig grün glänzend, berühren sich nicht; die Seitenaugen dieser Reihe viel kleiner, auf Halbmesser-Entfernung von den mittleren; die beiden Augen der zweiten Reihe sehr klein und näher zur ersten als zur hinteren Reihe; die beiden Augen der hinteren Reihe nicht kleiner als die Seitenaugen der vorderen Reihe, mit ganz seitlichem Ausblick, weiter von einander als die beiden Augen der zweiten Reihe ebenfalls von einander, und weiter von einander als von der Stirne entfernt.

Epigyne: laut Abbildung.

Maasse: Leib, 6·5, Cepth. 3, I. Beinpaar 4·9, II. 4, III. 4·4, IV. 6·5 $\frac{m}{m}$.

♂ Sehr dunkelbraun; Hinterleib, vorne, mit einer Spur eines Winkelfleckchens; die beiden Hinterbeine reinbraun das zweite Paar gelblich; das erste im Schenkel und Metatarsus braun, dessen Tibia, Patella und Tarsus gelb. Die Mandibeln horizontal vorgestreckt, braun, mit schwachem bronze Schimmer, oben abgeflacht, am inneren Falzrande mit neun grösseren und einigen kleineren Zahnchen bewehrt, die Mandibel-Klaue braun, lang, schlank, am Grunde und an der Spitze leicht geschwungen, im ersten Drittel vom Grunde gerechnet ein seitlich nach innen und etwas noch vorne gerichteter dolchartiger Stachel. Der Taster schlank, braun; dessen Tibia etwas verstärkt, am ausseren Ende mit einem Dorn bewehrt; die Deckschuppe löffelförmig, behaart; der Bulbus länglich, einfach, glatt, ohne Auszeichnung.

Maasse: Leib, 5·8, Cepth. 2·5, Mandibelstock 2, I. Beinpaar 4 $\frac{m}{m}$.

Nur einmal bei Feketető in Siebenbürgen, unter einem, tief in den Rasen eingewachsenen Steine angetroffen.

2. GENUS: LEPTORCHESTES THOR, 1870.

1. *Leptorchestes formicaeformis* (LUC, 1850). Illok, Apatin, Pancsova, Orsova, Parad, Budapest. Frühjahrs- und Sommerform. Die typische Form nur bei Illok auf Obstbäumen, an den übrigen Punkten kommt var. σ vor: Reinschwarz; der Hinterleib vorne nicht braun, jedoch mit der weissen Auszeichnung, die Hüfte des ersten und dritten Beinpaars braun, jene der übrigen Paare gelb; der Schenkel des ersten Paares braunschwarz, nur der Tarsus gelb; im übrigen mit der typischen Form übereinstimmend. Meist unter Rinden alter Pflöcke, besonders wenn dieselben dem Sonnenschein ausgesetzt sind.

3. GENUS: EPIBLEMUM (HENTZ. 1832).

1. *Epiblemum scenicum* (Cl. 1757). Aus den Niederungen von zahlreichen Punkten bekannt; kommt nicht nur in und an den Wohnungen des Menschen vor, sondern befindet sich auch auf Gesträuchen wohl; ist Sonnenthier mit vortrefflichem Sehvermögen ausgestattet; erhebt den Vorderleib und hält Umschau, folgt dem vorgehaltenen Finger u. s. w., ist in Ritzen oft colonienweise anzutreffen.

2. *Epiblemum cingulatum* (PANZ. 1797). Doroszló. Nur einmal angetroffen, u. z.: als Frühjahrsform.

3. *Epiblemum tenerum* (C. K. 1846). Doroszló. Nur einmal angetroffen; ist — wenigstens das ♀ mit *E. cingulatum* nahe verwandt.

4. GENUS: HELIOPHANUS C. K. (1833).

1. *Heliophanus cupreus* (WALCK. 1802). In den Niederungen von zahlreichen Punkten bekannt; wohl die gemeinste Art, welche an gut beschienenen Obstbaumstämmen, aber auch auf Geröllen und am Fusse der Gesträuche unter abgefallenem Laube häufig angetroffen wird.

2. *Heliophanus varians* SIM. (1869). Doroszló, Orsova. Mir der Lebensweise nach unbekannt.

3. *Heliophanus Kochii* SIM. (1869). Orsova. Mir durch Herrn E. SIMON als Art bezeichnet. Die Lebensweise kenne ich nicht.

4. *Heliophanus auratus* C. K. (1848). Pancsova, Stuhlweissenburg. Diese Art ist wohl = *H. Brannickyi* SIMON. Ich kenne deren Lebensweise nicht näher.

5. GENUS: BALLUS (C. K. 1850).

1. *Ballus depressus* (WALCK. 1802). Klausenburg, Torda, Doroszló, Apatin, Palanka, Pancsova, Tokaj, Rakamaz, Stuhlweissenburg, Budapest, Grosswardein. Frühjahrs- und Sommerform. Meist unter Steinen, abgefallenem Laube, aber auch im Grase; scheint den Schatten zu lieben.

6. GENUS: MARPESSA C. K. (1846).

1. *Marpessa muscosa* (Cl. 1757). Szász-Vesszős, Klausenburg, Mező-Zah, Olah-Fenes, Hermannstadt, Doroszló, Apatin, Pancsova, Ogradena, Alsó-Hámor, Ungvár. Sommerform, welche für Planken, alte Pflöcke, besonders wenn dieselben gut beschienen und altersgrau sind, eine Vorliebe hat; sie kommt jedoch auch auf den Stöcken der Schläge vor. Hat ein vortreffliches Sehvermögen und haltet oft Umschau.

2. *Marpessa radiata* (GRUBE. 1859). Tafel X. 211 ♀ vergr., 212 ♂ vergr., 213 Epigyne, 214 Taster des ♂ von der Seite, 215 dessen Genitaltheil von unten.

♀ Grundfarbe — auf den ersten Blick — gelblich. Cephalothorax mit weissgelblichen und röthlichen Schuppen bedeckt; der Hinterleib gelblich, vorne manchmal zwei undeutliche, röthliche Längsstreifen (im Weingeist erscheint der Kopftheil braunschwarz, die beiden Streifen des Hinterleibes schwarz, deutlich).

Var. *a*: Die zwei Längsstreifen auf dem Hinterleibe verschwunden.

Var. *β*: Die beiden Längsstreifen aus kleinen rhombischen Flecken zusammengesetzt. (♀ junior).

Maasse: Leib, 10, Cephlth. 3·7 m'_m .

♂ Kleiner, schlanker, mit verdicktem und verlängertem vorderen Beinpaar: die Beine gelb mit viel Braun, die braune Farbe bildet meistens scharfe Längsstreifen. Der keilförmige Hinterleib, oben, lebhaft gelb mit lebhaftem Seidenglanz, mit einem lebhaftrothen Mittelstreifen.

V. *β*: Der Hinterleib lebhaft roth durch eine gelbliche Aderzeichnung in rhombische Feldchen getheilt. Taster laut Abbildung.

Maasse: Leib, 7, Cepth. 3·2, I. Beinpaar 7·4, IV. 6·3 $\frac{m}{m}$.

GRUBES oberflächliche Beschreibung, so wie der Umstand, dass die Typen zu Grunde gingen, waren Schuld daran, dass diese Art zu vielfachen Irrungen Anlass gab. Auf Grund der ungarischen ♀ hat weder KOCH noch THORELL die Art erkannt, weil das ganz ausgebildete ♀ eben unbekannt war. SIMON hat sie dagegen sofort als «radiata» bestimmt. Die Entscheidung hing vor Allem von der Erwerbung der ♂ ab, und ich habe nun solche in dem Rohrdickicht der Baeska gefunden. Diese Männchen stellten es dann ausser Zweifel, dass hier jene Spinne vorliegt, welche OHLERT nach Männchen als «Euophrys radiata» bestimmt und dem Prof. THORELL übergeben hat. THORELL schrieb mir «stimmt genau mit Original Exemplaren von M. radiata OHLERT überein: die Weibchen müssen dann auch wohl zu dieser Art gehören.

Ich kenne die Art von Doroszló und Mező-Záh und ist sie das ganze Jahr hindurch zu haben. Sie webt in die Quasten des Rohres einen weiten, feinen Sack; die so zusammengesponnenen Quasten erkennt man schon aus grosser Entfernung. Hier wohnt das Thier, legt seine 38—40 Eier ab und erwartet deren Ausschlüpfen. Sie jagt im Sonnenschein auf den Stengeln und Blättern. Im Winter ist sie ebenfalls anzutreffen.

3. *Marpessa pomatia* (WALCK. 1825). Palánka, Apatin, Pancsova. Im Frühjahre auf den, aus Sambucus gezogenen lebenden Zäunen der Weingärten. Ist identisch mit der Art, welche SIMON in der «Monogr. des Attid.» unter dem Namen «Marpissus monachus» beschrieben hat.

4. *Marpessa encarpata* (WALCK. 1802). Szász-Vesszös, Doroszló. Neusatz. Frühjahrsform; besonders unter der Rinde gut beschienener Obstbäume zu finden. Ist mehr nur durch die Bestachelung der Beine von *Epiblemum* getrennt.

5. *Marpessa Canestrinii* PAV. (1869). Doroszló, Apatin. Diese prachtvolle Spinne kenne ich bis jetzt als Bewohnerin des Rohres, wo sie im Sonnenschein, besonders auf den Blättern ihre Jagd betreibt. Ihre gestreckte Gestalt sowohl als ganz besonders ihre goldige Beschuppung führen mich zu der Vermuthung, dass sie zu den ebenfalls im Rohre lebenden, glänzenden und vielfach variirenden Donatien im Mimicri Verhältnisse steht.

7. GENUS: DENDRYPHANTES (C. K. 1837).

1. *Dendryphantes bilineatus* (WALCK. 1837?). Kutyfalva, Palánka. Immer im Grase angetroffen. Die Eigenthümlichkeiten der Lebensweise mir wenig bekannt.

2. *Dendryphantes mucidus* C. K. (1846). C. KOCH beschrieb diese Art nach Typen, welche Dr. Rosenhauer im «Banate» sammelte.

8. GENUS: EUOPHRYS (C. K. 1834).

1. *Euophrys frontalis* (WALCK. 1802). Doroszló. Die Lebensweise dieser Art mir weniger bekannt.

9. GENUS: PHILAEUS THOR. (1870).

1. *Philaeus chrysops* (PODA. 1761). Pancsova, Mehádia, Orsova, Ogradena, Tokaj, Bükk-Gebirge, Demanova, Veszprém, B.-Füred, Budapest, Rákos-Palota. Sommerform, welche besonders in felsigem Gebirge weit über die Buchenregion hinaus vorkommt; besonders häufig im Kalkgebirge, an karstartigen Stellen, und ganz besonders im Gerölle der Berglehnen. Liebt die sonnigsten Stellen und besteigt erhöhte Punkte um dort den aufsitzenden Insecten beizukommen; das ♂ ist ein vorzüglicher, kühner Springer. Das ♀ haltet sich meistens im Gerölle verborgen. Ich bin dessen ganz sicher, dass die Formen, welche C. KOCH im XIII-ten Bande der «Arachniden» unter dem Namen *Dendryphantes xanthomelas* und *leucomelas* beschreibt, die Weibchen des *Philaeus chrysops* sind.

10. GENUS: ATTUS (WALCK. 1805).

1. *Attus falcatus* (Cl. 1757). Klausenburg, Parajd, Gyergyó-Szent-Miklos, Szász-Vesszős, Doroszló, Palánka, Orsova, Ogradena, Bázias, Rakamaz, Csorba. Weit verbreitet; geht weit in die alpine Region hinauf, jedoch mehr in den Niederungen und im Vorgebirge verbreitet.

2. *Attus farinosus* (C. K. 1846). Doroszló, Apatin, Palánka, Tokaj, Grosswardein. Liebt besonders das uppige Gras, und kenne ich die Form bisher nur aus den Niederungen. Scheint südlich zu incliniren.

3. *Attus rupicolus* (C. K. 1848). Centralkarpathen, Bihargebirge. Aus Höhen von über 1000 Meter als seltenere Erscheinung mitgebracht.

4. *ATTUS BRASSAYI* n. sp. (Tafel X, 216 ♀ vergrößert, 217 Epigyne).

Cephalothorax und Hinterleib reinschwarz; die Zeichnungen aus schneeweissen Schuppen bestehend; auf dem Kopftheile, vorne, über den Mittelaugen der vorderen Reihe, ein weisser Fleck, hinter jedem der hinteren Augen ein weisser Mondfleck; der Hinterleib, vorne mit weissem Bogenstreif, in der Mitte mit weissem Mittelstreif, welcher bis in die Nähe der Spinnwarzen dringt, den vorderen Bogenstreif jedoch nicht erreicht; auf jeder Seite zwei, schräg nach vorne laufende, weisse Rippenbänder; die Stirne unter den Vorderaugen weiss, die beiden grossen Mittelaugen in schmale, orangengelbe Ringe eingefasst; die Bauchfläche und Brustplatte spärlich weisslich behaart; die Beine braun, mit wenigen, weissen Schuppen; der Taster gelb.

Epigyne: laut Abbildung.

Maasse: Leib, 5, Cepth. 2·3, I. Beinpaar 4 $\frac{m}{mm}$.

♂ Unbekannt.

Orsova (Allion-Berg) als Sommerform einmal erbeutet. SIMON stellt diese Art in die Nähe des *Attus arcigerus* WALCK.

5. *Attus crucigerus* (WALCK. 1825). Budapest (Blocksberg). Nur einmal erbeutet.

6. *Attus Wagae* SIM. (1871—2). Central-Karpathen (Csorbaer See), Rákos. Nur einmal selbst erbeutet.

7. *Attus nidicolens* WALCK. (1847). Tokaj, S.-A.-Ujhely, Budapest. Als Sommerform kenne ich das Thier besonders aus Steingeröllen, wo seine volkreichen Colonien leicht zu finden sind.

8. *Attus arcuatus* (Cl. 1757). Doroszló, Apatin, Palánka, Tokaj, Rakamaz, Grosswardein, Fünfkirchen. Sommer- und Frühjahrsform; die ♂ sehr häufig auf sonnigen Blössen der Waldränder zu finden, die ♀ dagegen höchst selten; die letzteren scheinen unterirdisch zu wohnen.

9. *Attus floricola* (C. K. 1837). Szász-Vesszős. Mir bisher nur als Herbstform bekannt.

10. *Attus erraticus* WALCK. (1825). Pancsova, Orsova, Ogradena, Szajol, Tokaj, S.-A.-Ujhely, Alsó-Hámor, B.-Füred, Ungvár. Besonders auf sonnigen Geröllen, aber auch im Grase häufig anzutreffen.

11. *Attus pubescens* (FABR. 1775). Pressburg (Donau-Auen). Einmal ein Pärchen erbeutet.

11. GENUS: AELUOPS THOR. (1870).

1. *Aelurops festivus* (C. K. 1834). Klausenburg, Sebes-Váralja, Tokaj. Auf sonnigen, steinigen Berglehnen als Sommerform, welche vermöge ihrer Grösse und Lebhaftigkeit leicht auffällt, erbeutet.

2. *AELUOPS SIMPLEX* n. sp. (Tafel VIII, 189, α Taster des ♂, 190 Tibia des Tasters, 191 Hinterbein).

♂ Vorderleib braun, mit gelblichgrauen Häärchen; Hinterleib schwarz mit schmutziggelben Schuppen; die Beine braun, mit etwas lichterem Schenkeln. Die Tibia des ersten Beinpaars vorne-innen mit drei anliegenden, nach vorne gerichteten Stacheln.

Cephalothorax derb, hoch; das Augenfeld nach vorne geneigt, die Stirne überhängend, so, dass die grossen Mittelaugen von oben nicht sichtbar werden; das Augenfeld mit vielen, groben Haaren

bedeckt. Die Brustplatte elyptisch, klein, braun, mit spärlicher gelber Behaarung. Die Mandibeln am Grunde braun, gegen das Ende zu lighter. Die Beine stämmig.

Hinterleib nach hinten zu etwas erweitert.

Der Taster ziemlich kolbig, dessen Patella nicht länger als stark, die Tibia noch kürzer, am Ende mit einem etwas nach aussen und seitwärts gewendeten, auf die Deckschuppe aufliegenden, hasenohrförmigen Fortsatze. Die Deckschuppe grob behaart; der Bulbus einfach, etwas nach aussen zu hervorgequollen.

Maasse: Leib 6·3, Cephal. 3·6, I. Beinpaar 4·9, II. 5, III. 6·5, IV. 7·9 $\frac{mm}{mm}$.

♀ Unbekannt.

Doroszló, auf einer Wiese erbeutet. Der rechte Taster der Type ist reproducirt und entbehrt die Deckschuppe sammt Bulbus.

3. *Aelurops gilvus* (Sim. 1869). Veszprém. Zeitig im Herbste auf karstartiger Stelle einmal erbeutet.



INDEX.

A folyó betűkkel szedett nevek synonymák.

	Lap		Lap		Lap
AELUOPS	322	<i>depressa</i> WALCK.	303	<i>aureolus</i> CL.	218
<i>festivus</i> (C. K.)	322	<i>Derhamii</i> SCOP.	127	<i>babel</i> CL.	15
<i>gilvus</i> SIM.	324	<i>diodia</i> WALCK.	30	<i>bucculentus</i> CL.	57
<i>simplex</i> O. H.	323	<i>encarpata</i> WALCK.	308	<i>castaneus</i> CL.	92
AGALENA	130	<i>extensa</i> L.	46	<i>cellulanus</i> CL.	76
<i>labyrinthica</i> (CL.)	131	<i>fenestralis</i> STR.	116	<i>chrysops</i> PODA.	312
<i>similis</i> (KEYS.)	132	<i>formicaria</i> DE GEER.	294	<i>cornutus</i> CL.	17
AGALENINAE	120	<i>frontalis</i> WALCK.	311	<i>cristatus</i> CL.	234
AGALENOIDAE	108	<i>globosa</i> FABR.	230	<i>cucurbitinus</i> CL.	27
AGROECA	134	<i>holoscrieca</i> DE GEER.	145	<i>cuneatus</i> CL.	270
Haglundii THOR.	135	<i>Knorrii</i> SCOP.	283	<i>diadematus</i> CL.	13
AMAUROBIINAE	108	<i>lapidicola</i> WALCK.	170	<i>domesticus</i> CL.	126
AMAUROBIUS	114	<i>lobata</i> PALL.	6	<i>falcatus</i> CL.	314
<i>claustrarius</i> (HHN.)	117	<i>lucifuga</i> WALCK.	188	<i>fimbriatus</i> CL.	284
Erberi L. K.	119	<i>lugubris</i> WALCK.	252	<i>formicinus</i> CL.	222
<i>fenestralis</i> (STR.)	116	<i>Menardii</i> LATR.	42	<i>formosus</i> CL.	84
<i>ferox</i> (WALCK.)	115	<i>Merianae</i> SCOP.	43	<i>humatus</i> CL.	32
<i>inermis</i> L. K.	123	<i>nigrita</i> FABR.	187	<i>inquilinus</i> CL.	262
<i>pallidus</i> L. K.	118	<i>nocturna</i> L.	198	<i>labyrinthicus</i> CL.	131
<i>roscidus</i> C. K.	124	<i>nutrix</i> WALCK.	156	<i>latens</i> FABR.	109
<i>tetricus</i>	121	<i>oblonga</i> WALCK.	221	<i>lignarius</i> CL.	251
ANYPHAENA	141	<i>Petiverii</i> SCOP.	175	<i>lineatus</i> CL.	82
<i>accentuata</i> (WALCK.)	141	<i>phalangoides</i> FUES.	101	<i>lunatus</i> CL.	84
<i>Aranca.</i>		<i>picea</i> SULZ.	210	<i>marmoreus</i> CL.	15
<i>acalypha</i> WALCK.	29	<i>picta</i> WALCK.	89	<i>mirabilis</i> CL.	286
<i>accentuata</i> WALCK.	141	<i>Pluchii</i> SCOP.	102	<i>montanus</i> CL.	56
<i>adianta</i> WALCK.	26	<i>pubescens</i> FABR.	321	<i>monticolus</i> CL.	253
<i>agalena</i> WALCK.	23	<i>pulchella</i> WALCK.	91	<i>muscosus</i> CL.	304
<i>alsine</i> WALCK.	19	<i>quadripunctata</i> L.	165	<i>pallidulus</i> CL.	146
<i>arundinacea</i> L.	108	<i>ramosa</i> PANZ.	288	<i>patagiatus</i> CL.	18
<i>bimaculata</i> L.	91	<i>rufipes</i> L.	74	<i>piraticus</i> CL.	281
<i>bipunctata</i> L.	94	<i>ruricola</i> DE GEER.	278	<i>pulverulentus</i> CL.	271
<i>Brünnichii</i> SCOP.	7	<i>Sauvagesii</i> DORT.	213	<i>pyramidatus</i> CL.	15
<i>carnifex</i> FABR.	154	<i>senoculata</i> L.	201	<i>quadratus</i> CL.	16
<i>ceropegia</i> WALCK.	25	<i>triangulosa</i> WALCK.	95	<i>scenicus</i> CL.	297
<i>cinabarina</i> OLIV.	292	<i>tricuspidata</i> FABR.	231	<i>sclopetarius</i> CL.	21
<i>cinerea</i> FABR.	274	<i>truncata</i> PALL.	228	<i>segmentatus</i> CL.	44
<i>cingulata</i> PANZ.	299	<i>tuberculata</i> DE GEER.	79	<i>sericatus</i> CL.	22
<i>conica</i> PALL.	31	ARANEAE	3	<i>sisyphius</i> CL.	88
<i>corollata</i> L.	97	<i>Araucus.</i>		<i>trabalis</i> CL.	267
<i>corticalis</i> WALCK.	142	<i>amentatus</i> CL.	250	<i>triangularis</i> CL.	61
<i>cuprea</i> WALCK.	300	<i>angulatus</i> CL.	11	<i>umbraticus</i> CL.	20
<i>denticulata</i> OLIV.	134	<i>aquaticus</i> CL.	136	<i>vatus</i> CL.	227
<i>denticulata</i> WALCK.	85	<i>arcuatus</i> CL.	319	<i>virescens</i> CL.	216

<i>c. notatus</i> CL.	Lap 38	<i>claustraria</i> HAHN.	Lap 117	<i>Ninii</i> PAV.	Lap 204
ARGIOPE	6	<i>coerulescens</i> L. K.	148	<i>rubicunda</i> C. K.	207
<i>Brennichii</i> (SCOP.)	7	<i>corticalis</i> (WALCK.)	142	<i>Westringii</i> CAMBR.	205
<i>lobata</i> (PALL.)	6	<i>domestica</i> WID.	139	DYSDEROIDAE	201
ARGYRONETA	136	<i>ferox</i> WALCK.	115	EGAENUS	328
<i>aquatica</i> (CL.)	136	<i>frutetorum</i> L. K.	151	<i>convexus</i> C. K.	329
ARGYRONETINAE	136	<i>holosericea</i> (DE GEER)	145	<i>ictericus</i> C. K.	329
<i>Artanes poecilus</i> THOR.	220	<i>lutescens</i> WESTR.	149	ENYO	104
ASAGENA	98	<i>montana</i> L. K.	144	<i>germanica</i> C. K.	104
<i>phalerata</i> PANZ.	99	<i>pallidula</i> (CL.)	146	ENYOIDAE	104
<i>Atea melanogaster</i> C. K.	81	<i>paradoxa</i> L. K.	150	EPEIRA	8
ATTOIDAE	293	<i>pulicaria</i> SUND.	164	<i>acalypha</i> (WALCK.)	29
ATTUS	313	<i>terrestris</i> WESTR.	147	<i>adianta</i> (WALCK.)	26
<i>arcuatus</i> (CL.)	319	<i>trivialis</i> C. K.	143	<i>agalena</i> (WALCK.)	23
<i>bilineatus</i> WALCK.	310	COELOTES	121	<i>alborittata</i> WESTR.	36
<i>Brassayi</i> O. H.	316	<i>atropos</i> (WALCK.)	122	<i>alpica</i> L. K.	28
<i>crucigerus</i> WALCK.	317	<i>inermis</i> L. K.	123	<i>alsine</i> (WALCK.)	19
<i>erraticus</i> WALCK.	321	<i>roscidus</i> (C. K.)	124	<i>angulata</i> (CL.)	11
<i>falcatus</i> (CL.)	314	<i>solitarius</i> L. K.	125	<i>arbustorum</i> C. K.	13
<i>farinosus</i> (C. K.)	315	CRYPHOECA	129	<i>ceropegia</i> (WALCK.)	25
<i>floricola</i> (C. K.)	320	<i>carpathica</i> O. H.	129	<i>Circe</i> (SAV.)	10
<i>formicarformis</i> LUC.	296	CYBAEUS	120	<i>cornuta</i> (CL.)	17
<i>gilvus</i> SIM.	324	<i>tetricus</i> (C. K.)	121	<i>cucurbitina</i> (CL.)	27
<i>nidicolens</i> WALCK.	318	CYRTOPHORA	30	<i>Dalmatica</i> DOB.	23
<i>omatius</i> SIM.	307	<i>conica</i> (PALL.)	31	<i>diademata</i> (CL.)	13
<i>pubescens</i> (FABR.)	321	DENDRYPHANTES	310	<i>diodia</i> (WALCK.)	30
<i>radiatus</i> GRUBE	305	<i>bilineatus</i> (WALCK.)	310	<i>dromadaria</i> (WALCK.)	12
<i>rupicolus</i> (C. K.)	315	<i>uncidus</i> C. K.	311	<i>grossa</i> C. K.	9
<i>strigipes</i> WESTR.	305	DIAEA	230	<i>Herii</i> HAHN.	34
<i>Wagae</i> SIM.	317	<i>capparina</i> (C. K.)	232	<i>Lucina</i> SAV.	33
ATYPINAE	210	<i>globosa</i>	230	<i>lutea</i> C. K.	20
ATYPUS	210	<i>tricuspidata</i> (FABR.)	231	<i>marmorea</i> (CL.)	15
<i>anachoreta</i> AUSS.	211	DICTYNA	108	<i>patagiata</i> CL.	18
<i>piceus</i> (SULZ.)	210	<i>arundinacea</i> (L.)	108	<i>peleg</i> CL.	14
AULONIA	248	<i>latens</i> (FABR.)	109	<i>pinetorum</i> C. K.	11
<i>albinana</i> (WALCK.)	248	<i>uncinata</i> THOR.	110	<i>promincus</i> WESTR.	37
BALLUS	302	<i>variabilis</i> C. K.	111	<i>quadrata</i> (CL.)	16
<i>depressus</i> (WALCK.)	303	<i>vicina</i> SIM.	110	<i>sclopetaria</i> (CL.)	21
<i>Calliethera</i>		DIOTRICÆ	215	<i>sollers</i> (WALCK.)	22
<i>tenera</i> C. K.	299	DIPOENA	81	<i>stellata</i> C. K.	14
CERASTOMA	328	<i>melanogaster</i> (C. K.)	81	<i>umbratica</i> CL.	20
<i>cornutum</i> L.	329	DOLOMEDES	284	<i>Victoria</i> THOR.	24
<i>molluseum</i> L. K.	329	<i>fimbriatus</i> (CL.)	284	EPEIRINAE	6
<i>Cercéis</i>	37	<i>plantarius</i> v. HASSE.	285	EPEIROIDAE	6
CERCIDIA	37	DRASSOIDAE	137	EPIBLEMUM	297
<i>prominens</i> (WESTR.)	37	DRASSUS	165	<i>cingulatum</i> (PANZ.)	299
CHIRACANTHIUM	152	<i>angustifrons</i> WESTR.	172	<i>scenicum</i> (CL.)	297
<i>carnifex</i> (FABR.)	154	<i>ater</i> LATR.	177	<i>tenerum</i> (C. K.)	299
<i>cuniculum</i> O. H.	159	<i>atropos</i> WALCK.	122	EPISINUS	54
<i>efossum</i> O. H.	158	<i>bicolor</i> HAHN.	193	<i>truncatus</i> WALCK.	54
<i>elegans</i> THOR.	156	<i>lapidicola</i> (WALCK.)	170	ERESINAE	291
<i>italicum</i> CANESTR.	153	<i>loricatus</i> L. K.	173	ERESOIDAE	291
<i>nutrix</i> (WALCK.)	156	<i>minusculus</i> L. K.	168	ERESUS	291
<i>Penny</i> CAMBR.	155	<i>pubescens</i> THOR.	174	<i>cinabarinus</i> (OLIV.)	292
<i>rupestre</i> O. H.	157	<i>quadripunctatus</i> (L.)	165	<i>ruficapillus</i> C. K.	293
<i>Ciniplo</i>		<i>rubens</i> WALCK.	166	ERIGONE	70
<i>Erberi</i> KEYS	119	<i>scutulatus</i> L. K.	167	<i>apicata</i> (BLACK.)	71
CITIGRADAЕ	247	<i>troglydites</i> C. K.	170	<i>alticeps</i> (CAMBR.)	70
<i>Olotho</i>		<i>umbratilis</i> L. K.	169	<i>bituberculata</i> (WID.)	73
<i>Durandii</i> WALCK.	107	DYSDERA	202	<i>cornuta</i> (BLACK.)	75
CLUBIONA	142	<i>Cambridgei</i> THOR.	203	<i>dentipalpis</i> (WID.)	72
<i>brevipes</i> BLACKW.	152	<i>longitarsis</i> DOBL.	206	<i>fuscipalpis</i> (C. K.)	76

isabellina (C. K.)	Lap 73	frutetorum C. K.	Lap 62	Merianae (Scop.)	Lap 43
rubens (BLACK.)	74	hortensis SUND.	63	segmentata (CL.)	44
rufipes (L.)	74	leprosa OHL.	68	MICARIA	161
ERO	78	marginata C. K.	58	cineta L. K.	163
laevigata KEYS.	80	montana (CL.)	56	festiva C. K.	160
thoracica (WID.)	78	phrygiana C. K.	60	pulicaria (SUND.)	164
tuberculata (DE GEER)	79	pusilla SUND.	65	radiata L. K.	163
<i>Euophrys</i>	311	Rosenhaneri L. K.	69	Rogenhoferi O. H.	162
farinosa C. K.	315	Thorellii O. H.	69	MICROMMATA	216
festiva C. K.	322	triangularis (CL.)	61	virescens	216
floricola C. K.	320	LIOCRANUM	139	<i>Micryphantas.</i>	
frontalis (WALCK.)	311	domesticum (WID.)	139	fuscipalpis C. K.	76
radiata OHL.	305	Kochii O. H.	140	isabellinus C. K.	73
rupicola C. K.	315	LITHYPHANTES	96	MIMETUS	79
GNAPHOSA	187	corollatus (L.)	97	laevigatus (KEYS.)	80
bicolor (HBN.)	193	Paykullianus (WALCK.)	98	MISUMENA	226
dolosa O. H.	191	<i>Lucia.</i>		truncata (PALL.)	228
exornata (C. K.)	197	germanica C. K.	104	vatia (CL.)	227
fallax O. H.	196	LYCOSA	249	villosa (WALCK.)	229
fumosa (C. K.)	191	albimana WALCK.	248	MONAESSES	223
leporina (L. K.)	192	albofasciata BRUL.	269	cuneolus (C. K.)	224
lucifuga (WALCK.)	188	amentata (CL.)	250	NEMASTOMA	327
lugubris (C. K.)	189	anulata THOR.	257	bimaculatum FABR.	328
molesta O. H.	195	cursor HAHN.	273	Dacicum L. K.	328
montana (L. K.)	198	exornata O. H.	260	flavimanum C. K.	328
nocturna (L.)	198	farinosa O. H.	258	Sillii O. H.	328
opaca O. H.	195	festinans O. H.	259	triste C. K.	328
Schuszeri O. H.	199	infernalis MOTS.	275	NEMESIA	212
soror O. H.	190	Leopardus SUND.	282	pannonica O. H.	212
suspecta O. H.	194	lignaria (CL.)	251	Sauvagesii (DORTH.)	213
HARPACTES	207	lugubris (WALCK.)	252	<i>Neriene</i>	
rubicundus (C. K.)	207	monticola (CL.)	253	apicata BLACKW.	71
saevus O. H.	208	poecila O. H.	258	cornuta BLACKW.	75
<i>Heckerge</i>		prativaga L. K.	256	rubens BLACKW.	74
maculata BLACKW.	137	profuga O. H.	254	NESTICUS	76
HELIOPHANUS	300	proxima C. K.	255	cellulanus (CL.)	76
auratus C. K.	302	radiata LAT.	261	OCYALE	286
cupreus (WALCK.)	300	striatipes DOL.	266	mirabilis (CL.)	286
Kochii SIM.	301	LYCOSOIDAE	248	OPILO	328
HETEROPODOIDAE	216	MARPESSA	304	alpinus HERBST.	330
HISTOPONA	133	Canestrinii PAV.	309	grossipes HERBST.	330
torpida (C. K.)	133	encarpata (WALCK.)	308	instratus L. K.	329
HYPTIOTES	49	inuscosa (CL.)	304	parietinus DE GEER.	329
paradoxus (C. K.)	49	pomatia (WALCK.)	307	pristis L. K.	329
ISCHYROPSALIS	327	radiata (GRUBE.)	305	vorax L. K.	329
Helvegii PANZ.	328	<i>Marpissus.</i>		OPILIONES	327
manicata L. K.	328	monachus SIM.	307	ORBITELARIAE	4
LATERIGRADAЕ	215	pomatius SIM.	307	OXYOPES	287
LEIOBUNUM	327	radiatus SIM.	305	lineatus LATR.	289
bicolor FABR.	338	<i>Melanophora.</i>		ramosus (PANZ.)	288
glabrum L. K.	329	bimaculata C. K.	183	transalpinus (WALCK.)	290
hemisphaericum HERBST	328	conspicua C. K.	183	OXYOPOIDAE	287
nigricans C. K.	327	femella L. K.	182	PACHYGNATHA.	
LEPTORCHESTES	296	longipes L. K.	179	Clerckii SUND.	51
formicaeformis (LUC.)	296	oblonga C. K.	176	De Geerii SUND.	53
LINYPHIA	56	pedestris C. K.	180	Listeri SUND.	53
alaceris BLACK.	67	petrensis C. K.	184	<i>Phalangium.</i>	
alpina O. H.	66	praefica L. K.	178	phaleratum PANZ.	99
alticeps SUND.	65	serotina L. K.	181	PHILAEUS	312
bucculenta (CL.)	57	META	42	chrysops (PODA.)	312
clathrata SUND.	64	Menardii (LATR.)	42	PHILODROMUS	217
emphana (WALCK.)	59	Mengei BLACKW.	45	aureolus (CL.)	218

pellax O. H.	219	sanguinea C. K.	36	quadriguttata (HAHN.)	112
poecilus (THOR.)	220	<i>Sparassus</i>		Schineri J. K.	113
PHOLCINAE	100	<i>ornatus</i> C. K.	217	Veteranica O. H.	113
PHOLCIS	100	<i>Sphassus</i>		THOMISOIDAE	223
Forskåli THOR.	100	<i>transalpinus</i> WALCK.	290	THOMISUS	225
phalangoides (FUES.)	101	STEATODA	92	<i>capparinus</i> C. K.	232
Pinchii (SCOP.)	102	bipunctata (L.)	94	<i>cerinus</i> C. K.	247
PHRYROLITHUS	160	castanea (CL.)	92	<i>devius</i> C. K.	247
festivus C. K.	160	guttata (WID.)	96	<i>lateralis</i> HAHN.	237
Szilyi O. H.	161	triangulosa (WALCK.)	95	onustus WALCK.	225
PHYLLONETHIS	81	TAPINOC'EPHALI	212	<i>robustus</i> HAHN.	242
lineata (CL.)	82	TARENTULA	261	<i>sabulosus</i> HAHN.	238
PLATYLOPHUS	328	albofasciata (BRULL.)	269	<i>Ulni</i> HAHN.	239
alpestris C. K.	329	Cronebergii THOR.	264	<i>villosus</i> WALCK.	229
Pinetorum C. K.	329	cuneta (CL.)	270	<i>Thysa</i>	200
rufipes C. K.	329	cursor (HAHN.)	273	<i>pythonissaeformis</i> KEMP.	230
strigosus L. K.	329	Eichwaldii THOR.	265	TROCHOSA	273
PIRATA	281	inquilina (CL.)	262	cinerea (FABR.)	274
Knorrii (SCOP.)	283	nebulosa THOR.	271	Hungarica O. H.	279
Leopardus (SUND.)	282	pulverulenta (CL.)	271	infernalis (MOTS.)	275
piraticus (CL.)	281	radiata (LATR.)	261	ruricola (DE GEER.)	278
PROSTHESIMA	175	solitaria O. H.	263	stigmiosa THOR.	280
accepta O. H.	186	striatipes (DOL.)	266	terricola THOR.	279
Allionica O. H.	185	trabalis (CL.)	267	TUBITELARIAE	105
atra (LATR.)	177	TEGENARIA	126	ULOBORINAE	48
bimaculata (C. K.)	183	campestris C. K.	128	ULOBORUS	48
calceolata O. H.	180	Derhamii (SCOP.)	127	Walckenaerii LATR.	48
conspicua (L. K.)	183	domestica (CL.)	126	<i>Uptiotes</i>	49
femella (L. K.)	182	TERRITELARIAE	209	UROCTEA	106
longipes (L. K.)	179	TETRAGRATHA	45	Durandii (WALCK.)	107
nigrita (FABR.)	187	<i>chrysochlora</i> SIM.	47	UROCTEOIDAE	106
oblonga (C. K.)	176	extensa (L.)	46	<i>Walckenaera</i>	
pedestris (C. K.)	180	obtusa WESTR.	47	<i>altifrons</i> CAMBR.	70
Petiverii (SCOP.)	175	TEXTRIX	133	XYSTICTUS	233
petrensis (C. K.)	184	denticulata (OLIV.)	134	acerlus THOR.	243
praeifica (L. K.)	178	torpida C. K.	133	bifasciatus C. K.	238
serotina (L. K.)	181	THANATUS	221	cerinus (C. K.)	247
tragica O. H.	185	fornicivius (CL.)	222	cristatus (CL.)	234
<i>Pythonissa</i>		oblongus (WALCK.)	221	<i>cuneolus</i> C. K.	224
<i>erornata</i> C. K.	197	THERAPHOSIDAE	210	<i>devius</i> (C. K.)	244
<i>fumosa</i> C. K.	191	THERATRICA	4	frater O. H.	244
<i>leporina</i> L. K.	192	THERIDIIDAE	51	graeus C. K.	246
<i>lugubris</i> C. K.	189	THERIDIUM	83	horticola C. K.	246
<i>montana</i> L. K.	198	bimaculatum (L.)	91	impavidus THOR.	233
RETITELARIAE	50	<i>bituberculatum</i> REUSS.	73	Kochii THOR.	235
SALTICUS	293	denticulatum (WALCK.)	85	lateralis (HAHN.)	237
formicarius (DE GEER.)	294	<i>dentipalpis</i> WID.	72	luctator L. K.	233
Simonis O. H.	295	Frivaldszkyi O. H.	89	marmoratus THOR.	242
SALTIGRADAЕ	291	formosum (CL.)	84	perogaster THOR.	240
SCYTODES	103	<i>guttatum</i> WID.	96	praticola C. K.	245
thoracica LATR.	103	<i>Pagkullianum</i> WALCK.	98	robustus (HAHN.)	242
SCYTOPINAE	103	pictum (WALCK.)	89	sabulosus (HAHN.)	238
SCYTODOIDAE	100	pulchellum (WALCK.)	91	Ulni (HAHN.)	239
SEGESTRIA	201	<i>pygmaeum</i> SUND.	35	ZILLA	48
senoculata (L.)	201	<i>quadriguttatum</i> HAHN.	112	montana C. K.	49
SINGA	32	riparium (BLACK.)	86	Stroemii THOR.	41
albovittata (WESTR.)	36	sisyphium (CL.)	88	Thorellii ATTS.	40
hamata (CL.)	32	Tepidarium C. K.	83	x-notata (CL.)	48
Herii (HAHN.)	34	thoracicum REUSS.	78	ZOEA	137
Lucina (SAV.)	33	triste (HAHN.)	90	maculata (BL.)	137
nitidula C. K.	33	varians (HAHN.)	87		
pygmaea (SUND.)	35	TITANOECIA	111		

MAGYAR INDEX.

	Lap		Lap		Lap
AKNÁSZOK	212	CSUPASZOK	100	parittyás	250
AKNÁSZPÓK	212	CSUPASZPÓK	103	rétjáró	256
magyar	212	hátas	103	rokon	255
Sauvages	213	DARÓCZPÓK	201	tarka	258
ÁLLASPÓK	45	hatszemu	201	tönk	251
nyújtó	46	DICTYNAPÓK	108	FEJESZPÓKOK	291
zömök	47	buvá	109	FÉNYPÓK	161
ARASZPÓK	49	horgos	110	bolha	164
fűres	49	nádi	108	öves	163
ARGIOPEPÓK.		rokon	110	Rogenhöfer	162
Brünniché	7	változékony	111	sugaras	163
tarajos	6	DIPOENAPÓK	81	POGÓSPÓK	51
BÁNYÁSZPÓK	121	feketehasi	81	Clerck	51
fegyvertelen	123	DÖCZÖGÖPÓK	303	De Geer	53
harmatos	124	lapos	303	Lister	53
remete	125	ERETNEKEK	108	FOJTÓK	201
vaskos	122	ERETNEKPÓK	114	FOJTÓPÓK	202
BIGEÓK	311	ablakos	116	Cambridge	203
homlokos	311	Erber	119	lábás	206
BIKAPÓK	291	fakó	118	Nini	204
skarlát	292	vad	115	Westring	205
vörösféjű	293	zárkozott	117	FÖLDBESZÓVÓK	209
BOKORPÓK	81	ERIGONEPÓK	70	FURAPÓK	286
vonalas	82	fogaskezű	72	csodás	286
BONTÓPÓK	141	fűstöskezű	76	FUTÓK	217
jegyese	141	homlokos	70	GYÁSZPÓK	175
BORZOSOK	106	ikerféjű	73	Allioni	185
BORZPÓK	106	izabellszínű	73	czipós	180
Durand	107	süveges	71	czombos	182
BŰVÁROK	136	szarvas	75	éjjeli	181
BŰVÁRPÓK	136	vöröslábú	74	fekete	177
vizi	136	vöröslő	74	feltűnő	183
BUVÓK	104	EROPÓK	78	fogadott	186
BUVÓPÓK	104	csücskös	79	gyászoló	178
német	104	vaskos	78	hosszukás	176
CSELŐPÓK	273	FAGYÚPÓK	92	hosszúlábú	179
földi	278	cseppes	96	kétpettyes	183
jegyese	280	gesztenyeszínű	92	kormos	187
magyar	279	háromszögös	95	kövi	184
mezei	277	kétpontos	94	lábás	180
pókoli	275	FARKASOK	248	Petiver	175
szürke	274	FARKASPÓK	249	szomorú	185
CSILLÁRPÓK	300	bolygó	254	GYILKOSPÓKOK	291
aranyos	302	diszes	260	HÁLÓZÓK	1
Koch	301	gyászos	252	HÁTASOK	103
rezes	300	gyor	259	PIÚZPÓK	287
változékony	301	gyűrűslábú	257	csíkos	289
CSÓSZÓVÓK	105	hegyi	253	olasz	290
CSÖZÖK	210	lisztes	258	tűskés	288

	Lap		Lap		Lap
HÍUZPÓKOK	287	KENGYELFUTÓPÓK	217	MACSKAPÓK	322
HÍNYÓPÓK	216	aranyos	218	diszes	322
zoldelő	216	esalfa	219	egyszerű	323
HÚROKKÖTŐK	50	ezifra	220	mézes	324
ILLÓK	108	KEREKHÁLÓSOK	4	MARÓPÓK	187
KALITPÓK	142	KERESZTESEK	6	álmok	188
bokor	151	KERESZTESPÓK	8	bajos	195
clütő	150	ál	30	esalékony	191
földi	147	büvös	10	csinos	192
halavány	146	eserje	13	diszes	197
hegyi	144	eresz	21	éjjeli	198
kéklő	148	havasi	28	fura	196
kérgező	142	husalo	19	füstös	191
közönséges	143	koronás	13	gyanus	194
rövidlábú	152	kökény	26	gyászos	189
sárgás	149	márványozott	15	hegyi	198
selymes	145	nádi	17	kétszínű	193
KALOZPÓK	281	négyes	16	komor	195
Knorr	283	nyugtalan	23	Schlusszer	199
párducz	282	óriás	9	festvér	190
rabló	281	öves	18	MARPESSAPÓK	304
KANCSALOK	100	rés	20	almazöld	307
KANCSALPÓK	100	réti	29	Canestrini	309
Forskal	100	teve	12	csikos	305
lábás	101	tök	27	kezes	308
Pluch	102	ügyes	22	molos	304
KAPARÓPÓK	233	vállas	11	MÉTAPÓK	42
bátor	233	viaszos	25	gyűrűs	44
félrejáró	247	Victória	24	Menárd	42
fővenyes	238	KESZEGJÁRÓK	215	Mérián	44
görgő	246	KESZEGPÓK	226	MÉSZPÓK	111
hasas	240	alakoskodó	227	négycseppes	112
kerti	246	borzos	229	Schiner	113
kétesikos	238	vaskos	228	Veterani	113
Koch	235	KEZESPÓK	152	MONAESESPÓK	223
komor	243	csinos	156	ékelt	224
márványozott	242	dajka	156	NYESO PÓK	230
oldalas	237	földi	158	bütykös	230
réti	245	hóhér	154	Kapparisz	232
rokon	244	kövi	157	villás	231
szil	239	olasz	153	ORZÓK	137
tarajos	234	Penny	155	PARASZTPÓK	
vaskos	242	vájó	159	Haglund	135
viaszos	247	KÓBORPÓK	98	PÁRDUCZPÓK	137
KAPÓPÓK	165	ékes	99	tarka	137
barlangi	170	KOSPÓK	248	PHILAEUSPÓK	312
hengeres	167	fehérkezű	248	arany szemű	312
keskenyfejú	172	KOSZÓVOPÓK	96	PÓKOK	
komor	169	koszorús	97	RABLÓPÓK	207
kövi	170	Paykull	98	dühös	208
négygödros	165	KÜLLÓPÓK	30	vöröslő	207
piczi	168	kúpos	31	RÁKPÓK	225
pirosló	166	KÜLLŐSZÓVÓK	6	hasas	225
szőrös	174	LÁBASOK	216	REJTPÓK	129
vértés	173	LATORPÓK	221	kárpáti	129
KAROLÓK	223	hangya	222	SZIKLAPÓK	160
KÁRPITOSPÓK	133	hosszúkás	221	diszes	160
merev	133	LEJTOPÓK	310	Szily	161
KASZÁSPÓKOK	325	kétesikos	310	SENGAPÓK	32
KAZÁRPÓK	139	penészes	311	ékes	33
házi	139	LESÓPÓK	34	fehérjegyű	36
Koch	140	csonka	34	Her	34

	Lap		Lap		Lap
nyilas...	32	fehérdiszű...	269	hátas...	37
törpe...	35	futó...	273	VETŐPÓK...	297
yéres...	36	ködös...	271	öves...	299
SZÍNÉSZPÓK...	79	metzett...	270	színesz...	297
sikos...	80	poros...	271	törpe...	299
SZÖCSKEPÓK...	293	remete...	263	VIDRAPÓK...	284
hangya...	294	sugaras...	261	szegélyes...	284
Simon...	295	szűles...	267	VITORLAPÓK...	56
SZÜKÖK...	293	TÖLCSÉRPÓK...	130	bokor...	62
SZÖKÖPÓK...	313	illó...	131	csinos...	68
bolygó...	321	rokon...	132	czímeres...	59
hozatos...	321	TÖMLŐSÖK...	120	fejes...	65
Brassay...	316	TORKOSPÓK...	48	fürge...	67
fészkes...	318	Walckenaer...	48	háromszöges...	61
íves...	319	TORKOSPÓKOK...	48	havasi...	66
keresztes...	317	TÖRPEHURKOLÓK...	51	hegyi...	56
kőszáli...	315	TÖRPEPÓK...	83	límzett...	60
lisztes...	315	csinos...	91	kerti...	63
sarlós...	314	díszes...	84	piczi...	65
viráglukó...	320	festett...	89	pofás...	57
Waga...	317	Frivaldszky...	89	rácsoszott...	64
SZÖVŐPÓK...	133	fűrészkes...	85	Rosenhauer...	69
fogacsos...	134	gyászos...	90	szegélyes...	58
TAKÁCSPÓK...	76	kétpettyes...	91	Thorell...	69
búvó...	76	parti...	86	ZILLAPÓK...	38
TÁNCZOSPÓK...	296	Sisyphus...	88	hegyi...	39
hangyaalakú...	296	változó...	87	Stroem...	41
TARNAPÓK...	120	viráglázi...	83	Thorell...	40
búvó...	121	TORZOK...	210	x-jegyű...	38
TARENTULAPÓK...	261	TORZPÓK...	210	ZUGPÓK...	126
búvó...	262	szurkos...	210	Derham...	127
csikoslábú...	266	UGRÓK...	291	házi...	126
Croneberg...	264	ÜLDÖZŐK ...	215	mezei...	128
Eichwald...	265	VETÉLPÓK...	37		

JEGYZETEK ÉS IGAZÍTÁSOK.

I. KÖTET.

F. 107. és tovább a »Nevezetesebb lelhelyek« sorozatában néhány pont politikai meghatározása javításra szorúl, u. m. Baziás, Krassó megye; Grebenác, Temesmegye; Illok, Szerémség; Újvidék, Bácsmegye; Pancsova, Torontálmegye; Zimony, Slavonia területeihez tartoznak. Tátrafürednél „Szeges“ helyett *Szepes* teendő.

II. KÖTET.

»Tartalomjegyzék« VII-ik oldal tárgysora és lapjelölése a jelen III-ik kötet »Általános tartalomjegyzéke« szerint kiigazítandó.

III. KÖTET.

A mű első és második kötetében az „*abdomen*“-t magyarul „*potroh*“-nak neveztem; a harmadik kötetben következtessen „*végtest*“-et írtam azért, mert a *potroh* — legalább nézetem szerint — a has túlságát kifejezve még gúnyos értelemben is használatik s azonkívül nyelvértékemnek bizonyos aversiója van ellene.

Ugyan e kötetekben a szövőszerv részeit **karmok** nak neveztem, holott a jelen kötetben **körmök**-nek mondom. Ugy tapasztaltam, hogy a nép e kettőt vegyesen használja s nem áll, a mit némely műszo készítő hisz, hogy t. i. a *karomban* benne van a hegyesség, a *körömben* ellenben a laposság fogalma; tehát *karom* a sasé, *köröm* az emberé.

15. oldal »Spec. 8. Faj.« helyett »Spec. 7. Faj.« teendő s a többi faj sorszáma is ehhez képest kijavítandó.
54. »Episinus alatt »σινεζική« helyett »σινωμα«.
70. »Mértékek: »2.6 $\frac{c}{m}$ « helyett »2.6 $\frac{m}{m}$ «.
72. »Syn. »dentipalpes« helyett »dentipalpis«.
181. »Phyllonethis etym. „νελίς“ helyett „νελίς“.
103. »Scytodes »Syn. 1084« helyett »Syn. 1804«.
109. »»Dict. latens FABR.« helyett »Dict. latens (FABR.)«.
110. »Dict. uncinata THOR. a Syn. mellé »1856« teendő.
129. »Tegen. campestris, lelhelyek »Hliva« helyett »Hlina«.
133. »Textr. torpida C. K. a Syn. mellé »1841« teendő.
137. »»Drassoides« helyett »Drassoidae«, s az etym. megfejtésben „ζράσσομα“ helyett „δράσσομα“.
141. »Diocr. Kochii n. -p. »VI. tábla« helyett »VII. tábla«.

143. oldal »Club. trivialis (L. K.)« helyett »Club. trivialis L. K.«.
147. »»Club. terrestris (WESTR.)« helyett »Club. terrestr. WESTR.«.
149. »»Syn. 1951« helyett »Syn. 1851« teendő.
152. »»Club. brevipes (BLACKW.)« helyett »Club. brevipes BLACKW.«.
155. »Chir. Pennyi (CAMBR.)« helyett »Chir. Pennyi CAMBR.«.
161. »Phrurol. Szilyi: »b ♂« helyett »b ♀«, továbbá a leírás élére ♂ helyett ♀ teendő.
166. »»Drassus rubens (WALCK.)« helyett »Drassus rubens WALCK.«.
175. »Prothesima, etym. megfejtés „πρόση“ helyett „πρόση“.
180. »Prothesima pedestris (C. K.) Az elterjedésről szóló jegyzet annyiban hibás, hogy a faj eredetileg nem Orsovai, hanem Nürnbergi példányokra alapítottatott. Dr. Koch Orsovai példányok után felújította.
181. »7-ik sor, felülről »felső felén« helyett, »alsó felén«.
185. »Prosth. Allionica, mértékek, III lábpár 2 $\frac{m}{m}$ helyett 5 $\frac{m}{m}$ teendő.
186. »Prothesima accepta n. sp. A tábla magyarázatba még »166« betendő.
187. »»Fekete Gy.« helyett »Kormos Gy.« teendő, mivel a »fekete« a 177-ik oldalon már fölhasználott.
190. »Gnaphosa molesta n. sp. Az első sor élére ♂ helyett ♀ teendő.
196. »Gnaphosa opaca: »♂ előttem ismeretlen« helyett »♀ előttem stb.« teendő. Ugyanott 8-ik sor, felülről »szélén« helyett »szélével« teendő.
201. »19-ik sor, felülről, »alsó középsőktől« helyett „alsó szél-sőktől“ teendő.
210. »Micromm. virescens (CL.) Syn. »Aranca« helyett »Aranus« teendő.
223. »Thomisoidae etym. megfejtés „τωμιζω“ helyett „τωμιζω“.
248. »Aulonia etym. megfejtés „αυλώω“ helyett „αυλώω“.
284. »Dolomedes etym. megfejtés „δολομηδής“ helyett „δολομηδής“.
286. »Ocyale etym. megfejtés „οκύαλος“ helyett „οκύαλος“.
293. »Attoidea etym. megfejtés „αττω“ helyett „αττω“.
296. »Leptorchestes etym. megfejtés „λεπτορχήστις“ helyett „λεπτορχήστις“.

Linyphia unguis

152 Linyphia

153 Theridium

154 Tetraneura

155



Cryphaea

156 Lacertum

157 Chloracanthum

158 Chloracanthum

159



Chloracanthum

160 Phrurolithus

161 Micaria

162 Prosthesima

163



Prosthesima

164 Prosthesima

165 Prosthesima

166 Gnaphosa

167



Gnaphosa


168 Gnaphosa


169 Gnaphosa

170 Gnaphosa

171









109



110



FRANKLIN-TÄRSULAT NYOMDÁJA.